

# 附件 2：陕西美力源乳业集团有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 1:



**美力源**  
Meiliyuan

**冲调方法**

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干, 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒, 用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟, 冷却至50-55°C。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉, 请勿压紧专用量勺里的奶粉, 每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶, 摇匀至奶液充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度, 如需一次冲调多餐, 必须将奶液冷藏并在24小时内食用完, 将剩下的奶液弃掉。

**温馨提示:**

1. 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2. 喂奶时应抱着宝宝, 如有确息可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。



国食注字 YP20230202

**营养成分表**

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2107
蛋白质	g	0.55	11.49
脂肪	g	1.31	27.57
亚油酸	g	0.19	4.040
α-亚麻酸	mg	18.15	382.33
碳水化合物	g	2.4	50.64
维生素			
维生素A	μg RE	15	323
维生素D	μg	0.484	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.33
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.72	57.28
维生素K <sub>2</sub>	μg	25	532
维生素B <sub>1</sub>	μg	57	1198
维生素B <sub>2</sub>	μg	18.1	380.6
维生素B <sub>3</sub>	μg	0.109	2.299
烟酸(烟酰胺)	μg	207	4366
叶酸	μg	5.1	107
泛酸	μg	154	3253
维生素C	mg	4.2	87.8
生物素	μg	0.96	20.26
胆碱	mg	6.3	131.8
矿物质			
钠	mg	7.21	152
钾	mg	22	474
铜	μg	15.4	325.3
铁	mg	1.7	36.6
镁	mg	0.17	3.58
锌	μg	0.18	3.897
锰	μg	3.07	64.72
钙	mg	21	444
磷	mg	13	282
碘	μg	4.9	103.5
氯	mg	17	360
硒	μg	0.74	15.52
可选择成分			
肌醇	mg	3.6	75.6
牛磺酸	mg	1.4	29
左旋肉碱	mg	1.8	37.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.3	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	100.1
低聚半乳糖	mg	141.53	2982
低聚果糖	mg	38.87	819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	217.56	4584
乳铁蛋白	mg	1.7	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	6.13	129.18

**喂哺用量建议表**

婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (ml)	奶粉用量 (平均)
0-2周	8-10	30-90	1-3
2周-1月龄	6-7	90-120	3-4
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5-6	120-180	4-6
4-6月龄	5	180-210	6-7

注意: 每平均约4.5克羊奶粉

**配料表**

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇;

维生素: 维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>3</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>5</sub>(钙盐)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱;

矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠。



**美力源®**  
**婴儿配方羊奶粉**  
**(0-6月龄, 1段)**

1

净含量: 108克

陕西美力源乳业集团有限公司

生产者: 陕西美力源乳业集团有限公司

地址: 陕西省咸阳市武功县工业园

电话: 400-600-8670

网址: www.sxmylry.com

生产许可证编号: SC12961043100837

保质期: 24个月

产地: 陕西-咸阳

产品标准代码: GB 10765-2021

产品类别、属性及状态: 婴儿配方乳粉、乳基粉状

生产日期及产品批号见罐底



6 955801 119359

温馨提示:

1. 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

2. 喂奶时应抱着宝宝, 如有确息可能导致宝宝窒息。

3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。

ISO9001 体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP) 体系认证、良好生产规范(GMP) 认证

注: 即食状态下, 每100ml奶液中含有该产品13.5g。

## 标签 2:



### 贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内,每次使用后请盖紧瓶盖,开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示:请勿用微波炉加热,以免烫伤,请遵守说明,按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口,除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例,不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

### 陕西美力源乳业集团有限公司

生产者:陕西美力源乳业集团有限公司  
地址:陕西省咸阳市武功县工业园  
电话:400-600-8670  
网址:www.sxmlyny.com  
生产许可证编号:SC12961043100837  
保质期:24个月  
产地:陕西-咸阳  
产品标准代码:GB 10765-2021  
产品类别、属性及状态:婴儿配方乳粉、乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

### 冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手,将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒,用沸水煮5分钟。
2. 饮用沸水需5分钟,冷却至50-55℃。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉,请勿压紧专用量勺里的奶粉,每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。
6. 第一滴奶在手背测试温度,如第一次冲调多量,必须将奶液冷却并在2小时内食用完,将剩下的奶液弃掉。

### 温馨提示:

1. 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或不用母乳时可使用本产品。
2. 喂奶时请抱着宝宝,如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能影响健康。




# 美力源® 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

国食注字 YP20230202

# 1

净含量:300克

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2107
蛋白质	g	0.55	11.49
脂肪	g	1.31	27.57
亚油酸	g	0.19	4.040
α-亚麻酸	mg	18.15	392.33
碳水化合物	g	2.4	50.64
维生素			
维生素A	μg RE	15	323
维生素D	μg	0.484	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.33
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.72	57.28
维生素B <sub>1</sub>	μg	25	532
维生素B <sub>2</sub>	μg	57	1198
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.1	380.6
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.109	2.299
烟酸(烟酰胺)	μg	207	4366
叶酸	μg	5.1	107
泛酸	μg	154	3253
维生素C	mg	4.2	87.8
生物素	μg	0.96	20.26
胆碱	mg	6.3	131.8
矿物质			
钠	mg	7.21	152
钾	mg	22	474
钙	μg	15.4	325.3
镁	mg	1.7	36.6
铁	mg	0.17	3.58
锌	mg	0.18	3.897
锰	μg	3.07	64.72
铜	mg	21	444
磷	mg	13	282
碘	μg	4.9	103.5
氯	mg	17	360
硒	μg	0.74	15.52
可选择成分			
肌醇	mg	3.6	75.6
牛磺酸	mg	1.4	29
左旋肉碱	mg	1.8	37.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.3	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	100.1
低聚半乳糖	mg	141.53	2982
低聚果糖	mg	38.87	819
1,3-二油酸2-硬脂酸甘油三酯	mg	217.56	4584
乳铁蛋白	mg	1.7	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	6.13	129.18

注:即食状态下,每100ml奶液中会有该产品13.5g。

### 喂哺用量建议表

婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (ml)	奶粉用量 (平均)
0-2周	8-10	90-90	1-3
2周-1月龄	6-7	90-120	3-4
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5-6	120-180	4-6
4-6月龄	5	180-210	6-7

注:为平均的1日总羊奶粉

### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸2-硬脂酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核黄素、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、维生素:维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、矿物质:碳酸钾、磷酸三钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氯化锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠。

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证,危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证,良好生产规范(GMP)认证。

# 标签 3:



### 贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示:请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按照要求对奶嘴和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

### 陕西美力源乳业集团有限公司

生产者:陕西美力源乳业集团有限公司  
地址:陕西省咸阳市武功工业园  
电话:400-600-8670  
网址:www.xmlyry.com  
生产许可证编号:SC12961043100837  
保质期:24个月  
产地:陕西·咸阳  
产品标准代号:GB 10765-2021  
产品类别、属性及状态:婴儿配方乳粉、乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

### 冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手,将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒,用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟,冷却至50-55°C。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉,请勿用专用量勺量的奶粉,每瓶奶粉需要单独量勺。
5. 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。
6. 第一滴奶在手背测试温度,如需一次冲调多餐,必须将奶液冷却并在24小时内食用完,将喂剩下的奶液弃掉。

### 温馨提示:

1. 对于6个月前的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。2. 喂奶时应抱着宝宝,如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。



# 美力源® 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

国食注字 YP 20230202

1  
净含量:708克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2107
蛋白质	g	0.55	11.49
脂肪	g	1.31	27.57
亚油酸	g	0.19	4.040
α-亚油酸	mg	18.15	382.33
碳水化合物	g	2.4	50.64
维生素			
维生素A	μg RE	15	323
维生素D	μg	0.484	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.33
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.72	57.28
维生素B <sub>1</sub>	μg	25	532
维生素B <sub>2</sub>	μg	57	1198
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.1	380.6
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.109	2.299
烟酸(烟酰胺)	μg	207	4366
叶酸	μg	5.1	107
泛酸	μg	154	3253
维生素C	mg	4.2	87.8
生物素	μg	0.96	20.26
胆碱	mg	6.3	131.8
矿物质			
钠	mg	7.21	152
钾	mg	22	474
钙	μg	15.4	325.3
镁	mg	1.7	36.6
铁	mg	0.17	3.58
锌	mg	0.18	3.897
锰	μg	3.07	64.72
铜	mg	21	444
磷	mg	13	282
碘	μg	4.9	103.5
氯	mg	17	360
硒	μg	0.74	15.52
可选择成分			
肌醇	mg	3.6	75.6
牛磺酸	mg	1.4	29
左旋肉碱	mg	1.8	37.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.3	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	100.1
低聚半乳糖	mg	141.53	2982
低聚果糖	mg	38.87	819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	217.56	4584
乳铁蛋白	mg	1.7	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	6.13	129.18

注:即食状态下,每100ml奶液中含有该产品13.5g。

### 喂哺用量建议表

婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量(ml)	奶粉用量(平均)
0-2周	8-10	30-90	1-3
2周-1月龄	6-7	90-120	3-4
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5-6	120-180	4-6
4-6月龄	5	180-210	6-7

注意:每平均约4.5克羊奶粉

### 配料表

生羊乳、脱脂乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、维生素:维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育醇)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、矿物质:碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠。

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证

# 标签 4:



国食注字 YP 20230202



# 美力源® 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

1  
净含量: 800克



### 贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处, 请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用, 未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示: 请勿用微波炉加热, 以免烫伤。请遵守说明, 按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议, 否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

### 陕西美力源乳业集团有限公司

生产者: 陕西美力源乳业集团有限公司  
地址: 陕西省咸阳市武功县工业园  
电话: 400-600-8670  
网址: www.sxmyry.com  
生产许可证编号: SC12961043100837  
保质期: 24个月  
产地: 陕西·咸阳  
产品标准代号: GB 10765-2021  
产品类别、属性及状态: 婴儿配方乳粉、乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

### 冲调方法

1. 冲调奶粉前应将奶瓶洗净并晾干, 将奶瓶、奶嘴、奶嘴盖及器具清洗消毒, 用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟, 冷却至50-55°C。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉, 请勿压紧专用量勺里的奶粉, 每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶, 摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如第一次冲调多量, 必须将奶液冷却并在24小时内食用完毕, 将剩余的奶液丢弃。

### 温馨提示:

1. 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。2. 喂哺时应抱着宝宝, 如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。




营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2107
蛋白质	g	0.55	11.49
脂肪	g	1.31	27.57
亚油酸	g	0.19	4.040
α-亚麻酸	mg	18.15	382.33
碳水化合物	g	2.4	50.64
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	15	323
维生素D	μg	0.484	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.33
维生素K1	μg	2.72	57.28
维生素B1	μg	25	532
维生素B2	μg	57	1198
维生素B3	μg	18.1	380.6
维生素B5	μg	0.109	2.299
烟酸(烟酰胺)	μg	207	4366
叶酸	μg	5.1	107
泛酸	μg	154	3253
维生素C	mg	4.2	87.8
生物素	μg	0.96	20.26
胆碱	mg	6.3	131.8
<b>矿物质</b>			
钠	mg	7.21	152
钾	mg	22	474
铜	μg	15.4	325.3
镁	mg	1.7	36.6
铁	mg	0.17	3.58
锌	mg	0.18	3.897
锰	μg	3.07	64.72
钙	mg	21	444
磷	mg	13	282
碘	μg	4.9	103.5
氯	mg	17	360
硒	μg	0.74	15.52
<b>可选择成分</b>			
肌醇	mg	3.6	75.6
牛磺酸	mg	1.4	29
左旋肉碱	mg	1.8	37.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.3	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	100.1
低聚半乳糖	mg	141.53	2982
低聚果糖	mg	38.87	819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	217.56	4584
乳铁蛋白	mg	1.7	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	6.13	129.18

注: 即食状态下, 每100ml奶液中含有该产品13.5g。

### 喂哺用量建议表

婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (ml)	奶粉用量 (勺勺)
0-2周	8-10	30-90	1-3
2周-1月龄	6-7	90-120	3-4
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5-6	120-180	4-6
4-6月龄	5	180-210	6-7

注: 每勺勺的4.5克奶粉

### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇; 维生素: 维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B3(盐酸吡啶醇)、维生素B5(肌醇)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱; 矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化钾、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硫酸钠。

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证

## 标签 5:



本品含肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、膳食纤维、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、二十二碳六烯酸(DHA)有助于婴儿视力的正常发育,膳食纤维有助于维持正常的肠道功能,膳食纤维是低能量物质。

### 贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示:请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

### 陕西美力源乳业集团有限公司

生产者:陕西美力源乳业集团有限公司

地址:陕西省咸阳市武功县工业园

电话:400-600-8670

网址:www.sxmlyry.com

生产许可证编号:SC12961043100837

保质期:24个月

产地:陕西 咸阳

产品标准代码:GB 10766-2021

产品类别、属性及状态:较大婴儿配方乳粉、乳基粉状

生产日期及产品批号见罐底

### 冲调方法



1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手,将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒,用沸水煮5分钟。



2. 饮用水沸水煮5分钟,冷却至50-55°C。



3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。



4. 使用专用量勺加入奶粉,请勿压紧专用量勺里的奶粉,每瓶奶液需要单独调配。



5. 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。



6. 滴一滴奶在手背测试温度,如需一次冲调多餐,必须将奶液冷藏并在24小时内食用完,将喂剩下的奶液弃掉。

### 温馨提示:

1. 食用本品时须配合添加辅助食品。
2. 喂奶时应抱着宝宝,如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。



# 美力源® 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄,2段)

国食注字 YP20230203

# 2

净含量:108克

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2020
蛋白质	g	0.63	12.69
脂肪	g	1.15	23.26
亚油酸	g	0.17	3.493
α-亚麻酸	mg	16	323
碳水化合物	g	2.7	53.78
维生素			
维生素A	μg RE	19	378
维生素D	μg	0.505	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.3
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.75	55.47
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	536
维生素B <sub>2</sub>	μg	64	1299
维生素B <sub>6</sub>	μg	19.6	395
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.117	2.37
烟酸(烟酰胺)	μg	222	4476
叶酸	μg	5.1	102.2
泛酸	μg	166	3346
维生素C	mg	4.4	88.1
生物素	μg	1.06	21.45
胆碱	mg	6.9	139.9
矿物质			
钠	mg	6.19	125
钾	mg	20	402
铜	μg	16.3	330.2
镁	mg	1.8	36.3
铁	mg	0.25	5.1
锌	mg	0.18	3.61
锰	μg	3.89	78.59
钙	mg	24	480
磷	mg	14	285
碘	μg	5.4	109.3
硒	μg	15	300
氯	μg	0.72	14.49
可选择成分			
肌醇	mg	4.0	80.13
牛磺酸	mg	1.5	31
左旋肉碱	mg	2.0	40.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	100.1
低聚半乳糖	mg	147.62	2982
低聚果糖	mg	40.54	819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	177.13	3578
酸甘油三酯	mg	1.78	35.89
乳铁蛋白	mg	7.01	141.66
酪蛋白磷酸肽	mg	7.01	141.66

注:即食状态下,每100ml奶液中含有该产品13.5g。

### 喂哺用量建议表

较大婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (ml)	奶粉用量 (平勺)
6-9月龄	4-5	180-240	6-8
9-12月龄	4	180-210	6-7

注意:每平勺约4.5克羊奶粉

### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Db-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇;  
维生素:维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱;  
矿物质:碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠。

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证

# 标签 6:

**本品含肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、膳食纤维、1,3-二油酸-2-磷脂酰甘油三酯、十一双六烯酸(DHA)有助于婴儿视力的正常发育,膳食纤维有助于宝宝肠道的清洁排便,膳食纤维是低热量物质。**

**贮存方法**  
请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内,每次使用后请盖紧罐盖,开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

**提示:**请勿用微波炉加热,以免烫伤,请遵守说明,按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按医护人员指示喂哺较大婴儿(或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

陕西美力源乳业集团有限公司

生产者:陕西美力源乳业集团有限公司  
地址:陕西省咸阳市武功县工业园  
电话:400-600-8670  
网址:www.sxmlyry.com  
生产许可证编号:SC12961043100837  
保质期:24个月  
产地:陕西-咸阳  
产品标准代码:GB 10766-2021  
产品类型、属性及状态:较大婴儿配方乳粉、乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

**冲调方法**

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手,将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒,用沸水烫5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟,冷却至50-55℃。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉,请勿压紧专用量勺里的奶粉,每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶,摇晃至奶粉充分溶解。
6. 第一滴奶在手背测试温度,如第一次冲调多量,必须将奶液冷却并在24小时内食用完,将剩下的奶液弃掉。

**温馨提示:**

1. 食用本品时须配合添加辅食。
2. 喂奶时应看着宝宝,如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。




**美力源®**  
**较大婴儿配方羊奶粉**  
**(6-12月龄,2段)**

国食注字 YP20230203

**2**  
净含量:300克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2020
蛋白质	g	0.63	12.69
脂肪	g	1.15	23.26
亚油酸	g	0.17	3.493
α-亚油酸	mg	16	323
碳水化合物	g	2.7	53.78
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	19	378
维生素D	μg	0.505	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.3
维生素K1	μg	2.75	55.47
维生素B1	μg	27	536
维生素B2	μg	64	1259
维生素B3	μg	19.6	395
维生素B6	μg	0.117	2.37
烟酸(烟酰胺)	μg	222	4476
叶酸	μg	5.1	102.2
泛酸	μg	166	3346
维生素C	mg	4.4	88.1
生物素	μg	1.06	21.45
胆碱	mg	6.9	139.9
<b>矿物质</b>			
钠	mg	6.19	125
钾	mg	20	402
钙	μg	16.3	330.2
镁	mg	1.8	36.3
铁	mg	0.25	5.1
锌	μg	0.18	3.61
锰	μg	3.89	78.59
铜	mg	24	480
磷	mg	14	285
碘	μg	5.4	109.3
硒	μg	15	300
氯	μg	0.72	14.49
<b>可选择成分</b>			
肌醇	mg	4.0	80.13
牛磺酸	mg	1.5	31
左旋肉碱	mg	2.0	40.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	100.1
低聚半乳糖	mg	147.62	2982
低聚果糖	mg	40.54	819
1,3-二油酸-2-甘油	mg	177.13	3578
甘油三酯	mg	1.78	35.89
乳铁蛋白	mg	7.01	141.66

注:即食状态下,每100ml奶液中含有该产品13.5g。

**喂哺用量建议表**

较大婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量(ml)	奶粉用量(勺勺)
6-9月龄	4-5	180-240	6-8
9-12月龄	4	180-210	6-7

注:每勺5g(20mL水冲调)

**配料表**

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、维生素:维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(di-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B3(盐酸吡哆醇)、维生素B6(吡哆醇)、维生素C(L-抗坏血酸)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氧化胆碱、矿物质:碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠。

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证,危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证,良好生产规范(GMP)认证

# 标签 7:

本品含肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、维生素E、1,3-二油酸-2-硬脂酰甘油三酯、二十二碳六烯酸(DHA)有助于婴儿视力的正常发育,辅食喂养有助于婴儿正常生长发育功能,辅食纤维促进便秘预防。

**贮存方法**  
请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖,开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

**提示:**请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

**陕西美力源乳业集团有限公司**

生产者:陕西美力源乳业集团有限公司  
地址:陕西省咸阳市武功县工业园  
电话:400-600-8670  
网址:www.sxmyry.com  
生产许可证编号:SC12961043100837  
保质期:24个月  
产地:陕西·咸阳  
产品标准代号:GB 10766-2021  
产品类别、属性及状态:较大婴儿配方乳粉、乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

**冲调方法**

1. 冲调奶粉前应将奶瓶和奶嘴洗净并擦干,将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒,用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟,冷却至50-55°C。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉,请勿压紧专用量勺里的奶粉,每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。
6. 第一滴奶在手背测试温度,如需一次冲调多餐,必须将奶液冷却并在24小时内食用完,将喂剩下的奶液弃掉。

**温馨提示:**

1. 食用本品时须配合添加辅食。
2. 喂奶时应抱着宝宝,如有感冒可能传染给宝宝。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。




# 美力源® 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄,2段)

国食注字 YP 20230203

# 2

净含量:708克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2020
蛋白质	g	0.63	12.69
脂肪	g	1.15	23.26
亚油酸	g	0.17	3.493
α-亚油酸	mg	16	323
碳水化合物	g	2.7	53.78
维生素			
维生素A	μg RE	19	378
维生素D	μg	0.505	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.3
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.75	55.47
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	536
维生素B <sub>2</sub>	μg	64	1299
维生素B <sub>6</sub>	μg	19.6	395
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.117	2.37
烟酸(烟酰胺)	μg	222	4476
叶酸	μg	5.1	102.2
泛酸	μg	166	3346
维生素C	mg	4.4	88.1
生物素	μg	1.06	21.45
胆碱	mg	6.9	139.9
矿物质			
钠	mg	6.19	125
钾	mg	20	402
钙	μg	16.3	330.2
镁	mg	1.8	36.3
铁	mg	0.25	5.1
锌	mg	0.18	3.61
锰	μg	3.89	78.59
铜	mg	24	480
磷	mg	14	285
碘	μg	5.4	109.3
硒	mg	15	300
氯	μg	0.72	14.49
可选择成分			
肌醇	mg	4.0	80.13
牛磺酸	mg	1.5	31
左旋肉碱	mg	2.0	40.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	91.24
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	100.1
低聚半乳糖	mg	147.62	2982
低聚果糖	mg	40.54	819
1,3-二油酸-2-硬脂酰甘油三酯	mg	177.13	3578
乳铁蛋白	mg	1.78	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	7.01	141.66

注:即食状态下,每100ml奶液中含有该产品13.5g。

**喂哺用量建议表**

较大婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (ml)	奶粉用量 (平均)
6-9月龄	4-5	180-240	6-8
9-12月龄	4	180-210	6-7

注意:每平均约4.5克羊奶粉

**配料表**

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-硬脂酰甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核黄素、磷酯、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、维生素:维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育醇)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、矿物质:碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠。

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证

# 标签 8:



本品含肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、膳食纤维、1,3-二甘油酯、特利酸甘三酯、二十二碳六烯酸(DHA)有助于婴幼儿的大脑正常发育,膳食纤维有助于保持正常的肠道功能,膳食纤维是低能量物质。

### 贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖,开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示:请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例。不当的冲泡方式可能会给您的宝宝带来不适。

### 陕西美力源乳业集团有限公司

生产者:陕西美力源乳业集团有限公司  
地址:陕西省咸阳市武功县工业园  
电话:400-600-8670  
网址:www.sxmyry.com  
生产许可证编号:SC12961043100837  
保质期:24个月  
产地:陕西-咸阳  
产品标准代号:GB 10766-2021  
产品类型、属性及状态:较大婴儿配方乳粉、乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

### 冲泡方法

1. 冲泡奶粉前应彻底洗净和擦干手,视奶瓶、奶嘴、奶嘴盖及器具清洗消毒,用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟,冷却至50-55°C。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉,请勿压紧专用量勺里的奶粉,每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶,摇晃至奶粉充分溶解。
6. 将一滴奶在手背测试温度。如果一次冲调多瓶,必须将奶液冷藏并在24小时内食用完,将剩余的奶液弃掉。

### 温馨提示:

1. 食用本品时须配合添加辅食。
2. 喂奶时应抱着宝宝,如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或食用不当可能影响健康。



# 美力源® 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄,2段)

国食注字 YP 20230203

# 2

净含量:800克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2020
蛋白质	g	0.63	12.69
脂肪	g	1.15	23.26
亚油酸	g	0.17	3.493
α-亚麻酸	mg	16	323
碳水化合物	g	2.7	53.78
维生素			
维生素A	μg RE	19	378
维生素D	μg	0.505	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.3
维生素K1	μg	2.75	55.47
维生素B1	μg	27	536
维生素B2	μg	64	1299
维生素B6	μg	19.6	395
维生素B12	μg	0.117	2.37
烟酸(烟酰胺)	μg	222	4476
叶酸	μg	5.1	102.2
泛酸	μg	166	3346
维生素C	mg	4.4	88.1
生物素	μg	1.06	21.45
胆碱	mg	6.9	139.9
矿物质			
钠	mg	6.19	125
钾	mg	20	402
铜	μg	16.3	330.2
镁	mg	1.8	36.3
铁	mg	0.25	5.1
锌	mg	0.18	3.61
锰	μg	3.89	78.59
钙	mg	24	480
磷	mg	14	285
碘	μg	5.4	109.3
氯	mg	15	300
硒	μg	0.72	14.49
可选择成分			
肌醇	mg	4.0	80.13
牛磺酸	mg	1.5	31
左旋肉碱	mg	2.0	40.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	91.24
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	100.1
低聚果糖	mg	147.62	2982
低聚果糖	mg	40.54	819
1,3-二甘油酯-棕榈	mg	177.13	3578
甜甘三酯			
乳铁蛋白	mg	1.78	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	7.01	141.66

注:即食状态下,每100ml奶液中含有该产品13.5g。

喂哺用量建议表			
较大婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (ml)	奶粉用量 (平均)
6-9月龄	4-5	180-240	6-8
9-12月龄	4	180-210	6-7

注:量,指平均每次喂哺奶量。

### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、低聚半乳糖、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇; 维生素:维生素A(β-胡萝卜素)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱; 矿物质:磷酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、磷酸铁、氧化锌、硫酸钾、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠。

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

# 标签 9:



本品含硒、胆碱、锰、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯。

### 贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

### 陕西美力源乳业集团有限公司

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司

地址：陕西省咸阳市武功县工业园

电话：400-600-8670

网址：www.sxmlyry.com

生产许可证编号：SC12961043100837

保质期：24个月

产地：陕西·咸阳

产品标准代号：GB 10767-2021

产品类别、属性及状态：幼儿配方羊奶粉、乳基粉状

生产日期及产品批号见罐底

### 冲调方法



1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。



2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55°C。



3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。



4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。



5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。



6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将剩下的奶液弃掉。

### 温馨提示：

1. 喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。2. 配制不当或使用不当可能会影响健康。



# 美力源® 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

国食注字 YP20230204

# 3

净含量：108克

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1952
蛋白质	g	0.76	14.9
脂肪	g	1.04	20.3
亚油酸	g	0.16	3.161
α-亚麻酸	mg	12.74	248.6
碳水化合物	g	2.8	54
维生素			
维生素A	μg RE	20	392
维生素D	μg	0.523	10.2
维生素E	mg α-TE	0.18	3.46
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.78	54.23
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	531
维生素B <sub>2</sub>	μg	72	1414
维生素B <sub>6</sub>	μg	22.4	436.8
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.121	2.36
烟酸(烟酰胺)	μg	232	4535
叶酸	μg	5.5	107.5
泛酸	μg	174	3392
维生素C	mg	4.5	88.7
生物素	μg	1.25	24.35
矿物质			
钠	mg	7.81	152.4
钾	mg	26	515
铜	μg	17.5	341.6
镁	mg	2.0	38.7
铁	mg	0.26	5.17
锌	mg	0.17	3.28
钙	mg	28	546
磷	mg	17	338
碘	μg	5.2	102.2
氯	mg	22	429
可选择成分			
硒	μg	0.64	12.4
胆碱	mg	7.8	152.8
锰	μg	4.56	88.95
肌醇	mg	4.1	80.7
牛磺酸	mg	1.7	34
左旋肉碱	mg	2.4	47.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	91.24
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.1	100.1
低聚半乳糖	mg	152.77	2982
低聚果糖	mg	41.96	819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	165.34	3227.5
乳铁蛋白	mg	1.84	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	8.00	156.17

注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。

### 喂哺用量建议表

幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (ml)	奶粉用量 (平均)
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注意：每平均约4.5克羊奶粉

### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇；维生素：维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；矿物质：碳酸钙、磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

### 注：生羊乳加工

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证

# 标签 10:

本品含钙、胆碱、镁、肌酸、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯。

**贮存方法**  
请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于水箱内,每次使用后请盖紧罐盖,开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示:请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例,不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

**陕西美力源乳业集团有限公司**

生产者:陕西美力源乳业集团有限公司  
地址:陕西省咸阳市武功县工业园  
电话:400-600-8670  
网址:www.sxmyly.com  
生产许可证编号:SC12961043100837  
保质期:24个月  
产地:陕西-咸阳  
产品标准代码:GB 10767-2021  
产品类别、属性及状态:幼儿配方乳粉、乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

**冲调方法**

- 1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手,将奶瓶、奶嘴、奶嘴盖及器具清洗消毒,用沸水煮沸5分钟。
- 2.饮用水沸水煮沸5分钟,冷却至50-55°C。
- 3.参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
- 4.使用专用量勺加入奶粉,请勿压紧专用量勺里的奶粉,每瓶奶液需要单独调配。
- 5.盖紧奶瓶,摇晃至奶粉充分溶解。
- 6.滴一滴奶在手背测试温度,如需一次冲调多餐,必须将奶液冷藏并在24小时内食用完毕,将喂剩下的奶液弃掉。

**温馨提示:**  
1.喂奶时应抱着宝宝,如有疏忽可能导致宝宝窒息。2.配制不当或使用不当可能会影响健康。




# 美力源® 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)

国食注字 YP20230204

# 3

净含量:300克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1952
蛋白质	g	0.76	14.9
脂肪	g	1.04	20.3
亚油酸	g	0.16	3.161
α-亚麻酸	mg	12.74	248.6
碳水化合物	g	2.8	54
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	20	392
维生素D	μg	0.523	10.2
维生素E	mg α-TE	0.18	3.46
维生素K1	μg	2.78	54.23
维生素B1	μg	27	531
维生素B2	μg	72	1414
维生素B6	μg	22.4	436.8
维生素B12	μg	0.121	2.36
烟酸(烟酰胺)	μg	232	4535
叶酸	μg	5.5	107.5
泛酸	μg	174	3392
维生素C	mg	4.5	88.7
生物素	μg	1.25	24.35
<b>矿物质</b>			
钠	mg	7.81	152.4
钾	mg	26	515
铜	μg	17.5	341.6
镁	mg	2.0	38.7
铁	mg	0.26	5.17
锌	mg	0.17	3.28
钙	mg	28	546
磷	mg	17	338
碘	μg	5.2	102.2
氯	mg	22	429
<b>可选择成分</b>			
硒	μg	0.64	12.4
胆碱	mg	7.8	152.8
锰	μg	4.56	88.95
肌醇	mg	4.1	80.7
牛磺酸	mg	1.7	34
左旋肉碱	mg	2.4	47.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.1	100.1
低聚半乳糖	mg	152.77	2982
低聚果糖	mg	41.96	819
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	165.34	3227.5
酪蛋白	mg	1.84	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	8.00	156.17

注:即食状态下,每100ml奶液中含有该产品13.5g。

**喂哺用量建议表**

幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (ml)	奶粉用量 (平勺)
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注意:每勺约4.5克羊奶粉

**配料表**

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、食用植物油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇; 维生素:维生素A(视黄醇)、维生素B1(硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸)、维生素D(生物素)、氯化胆碱; 矿物质:碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

**注:生羊乳加工**  
本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证

# 标签 11:

本品含钙、胆碱、锰、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1,3-二甘油2-硬脂酸甘油三酯。

### 贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

### 陕西美力源乳业集团有限公司

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司  
地址：陕西省咸阳市武功县工业园  
电话：400-600-8670  
网址：www.xmilyry.com  
生产许可证编号：SC12961043100837  
保质期：24个月  
产地：陕西·咸阳  
产品标准代码：GB 10767-2021  
产品类别、属性及状态：幼儿配方乳粉、乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

### 冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手。将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55°C。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压入专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇晃至奶粉充分溶解。
6. 第一滴奶在手背测试温度。如隔一次冲调多餐，必须将奶冷藏并在24小时内食用完，将喝剩下的奶液弃掉。

### 温馨提示：

1. 喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
2. 配制不当或使用不当可能会影响健康。




# 美力源® 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

国食注字 YP20230204

# 3

净含量：708克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1952
蛋白质	g	0.76	14.9
脂肪	g	1.04	20.3
亚油酸	g	0.16	3.161
α-亚油酸	mg	12.74	248.6
碳水化合物	g	2.8	54
维生素			
维生素A	μg RE	20	392
维生素D	μg	0.523	10.2
维生素E	mg α-TE	0.18	3.46
维生素K	μg	2.78	54.23
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	531
维生素B <sub>2</sub>	μg	72	1414
维生素B <sub>6</sub>	μg	22.4	436.8
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.121	2.36
烟酸(烟酰胺)	μg	232	4535
叶酸	μg	5.5	107.5
泛酸	μg	174	3392
维生素C	mg	4.5	88.7
生物素	μg	1.25	24.35
矿物质			
钠	mg	7.81	152.4
钾	mg	26	515
铜	μg	17.5	341.6
镁	mg	2.0	38.7
铁	mg	0.26	5.17
锌	mg	0.17	3.28
钙	mg	28	546
磷	mg	17	338
碘	μg	5.2	102.2
氯	mg	22	429
可选择成分			
硒	μg	0.64	12.4
胆碱	mg	7.8	152.8
锰	μg	4.56	88.95
肌醇	mg	4.1	80.7
牛磺酸	mg	1.7	34
左旋肉碱	mg	2.4	47.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	91.24
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.1	100.1
低聚半乳糖	mg	152.77	2982
低聚果糖	mg	41.96	819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	165.34	3227.5
乳铁蛋白	mg	1.84	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	8.00	156.17

注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。

### 喂哺用量建议表

幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (ml)	奶粉用量 (平勺)
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注意：每平均勺4.5克羊奶粉

### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇；维生素：维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；矿物质：碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硫酸钠。

注：生羊乳加工

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证

# 标签 12:

本品含钠、胆碱、镁、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1,3-二甘油-2-硬脂酸甘油酯。

### 贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

### 陕西美力源乳业集团有限公司

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司  
地址：陕西省咸阳市武功县工业园  
电话：400-600-8670  
网址：www.sxmyly.com  
生产许可证编号：SC12961043100837  
保质期：24个月  
产地：陕西·咸阳  
产品标准代码：GB 10767-2021  
产品类别、属性及状态：幼儿配方乳粉-乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

### 冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶嘴盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇晃至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多瓶，必须将奶液冷却并在24小时内食用完，将喝剩下的奶液弃掉。

### 温馨提示：

1. 喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。2. 配制不当或使用不当可能会影响健康。




国食注字 YP20230204

# 美力源® 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

# 3

净含量:800克

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1952
蛋白质	g	0.76	14.9
脂肪	g	1.04	20.3
亚油酸	g	0.16	3.161
α-亚麻酸	mg	12.74	248.6
碳水化合物	g	2.8	54
维生素			
维生素A	μg RE	20	392
维生素D	μg	0.523	10.2
维生素E	mg α-TE	0.18	3.46
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.78	54.23
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	531
维生素B <sub>2</sub>	μg	72	1414
维生素B <sub>6</sub>	μg	22.4	436.8
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.121	2.36
烟酸(烟酰胺)	μg	232	4535
叶酸	μg	5.5	107.5
泛酸	μg	174	3392
维生素C	mg	4.5	88.7
生物素	μg	1.25	24.35
矿物质			
钠	mg	7.81	152.4
钾	mg	26	515
铜	μg	17.5	341.6
镁	mg	2.0	38.7
铁	mg	0.26	5.17
锌	mg	0.17	3.28
钙	mg	28	546
磷	mg	17	338
碘	μg	5.2	102.2
氯	mg	22	429
可选择成分			
硒	μg	0.64	12.4
胆碱	mg	7.8	152.8
锰	μg	4.56	88.95
肌醇	mg	4.1	80.7
牛磺酸	mg	1.7	34
左旋肉碱	mg	2.4	47.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.1	100.1
低聚果糖	mg	152.77	2982
低聚乳糖	mg	41.96	819
1,3-二甘油-2-棕榈酸甘油三酯	mg	165.34	3227.5
乳铁蛋白	mg	1.84	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	8.00	156.17

注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。

### 喂哺用量建议表

幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (ml)	奶粉用量 (平均)
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注意：每平均约4.5克羊奶粉

### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二甘油-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、维生素：维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；矿物质：碳酸钙、焦磷酸铁、氯化钾、硫酸铜、硫酸锰、硝酸钾、亚硒酸钠。

注：生羊乳加工

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证

# 标签 13:



**贮存方法**

请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

**提示:**请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

**陕西美力源乳业集团有限公司**

生产者:陕西美力源乳业集团有限公司  
地址:陕西省咸阳市武功县工业园  
电话:400-600-8670  
网址:www.sxmlyr.com  
生产许可证编号:SC12961043100837  
保质期:24个月  
产地:陕西·咸阳  
产品标准代码:GB 10765-2021  
产品类别、属性及状态:婴儿配方乳粉、乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

- 冲调方法**
1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手,将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒,用沸水煮5分钟。
  2. 饮用沸水煮5分钟,冷却至50-55°C。
  3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
  4. 使用专用量勺加入奶粉,请勿压紧专用量勺里的奶粉,每瓶奶液需要单独调配。
  5. 盖紧奶瓶,摇晃至奶粉充分溶解。
  6. 滴一满奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐,必须将奶液冷藏并在24小时内食用完,将喂剩下的奶液弃掉。

**温馨提示:**

1. 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳;在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2. 喂奶时应抱着宝宝,如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。



## 爱优素®

国食注字 YP20230205



# 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

净含量: 108克

**营养成分表**

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2105
蛋白质	g	0.53	11.25
脂肪	g	1.30	27.45
亚油酸	g	0.19	4.049
α-亚麻酸	mg	16.91	356
碳水化合物	g	2.4	51
维生素			
维生素A	μg RE	15	322
维生素D	μg	0.485	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.33
维生素K1	μg	2.72	57.28
维生素B1	μg	25	532
维生素B2	μg	57	1199
维生素B6	μg	18.0	379.4
维生素B12	μg	0.110	2.305
烟酸(烟酰胺)	μg	208	4371
叶酸	μg	5.1	106.8
泛酸	μg	155	3258
维生素C	mg	4.2	87.8
生物素	μg	0.96	20.19
胆碱	mg	6.3	131.7
矿物质			
钠	mg	7.17	151
钾	mg	22	471
铜	μg	15.4	325.1
镁	mg	1.7	36.3
铁	mg	0.17	3.58
锌	mg	0.18	3.89
锰	μg	3.06	64.44
钙	mg	21	440
磷	mg	13	279
碘	μg	4.9	103.1
氯	mg	17	356
硒	μg	0.74	15.51
可选择成分			
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.3	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	100.1
低聚半乳糖	mg	141.66	2982
低聚果糖	mg	38.91	819
1,3-二油酸2-硬脂酸甘油三酯	mg	217.48	4578
叶黄素	μg	3.25	68.47
核苷酸	mg	1.4	29.57
乳铁蛋白	mg	1.71	35.89

注:即食状态下,每100ml奶液中含有该产品13.5g。

**喂哺用量建议表**

婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (mL)	奶粉用量 (平勺)
0-2周	8-10	30-90	1-3
2周-1月龄	6-7	90-120	3-4
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5-6	120-180	4-6
4-6月龄	5	180-210	6-7

注意:每平勺约4.5克羊奶粉

**配料表**

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸2-硬脂酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、磷脂、乳铁蛋白、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素; 维生素:维生素A(视黄醇)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B12(盐酸钴胺素)、维生素B3(烟酰胺)、维生素B5(泛酸)、维生素B7(生物素)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱; 矿物质:磷酸三钙、碳酸钾、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠。

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证

# 标签 14:



**贮存方法**

请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖,开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

**提示:**请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

**陕西美力源乳业集团有限公司**

生产者:陕西美力源乳业集团有限公司  
地址:陕西省咸阳市武功县工业园  
电话:400-600-8670  
网址:www.sxmyly.com  
生产许可证编号:SC12961043100837  
保质期:24个月  
产地:陕西 咸阳  
产品标准代号:GB 10765-2021  
产品类别、属性及状态:婴儿配方乳粉,乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

**冲调方法**

- 1.冲调奶粉前应彻底洗净和晾干手,将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒,用沸水煮5分钟。
- 2.饮用水沸水煮5分钟,冷却至50-55°C。
- 3.参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
- 4.使用专用量勺加入奶粉,请勿用家专用量勺量的奶粉,每瓶奶液需要单独调配。
- 5.盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。
- 6.将一食指在手背测试温度,如第一次冲调多量,必须将奶液冷藏并在24小时内食用完,将喂剩下的奶液弃掉。

**温馨提示:**

1.对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。2.喂奶时应注意卫生,如母乳量可能受宝宝情绪影响。3.喂奶时应当使用不当可能会影响健康。



## 爱优素®

国食注字 YP 20230205



# 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

# 1

净含量:300克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2105
蛋白质	g	0.53	11.25
脂肪	g	1.30	27.45
亚油酸	g	0.19	4.049
α-亚麻酸	mg	16.91	356
碳水化合物	g	2.4	51
维生素			
维生素A	μg RE	15	322
维生素D	μg	0.485	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.33
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.72	57.28
维生素B <sub>1</sub>	μg	25	532
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	1199
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.0	379.4
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.110	2.305
烟酸(烟酰胺)	μg	208	4371
叶酸	μg	5.1	106.8
泛酸	μg	155	3258
维生素C	mg	4.2	87.8
生物素	μg	0.96	20.19
胆碱	mg	6.3	131.7
矿物质			
钠	mg	7.17	151
钾	mg	22	471
钙	μg	15.4	325.1
镁	mg	1.7	36.3
铁	mg	0.17	3.58
锌	mg	0.18	3.89
锰	μg	3.06	64.44
铜	μg	21	440
钴	mg	13	279
碘	μg	4.9	103.1
硒	mg	17	356
砷	μg	0.74	15.51
可选择成分			
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.3	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	100.1
低聚半乳糖	mg	141.66	2982
低聚果糖	mg	38.91	819
1,3-二油酸2-硬脂酸甘油三酯	mg	217.48	4578
叶黄素	μg	3.25	68.47
核苷酸	mg	1.4	29.57
乳铁蛋白	mg	1.71	35.89

喂哺用量建议表				
婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (ml)	奶粉用量 (平均)	
0-2周	8-10	30-90	1-3	
2周-1月龄	6-7	90-120	3-4	
1-2月龄	5-6	120	4	
2-4月龄	5-6	120-180	4-6	
4-6月龄	5	180-210	6-7	

注意:每平均约4.5克羊奶粉

**配料表**

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸2-硬脂酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、磷脂、乳铁蛋白、核苷酸、维生素D、二氧钠、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠)、叶黄素、维生素A(维生素A(醋酸视黄醇))、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、矿物质:磷酸三钙、磷酸钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸铁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚磷酸钠。

本企业已通过质量管理体系(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证

注:即食状态下,每100ml奶液中含有该产品13.5g。

# 标签 15:



## 爱优素®

国食注字 YP 20230205



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2105
蛋白质	g	0.53	11.25
脂肪	g	1.30	27.45
亚油酸	g	0.19	4.049
α-亚麻酸	mg	16.91	356
碳水化合物	g	2.4	51
维生素			
维生素A	μg RE	15	322
维生素D	μg	0.485	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.33
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.72	57.28
维生素B <sub>1</sub>	μg	25	532
维生素B <sub>2</sub>	μg	57	1199
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.0	379.4
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.110	2.305
烟酸(烟酰胺)	μg	208	4371
叶酸	μg	5.1	106.8
泛酸	μg	155	3258
维生素C	mg	4.2	87.8
生物素	μg	0.96	20.19
胆碱	mg	6.3	131.7
矿物质			
钠	mg	7.17	151
钾	mg	22	471
铜	μg	15.4	325.1
镁	mg	1.7	36.3
铁	mg	0.17	3.58
锌	mg	0.18	3.89
锰	μg	3.06	64.44
钙	mg	21	440
磷	mg	13	279
碘	μg	4.9	103.1
硒	μg	17	356
氯	mg	0.74	15.51
可选择成分			
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.3	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	100.1
低聚半乳糖	mg	141.66	2982
低聚果糖	mg	38.91	819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	217.48	4578
叶黄素	μg	3.25	68.47
核黄素	mg	1.4	29.57
乳铁蛋白	mg	1.71	35.89

喂哺用量建议表			
婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (ml)	奶粉用量 (平均)
0-2月龄	8-10	30-90	1-3
2月-1月龄	6-7	90-120	3-4
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5-6	120-180	4-6
4-6月龄	5	180-210	6-7

注意: 每勺平均约4.5克奶粉

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核黄素、磷脂、乳铁蛋白、柠檬酸钙、磷酸二氢钠、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素;	
维生素: 维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>12</sub> (氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱;	
矿物质: 硫酸三钙、磷酸钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸锌、氯化锌、硫酸铜、硫酸铁、磷酸铁、氯化钾、硫酸钾、硫酸钠、亚硫酸钠。	

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证

注: 即食状态下, 每100ml奶液中含有该产品13.5g。



爱优素®

**贮存方法**  
请将本产品置于阴凉干燥处, 请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用。未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

**提示:** 请勿用微波炉加热, 以免烫伤。请遵守说明, 按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议, 否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

**陕西美力源乳业集团有限公司**  
生产者: 陕西美力源乳业集团有限公司  
地址: 陕西省咸阳市武功县工业园  
电话: 400-600-8670  
网址: www.xmlyry.com  
生产许可证编号: SC12961043100837  
保质期: 24个月  
产地: 陕西·咸阳  
产品标准代号: GB 10765-2021  
产品分类、属性及状态: 婴儿配方乳粉、乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

- 冲调方法**
1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手, 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒, 用沸水煮5分钟。
  2. 饮用水沸水煮5分钟, 冷却至50-55℃。
  3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
  4. 使用专用量勺加入奶粉, 请勿压紧专用量勺里的奶粉, 每瓶奶液需要单独调配。
  5. 盖紧奶瓶, 摇晃至奶粉充分溶解。
  6. 请一喂奶在手背测试温度, 如能一次冲调多量, 必须将奶液冷藏并在24小时内食用完, 将喝剩下的奶液扔掉。

**温馨提示:**  
1. 对于0-6月龄的婴儿, 最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可用本产品。2. 喂奶时应抱着宝宝, 如有疑问请咨询医生、药师, 如服用不当或服用不当可能会影响健康。



# 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

净含量: 800克

# 标签 16:

本品含二十二碳六烯酸(DHA)、膳食纤维、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚糖、膳食纤维有助于维持正常肠道菌群。二十二碳六烯酸(DHA)有助于视力的正常发育。

## 贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示:请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺较大婴儿,或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

## 陕西美力源乳业集团有限公司

生产者:陕西美力源乳业集团有限公司  
地址:陕西省咸阳市武功县工业园  
电话:400-600-8670  
网址:www.sxmyry.com  
生产许可证编号:SC12961043100837  
保质期:24个月  
产地:陕西 咸阳  
产品标准代号:GB 10766-2021  
产品类别、属性及状态:较大婴儿配方乳粉、乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

### 冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手,将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒,用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟,冷却至50-55°C。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉,请勿压紧专用量勺里的奶粉,每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐,必须将奶液冷藏并在24小时内食用完,将喝剩下的奶液弃掉。

温馨提示:  
1. 食用本产品时须配合添加辅食。  
2. 喂哺时应看着宝宝,如有迹象可能導致宝宝窒息。  
3. 食用不当或使用不当可能会影响健康。



# 爱优素®

国食注字 YP20230206



# 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

净含量:108克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2033
蛋白质	g	0.61	12.34
脂肪	g	1.17	23.86
亚油酸	g	0.18	3.601
α-亚油酸	mg	16.18	329
碳水化合物	g	2.6	53.5
维生素			
维生素A	μg RE	19	378
维生素D	μg	0.50	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.31
维生素K1	μg	2.75	55.85
维生素B1	μg	26	536
维生素B2	μg	63	1290
维生素B6	μg	19.4	393.7
维生素B12	μg	0.116	2.363
烟酸(烟酰胺)	μg	220	4465
叶酸	μg	5.0	102.1
泛酸	μg	164	3338
维生素C	mg	4.3	88.1
生物素	μg	1.05	21.34
胆碱	mg	6.8	139.2
矿物质			
钠	mg	6.10	124
钾	mg	20	398
铜	μg	16.2	329.8
镁	mg	1.8	36
铁	mg	0.25	5.1
锌	mg	0.16	3.28
锰	μg	3.85	78.26
钙	mg	23	477
磷	mg	14	283
碘	μg	5.4	108.8
氯	mg	15	297
硒	μg	0.71	14.47
可选择成分			
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.9	100.1
低聚乳糖	mg	146.68	2982
低聚果糖	mg	40.29	819
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	175.80	3574
叶黄素	μg	8.98	182.58
核苷酸	mg	1.52	30.83
乳铁蛋白	mg	1.77	35.89

注:即食状态下,每100ml奶液中含有该产品13.5g。

### 喂哺用量建议表

较大婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (ml)	奶粉用量 (平勺)
6-9月龄	4-5	180-240	6-8
9-12月龄	4	180-210	6-7

注意:每平勺约4.5克羊奶粉

### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、磷脂、乳铁蛋白、柠檬酸钙、磷酸二氢钠、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素、维生素:维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱;  
矿物质:磷酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氯化钾、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠。

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证

# 标签 17:



本品含二十二碳六烯酸(DHA)、膳食纤维、1,3-二油酸-2-棕榈酰甘油三酯。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。二十二碳六烯酸(DHA)有助于婴儿脑力的正常发育。

### 贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖,开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示:请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按照要求对奶嘴和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺较大婴儿(或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例,不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

### 陕西美力源乳业有限公司

生产者:陕西美力源乳业有限公司  
地址:陕西省咸阳市武功县工业园  
电话:400-600-8670  
网址:www.sxmyry.com  
生产许可证编号:SC12961043100837  
保质期:24个月  
产地:陕西·咸阳  
产品标准代号:GB 10766-2021  
产品类型、属性及状态:较大婴儿配方乳粉,乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

### 冲调方法

- 1.冲调奶粉前应将底盖洗净并擦干,将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒,用沸水煮5分钟。
- 2.饮用水沸水煮5分钟,冷却至50-55°C。
- 3.参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
- 4.使用专用量勺加入奶粉,请勿压紧专用量勺里的奶粉,每匙奶粉需要单独调匀。
- 5.盖紧奶瓶,摇晃至奶粉充分溶解。
- 6.滴一茶匙在手背测试温度,如隔一次冲调多者,必须将奶液冷藏并在24小时内食用完,冲调剩下的奶液扔掉。

### 温馨提示:

- 1.食用本品时请配合添加辅食。
- 2.请勿向冲调后的宝宝,如有任何可能导致宝宝窒息。
- 3.配奶不当或使用不当可能会影响健康。



## 爱优素®

国食注字 YP 20230206



# 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

净含量:300克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2033
蛋白质	g	0.61	12.34
脂肪	g	1.17	23.86
亚油酸	g	0.18	3.601
α-亚麻酸	mg	16.18	329
碳水化合物	g	2.6	53.5
维生素			
维生素A	μg RE	19	378
维生素D	μg	0.50	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.31
维生素K1	μg	2.75	55.85
维生素B1	μg	26	536
维生素B2	μg	63	1290
维生素B6	μg	19.4	393.7
维生素B12	μg	0.116	2.363
烟酸(烟酰胺)	μg	220	4465
叶酸	μg	5.0	102.1
泛酸	μg	164	3338
维生素C	mg	4.3	88.1
生物素	μg	1.05	21.34
胆碱	mg	6.8	139.2
矿物质			
钠	mg	6.10	124
钾	mg	20	398
铜	μg	16.2	329.8
铁	mg	1.8	36
镁	mg	0.25	5.1
锌	mg	0.16	3.28
锰	μg	3.85	78.26
钙	mg	23	477
磷	mg	14	283
碘	μg	5.4	108.8
氯	mg	15	297
硒	μg	0.71	14.47
可选择成分			
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.9	100.1
低聚半乳糖	mg	146.68	2982
低聚果糖	mg	40.29	819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	175.80	3574
胆钙三醇	μg	8.98	182.58
叶黄素	mg	1.52	30.83
核黄素	mg	1.77	35.89

注:即食状态下,每100m奶液中含有该产品13.5g。

### 喂哺用量建议表

较大婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (mL)	奶粉用量 (平均)
6-9月龄	4-5	180-240	6-8
9-12月龄	4	180-210	6-7

注意:每平勺约4.5克羊奶粉

### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酰甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、磷脂、乳铁蛋白、柠檬酸钙、磷酸二氢钠、核黄素(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素;

维生素:维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱;

矿物质:碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氯化钾、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠。

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证

# 标签 18:



## 爱优素<sup>®</sup>

国食注字 YP 20230206



本品含二十二碳六烯酸(DHA)、膳食纤维、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸、膳食纤维有助于维持正常的肠道菌群平衡、二十二碳六烯酸(DHA)有助于婴儿脑力的正常发育。

### 贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内,每次使用后请盖紧罐盖,开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示:请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例,不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

陕西美力源乳业有限公司  
生产者:陕西美力源乳业有限公司  
地址:陕西省咸阳市武功县工业园  
电话:400-600-8670  
网址:www.sxmyly.com  
生产许可证编号:SC12961043100837  
保质期:24个月  
产地:陕西·咸阳  
产品标准代号:GB 10766-2021  
产品类型、属性及状态:较大婴儿/配方乳粉、乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

### 冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手,将奶瓶、奶嘴、奶嘴盖及器具清洗干净,用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟,冷却至50-55°C。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉,请勿压紧专用量勺里的奶粉,每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度,如需一次冲调多瓶,必须将奶液冷却并在24小时内食用完,将剩余的奶液弃掉。

### 温馨提示:

1. 食用本品时须配合添加辅食。
2. 喂奶时应看着宝宝,如有异常可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。



# 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段) 2

净含量: 800克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2033
蛋白质	g	0.61	12.34
脂肪	g	1.17	23.86
亚油酸	g	0.18	3.601
α-亚麻酸	mg	16.18	329
碳水化合物	g	2.6	53.5
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	19	378
维生素D	μg	0.50	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.31
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.75	55.85
维生素B <sub>1</sub>	μg	26	536
维生素B <sub>2</sub>	μg	63	1290
维生素B <sub>6</sub>	μg	19.4	393.7
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.116	2.363
烟酸(如烟酰胺)	μg	220	4465
叶酸	μg	5.0	102.1
泛酸	μg	164	3338
维生素C	mg	4.3	88.1
生物素	μg	1.05	21.34
胆碱	mg	6.8	139.2
<b>矿物质</b>			
钠	mg	6.10	124
钾	mg	20	398
钙	μg	16.2	329.8
镁	mg	1.8	36
铁	mg	0.25	5.1
锌	mg	0.16	3.28
锰	μg	3.85	78.26
铜	mg	23	477
磷	mg	14	283
碘	μg	5.4	108.8
氯	mg	15	297
硒	μg	0.71	14.47
<b>可选择成分</b>			
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	91.24
二十碳四烯酸(AARA)	mg	4.9	100.1
低聚半乳糖	mg	146.68	2982
低聚果糖	mg	40.29	819
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	175.80	3574
叶黄素	μg	8.98	182.58
核苷酸	mg	1.52	30.83
乳铁蛋白	mg	1.77	35.89

注:即食状态下,每100ml奶液中含有该产品13.5g。

喂哺用量建议表			
较大婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (ml)	奶粉用量 (平均)
6-9月龄	4-5	180-240	6-8
9-12月龄	4	180-210	6-7

注意: 每平均约4.5克羊奶粉

配料表
生牛乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、磷脂、乳铁蛋白、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素;
维生素: 维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>12</sub> (氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱;
矿物质: 碳酸钾、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氯化钾、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚磷酸钠。

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证

# 标签 19:



## 爱优素®

国食注字 YP20230207



**本品含钙、胆碱、镁、膳食纤维、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、核甘糖、膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。**

**贮存方法**  
请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

**提示:**请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

**陕西美力源乳业集团有限公司**  
生产者: 陕西美力源乳业集团有限公司  
地址: 陕西省咸阳市武功县工业园  
电话: 400-600-8670  
网址: www.sxmyry.com  
生产许可证编号: SC12961043100837  
保质期: 24个月  
产地: 陕西 咸阳  
产品标准代码: GB 10767-2021  
产品类别、属性及状态: 幼儿配方乳粉、乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

- 冲调方法**
1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
  2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。
  3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
  4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
  5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
  6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喝剩下的奶液弃掉。

**温馨提示:**  
1. 喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。  
2. 配奶不当或使用不当可能会影响健康。



**营养成分表**

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1952
蛋白质	g	0.75	14.68
脂肪	g	1.04	20.3
亚油酸	g	0.16	3.128
α-亚麻酸	mg	12.48	243.68
碳水化合物	g	2.8	54.27
维生素			
维生素A	μg RE	20	393
维生素D	μg	0.523	10.2
维生素E	mg α-TE	0.18	3.46
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.78	54.23
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	532
维生素B <sub>2</sub>	μg	73	1418
维生素B <sub>6</sub>	μg	22.4	437.2
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.121	2.364
烟酸(烟酰胺)	μg	233	4541
叶酸	μg	5.5	107.6
泛酸	μg	174	3397
维生素C	mg	4.5	88.7
生物素	μg	1.25	24.39
矿物质			
钠	mg	7.84	153
钾	mg	26	516
铜	μg	17.5	341.8
镁	mg	2.0	38.8
铁	mg	0.26	5.17
锌	mg	0.17	3.28
钙	mg	28	546
磷	mg	17	339
碘	μg	5.2	102.3
氯	mg	22	430
可选择成分			
硒	μg	0.64	12.41
胆碱	mg	7.8	153.1
锰	μg	4.56	89.05
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.1	100.1
低聚果糖	mg	152.77	2982
低聚果糖	mg	41.96	819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	165.47	3230
叶黄素	μg	9.35	182.58
核黄素	mg	1.64	32.07
乳铁蛋白	mg	1.84	35.89

**喂哺用量建议表**

幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (ml)	奶粉用量 (平均)
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注: 每平均约4.5克羊奶粉

**配料表**  
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、食用植物油和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、磷脂、乳铁蛋白、柠檬酸、磷酸二氢钠、核甘糖(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素、维生素: 维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、核黄素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱; 矿物质: 硫酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠。

**注: 生羊乳加工**  
本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证

# 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段) 3

净含量: 108克

注: 即食状态下, 每100ml奶液中含有该产品13.5g。

# 标签 20:

**营养成分** 脂肪、糖、膳食纤维、DHA、ARA、核苷酸、益生元、益生菌、乳铁蛋白、乳脂球膜、膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。

**贮存方法**  
请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

**提示:** 请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

**陕西美力源乳业有限公司**  
生产者: 陕西美力源乳业有限公司  
地址: 陕西省咸阳市武功县工业园  
电话: 400-600-8670  
网址: www.sxmyly.com  
生产许可证编号: SC12961043100837  
保质期: 24个月  
产地: 陕西 咸阳  
产品标准代码: GB 10767-2021  
产品类别、属性及状态: 幼儿配方乳粉、乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

**冲调方法**

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶嘴、奶嘴、奶嘴盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55°C。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇晃至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如果一次冲调多瓶，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将瓶剩下的奶液弃掉。

**温馨提示:**  
1. 请按时给宝宝喂奶，如有疏忽可能导致宝宝窒息。  
2. 配制不当或使用不当可能会影响健康。



国食注字 YP20230207

# 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段) 3 净含量: 300克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1952
蛋白质	g	0.75	14.68
脂肪	g	1.04	20.3
亚油酸	g	0.16	3.128
α-亚油酸	mg	12.48	243.68
碳水化合物	g	2.8	54.27
维生素			
维生素A	μg RE	20	393
维生素D	μg	0.523	10.2
维生素E	mg α-TE	0.18	3.46
维生素K1	μg	2.78	54.23
维生素B1	μg	27	532
维生素B2	μg	73	1418
维生素B4	μg	22.4	437.2
维生素B5	μg	0.121	2.364
烟酸(烟酰胺)	μg	233	4541
叶酸	μg	5.5	107.6
泛酸	μg	174	3397
维生素C	mg	4.5	88.7
生物素	μg	1.25	24.39
矿物质			
钠	mg	7.84	153
钾	mg	26	516
铜	μg	17.5	341.8
镁	mg	2.0	38.8
铁	mg	0.26	5.17
锌	mg	0.17	3.28
钙	mg	28	546
磷	mg	17	339
碘	μg	5.2	102.3
氯	mg	22	430
可选择成分			
胆碱	μg	0.64	12.41
胆碱	mg	7.8	153.1
锰	μg	4.56	89.05
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.1	100.1
低聚半乳糖	mg	152.77	2982
低聚果糖	mg	41.96	819
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	165.47	3230
叶黄素	μg	9.35	182.58
核苷酸	mg	1.64	32.07
乳铁蛋白	mg	1.84	35.89

注: 即食状态下, 每100ml奶液中含有该产品13.5g。

喂哺用量建议表			
幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (ml)	奶粉用量 (平均)
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注意: 每平均约4.5克羊奶粉

**配料表**  
生牛乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、食用植物油和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、磷脂、乳铁蛋白、柠檬酸钙、磷酸二氢钠、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素; 维生素: 维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B4(盐酸吡哆醇)、维生素B5(d-泛酸)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱; 矿物质: 碳酸钙、焦磷酸钙、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、磷酸钾、亚硒酸钠。

**注: 生牛乳加工**  
本企业已通过质量管理体系(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证

# 标签 21:



## 爱优素®

国食注字 YP20230207



本品含钙、胆碱、镁、膳食纤维、1,3-二甘油-2-棕榈酸甘油三角、核苷酸。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。

**贮存方法**  
请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖，开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

**提示:**请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

**陕西美力源乳业集团有限公司**  
生产者:陕西美力源乳业集团有限公司  
地址:陕西省咸阳市武功县工业园  
电话:400-600-8670  
网址:www.sxmyry.com  
生产许可证编号:SC12961043100837  
保质期:24个月  
产地:陕西·咸阳  
产品标准代号:GB 10767-2011  
产品类别、属性及状态:幼儿配方奶粉、乳基粉状  
生产日期及产品批号见罐底

**冲调方法**

1. 冲调奶粉前应将双手洗净和擦干，将奶瓶、奶嘴、奶桶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度，如需一次冲调多瓶，必须将奶液冷却并在24小时内食用完，将剩余的奶液弃掉。

**温馨提示:**  
1. 请勿将奶粉喂给宝宝，如有疑问请咨询致宝宝电话。  
2. 配制不当或使用不当可能会影响健康。



# 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

净含量: 800克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1952
蛋白质	g	0.75	14.68
脂肪	g	1.04	20.3
亚油酸	g	0.16	3.128
α-亚麻酸	mg	12.40	243.69
碳水化合物	g	2.8	54.27
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	20	393
维生素D	μg	0.523	10.2
维生素E	μg	0.18	3.46
维生素K1	mg α-TE	2.78	54.23
维生素B1	μg	27	532
维生素B2	μg	73	1418
维生素B3	μg	22.4	437.2
维生素B5	μg	0.121	2.364
维生素B6	μg	233	4541
烟酸(烟酰胺)	μg	5.5	107.6
叶酸	μg	174	3397
维生素C	mg	4.5	88.7
生物素	μg	1.25	24.39
<b>矿物质</b>			
钠	mg	7.84	153
钾	mg	26	516
钙	μg	17.5	341.8
镁	mg	2.0	38.8
铁	mg	0.26	5.17
锌	mg	0.17	3.28
铜	mg	28	546
磷	mg	17	339
碘	μg	5.2	102.3
硒	mg	22	430
<b>可选择成分</b>			
碘	μg	0.64	12.41
胆碱	mg	7.8	153.1
锰	μg	4.56	89.05
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.1	100.1
低聚半乳糖	mg	152.77	2982
低聚果糖	mg	41.96	819
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三角	mg	165.47	3230
叶黄素	μg	9.35	182.58
核苷酸	mg	1.64	32.07
乳铁蛋白	mg	1.84	35.89

注:即食状态下,每100ml奶液中会有该产品13.5g。


喂哺用量建议表			
幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (ml)	奶粉用量 (平勺)
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注意: 每平勺约4.5克羊奶粉

**配料表**  
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、食用植物油和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三角、低聚果糖、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、核桃油、磷脂、乳铁蛋白、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素、维生素:维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(di-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B3(盐酸吡哆醇)、维生素B5(葡糖胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱; 矿物质:碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠。

**注:生羊乳加工**  
本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证

标签 22 (盖贴):



美力源系列：  
108g、300g、708g  
和 800g 所有包装  
通田

标签 23 (盖贴):



爱优素系列：  
108g、300g 和  
800g 所有包装  
通用