

# 附件2: 陕西秦龙乳业集团有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息 标签1

258.1x109.5mm 2023050309

### 奶具消毒及冲泡喂养方法

- 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。
- 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40℃-45℃。
- 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
- 参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的奶粉。
- 将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。
- 在为宝宝喂养奶粉前，请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温，温度适宜即可喂哺。

### 贮存条件

- 本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
- 每次食用后，请盖紧罐盖。
- 开罐后请于4周内用完。

6 947402 308379

本企业通过ISO9001质量管理体系认证  
通过乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证  
通过乳制品良好生产规范(GMP)体系认证

您可以拨打免费咨询热线，与我们取得联系  
**400-013-8789**  
请在工作时间拨打  
如果您想了解更多产品信息  
请登录官方网站: [www.jiefumilk.com](http://www.jiefumilk.com)

### 喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量	每日喂哺次数	
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	
0~2周	60	2	7 8
2~4周	90	3	6 7
1~2月	120	4	5 6
2~4月	150	5	5 6
4~6月	180	6	5 6

每量勺奶粉约4.5g

- 调奶时注意参照喂哺建议表中的奶粉量和温开水用量进行冲调，用太少或多指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓度。
- 请使用罐内专用量勺。
- 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。
- 冲奶时请按照喂哺建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
- 本喂哺建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- 喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。

### 重要声明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

## 杰赋小羊<sup>®</sup> 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

国食注字 YP20230116      净含量: 100克

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	KJ	100	2093
蛋白质	g	0.54	11.2
脂肪	g	1.74	25.9
亚油酸	g	0.16	3.41
α-亚麻酸	mg	18	369
碳水化合物	g	2.6	55.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	367
维生素D	μg	0.60	12.6
维生素E	mg α-TE	0.41	8.55
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.22	46.4
维生素B <sub>1</sub>	μg	18	367
维生素B <sub>2</sub>	μg	39	820
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.2	298
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.086	1.8
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3040
叶酸	μg	3.7	77.7
泛酸	μg	164	3430
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.74	15.5
胆碱	mg	6.3	132
矿物质			
钠	mg	8.8	184
钾	mg	21.3	445
铜	μg	17.9	375
镁	mg	1.5	32.3
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.15	3.14
钙	μg	3.29	68.8
磷	mg	15.0	314
碘	μg	9	197
溴	μg	4.5	94.2
氯	mg	17	347
硒	μg	0.90	18.9
可选择成分			
二十二碳六烯酸	mg	4.5	94.2
二十碳四烯酸	mg	5.2	108
低聚半乳糖	mg	42.9	898
低聚果糖	mg	10.8	226
叶黄素	μg	3.65	76.3
乳铁蛋白	mg	1.30	27.2

### 配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、叶黄素、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)

食品生产许可证编号: SC12961011400882  
标准代号: GB10765-2021  
产品类别: 婴儿配方羊奶粉  
产品属性: 乳基粉状  
保质期: 24个月  
生产日期、批号: 见底部喷码  
生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址: 西安市阎良区关山镇  
产址: 陕西西安  
联系电话: 029-86520249  
曾用名: 杰赋<sup>®</sup>

# 标签2

393.8x165mm 2023050309

### 奶具消毒及冲泡喂养方法



1 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。

2 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40℃-45℃。



3 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。

4 参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的奶粉。



5 将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇晃至奶粉充分溶解。

6 在为宝宝喂养奶粉前，请先将一小滴奶液滴至手掌内侧测试奶温，温度适宜即可喂哺。

### 贮存条件

1. 本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2. 每次食用后，请盖紧罐盖。
3. 开罐后请于四周内用完。



本企业通过ISO9001质量管理体系认证  
通过乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证  
通过乳制品良好生产规范(GMP)体系认证

您可以通过在线客服热线，与我们联系  
**400-013-8789**

请在工作时间拨打  
如果您想了解更多产品信息  
请登录官方网站：[www.jiefumilk.com](http://www.jiefumilk.com)

### 喂哺建议表

婴儿月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	每日喂哺次数	每日喂哺次数
0~2周	60	2	7	8
2~4周	90	3	6	7
1~2月	120	4	5	6
2~4月	150	5	5	6
4~6月	180	6	5	6

每量勺奶粉约4.5g

1 请奶时注意参照喂哺建议表中的奶粉量和温开水用量进行冲调，用过多或少指定份量的奶粉，会让婴儿得不到适当的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。

2 请使用罐内专用量勺。

3 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。

4 冲奶时请按喂哺建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。

5 本喂哺建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养师专家或医生的意见而酌情增减。

6 喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。

### 重要声明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



# 杰赋小羊® 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)



国食注字 YP20230116

净含量: 400克

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2093
蛋白质	g	0.54	11.2
脂肪	g	1.24	25.9
亚油酸	g	0.16	3.41
α-亚麻酸	mg	18	369
碳水化合物	g	2.6	55.0
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	18	367
维生素D	μg	0.60	12.6
维生素E	mg α-TE	0.41	8.55
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.22	46.4
维生素B <sub>1</sub>	μg	18	367
维生素B <sub>2</sub>	μg	39	820
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.2	298
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.086	1.8
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3040
叶酸	μg	3.7	77.7
泛酸	μg	164	3430
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.74	15.5
胆碱	mg	6.3	132
<b>矿物质</b>			
钠	mg	8.8	184
钾	mg	21.3	445
铜	μg	17.9	375
镁	mg	1.5	32.3
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.15	3.14
锰	μg	3.29	68.8
钙	mg	15.0	314
磷	mg	9	197
碘	μg	4.5	94.2
氯	mg	17	347
硒	μg	0.90	18.9
<b>可选择成分</b>			
二十二碳六烯酸	mg	4.5	94.2
二十碳四烯酸	mg	5.2	108
低聚半乳糖	mg	42.9	898
低聚果糖	mg	10.8	226
叶黄素	μg	3.65	76.3
乳铁蛋白	mg	1.30	27.2

### 配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、叶黄素、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、磷(磷酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)

食品生产许可证编号: SC12961011400882  
标准代号: GB10765-2021  
产品类别: 婴儿配方羊奶粉  
产品属性: 乳基粉状  
保质期: 24个月

生产日期、批号: 见底部喷码  
生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址: 西安市阎良区关山镇  
产区: 陕西西安  
联系电话: 029-86520249

曾用名: 杰赋



# 标签3

393.8x175mm 2023050318

### 奶具消毒及冲调喂养方法



1 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。



2 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。



3 将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。

### 贮存条件

1. 本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2. 每次食用后，请盖紧瓶盖。
3. 开罐后请于四周内用完。



6 947402 300601

本企业通过ISO9001质量管理体系认证  
通过乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证  
通过乳制品良好生产规范(GMP)体系认证

如您想了解更多信息，请与我们联系

**400-013-8789**

请在工作时间拨打

如果您想了解更多产品信息  
请登录官方网站：[www.jiefumilk.com](http://www.jiefumilk.com)

### 喂养建议表

婴儿年龄	每次喂奶量		每日喂奶次数	
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)		
0~2周	60	2	7	8
2~4周	90	3	6	7
1~2月	120	4	5	6
2~4月	150	5	5	6
4~6月	180	6	5	6

每量勺奶粉约4.5g

1 喂奶时注意参照喂养建议表中的奶量和温开水用量进行冲调，用过多或少或多指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变变奶的浓度。

2 请使用罐内专用量勺。

3 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。

4 冲奶时请按照喂养建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。

5 本喂养建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计，您可依据宝宝的发育状况及营养师或医生的意见而酌情增减。

6 喂奶时多加照顾，以防宝宝呛奶。

### 重要声明

对于0-6月龄的婴儿最理想食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



杰赋小羊®

## 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)



国食注字 YP20230116

净含量: 800克

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2093
蛋白质	g	0.54	11.2
脂肪	g	1.24	25.9
亚油酸	g	0.16	3.41
α-亚麻酸	mg	18	369
碳水化合物	g	2.6	55.0
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	18	367
维生素D	μg	0.60	12.6
维生素E	mg α-TE	0.41	8.55
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.22	46.4
维生素B <sub>1</sub>	μg	18	367
维生素B <sub>2</sub>	μg	39	820
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.2	298
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.086	1.8
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3040
叶酸	μg	3.7	77.7
泛酸	μg	164	3430
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.74	15.5
胆碱	mg	6.3	132
<b>矿物质</b>			
钠	mg	8.8	184
钾	mg	21.3	445
铜	μg	17.9	375
镁	mg	1.5	32.3
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.15	3.14
锰	μg	3.29	68.8
钙	mg	15.0	314
磷	mg	9	197
碘	μg	4.5	94.2
氯	mg	17	347
硒	μg	0.90	18.9
<b>可选择成分</b>			
二十二碳六烯酸	mg	4.5	94.2
二十碳四烯酸	mg	5.2	108
低聚半乳糖	mg	42.9	898
低聚果糖	mg	10.8	226
叶黄素	μg	3.65	76.3
乳铁蛋白	mg	1.30	27.2

### 配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、动物双歧杆菌乳亚种Bifidobacterium lactis、维生素A(维生素A)、维生素D<sub>3</sub>、乳铁蛋白、维生素E(α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、叶黄素、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(磷酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)

食品生产许可证编号: SC12961011400882

标准代号: GB10765-2021

产品类别: 婴儿配方羊奶粉

产品属性: 乳基粉状

保质期: 24个月

生产日期、批号: 见底部喷码

生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司

地址: 西安市阎良区关山镇

产地: 陕西西安

联系电话: 029-86520249

曾用名: 杰赋™



# 标签4

393.8x165mm 2023050309

### 奶具消毒及冲调喂养方法



1. 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。



3. 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。



5. 将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。

### 贮存条件

1. 本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2. 每次食用后，请盖紧瓶盖。
3. 开罐后请于四周内用完。



6 947402 308416

本企业通过ISO9001质量管理体系认证  
通过乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证  
通过乳制品良好生产规范(GMP)体系认证

您可以通过扫描下方二维码，与我们的营养师  
400-013-8789  
进行咨询。

如果您想了解更多产品信息  
请登录官方网站：[www.jiefumik.com](http://www.jiefumik.com)

### 喂养建议表

婴儿月龄	每次喂奶量		每日喂奶次数	
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	4	5
6~8月	180	6	4	5
8~10月	210	7	3	4
10~12月	210	7	3	4

每量勺奶粉约4.5g

1. 请奶时注意参照喂养建议表中的奶量和温开水用量进行冲调，用过多或少指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓度。
2. 请使用罐内专用量勺。
3. 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。
4. 冲奶时请按喂养建议表调制，每次只调制一次用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
5. 本喂养建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
6. 喂奶时多加照顾，以防宝宝呛奶。

### 重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。



杰赋小羊®

## 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



国食注字 YP20230117

净含量: 400克

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2044
蛋白质	g	0.61	12.4
脂肪	g	1.19	24.4
亚油酸	g	0.15	3.04
α-亚麻酸	mg	15	316
碳水化合物	g	2.6	53.7
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.60	12.3
维生素E	mg α-TE	0.44	8.98
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.02	41.2
维生素B <sub>1</sub>	μg	22	444
维生素B <sub>2</sub>	μg	39	788
维生素B <sub>6</sub>	μg	16.1	329
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.078	1.6
烟酸(烟酰胺)	μg	140	2854
叶酸	μg	3.8	77.2
泛酸	μg	144	2935
维生素C	mg	4.2	85.2
生物素	μg	0.72	14.7
胆碱	mg	6.3	128
<b>矿物质</b>			
钠	mg	9.1	186
钾	mg	23.4	479
钙	μg	15.9	326
镁	mg	1.6	32.6
铁	mg	0.30	6.14
锌	mg	0.15	3.08
锰	μg	4.68	95.7
铜	mg	21.3	435
磷	mg	11	227
碘	μg	4.5	92.0
硒	mg	19	385
钴	μg	0.68	13.8
<b>可选择成分</b>			
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸	mg	5.4	110
低聚半乳糖	mg	87.9	1796
低聚果糖	mg	18.2	371
叶黄素	μg	7.34	150
乳铁蛋白	mg	0.79	16.1

### 配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、叶黄素、铜(硫酸铜)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙)、磷(磷酸钙)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)

食品生产许可证编号: SC12961011400882

标准代号: GB10766-2021

产品类型: 较大婴儿配方羊奶粉

产品属性: 乳基粉状

保质期: 24个月

生产日期、批号: 见底部喷码

生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司

地址: 西安市阎良区关山镇

产址: 陕西西安

联系电话: 029-86520249

曾用名: 杰赋



# 标签5

393.8x175mm 2023050318

### 奶具消毒及冲调喂养方法



1 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。



2 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40℃-45℃。



3 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。



4 将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇晃至奶粉充分溶解。

### 贮存条件

1. 本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2. 每次食用后，请盖紧瓶盖。
3. 开罐后请于四周内用完。



6 947402 1300618

本企业通过ISO9001质量管理体系认证  
通过乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证  
通过乳制品良好生产规范(GMP)体系认证

您可以拨打免费咨询热线，与我们联系  
**400-013-8789**

请在工作时间拨打  
如您想了解更多产品信息  
请登录官方网站：[www.jiefumilk.com](http://www.jiefumilk.com)

### 喂养建议表

婴儿年龄	每次喂奶量		每日喂奶次数	
	温开水用量 (ml)	奶粉用量 (g)	每日喂奶次数	每日喂奶次数
6~8月	180	6	4	5
8~10月	210	7	3	4
10~12月	210	7	3	4

每量勺奶粉约4.5g

- 1 喂奶时注意参照喂养建议表中的奶粉量和温开水用量进行冲调，用过多或少或过多预定量的奶粉，会导致宝宝得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶粉的浓度。
- 2 请使用罐内专用量勺。
- 3 没有煮沸的水、没有消毒的奶嘴或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。
- 4 冲奶时请按喂养建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
- 5 本喂养建议表是参照正常发育宝宝的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- 6 喂奶时多加照顾，以防宝宝呛奶。

### 重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。



杰赋小羊®

## 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



# 2

国食注字 YP20230117

净含量: 800克

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2044
蛋白质	g	0.61	12.4
脂肪	g	1.19	24.4
亚油酸	g	0.15	3.04
α-亚麻酸	mg	15	316
碳水化合物	g	2.6	53.7
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.60	12.3
维生素E	mg α-TE	0.44	8.98
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.02	41.2
维生素B <sub>1</sub>	μg	22	444
维生素B <sub>2</sub>	μg	39	788
维生素B <sub>6</sub>	μg	16.1	329
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.078	1.6
烟酸(烟酰胺)	μg	140	2854
叶酸	μg	3.8	77.2
泛酸	μg	144	2935
维生素C	mg	4.2	85.2
生物素	μg	0.72	14.7
胆碱	mg	6.3	128
<b>矿物质</b>			
钠	mg	9.1	186
钾	mg	23.4	479
铜	μg	15.9	326
镁	mg	1.6	32.6
铁	mg	0.30	6.14
锌	mg	0.15	3.08
锰	μg	4.68	95.7
钙	mg	21.3	435
磷	mg	11	227
碘	μg	4.5	92.0
氯	mg	19	385
硒	μg	0.68	13.8
<b>可选择成分</b>			
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸	mg	5.4	110
低聚半乳糖	mg	87.9	1796
低聚果糖	mg	18.2	371
叶黄素	μg	7.34	150
乳铁蛋白	mg	0.79	16.1

### 配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(B<sub>7</sub>)、生物素、胆碱(氯化胆碱)、叶黄素、铜(硫酸铜)、铁(硫酸亚铁)、钾(硫酸钾)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙)、磷(磷酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)

食品生产许可证编号: SC12961011400882

标准代号: GB10766-2021

产品类别: 较大婴儿配方羊奶粉

产品属性: 乳基粉状

保质期: 24个月

生产日期、批号: 见底部喷码

生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司

地址: 西安市阎良区关山镇

产地: 陕西西安

联系电话: 029-86520249

曾用名: 杰赋®



# 标签6

393.8x165mm 2023050309

### 奶具消毒及冲泡喂养方法



- 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。
- 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40~45℃。



- 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
- 参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的奶粉。



- 将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后轻匀至奶粉充分溶解。
- 在为宝宝喂养奶粉前，请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试温度，温度适宜即可喂哺。

### 贮存条件

- 本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
- 每次食用后，请盖紧瓶盖。
- 开罐后请于四周内用完。

本企业通过ISO9001质量管理体系认证  
通过乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证  
通过乳制品良好生产规范(GMP)体系认证

您可以通过拨打免费咨询热线，与我们联系  
**400-013-8789**  
请在工作时间拨打  
如果您想了解更多产品信息  
请登官方网站：[www.jiefumilk.com](http://www.jiefumilk.com)

### 喂哺建议表

幼儿年龄	每次喂哺量		
	温开水用量 (ml)	奶勺用量 (勺勺数)	每日喂哺次数
12~24月	210	7	3 4
24~36月	210	7	2 3

每量勺奶粉约4.5g

- 喂哺时注意参照喂哺建议表中的奶粉量和温开水用量进行冲调，用过多或少指定份量的奶粉，会令幼儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓度。
- 请使用罐内专用量勺。
- 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。
- 冲奶时请按照喂哺建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
- 本喂哺建议表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- 喂哺时多加照服，以防宝宝呛奶。



## 杰赋小羊<sup>®</sup>

# 幼儿配方羊奶粉

## (12-36月龄, 3段)



# 3

国食注字 YP20230118      净含量: 400克

### 营养成分表

项目	单位	每100g	每100kcal
能量	kJ	100	2041
蛋白质	g	0.69	14.0
脂肪	g	1.20	24.4
亚油酸	g	0.14	2.86
α-亚油酸	mg	15	307
碳水化合物	g	2.5	52.0
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.60	12.3
维生素E	mg α-TE	0.44	8.90
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.01	41.1
维生素B <sub>1</sub>	μg	22	449
维生素B <sub>2</sub>	μg	37	759
维生素B <sub>6</sub>	μg	16.2	331
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.078	1.6
烟酸(烟酰胺)	μg	142	2898
叶酸	μg	3.8	77.4
泛酸	μg	148	3012
维生素C	mg	3.1	62.8
生物素	μg	0.72	14.6
<b>矿物质</b>			
钠	mg	9.9	203
钾	mg	26.5	540
铜	μg	16.1	329
镁	mg	1.8	36.5
铁	mg	0.30	6.13
锌	mg	0.14	2.91
钙	mg	21.3	434
磷	mg	13	258
碘	μg	4.0	81.1
硒	μg	22	448
<b>可选择成分</b>			
胆碱	μg	0.70	14.2
胆碱	mg	6.4	130
锰	μg	4.75	97.0
二十二碳六烯酸	mg	2.2	45.9
二十碳四烯酸	mg	2.4	48.6
低聚半乳糖	mg	80.6	1646
低聚果糖	mg	18.2	371
叶黄素	μg	7.35	150
乳铁蛋白	mg	0.79	16.1

### 配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、叶黄素、铜(硫酸铜)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(磷酸钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)

食品生产许可证编号: SC12961011400882  
标准代号: GB10767-2021  
产品类别: 幼儿配方羊奶粉  
产品属性: 乳基粉状  
保质期: 24个月  
生产日期、批号: 见底部喷码  
生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址: 西安市阎良区关山镇  
产地: 陕西西安  
联系电话: 029-86520249  
曾用名: 杰赋



# 标签7

393.8x175mm 2023050318

### 奶具消毒及冲调喂养方法



①先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。



②将饮用水煮沸5分钟后冷却至40℃-45℃。



③将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。



④将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。

### 贮存条件

- 1.本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
- 2.每次食用后，请盖紧罐盖。
- 3.开罐后请于四周内用完。



本企业通过ISO9001质量管理体系认证  
通过乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证  
通过乳制品良好生产规范(GMP)体系认证

您可以拨打免费咨询热线，与我们取得联系  
**400-013-8789**

请在工作时间拨打  
如果您想了解更多产品信息  
请登录官方网站：[www.jiefumilk.com](http://www.jiefumilk.com)

### 喂哺建议表

幼儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	每日喂哺次数	每日喂哺次数
12~24月	210	7	3	4
24~36月	210	7	2	3

每量勺奶粉约4.5g

- ① 喂奶时注意参照喂哺建议表中的奶粉量和温开水用量进行冲调，用太少或多指定份量的奶粉，会令幼儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓度。
- ② 请使用罐内专用量勺。
- ③ 没有煮沸的水，没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。
- ④ 冲奶时请按喂哺建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
- ⑤ 本喂哺建议表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- ⑥ 喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。



杰赋小羊®

# 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)

# 3



国食注字 YP20230118

净含量:800克

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2041
蛋白质	g	0.69	14.0
脂肪	g	1.20	24.4
亚油酸	g	0.14	2.86
α-亚麻酸	mg	15	307
碳水化合物	g	2.5	52.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.60	12.3
维生素E	mg α-TE	0.44	8.90
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.01	41.1
维生素B <sub>1</sub>	μg	22	449
维生素B <sub>2</sub>	μg	37	759
维生素B <sub>6</sub>	μg	16.2	331
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.078	1.6
烟酸(烟酰胺)	μg	142	2898
叶酸	μg	3.8	77.4
泛酸	μg	148	3012
维生素C	mg	3.1	62.8
生物素	μg	0.72	14.6
矿物质			
钠	mg	9.9	203
钾	mg	26.5	540
铜	μg	16.1	329
镁	mg	1.8	36.5
铁	mg	0.30	6.13
锌	mg	0.14	2.91
钙	mg	21.3	434
磷	mg	13	258
碘	μg	4.0	81.1
硒	μg	22	448
可选择成分			
硒	μg	0.70	14.2
胆碱	mg	6.4	130
锰	μg	4.75	97.0
二十二碳六烯酸	mg	2.2	45.9
二十碳四烯酸	mg	2.4	48.6
低聚半乳糖	mg	80.6	1646
低聚果糖	mg	18.2	371
叶黄素	μg	7.35	150
乳铁蛋白	mg	0.79	16.1

### 配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(DL-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、叶黄素、铜(硫酸铜)、铁(硫酸亚铁)、钾(硫酸钾)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙)、磷(磷酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)

食品生产许可证编号:SC12961011400882  
标准代号:GB10767-2021  
产品类别:幼儿配方羊奶粉  
产品属性:乳基粉状  
保质期:24个月  
生产日期、批号:见底部喷码  
生产商:陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址:西安市阎良区关山镇  
产地:陕西西安  
联系电话:029-86520249  
曾用名:杰赋®



# 标签8

113.5mm

258.1mm

配料表	
生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种DS-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B <sub>1</sub> （盐酸硫胺素）、维生素B <sub>2</sub> （核黄素）、维生素B <sub>3</sub> （盐酸吡哆醇）、维生素B <sub>5</sub> （肌醇）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、钙（柠檬酸钙）、钾（氯化钾）、铜（硫酸铜）、锰（硫酸锰）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、硒（硫酸硒）、碘（碘酸钾）、磷（磷酸三钙）、磷（磷酸二钙）、磷（磷酸钾）、磷（亚磷酸钾）	
致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。	

  

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2080
蛋白质	g	0.55	11.4
脂肪	g	1.22	25.4
碳水化合物	g	2.6	55.1
维生素A	μg RE	18	364
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.36	7.37
维生素K	μg	2.21	46.0
维生素B <sub>1</sub>	μg	18	364
维生素B <sub>2</sub>	μg	37	669
维生素B <sub>3</sub>	μg	14.3	299
维生素B <sub>5</sub>	μg	0.087	1.8
烟酸（烟酰胺）	μg	146	3042
叶酸	μg	3.7	77.7
泛酸	μg	165	3433
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.75	15.6
胆碱	mg	6.3	132
肌醇	mg	8.8	182
钙	mg	23.3	442
钾	mg	17.9	372
钠	mg	1.6	32.5
铁	mg	0.16	3.32
铜	mg	0.15	3.12
锰	μg	3.31	68.9
锌	μg	16.0	312
硒	μg	10	196
磷	mg	4.5	93.6
氮	mg	17	349
膳食纤维	mg	0.90	18.8
可选择成分	mg	2.4	50.8
肌醇	mg	1.4	29.0
左旋肉碱	mg	0.7	14.7
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
二十碳四烯酸	mg	5.1	107
低聚半乳糖	mg	21.6	449
低聚果糖	mg	37.9	788
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.2
叶黄素	mg	3.61	75.0
核苷酸	mg	0.79	16.4
乳铁蛋白	mg	1.31	27.2



## 卡倍多®



净含量:120克

国食注字YP20230119

# 1 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

## 卡倍多®

本公司已通过：  
质量管理体系 (ISO9001) 认证  
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证  
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

### 冲调方法

冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶嘴盖放入清水中煮沸5分钟。

冲调用水煮沸后冷却至40°C-45°C，在奶瓶中加入适量的温开水。

用量勺量取准确份量的婴儿配方奶粉加入奶瓶中。

盖严奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后滴一两奶液在手腕内测试温度，温度适宜即可喂奶。

### 注意事项

- 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起婴儿的不适。
- 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
- 换奶时替代品要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝有无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

食品生产许可证编号：SC12961011400882  
产品标准代号：GB10765-2021  
产品类别：婴儿配方羊奶粉  
产品属性：乳基-粉状  
保质期：24个月  
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西-西安  
生产商：陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址：西安市南关区关山镇  
电话：029-86822282  
客服电话：029-81612722  
公司网址：www.youjigoatmilk.com

咨询热线：4008-616-909

扫一扫，了解详情，走进卡倍多

保持环境清洁 请勿乱丢空罐

5.3x7.4=39.22 5.6x7.3=40.88 5.8x7.4=42.92



商品名称面积=123.02

17.1x4.9=83.79



商标总面积=131.81

9.8x4.9=48.02



8x7.8=62.4 8x8=64 8.1x7.4=59.94 8.1x8.3=67.23 8.2x8.4=68.88 7.9x8.2=64.78 8.4x8.3=69.72 3.5x5.9=20.65 3.6x5.8=20.88 5.7x6.8=38.76 7.3x7.1=51.83 1.9x5.7=10.83 7.2x6.9=49.68

# 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

通用名称面积总计=649.58

# 标签9

145mm

393.8mm

**配料表**

生羊乳、脱盐羊乳、植物油、食用植物油和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、低果寡糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇棕榈酸酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B<sub>1</sub>（盐酸硫胺素）、维生素B<sub>2</sub>（核黄素）、维生素B<sub>6</sub>（盐酸吡哆醇）、维生素B<sub>12</sub>（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、牛黄果、卵（柠檬酸钙）、钾（氯化钾）、铜（硫酸铜）、钙（硫酸钙）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸钾）、碘（碘酸钾）、钙（磷酸三钙）、磷（磷酸钾）、磷（亚磷酸钾）

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳清）。

**贮存条件**

- 1、本品贮存于阴凉、干燥处，建议置于冰箱内。
- 2、每次食用后，请盖紧罐盖。
- 3、开罐后请于24小时内用完。

**喂哺建议表**

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	
0~2周	60	2	7-8
2~4周	90	3	6-7
1~2月	120	4	5-6
2~4月	150	5	5-6
4~6月	180	6	5-6

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。

**营养成分表**

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2080
蛋白质	g	0.65	13.4
脂肪	g	1.22	25.4
亚油酸	g	0.13	2.74
α-亚麻酸	mg	15	312
碳水化合物	g	2.6	55.1
维生素A	μg RE	18	364
维生素D	μg	0.60	12.5
E (dl-α-生育酚生育酚)	μg α-TE	0.38	7.97
维生素K	μg	2.21	46.0
维生素B <sub>1</sub>	μg	18	364
维生素B <sub>2</sub>	μg	32	669
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.3	298
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.087	1.8
烟酸 (烟酰胺)	μg	146	3042
叶酸	μg	3.7	77.7
泛酸	μg	165	3435
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.75	15.6
胆钙化醇	μg	6.3	132
肌醇	mg	8.8	182
牛磺酸	mg	213	442
钾	mg	17.9	372
钠	mg	1.6	32.5
钙	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.15	3.12
锰	μg	3.31	68.9
铜	μg	15.0	312
碘	μg	10	198
磷	mg	4.5	93.6
氯	mg	17	349
糖	mg	0.90	18.8
可溶性成分	mg	2.4	50.8
葡萄糖	mg	1.4	29.0
左旋肉碱	mg	0.7	14.7
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
二十碳四烯酸	mg	5.1	107
低聚半乳糖	mg	21.6	449
低果寡糖	mg	37.9	786
1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	g	0.15	3.2
叶黄素	μg	3.61	75.0
核黄素	mg	0.79	16.4
乳铁蛋白	mg	1.31	27.2

秦龙®

卡倍多®



净含量: 350克 国食注字YP20230119

1

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

卡倍多®

本公司已通过：  
质量管理体系 (ISO9001) 认证  
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证  
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

**冲泡方法**



**注意事项**

- 1、水和奶粉未经消毒或浓度不当等可能引起婴儿的不适。
- 2、喂哺时应抱着婴儿，如让宝宝躺下可能会引起窒息。
- 3、换奶时替代品要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
- 4、对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

食品生产许可证编号：SC12961011400882  
产品标准代号：GB10765-2021  
产品类别：婴儿配方羊奶粉  
产品属性：乳基 粉状  
保质期：24个月  
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西 西安  
生产商：陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址：西安市雁塔区关山嘴  
电话：029-86822282  
客服电话：029-81612722  
公司网址：www.youjigomilk.com

咨询热线：4008-616-909  
扫一扫，智慧购物，品质有保障



6795+4365 7263+6698 7469+4936

卡倍多®

商品名称面积=200.17

22465+13336

卡倍多®

秦龙®

商标总面积=213.98

10389+10197 103210+10404 103843+9579 103810+10918 104010+11024 103104+10504 103105+11235 45675+3375 4641+9404 7286+4512 9269+428 24673+1732 9268+8696

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

通用名称面积总计=1049.6

# 标签10

158mm

393.8mm

配料表			
生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇棕榈酸酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B <sub>1</sub> （盐酸硫胺素）、维生素B <sub>2</sub> （核黄素）、维生素B <sub>3</sub> （盐酸吡哆醇）、维生素B <sub>5</sub> （氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、钠（柠檬酸钠）、钾（氯化钾）、铜（硫酸铜）、镁（硫酸镁）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、硒（亚硒酸钠）、钙（磷酸钙）、碘（亚碘酸钠）、磷（磷酸三钙）、磷（磷酸钾）、磷（亚磷酸钾）			
致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。			
营养成分表			
项目	单位	每100g	每100g
能量	kJ	100	2080
蛋白质	g	0.55	11.4
脂肪	g	1.22	25.4
碳水化合物	g	0.13	2.74
α-亚麻酸	mg	15	312
维生素A	μg RE	16	364
维生素D	μg	0.40	12.5
维生素E	mg α-TE	0.38	7.97
维生素K	μg	2.21	46.0
维生素B <sub>1</sub>	μg	18	364
维生素B <sub>2</sub>	μg	32	669
维生素B <sub>3</sub>	μg	14.3	298
维生素B <sub>5</sub>	μg	0.087	1.8
烟酸（烟酰胺）	μg	146	3042
叶酸	μg	3.7	77.7
泛酸	μg	165	3433
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.75	15.6
肌醇	mg	6.3	132
胆碱	mg	8.8	182
钠	mg	21.3	442
钾	mg	17.9	372
钙	mg	1.6	32.5
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.15	3.12
铜	μg	3.31	68.9
硒	μg	15.0	312
碘	μg	10	198
磷	mg	4.5	93.6
氯	mg	17	349
糖	g	0.90	18.8
可选择成分			
胆碱	mg	2.4	50.8
牛磺酸	mg	1.4	29.0
左旋肉碱	mg	0.7	14.7
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
二十碳四烯酸	mg	5.1	107
低聚半乳糖	mg	21.6	449
低聚果糖	mg	37.9	788
1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	g	0.15	3.2
叶黄素	mg	3.61	75.0
核苷酸	mg	0.79	16.4
乳铁蛋白	mg	1.31	27.2

1、本品贮于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。  
2、每次食用后，请盖紧瓶盖。  
3、开罐后请于四周内用完。

喂哺建议表			
婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	
0~2月	60	2	7
2~4月	90	3	6
1~2月	120	4	5
2~4月	150	5	5
4~6月	180	6	5

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。



## 卡倍多®



净含量:680克

国食注字YP20230119

# 1 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

## 卡倍多®

本公司已通过：  
质量管理体系 (ISO9001) 认证  
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证  
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

冲调方法



1 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶嘴盖放入沸水中煮沸5分钟。

2 冲调用水煮沸后冷却至40°C-45°C，在瓶中加入需要量的温开水。

3 用量勺量取准确份量的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。

4 盖紧奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后滴一两奶液在手腕内侧感受温度，温度适宜即可喂哺。

注意事项

- 1、水和奶液未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起婴儿不适。
- 2、喂奶时抱紧婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
- 4、对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

食品生产许可证编号: SC12961011400882  
产品标准代号: GB10765-2021  
产品类别: 婴儿配方羊奶粉  
产品属性: 乳基-粉状  
保质期: 24个月  
生产日期、批号: 见罐底喷码

咨询热线  
4008-616-909



扫一扫，查看详情，送进卡倍多

产地: 陕西 西安  
生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址: 西安市周陵区关山镇  
电话: 029-86822282  
客服电话: 029-81612722  
公司网址: www.youjigomilk.com

保持环境清洁  
请勿乱丢空罐



商品名称面积=242.05

商标总面积=249.51

# 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

通用名称面积总计=1248.45

# 标签11

175mm

393.8mm

**配料表**

生牛乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油和油（玉米油、低芥酸籽桐油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇棕榈酸酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B<sub>1</sub>（盐酸硫胺素）、维生素B<sub>2</sub>（核黄素）、维生素B<sub>6</sub>（盐酸吡哆醇）、维生素B<sub>12</sub>（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、钙（柠檬酸钠）、钾（氯化钾）、磷（硫酸钾）、镁（硫酸镁）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸钙、磷酸三钙）、磷（磷酸三钙）、碘（碘酸钾）、碘（亚硫酸钠）

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

**贮存条件**

- 1、本品贮存阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
- 2、每次食用后，请盖紧罐盖。
- 3、开罐后请于四周内用完。

**哺喂建议表**

婴儿年龄	每次哺喂量		每日哺喂次数
	温开水量 (mL)	奶粉用量 (勺数)	
0-2月	60	7	8
2-4月	90	3	6
1-2月	120	4	5
2-4月	150	5	5
4-6月	180	6	5

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的哺喂量建议表是根据平均的需要量而定的，仅供参考。

**营养成分表**

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2080
蛋白质	g	0.55	11.4
脂肪	g	1.22	25.4
碳水化合物	g	0.13	2.74
α-亚麻酸	mg	15	312
维生素A	μg RE	18	364
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.38	7.97
维生素K	μg	2.21	46.0
维生素B <sub>1</sub>	μg	18	364
维生素B <sub>2</sub>	μg	32	669
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.3	298
烟酸（烟酰胺）	μg	146	3042
叶酸	μg	3.7	77.7
泛酸	μg	165	3433
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.75	15.6
胆碱	mg	6.3	132
肌醇	mg	8.8	182
钾	mg	21.3	442
钠	mg	17.9	372
钙	mg	1.6	32.5
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.15	3.12
锰	μg	3.31	68.9
碘	μg	15.0	312
磷	mg	10	198
维生素	μg	4.5	93.6
类	mg	17	349
磷	μg	0.90	18.8
可选择成分	mg	2.4	50.8
乳糖	mg	1.4	29.0
牛磺酸	mg	0.7	14.7
左旋肉碱	mg	4.5	93.6
二十二碳六烯酸	mg	5.1	107
三-硬脂酸甘油酯	mg	21.6	449
低聚半乳糖	mg	37.9	788
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.2
叶黄素	mg	3.61	75.0
核苷酸	mg	0.79	16.4
乳铁蛋白	mg	1.31	27.2



## 卡倍多®



净含量:800克

国食注字YP20230119

# 1 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

**卡倍多®** 本公司已通过：  
质量管理体系 (ISO9001) 认证  
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证  
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

**冲泡方法**

- 1 冲泡前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶嘴盖放入清水中煮沸5分钟。
- 2 冲调用水煮沸后冷却至40°C-45°C，在奶瓶中加入需要量的温开水。
- 3 用专用勺取准磅数重的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。
- 4 盖严奶瓶，推动底部充分溶解，然后摇晃奶瓶使在手腕内测试温度，温度适宜即可哺喂。

**注意事项**

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等可能引起婴儿的不适。
- 2、喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
- 4、对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

食品生产许可证编号：SC12961011400882  
产品标准代号：GB10765-2021  
产品类别：乳基-粉状  
保质期：24个月  
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西-西安  
生产商：陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址：西安市阎良区关山镇  
电话：029-86622282  
客服电话：029-81612722  
公司网址：www.youjigoatmilk.com

咨询热线：4008-616-909

扫一扫，查看详情，走进卡倍多

保持环境清洁 请勿乱丢垃圾

6 947402 300519



商品名称面积=336.09



商标总面积=298.28

# 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

通用名称面积总计=1428.72

# 标签12

175mm

393.8mm

**配料表**

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、1,3-二油酰-2-硬脂酰甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bd-12、核苷酸（5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇棕榈酸酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚醋酸酯）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B<sub>1</sub>（盐酸硫胺素）、维生素B<sub>2</sub>（核黄素）、维生素B<sub>6</sub>（盐酸吡哆醇）、维生素B<sub>12</sub>（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、钠（柠檬酸钠）、钾（氯化钾）、钙（硫酸钙）、镁（硫酸镁）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、铜（硫酸铜）、磷（磷酸三钙）、磷（磷酸二氢钾）、磷（亚磷酸钠）

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

**贮存条件**

- 1、本品贮于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
- 2、每次食用后，请盖紧罐盖。
- 3、开罐后请于四周内用完。

**哺喂建议表**

婴儿年龄	每次哺喂量		每日哺喂次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (勺勺数)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-4月	150	5	5-6
4-6月	180	6	5-6

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的哺喂量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。

**营养成分表**

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2080
蛋白质	g	6.55	11.4
脂肪	g	1.22	25.4
亚油酸	g	0.13	2.74
α-亚麻酸	mg	15	312
碳水化合物	g	2.6	53.1
维生素			
维生素A	μg RE	18	364
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.38	7.97
维生素K	μg	2.21	46.0
维生素B <sub>1</sub>	μg	1.8	36.6
维生素B <sub>2</sub>	μg	32	669
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.3	298
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.087	1.8
烟酸（烟酰胺）	μg	146	3062
叶酸	μg	3.7	77.7
泛酸	μg	165	3433
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.75	15.6
胆碱	mg	6.3	132
矿物质			
钠	mg	8.8	182
钾	mg	21.3	442
钙	mg	17.9	372
镁	mg	3.6	73.5
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.15	3.12
锰	μg	3.31	68.9
铜	μg	15.0	312
磷	mg	10	198
碘	μg	4.5	93.6
硒	μg	17	349
维生素			
维生素E	mg	0.90	18.8
可选择成分			
葡萄糖	mg	2.4	50.8
牛磺酸	mg	1.4	29.0
左旋肉碱	mg	0.7	14.7
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
十一碳烯酸	mg	5.1	107
低聚半乳糖	mg	21.6	449
低聚果糖	mg	37.9	788
1,3-二油酰-2-硬脂酰甘油三酯	g	0.15	3.2
叶黄素	mg	3.61	75.0
核苷酸	mg	0.79	16.4
乳铁蛋白	mg	1.31	27.2



## 卡倍多®



净含量:900克

国食注字YP20230119

# 1 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

**卡倍多®**

本公司已通过：  
质量管理体系 (ISO9001) 认证  
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证  
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

**冲调方法**

1. 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶嘴盖放入清水中煮沸5分钟。
2. 冲调用水煮沸后冷却至40℃-45℃，在奶瓶中加入需要量的温开水。
3. 用量勺量取准确份量的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后倒一满奶瓶在手腕内倒置试温度，温度适宜即可哺喂。

**注意事项**

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起婴儿的不适。
- 2、喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝先不遇再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
- 4、对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可使用本产品。

食品生产许可证编号：SC12961011400882  
产品标准代号：GB10765-2021  
产品类别：婴儿配方羊奶粉  
产品属性：乳基·粉状  
保质期：24个月  
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西 西安  
生产商：陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址：西安市南关区关山镇  
电话：029-86822282  
客服电话：029-81612722  
公司网址：www.youjigaoatmilk.com

保持环境清洁 请勿乱丢空罐

咨询热线 4008-616-909

扫一扫，登录官网，走进卡倍多

6 49474021309376



商品名称面积=336.09



商标总面积=298.28

# 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

通用名称面积总计=1428.72

# 标签13

258.1mm

113.5mm

**配料表**

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(DL-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>3</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>5</sub>(D-泛酸钙)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)。

致敏物质提示: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

**贮存条件**

- 1、本品贮存于阴凉、干燥处, 请勿置于冰箱内。
- 2、每次食用后, 请盖紧罐盖。
- 3、开罐后请于四周内用完。

**喂哺建议表**

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	
6-8月	180	6	4-5
8-10月	210	7	3-4
10-12月	210	7	3-4

每量勺奶粉约4.5g

注: 以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定, 仅供参考。

**营养成分表**

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2046
蛋白质	g	0.63	13.0
脂肪	g	1.19	24.3
碳水化合物	g	0.15	3.16
α-亚麻酸	mg	15	308
碳水化合物	g	2.6	53.6
维生素			
维生素A	μg RE	23	461
维生素D	μg	0.60	12.3
维生素E	mg α-TE	0.38	7.85
维生素K	μg	1.98	40.6
维生素B <sub>1</sub>	μg	21	434
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	557
维生素B <sub>3</sub>	μg	15.5	318
维生素B <sub>5</sub>	μg	0.068	1.4
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2816
叶酸	μg	3.8	77.0
泛酸	μg	162	3321
维生素C	mg	4.2	85.2
生物素	μg	0.78	15.9
胆碱	mg	6.2	127
钙	mg	6.2	126
钠	mg	22.5	461
铜	μg	15.9	326
镁	mg	1.7	34.8
铁	mg	0.30	6.15
锌	mg	0.15	3.08
锰	μg	5.22	107
钾	mg	21.3	436
磷	mg	11	227
碘	μg	4.5	92.2
硒	μg	19	384
活	μg	0.74	15.2
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.6
牛磺酸	mg	1.4	28.7
左旋肉碱	mg	0.7	15.1
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.2
二十碳四烯酸	mg	5.4	110
低聚半乳糖	mg	65.8	1347
低聚果糖	mg	98.1	2011
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.6
叶黄素	mg	7.32	150
核苷酸	mg	0.89	18.3
乳铁蛋白	mg	0.80	16.4



## 卡倍多®



净含量: 120克 国食注字YP20230120

# 2

## 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

### 卡倍多®

本公司已通过:  
质量管理体系 (ISO9001) 认证  
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证  
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

**冲调方法**

1 冲调前洗净双手, 将干净的奶瓶、奶嘴和奶盖放入沸水中煮沸5分钟。

2 冲调用水煮沸后冷却至40°C-45°C, 在奶瓶中加入需要量的温开水。

3 用量勺量取准确的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。

4 盖严奶瓶, 摇动至奶粉充分溶解, 然后倒一满奶液在手腕内侧测试温度, 温度适宜即可喂哺。

**注意事项**

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起婴儿的不适。
- 2、喂奶时应抱着婴儿, 如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
- 3、换奶时请使品牌逐步添加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适再逐步递增1/4, 直到宝宝完全适应。
- 4、食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

食品生产许可证编号: SC12961011400882  
产品标准代号: GB10766-2021  
产品类别: 较大婴儿配方羊奶粉  
产品属性: 乳基 粉状  
保质期: 24个月  
生产日期、批号: 见罐底喷码

产地: 陕西 西安  
生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址: 西安市阎良区关山镇  
电话: 029-86622282  
客服电话: 029-81612722  
公司网址: www.youjigatmilk.com

咨询热线: 4008-616-909

扫一扫, 查看详情, 走进卡倍多

5.3x7.4=39.22 5.6x7.3=40.88 5.8x7.4=42.92

17.1x4.9=83.79

9.9x4.9=48.02

商品名称面积=123.02 商标总面积=131.81

8.4x8.3=69.72 7.7x8.2=63.14 7.9x7.8=61.62 7.9x8=63.2 8x7.4=59.2 8x8.3=66.4 8.1x8.4=68.04 7.8x8.2=63.96 8.3x8.3=68.89 3.5x5.9=20.65 1.9x5.7=10.83 3.5x5.8=20.35 6.6x8=52.8 7.2x7.1=51.12 3.5x5.8=20.3 7.1x6.9=48.99

# 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

通用名称面积总计=794.44

# 标签14

145mm

393.8mm

配料表		
生乳乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种01-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B <sub>1</sub> (硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (吡哆醇)、维生素B <sub>12</sub> (钴胺素)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、甜(低糖钠)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(硬脂酸钙)、磷(磷酸钙)、硒(亚硒酸钠)、致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。		

营养成分表		
项目	单位	每100kJ 每100g
能量	kJ	100 2048
蛋白质	g	0.63 13.0
脂肪	g	1.19 24.3
碳水化合物	g	0.15 3.16
α-亚麻酸	mg	15 308
维生素A	μg RE	23 441
维生素D	μg	0.60 12.3
维生素E	μg α-TE	0.38 7.85
维生素K	μg	1.98 40.6
维生素B <sub>1</sub>	μg	21 434
维生素B <sub>2</sub>	μg	27 557
维生素B <sub>6</sub>	μg	15 318
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.068 1.4
烟酸(烟酰胺)	μg	138 2816
叶酸	μg	3.8 77.0
泛酸	μg	162 3321
维生素C	mg	4.2 85.2
生物素	μg	0.78 15.9
胆碱	mg	6.2 127
肌醇	mg	6.2 126
牛磺酸	mg	22.5 461
叶黄素	mg	15.9 326
铁	mg	0.30 6.15
锌	mg	0.15 3.08
锰	mg	5.22 107
磷	mg	21.3 436
硒	μg	11 227
钙	mg	4.5 92.2
钠	mg	19 384
钾	mg	0.74 15.2
可选择成分	mg	2.0 40.6
视黄醇	μg	1.4 28.7
左旋肉碱	mg	0.7 15.1
二十二碳六烯酸	mg	4.5 92.2
二十碳四烯酸	mg	5.4 110
低聚半乳糖	mg	65.8 1347
低聚果糖	mg	38.1 781
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13 2.6
叶黄素	mg	7.32 150
核苷酸	mg	0.69 13.3
乳铁蛋白	mg	0.80 16.4

**贮藏条件**

- 1、本品贮于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
- 2、每次食用后，请拧紧罐盖。
- 3、开罐后请于四周内用完。

喂养建议表			
婴儿年龄	每次喂奶量		每日喂奶次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	
6-8月	180	6	4 5
8-10月	210	7	3 4
10-12月	210	7	3 4

注: 量勺奶粉4.5g  
注: 以上的喂养量建议表是根据平均的胃容量而定, 仅供参考。



净含量: 350克 国食注字YP20230120

## 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

**卡倍多®** 质量管理体系 (ISO9001) 认证  
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证  
乳制品销售分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

**冲泡方法**

1. 冲罐前洗净双手，将罐盖拧开，将奶粉倒入杯中。
2. 冲罐用水煮沸后冷却至40°C-45°C，将奶粉加入杯中，搅拌均匀。
3. 用勺子取取准确重量，将较大婴儿配方奶粉加入杯中。
4. 盖严奶瓶，晃动奶瓶使奶粉溶解，然后滴一滴奶液在手腕内侧测试温度，温度适宜即可喂奶。

**注意事项**

- 1、水和奶粉未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起婴儿的不适。
- 2、喂奶时应抱着婴儿，如摇晃剧烈可能会引起婴儿窒息。
- 3、换奶时替代品要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
- 4、食用本产品时，须配合添加辅食。

食品生产许可证编号: SC12961011400882  
产品标准代号: GB10766-2021  
产品类别: 较大婴儿配方羊奶粉  
产品属性: 乳基 粉状  
保质期: 24个月  
生产日期、批号: 见罐底喷码

产地: 陕西 西安  
生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址: 西安中周民民火山  
电话: 029-86822282  
客服电话: 029-81612722  
公司网址: www.youjigoutmik.com

咨询热线: 4008-616-909  
扫一扫, 智慧购, 品质看得见

6769#4365 7269#4676 7460#4958  
**卡倍多®**

22865#13334  
**卡倍多®**

12866#8864  
**秦龙 QINLONG**

商品名称面积=200.17 商标总面积=213.98

107x108#11342 98x115#1029 106#9#99 101x102#10302 1019#4#94 102x105#1071 103x107#1021 104x103#103 104x105#1113 45x7#4#33 24x73#1732 24x74#2356 71x8#4#106 91x8#4#99 24x74#3256 91x8#4#108

## 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

通用名称面积总计=1282.96

# 标签15

158mm

393.8mm

### 配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物油和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油醇-2-酰基甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、植聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙)、磷(磷酸钾)、硒(亚硒酸钠)、

致敏物质提示: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2048
蛋白质	g	0.63	13.0
脂肪	g	1.19	24.3
亚油酸	g	0.15	3.16
α-亚麻酸	mg	15	308
碳水化合物	g	2.6	53.6
维生素			
维生素A	μg RE	23	461
维生素D	μg	0.60	12.3
维生素E	mg α-TE	0.38	7.85
维生素K	μg	1.98	40.6
维生素B <sub>1</sub>	μg	21	434
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	557
维生素B <sub>6</sub>	μg	15.5	315
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.068	1.4
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2816
叶酸	μg	3.8	77.0
泛酸	μg	3.62	3321
维生素C	mg	4.2	85.2
生物素	μg	0.78	15.9
肌醇	mg	6.2	127
葡萄糖	mg	6.2	126
铜	mg	22.5	461
钙	mg	15.9	326
镁	mg	1.7	34.8
铁	mg	0.30	6.15
锌	mg	0.15	3.08
锰	μg	5.22	107
钾	mg	21.3	436
磷	mg	11	227
氯	mg	6.5	132.2
硒	μg	19	384
钠	μg	0.74	15.2
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.6
牛磺酸	mg	1.4	28.7
左旋肉碱	mg	0.7	15.1
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.2
二十二碳四烯酸	mg	5.4	110
低聚半乳糖	mg	65.8	1347
低聚果糖	mg	38.1	781
1,3-二油醇-2-酰基甘油三酯	g	0.13	2.6
叶黄素	μg	7.32	150
核苷酸	mg	0.89	18.3
乳铁蛋白	mg	0.80	16.4

### 贮存条件

1. 本品贮于阴凉、干燥处，请置于冰箱内。
2. 每次食用后，请盖紧罐盖。
3. 开罐后请于四周内用完。

### 哺喂建议表

婴儿年龄	每次哺喂量		每日哺喂次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (勺勺数)	
6~8月	180	6	4 5
8~10月	210	7	3 4
10~12月	210	7	3 4

每量勺奶粉约4.5g

注: 以上的哺喂量建议表是根据平均的需要量而定, 仅供参考。



净含量: 680克      国食注字YP20230120

## 较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄, 2段)

## 卡倍多®

### 冲调方法

冲调前洗净双手。

冲调用水煮沸后冷却至40℃-45℃, 在奶瓶中加入需要量的温开水。

用量勺量取准确份量的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。

盖严奶瓶, 摇动使奶粉充分溶解, 然后滴一滴奶液在手腕内侧测试温度, 温度适宜即可哺喂。

本公司已通过:  
 质量管理体系 (ISO9001) 认证  
 乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证  
 乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

### 注意事项

1. 水和奶量未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起婴儿的不适。
2. 喂奶时抱起婴儿, 如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
3. 换奶时替代品牌要逐步添加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝有无不适再逐步递增1/4, 直到宝宝完全适应。
4. 食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

食品生产许可证编号: SC12961011400882  
 产品标准代号: GB10766-2021  
 产品类别: 较大婴儿配方羊奶粉  
 产品属性: 乳基 粉状  
 保质期: 24个月  
 生产日期、批号: 见罐底喷码

产地: 陕西 西安  
 生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司  
 地址: 西安市周至区关山镇  
 电话: 029-86822282  
 客服电话: 029-81612722  
 公司网址: www.youjigostmilk.com

咨询热线  
4008-616-909

扫一扫, 智慧营销, 走进卡倍多

6 9474201309413



# 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

商品名称面积=242.05

商标总面积=249.51

通用名称面积总计=1532.58

# 标签16

175mm

393.8mm

**配料表**

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙)、磷(磷酸钙)、硒(亚硒酸钠)。

致敏物质提示: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

**贮存条件**

- 1、本品贮于阴凉、干燥处, 请勿置于冰箱内。
- 2、每次食用后, 请盖紧罐盖。
- 3、开罐后请于四周内用完。

**喂哺建议表**

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (勺勺数)	
6-8月	180	6	4-5
8-10月	210	7	3-4
10-12月	210	7	3-4

每勺勺奶粉约4.5g

注: 以上的喂哺量建议表是根据平均的用量而定, 仅供参考。

**营养成分表**

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2048
蛋白质	g	0.63	13.0
脂肪	g	1.19	24.3
碳水化合物	g	0.15	3.16
α-亚麻酸	mg	15	308
维生素A	μg RE	23	461
维生素D	μg	0.60	12.3
维生素E	mg α-TE	0.38	7.85
维生素K	μg	1.98	40.6
维生素B <sub>1</sub>	μg	21	434
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	557
维生素B <sub>6</sub>	μg	15.5	318
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.068	1.4
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2816
叶酸	μg	3.8	77.0
泛酸	μg	162	3323
维生素C	mg	4.2	85.2
生物素	μg	0.78	15.9
胆碱	mg	6.2	127
钙	mg	6.2	126
磷	mg	22.5	461
钾	mg	15.9	326
镁	mg	1.7	34.8
铁	mg	0.30	6.15
锌	mg	0.15	3.08
锰	μg	5.22	107
铜	μg	21.3	436
钠	mg	11	227
硒	μg	4.5	92.2
氯	mg	19	384
碘	μg	0.74	15.2
可溶性成分	mg	2.0	40.6
乳糖	mg	1.4	28.7
牛磺酸	mg	0.7	15.1
左旋肉碱	mg	4.5	92.2
二十二碳六烯酸	mg	55.5	1110
二十碳四烯酸	mg	65.8	1347
低聚半乳糖	mg	38.1	781
1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	g	0.13	2.6
叶黄素	μg	17.32	350
核黄素	mg	0.89	18.3
乳铁蛋白	mg	0.80	16.4



净含量:800克 国食注字YP20230120

## 2 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

**卡倍多®** 本公司已通过: 质量管理体系 (ISO9001) 认证, 乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证, 乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证。

**冲泡方法**

1. 冲调前洗净双手, 将干净的奶瓶、奶嘴和奶嘴盖放入清水中煮沸5分钟。
2. 冲调用水煮沸后冷却至40°C-45°C, 在奶瓶中加入适量的温开水。
3. 用量勺量取准确份量的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶, 推动塞奶粉充分溶解, 摇晃均匀前请在手腕内侧测试温度, 温度适宜即可哺喂。

**注意事项**

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起婴儿的不适。
- 2、喂哺时应抱着婴儿, 如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌要逐步添加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适再逐步递增1/4, 直到宝宝完全适应。
- 4、食用本产品时, 须配合添加辅食。

食品生产许可证编号: SC12961011400882  
产品标准代号: GB10766-2021  
产品类别: 较大婴儿配方羊奶粉  
产品属性: 乳基、粉状  
保质期: 24个月  
生产日期、批号: 见罐底喷码

产地: 陕西 西安  
生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址: 西安市周至县关山镇  
电话: 029-86822282  
客服电话: 029-81612722  
公司网址: www.youjigoatmilk.com

保持环境清洁 请勿乱丢空罐

咨询热线: 4008-616-909  
扫一扫, 查看详情, 连接卡倍多

947402300526



商品名称面积=336.09



商标总面积=298.28

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

通用名称面积总计=1780.4

# 标签17

175mm

393.8mm

**配料表**

生乳乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 B-12、核苷酸（5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（α-D-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B<sub>1</sub>（盐酸硫胺素）、维生素B<sub>2</sub>（核黄素）、维生素B<sub>6</sub>（盐酸吡哆醇）、维生素B<sub>12</sub>（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、四氢苯、胆（胆碱）、镁（硫酸镁）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸钙）、磷（磷酸钙）、铜（亚硫酸铜）。

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

**贮存条件**

- 1、本品贮于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
- 2、每次食用后，请盖紧罐盖。
- 3、开罐后请于四周内用完。

**喂哺建议表**

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	
6-8月	180	6	4-5
9-10月	210	7	3-4
10-12月	210	7	3-4

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。

**营养成分表**

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2048
蛋白质	g	0.63	13.0
脂肪	g	1.19	24.3
碳水化合物	g	0.15	3.16
α-亚麻酸	mg	15	308
维生素A	μg RE	23	461
维生素D	μg	0.60	12.3
维生素E	μg α-TE	0.38	7.85
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.98	40.6
维生素B <sub>1</sub>	μg	21	434
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	557
维生素B <sub>6</sub>	μg	15.5	318
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.068	1.4
烟酸（烟酰胺）	μg	338	2814
叶酸	μg	3.8	77.0
泛酸	μg	162	3321
维生素C	mg	4.2	85.2
生物素	μg	0.78	15.9
胆碱	mg	6.2	127
肌醇	mg	6.2	126
钠	mg	22.6	461
钾	mg	15.9	326
镁	mg	3.7	34.8
铁	mg	0.30	6.15
锌	mg	0.15	3.08
锰	μg	5.22	107
钙	mg	21.3	436
磷	mg	11	227
铜	μg	4.5	92.2
硒	μg	19	384
碘	μg	0.74	15.2
可选择成分	mg	2.0	40.6
乳糖	mg	1.4	28.7
左旋肉碱	mg	0.7	15.1
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.2
三-硬脂甘油酯	mg	15.4	310
低聚半乳糖	mg	65.8	1347
低聚果糖	mg	38.1	781
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.6
叶黄素	μg	7.32	150
核苷酸	mg	0.89	18.3
乳铁蛋白	mg	0.80	16.4



## 卡倍多®



净含量:900克

国食注字YP20230120

# 2

## 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

### 卡倍多®

本公司已通过：  
质量管理体系 (ISO9001) 认证  
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证  
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

#### 冲泡方法



1 冲泡前洗净双手。



2 冲调用水煮沸后冷却至40°C-45°C，在奶瓶中加入需要量的温开水。



3 用量勺量取准确份量的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。



4 盖紧奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后倒一满奶液在手腕内侧测试温度，温度适宜即可喂哺。

#### 注意事项

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起婴儿的不适。
- 2、喂哺时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
- 4、食用本产品时，须配合添加辅助食品。

食品生产许可证编号：SC12961011400882  
产品标准代号：GB10766-2021  
产品类型：较大婴儿配方羊奶粉  
产品属性：乳基 奶状  
保质期：24个月  
生产日期、批号：见罐底喷码

咨询热线  
4008-616-909



扫一扫，尽享福利，尽享卡倍多

产地：陕西 西安  
生产商：陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址：西安市阎良区关山镇  
电话：029-86822282  
客服电话：029-81612722  
公司网址：www.youjigaoatmilk.com

保持环境清洁  
请勿乱丢空罐



6 19474021309383



商品名称面积=336.09



商标总面积=298.28

# 较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

通用名称面积总计=1780.4

# 标签18

258.1mm

113.5mm

**配料表**

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生白蛋白、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-核苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B<sub>1</sub>（硫胺素）、维生素B<sub>2</sub>（核黄素）、维生素B<sub>6</sub>（吡哆素）、维生素B<sub>12</sub>（钴胺素）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、铜（硫酸铜）、铁（硫酸亚铁）、钾（硫酸钾）、锰（硫酸锰）、钙（磷酸钙）、磷（磷酸钾）、硒（亚硒酸钠）、

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

**贮存条件**

- 1、本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
- 2、每次食用后，请盖紧瓶盖。
- 3、开罐后请于四周内用完。

**喂哺建议表**

幼儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (勺)	
12~24月	210	7	3~4
24~36月	210	7	2~3

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。

**营养成分表**

项目	单位	每100g	每100kcal
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	0.70	14.3
脂肪	g	11.8	23.9
总糖	g	0.15	2.98
α-脂肪酸	mg	15	305
碳水化合物	g	2.6	52.4
维生素			
维生素A	μg	RE: 23	458
维生素D	μg	0.60	12.2
维生素E	mg	0.39	7.56
维生素K	μg	2.00	40.6
维生素B <sub>1</sub>	μg	22	451
维生素B <sub>2</sub>	μg	35	718
维生素B <sub>6</sub>	μg	16.3	331
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.079	1.6
烟酸(烟酰胺)	μg	143	2913
叶酸	μg	3.8	77.5
泛酸	μg	149	3037
维生素C	mg	3.1	62.8
生物素	μg	0.73	14.9
矿物质			
钠	mg	10.2	208
钾	mg	27.6	560
钙	mg	16.3	331
镁	mg	1.9	37.8
磷	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.15	2.96
铜	mg	21.7	440
铁	mg	13	268
锰	mg	4.1	82.5
硒	mg	23	469
可溶性成分			
钙	μg	0.70	14.3
胆碱	mg	6.4	131
铁	μg	4.81	97.8
维生素	mg	2.6	52.6
牛磺酸	mg	1.2	24.5
左旋肉碱	mg	1.1	22.0
二十二碳六烯酸	mg	2.3	46.2
二十碳四烯酸	mg	2.4	49.0
低聚半乳糖	mg	44.2	898
低聚果糖	mg	38.5	777
1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	mg	0.12	2.5
叶黄素	μg	7.38	150
核苷酸	mg	0.93	18.9
乳铁蛋白	mg	0.79	16.1



净含量120克 国食注字YP20230121

## 3 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

**卡倍多®**

本公司已通过：  
质量管理体系 (ISO9001) 认证  
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证  
乳制品营养成分与关键控制点 (HACCP) 体系认证

**冲调方法**

1. 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶盖放入清水中煮沸5分钟。
2. 冲调用水煮沸后冷却至40°C-45°C，在奶瓶中加入所需量的温开水。
3. 用量勺量取规定份量的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶，推动奶瓶充分溶解，然后沿一薄奶液在手掌内做圆周式温度，温度适宜即可喂哺。

**注意事项**

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起幼儿的不适。
- 2、喂哺时应抱着幼儿，如疏忽照顾可能会引起幼儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。

食品生产许可证编号：SC12961011400882  
产品标准代号：GB10767-2021  
产品类别：幼儿配方羊奶粉  
产品属性：乳基、粉状  
保质期：24个月  
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西·西安  
生产商：陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址：西安市海陵区关山镇  
电话：029-86822282  
客服热线：029-81612722  
公司网址：www.youjigatmilk.com

咨询热线：4008-616-909

扫一扫，登录官网，走进卡倍多

保持环境清洁 请勿乱丢空罐

6 947402 309451

5.3x7.4=39.22 5.6x7.3=40.88 5.8x7.4=42.92



商品名称面积=123.02

17.1x4.9=83.79



商标总面积=131.81

9.8x4.9=48.02



7.7x8.3=63.91 8x8.1=64.8 8x7.4=59.2 8.1x8.4=68.04 8.1x8.4=68.04 7.9x8.3=65.57 8.4x8.3=69.72 7.4x5.8=42.92 8x5.9=46.4 5.6x8.8=38.08 7.2x7.2=51.84 3.5x5.9=20.65 7.2x7.1=51.12

幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

通用名称面积总计=710.29

# 标签19

145mm

393.8mm

### 配料表

生羊乳、脱盐羊乳、植物油、食用植物油脂和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种04-12、核苷酸（5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B<sub>1</sub>（盐酸硫胺素）、维生素B<sub>2</sub>（核黄素）、维生素B<sub>6</sub>（盐酸吡哆醇）、维生素B<sub>12</sub>（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、甜（低聚糖）、铁（低聚铁）、锌（低聚锌）、锰（低聚锰）、钙（低聚钙）、磷（低聚磷）、硒（低聚硒）、碘（低聚碘）。

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

### 贮存条件

- 1、本品贮于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
- 2、每次食用后，请盖紧罐盖。
- 3、开罐后请于四周内用完。

哺喂建议表		
幼儿年龄	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)
12~24月	210	7
24~36月	210	7

每量勺奶粉4.5g

注：以上的哺喂量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	0.20	14.2
脂肪	g	1.18	23.9
碳水化合物	g	0.15	2.98
α-亚麻酸	mg	15	305
维生素A	μg RE	23	458
维生素D	μg	0.60	12.2
维生素E	μg α-TE	0.39	7.86
维生素K	μg	2.00	40.6
维生素B <sub>1</sub>	μg	22	451
维生素B <sub>2</sub>	μg	35	718
维生素B <sub>6</sub>	μg	16.3	331
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.079	1.6
烟酸（烟酰胺）	μg	143	2913
叶酸	μg	3.8	77.5
泛酸	μg	149	3027
维生素C	mg	3.1	62.8
生物素	μg	0.73	14.9
矿物质	mg	10.2	208
钠	mg	27.6	560
钾	mg	16.3	331
镁	mg	1.9	37.8
铁	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.15	2.96
铜	mg	21.7	440
磷	mg	13	268
碘	μg	4.1	82.5
硒	μg	23	469
可选择成分	μg	0.70	14.3
碘	μg	6.4	131
锰	μg	4.81	97.8
果糖	mg	2.6	52.6
牛磺酸	mg	1.2	24.5
左旋肉碱	mg	1.1	22.0
二十二碳六烯酸	mg	2.3	46.2
二十碳四烯酸	mg	2.4	49.0
低聚半乳糖	mg	44.2	898
低聚果糖	mg	38.2	772
1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	g	0.12	2.5
叶黄素	μg	7.38	150
核苷酸	mg	0.93	18.9
乳铁蛋白	mg	0.79	16.1



## 卡倍多®

净含量: 350克      国食注字YP20230121

# 3

## 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

### 冲调方法



1. 冲调前洗净双手。
2. 冲调用水煮沸后冷却至40℃-45℃。
3. 用勺子量取准确份量加入奶粉中。
4. 摇匀奶粉。

冲调时请参照奶粉罐上的说明。奶粉加入奶粉罐中，加入适量的温开水。

### 注意事项

- 1、水和奶粉未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起幼儿的不适。
- 2、喂奶时应抱着幼儿，如疏忽照顾可能会引起幼儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝有无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。

本公司已通过：  
质量管理体系 (ISO9001) 认证  
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证  
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

食品生产许可证编号: SC12961011400882  
产品标准代号: GB10767-2021  
产品类别: 幼儿配方羊奶粉  
产品属性: 乳基 粉状  
保质期: 24个月  
生产日期、批号: 见罐底喷码

产地: 陕西 西安  
生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址: 西安中周民民梁山  
电话: 029-86822282  
客服电话: 029-81612722  
公司网址: www.youjigoutaimitk.com

咨询热线: 4008-616-909  
扫一扫, 了解更多




6 1947402 508065



商品名称面积=200.17



商标总面积=213.98

4761-4316 7361-6416 7461-4316 1020-031-0516 10261-4918 1031-101-1918 1041-011-1118 1011-011-1015 1011-011-1312 9107-4703 10207-5765 7287-4214 9261-4312 4507-5375 9261-8216

# 幼儿配方羊奶粉 (12 - 36 月龄 , 3 段)

通用名称面积总计=1155.52

# 标签20

158mm

393.8mm

**配料表**

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚果糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚混合酯）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B<sub>1</sub>（盐酸硫胺素）、维生素B<sub>2</sub>（核黄素）、维生素B<sub>6</sub>（盐酸吡哆醇）、维生素B<sub>12</sub>（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、铜（硫酸铜）、铁（硫酸亚铁）、钾（硫酸钾）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸钙）、碘（碘酸钾）、硒（亚硒酸钠）

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

**贮存条件**

- 1、本品应于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
- 2、每次食用后，请盖紧瓶盖。
- 3、开封后请于四周内用完。

**喂哺建议表**

幼儿年龄	每次喂哺量 温开用水量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	每日喂哺次数
12-24月	210	7	3 4
24-36月	210	7	2 3

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。

**营养成分表**

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	6.70	14.3
脂肪	g	1.15	23.9
总糖	g	0.15	2.98
α-亚麻酸	mg	15	305
碳水化合物	g	2.6	52.4
维生素			
维生素A	μg	RD 23	458
维生素D	μg	0.60	12.2
维生素E	μg	0.39	7.86
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.00	40.6
维生素B <sub>1</sub>	μg	22	451
维生素B <sub>2</sub>	μg	35	718
维生素B <sub>6</sub>	μg	16.3	331
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.079	1.6
烟酸（烟酰胺）	μg	143	2913
叶酸	μg	3.8	77.5
泛酸	μg	149	3037
维生素C	mg	3.1	62.8
生物素	μg	0.73	14.9
矿物质			
钠	mg	10.2	208
钾	mg	27.6	560
钙	mg	16.3	331
镁	mg	1.9	37.8
铁	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.15	2.96
铜	mg	21.7	440
碘	mg	13	268
硒	μg	4.1	82.5
氯	mg	23	469
可选择成分			
碘	μg	0.70	14.3
烟酸	μg	4.4	89
铁	μg	4.81	97.8
肌醇	mg	2.6	52.6
牛磺酸	mg	1.2	24.5
左旋肉碱	mg	3.1	62.0
二十二碳六烯酸	mg	2.3	46.2
二十碳四烯酸	mg	2.4	49.0
低聚果糖	mg	44.2	898
低聚果糖	mg	38.2	777
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.5
叶黄素	μg	7.38	150
核苷酸	mg	0.93	18.9
乳铁蛋白	mg	0.79	16.1



净含量:680克 国食注字YP20230121

# 3

## 幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄, 3段)

**卡倍多®** 本公司已通过：  
质量管理体系 (ISO9001) 认证  
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证  
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

**冲调方法**

- 1 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶盖放入清水中煮沸5分钟。
- 2 冲调用水煮沸后冷却至40°C-45°C，在奶瓶中加入需要量的温开水。
- 3 用量勺量取准确份量的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶中。
- 4 摇匀奶瓶，帮助奶粉充分溶解，然后滴一两滴凉在手腕内侧测试温度，温度适宜即可喂哺。

**注意事项**

- 1、水和奶粉未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起幼儿的不适。
- 2、喂哺时应稍倾斜奶瓶，如疏忽照顾可能会引起幼儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。

食品生产许可证编号：SC12961011400882  
产品标准代号：GB10767-2021  
产品类型：幼儿配方羊奶粉  
产品属性：乳基、粉状  
保质期：24个月  
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西-西安  
生产商：陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址：西安市雁塔区丈八镇  
电话：029-86822282  
客服电话：029-81612722  
公司网址：www.youjigotmilk.com

保持环境清洁 请勿乱丢空罐

扫描二维码，注册卡倍多

4008-616-909

6 9474021309420

7&103-7828 79x103-8137 8x103-824

卡倍多®

24x63-15496 卡倍多®

117x69-9453 秦龙®

商品名称面积=242.05 商标总面积=249.51

107x116-13412 115x112-12432 115x103-11433 112x116-12992 113x112-13221 11x113-10665 11&116-116156 113&114&143 111&12-9102 7&104-7332 10x10-100 51&10-408 10&1-797

# 幼儿配方羊奶粉 (12 - 36 月龄, 3 段)

通用名称面积总计=1371.53

# 标签21

175mm

393.8mm

**配料表**

生乳乳、脱脂羊乳清粉、食用糖调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种（Bb-12）、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇棕榈酸酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B<sub>1</sub>（盐酸硫胺素）、维生素B<sub>2</sub>（核黄素）、维生素B<sub>3</sub>（盐酸吡哆醇）、维生素B<sub>5</sub>（蛋氨酸）、维生素B<sub>6</sub>（烟酰胺）、叶酸（邻氨基苯甲酰-L-谷氨酸钠）、生物素（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、铜（硫酸铜）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸钙）、磷（磷酸钙）、碘（碘酸钾）、硒（亚硒酸钠）。

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

**贮存条件**

- 1、本品贮于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
- 2、每次食用后，请盖紧罐盖。
- 3、开罐后请于四周内用完。

**喂哺建议表**

幼儿年龄	每次喂哺量 温开水冲量 (mL)	奶粉用量 (勺勺数)	每日喂哺次数
12~24月	210	7	3 4
24~36月	210	7	2 3

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。

**营养成分表**

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	0.70	14.3
脂肪	g	1.18	23.9
碳水化合物	g	0.15	2.98
α-亚麻酸	mg	15	305
维生素	g	2.6	52.4
维生素A	μg RE	23	458
维生素D	μg D.E	0.60	12.2
维生素E	mg α-TE	0.39	7.86
维生素K	μg	2.00	40.6
维生素B <sub>1</sub>	μg	22	451
维生素B <sub>2</sub>	μg	35	718
维生素B <sub>3</sub>	μg	16.3	331
维生素B <sub>5</sub>	μg	0.079	1.6
叶酸（邻氨基苯甲酰-L-谷氨酸钠）	μg	14.3	291.3
叶酸	μg	3.8	77.5
泛酸	μg	14.9	303.7
维生素C	mg	3.1	62.8
生物素	μg	0.73	14.9
矿物质	mg	10.2	208
钙	mg	27.6	560
磷	mg	16.3	331
钾	mg	1.9	37.8
铁	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.15	2.96
铜	μg	21.7	440
碘	μg	13	268
硒	μg	4.1	82.5
氯	mg	23	469
可溶性膳食纤维	g	0.70	14.3
膳食纤维	mg	6.4	131
锰	μg	4.81	97.9
钠	mg	2.6	52.5
牛磺酸	mg	1.2	24.5
左旋肉碱	mg	1.1	22.0
二十二碳六烯酸	mg	2.3	46.2
二十碳四烯酸	mg	2.4	49.0
低聚半乳糖	mg	44.2	898
低聚果糖	mg	38.2	777
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.5
核苷酸	μg	7.98	159
核苷酸	μg	0.93	18.9
乳铁蛋白	mg	0.79	16.1



卡倍多®



净含量:800克

国食注字YP20230121

3  
幼儿配方羊奶粉  
(12-36月龄, 3段)

卡倍多®

本公司已通过：  
质量管理体系（ISO9001）认证  
乳制品良好生产规范（GMP）体系认证  
乳制品危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证

**冲泡方法**



1 冲泡前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和瓶盖放入沸水中煮沸5分钟。



2 冲泡用水煮沸后冷却至40℃-45℃。在奶瓶中加入适量的温开水。



3 用量勺量取准确份量的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶中。



4 盖严奶瓶，推动至奶粉充分溶解，然后摇晃奶瓶至在手腕内倒测试温度，温度适宜即可喂哺。

**注意事项**

- 1、水和奶粉未经消毒或奶液浓度不当等可能引起幼儿的不适。
- 2、喂奶时应抱着幼儿，如疏忽照顾可能会引起幼儿窒息。
- 3、添加时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。

食品生产许可证编号：SC12961011400882  
产品标准代号：GB10767-2021  
产品类型：幼儿配方羊奶粉  
产品属性：乳基-粉状  
保质期：24个月  
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西 西安  
生产商：陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址：西安中商西谷关山镇  
电话：029-86422282  
客服电话：029-81612722  
公司网址：www.youjigaoaimilk.com

咨询热线  
4008-616-909



扫一扫，智慧管理，走进卡倍多

保持环境清洁 请勿乱丢空罐



商品名称面积=336.09



商标总面积=298.28

115612441426 119612116339 11961111309 119612414756 12201251030 117612414274 12461251055 114874957 11968740353 8410148484 1076106111342 52884674 107610411138

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)

通用名称面积总计=1569.82

# 标签22

175mm

393.8mm

**配料表**

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇棕榈酸酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B<sub>1</sub>（盐酸硫胺素）、维生素B<sub>2</sub>（核黄素）、维生素B<sub>3</sub>（盐酸烟酰胺）、维生素B<sub>5</sub>（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、甜（硫酸铜）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸钙）、磷（磷酸钾）、碘（亚硒酸钠）、

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

**贮存条件**

- 1、本品贮存阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
- 2、每次食用后，请盖紧瓶盖。
- 3、开罐后请于四周内用完。

**哺喂建议表**

幼儿年龄	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (勺数)	每日哺喂次数
12-24月	210	7	3 4
24-36月	210	7	2 3

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的哺喂量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。

**营养成分表**

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	0.70	14.3
脂肪	g	1.18	23.9
亚油酸	g	0.15	2.98
α-亚麻酸	mg	15	305
碳水化合物	g	2.6	52.4
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	23	458
维生素D	μg	0.60	12.2
维生素E	mg α-TE	0.39	7.86
维生素K	μg	2.00	40.6
维生素B <sub>1</sub>	μg	22	451
维生素B <sub>2</sub>	μg	35	718
维生素B <sub>3</sub>	μg	16.3	331
维生素B <sub>5</sub>	μg	0.079	1.6
泛酸	μg	143	2913
叶酸	μg	3.8	77.5
生物素	μg	149	3037
维生素C	mg	3.1	62.8
生物素	μg	0.73	14.9
<b>矿物质</b>			
钙	mg	10.2	208
钾	mg	27.6	560
镁	mg	16.3	331
钠	mg	1.9	37.8
铁	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.15	2.96
铜	mg	21.7	440
磷	mg	13	268
碘	μg	4.1	82.5
硒	μg	23	469
<b>可选择成分</b>			
碘	μg	0.70	14.3
胆碱	mg	6.4	131
锰	μg	4.81	97.8
肌醇	mg	2.6	52.6
牛磺酸	mg	1.2	24.5
左旋肉碱	mg	1.1	22.0
二十二碳六烯酸	mg	2.3	46.2
低聚半乳糖	mg	44.2	898
低聚果糖	mg	38.2	777
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.5
叶黄素	μg	7.38	150
核黄素	mg	0.93	18.9
乳铁蛋白	mg	0.79	16.1



## 卡倍多®



净含量:900克

国食注字YP20230121

# 3 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

## 卡倍多®

本公司已通过：  
质量管理体系 (ISO9001) 认证  
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证  
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

### 冲泡方法



1 冲泡前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶嘴盖放入清水中煮沸5分钟。



2 冲调用水煮沸后冷却至40℃-45℃，在奶嘴中加入需要量的温开水。



3 用量勺量取准确份量的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶中。



4 盖严奶瓶，推动至奶粉充分溶解，然后滴一滴奶液在手腕内侧测试温度，温度适宜即可哺喂。

### 注意事项

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起幼儿的不适。
- 2、哺喂时应抱着幼儿，如疏忽照顾可能会引起幼儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。

食品生产许可证编号：SC12961011400882  
产品标准代号：GB10767-2021  
产品类型：幼儿配方羊奶粉  
保质期：24个月  
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西 西安  
生产商：陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址：西安市阎良区关山镇  
电话：029-86822282  
客服电话：029-81612722  
公司网址：www.youjigotmilk.com

咨询热线  
4008-616-909



扫一扫，查看详情，走进卡倍多

保持环境清洁 请勿乱丢空罐  
6 947402 309390



商品名称面积=336.09



商标总面积=298.28

# 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

通用名称面积总计=1569.82

# 标签23

258.1x109.5mm 2023042417

## 配料表

生羊乳、乳糖、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、羊乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、左旋肉碱、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

## 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2102	胆碱	mg	6.7	141
蛋白质	g	0.54	11.3	<b>矿物质</b>			
脂肪	g	1.26	26.4	钠	mg	8.8	184
亚油酸	g	0.13	2.73	钾	mg	21.3	447
α-亚麻酸	mg	15	316	铜	μg	17.9	376
<b>碳水化合物</b>	g	2.6	54.2	镁	mg	1.6	33.7
<b>维生素</b>				铁	mg	0.16	3.35
维生素A	μg RE	18	368	锌	mg	0.15	3.20
维生素D	μg	0.60	12.7	锰	μg	2.70	56.7
维生素E	mg α-TE	0.38	7.96	钙	mg	15.0	316
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.19	46.0	磷	mg	9	189
维生素B <sub>1</sub>	μg	18	368	碘	μg	4.5	94.6
维生素B <sub>2</sub>	μg	28	594	氯	mg	18	381
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.5	305	硒	μg	0.90	19.0
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.057	1.2	<b>可选择成分</b>			
烟酸(烟酰胺)	μg	140	2949	左旋肉碱	mg	0.5	9.5
叶酸	μg	3.7	77.0	二十二碳六烯酸	mg	4.5	94.6
泛酸	μg	136	2863	二十碳四烯酸	mg	5.1	107
维生素C	mg	4.1	85.2	低聚果糖	mg	70.8	1488
生物素	μg	0.71	15.0	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.2

## 贮存条件

本品贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。每次食用后,请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。

## 重要声明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



# 欧蓓尔

## 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)



国食注字YP20230122

净含量: 100克

## 食用方法



1 冲调奶粉前使用肥皂或清水将手彻底洗净。2 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。3 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C,倒入经消毒后的奶瓶中。4 参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的奶粉倒入奶瓶中。5 奶粉倒入后,盖紧瓶盖摇动至奶粉充分溶解。6 在给宝贝喂奶粉前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。

## 喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(mL)	奶粉用量(量勺数)	
0~2周	60	2	7-8
2~4周	90	3	6-7
1~2月	120	4	5-6
2~4月	150	5	5-6
4~6月	180	6	5-6

每量勺奶粉约4.5g

## 爱心提示

① 调奶时注意参照喂哺建议表中的奶量和温开水进行冲调,用少或过多指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。② 请使用罐内专用量勺。③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。④ 冲奶时请按照喂哺建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑤ 本喂哺建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

## 企业信息

食品生产许可证编号: SC12961011400882  
 产品标准代号: GB10765-2021  
 产品类别: 婴儿配方羊奶粉  
 产品属性: 乳基、粉状  
 生产日期、批号: 见底部喷码 保质期: 24个月  
 生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司  
 地址: 西安市阎良区关山镇  
 产地: 陕西·西安  
 联系电话: 029-86822282  
 全国客服热线: 400-900-6678

## 本公司已通过:

质量管理体系(ISO9001)认证  
 乳制品良好生产规范(GMP)体系认证  
 乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证



6 947402 309468

# 标签24

393.8x175mm 2023042417

393mm

### 配料表

生羊乳、乳糖、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、羊乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、左旋肉碱、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

### 贮存条件

本品贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。  
每次食用后,请盖紧罐盖。  
开罐后请于四周内用完。

### 企业信息

食品生产许可证编号: SC12961011400882  
产品标准代号: GB10765-2021  
产品类别: 婴儿配方羊奶粉  
产品属性: 乳基·粉状  
保质期: 24个月  
生产日期、批号: 见底部喷码  
生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址: 西安市阎良区关山镇  
产地: 陕西·西安  
联系电话: 029-96522282  
全国客服热线: 400-900-6678



### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2102
蛋白质	g	0.54	11.3
脂肪	g	1.26	26.4
亚油酸	g	0.13	2.73
α-亚油酸	mg	15	316
碳水化合物	g	2.6	54.2
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	18	368
维生素D	μg	0.60	12.7
维生素E	mg α-TE	0.38	7.96
维生素K	μg	2.19	46.0
维生素B <sub>1</sub>	μg	18	368
维生素B <sub>2</sub>	μg	28	594
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.5	305
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.057	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	140	2949
叶酸	μg	3.7	77.0
泛酸	μg	136	2863
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.71	15.0
胆碱	mg	6.7	141
<b>矿物质</b>			
钠	mg	8.8	184
钾	mg	21.3	447
铜	μg	17.9	376
镁	mg	1.6	33.7
铁	mg	0.16	3.35
锌	mg	0.15	3.20
锰	μg	2.70	56.7
钙	mg	15.0	316
磷	mg	9	189
碘	μg	4.5	94.6
氯	mg	18	381
硒	μg	0.90	19.0
<b>可选择成分</b>			
左旋肉碱	mg	0.5	9.5
二十二碳六烯酸	mg	4.5	94.6
二十碳四烯酸	mg	5.1	107
低聚果糖	mg	70.8	1488
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.2



## 欧蓓尔 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)



国食注字YP20230122  
净含量: 800克

### 食用方法



- 1 冲调奶粉前使用肥皂或清水将手彻底洗净。
- 2 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。
- 3 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C,倒入经消毒后的奶瓶中。
- 4 参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的奶粉倒入奶瓶中。
- 5 奶粉倒入后,盖紧瓶盖摇动至奶粉充分溶解。
- 6 在给宝宝喂羊奶粉前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。

### 喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)		
0~2周	60	2	7	8
2~4周	90	3	6	7
1~2月	120	4	5	6
2~4月	150	5	5	6
4~6月	180	6	5	6

每量勺奶粉约4.5g

### 爱心提示

- ① 调奶时注意参照喂哺建议表中的奶量和温开水进行冲调,用太少或过多指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。
- ② 请使用罐内专用量勺。
- ③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。
- ④ 冲奶时请按照喂哺建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。
- ⑤ 本喂哺建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- ⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

### 重要声明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

### 本公司已通过:

质量管理体系 (ISO9001) 认证  
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证  
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证



175mm

# 标签25

258.1x109.5mm 2023042417

**配料表**

生羊乳、乳糖、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、羊乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、左旋肉碱、铜(硫酸铜)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)

营养成分表							
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2079	胆碱	mg	6.7	139
蛋白质	g	0.57	11.8	<b>矿物质</b>			
脂肪	g	1.22	25.4	钠	mg	5.9	123
亚油酸	g	0.15	3.20	钾	mg	22.5	468
α-亚麻酸	mg	15	312	铜	μg	15.3	318
碳水化合物	g	2.6	54.5	镁	mg	1.5	31.2
<b>维生素</b>				铁	mg	0.30	6.24
维生素A	μg RE	23	468	锌	mg	0.15	3.12
维生素D	μg	0.60	12.5	锰	μg	4.68	97.3
维生素E	mg α-TE	0.38	7.84	钙	mg	21.3	442
维生素K	μg	1.95	40.6	磷	mg	11	227
维生素B <sub>1</sub>	μg	20	420	碘	μg	4.5	93.6
维生素B <sub>2</sub>	μg	24	504	氯	mg	18	371
维生素B <sub>6</sub>	μg	15.5	323	硒	μg	0.68	14.1
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.053	1.1	<b>可选择成分</b>			
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2859	左旋肉碱	mg	0.6	11.5
叶酸	μg	3.7	76.3	二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
泛酸	μg	138	2863	二十四烯酸	mg	5.3	110
维生素C	mg	4.1	85.2	低聚果糖	mg	71.5	1486
生物素	μg	0.69	14.3	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	3.0

**贮存条件**

本品贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。每次食用后,请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。

**声明**

食用本产品时,须配合添加辅助食品




## 欧蓓尔

# 较大婴儿配方羊奶粉

### (6-12月龄, 2段)



国食注字YP20230123  
净含量: 100克

**食用方法**



- 1 冲调奶粉前使用肥皂或清水将手彻底洗净。
- 2 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。
- 3 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C,倒入经消毒后的奶瓶中。
- 4 参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的粉倒入奶瓶中。
- 5 奶粉倒入后,盖紧瓶盖摇动至奶粉充分溶解。
- 6 在给宝宝喂奶粉前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。

**喂哺建议表**

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)		
6~8月	180	6	4	5
8~10月	210	7	3	4
10~12月	210	7	3	4

每量勺奶粉约4.5g

**爱心提示**

① 调奶时注意参照喂哺建议表中的奶量和温开水进行冲调,用过多或过少指定份量的奶粉,会导致宝宝得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。② 请使用罐内专用量勺。③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。④ 冲奶时请按照喂哺建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑤ 本喂哺建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

**企业信息**

食品生产许可证编号: SC12961011400882  
产品标准代号: GB10766-2021  
产品类别: 较大婴儿配方羊奶粉  
产品属性: 乳基 粉状  
生产日期: 批号: 见底部喷码 保质期: 24个月  
生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址: 西安市阎良区关山镇  
产地: 陕西·西安  
联系电话: 029-86822282  
全国客服热线: 400-900-6678

**本公司已通过:**

质量管理体系 (ISO9001) 认证  
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证  
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证



6 947402 1309475



# 标签26

393.8x175mm 2023042417

393mm

175mm

### 配料表

生羊乳、乳糖、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、羊乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、左旋肉碱、铜(硫酸铜)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸氢钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

### 贮存条件

本品贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。每次食用后,请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。

### 企业信息

食品生产许可证编号: SC12961011400882  
产品标准代号: GB10766-2021  
产品类别: 较大婴儿配方羊奶粉  
产品属性: 乳基·粉状  
保质期: 24个月  
生产日期、批号: 见底部喷码  
生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司  
地址: 西安市阎良区关山镇  
产地: 陕西·西安  
联系电话: 029-86822282  
全国客服热线: 400-900-6678



### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2079
蛋白质	g	0.57	11.8
脂肪	g	1.22	25.4
亚油酸	g	0.15	3.20
α-亚麻酸	mg	15	312
碳水化合物	g	2.6	54.5
维生素			
维生素A	μg RE	23	468
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.38	7.84
维生素K	μg	1.95	40.6
维生素B <sub>1</sub>	μg	20	420
维生素B <sub>2</sub>	μg	24	504
维生素B <sub>6</sub>	μg	15.5	323
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.053	1.1
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2859
叶酸	μg	3.7	76.3
泛酸	μg	138	2863
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.69	14.3
胆碱	mg	6.7	139
矿物质			
钠	mg	5.9	123
钾	mg	22.5	468
钙	μg	15.3	318
镁	mg	1.5	31.2
铁	mg	0.30	6.24
锌	mg	0.15	3.12
锰	μg	4.68	97.3
铜	mg	21.3	442
碘	μg	11	227
氯	μg	4.5	93.6
硒	μg	18	371
硒	μg	0.68	14.1
可选择成分			
左旋肉碱	mg	0.6	11.5
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
二十碳四烯酸	mg	5.3	110
低聚果糖	mg	71.5	1486
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	3.0



## 欧蓓尔 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



国食注字YP20230123  
净含量: 800克

### 食用方法



- 1 冲调奶粉前使用肥皂或清水将手彻底洗净。
- 2 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。
- 3 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C,倒入经消毒后的奶瓶中。
- 4 参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的奶粉倒入奶瓶中。
- 5 奶粉倒入后,盖紧瓶盖摇动至奶粉充分溶解。
- 6 在给宝喂奶前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。

### 喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)		
6~8月	180	6	4	5
8~10月	210	7	3	4
10~12月	210	7	3	4

每量勺奶粉约4.5g

### 爱心提示

- ① 调奶时注意参照喂哺建议表中的奶量和温开水进行冲调,用太少或过多指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。
- ② 请使用罐内专用量勺。
- ③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。
- ④ 冲奶时请按照喂哺建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。
- ⑤ 本喂哺建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- ⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

### 声明

食用本产品时,须配合添加辅助食品

### 本公司已通过:

质量管理体系 (ISO9001) 认证  
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证  
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证



# 标签27

258.1x109.5mm 2023042417

### 配料表

生羊乳、乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、脱盐羊乳清粉、羊乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>3</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>5</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、左旋肉碱、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2051	钠	mg	6.1	125
蛋白质	g	0.60	12.4	钾	mg	22.5	462
脂肪	g	1.18	24.2	铜	μg	15.6	319
亚油酸	g	0.15	3.14	镁	mg	1.9	38.2
α-亚麻酸	mg	15	308	铁	mg	0.30	6.16
碳水化合物	g	2.7	54.9	锌	mg	0.14	2.88
维生素				钙	mg	21.3	436
维生素A	μg RE	23	462	磷	mg	12	236
维生素D	μg	0.60	12.4	碘	μg	4.2	86.2
维生素E	mg α-TE	0.38	7.86	氯	mg	20	406
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.98	40.6	可选择成分			
维生素B <sub>1</sub>	μg	20	420	硒	μg	0.69	14.2
维生素B <sub>2</sub>	μg	24	493	胆碱	mg	6.8	139
维生素B <sub>3</sub>	μg	15.7	321	锰	μg	4.81	98.7
维生素B <sub>5</sub>	μg	0.054	1.1	左旋肉碱	mg	0.5	10.8
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2821	二十二碳六烯酸	mg	2.2	45.2
叶酸	μg	3.7	76.1	二十碳四烯酸	mg	2.3	48.0
泛酸	μg	140	2875	低聚果糖	mg	72.5	1487
维生素C	mg	3.1	62.8	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.5
生物素	μg	0.72	14.8				

### 贮存条件

本品贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。每次食用后,请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。



## 欧蓓尔

# 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)



国食注字YP20230124

净含量: 100克

### 食用方法



① 冲调奶粉前使用肥皂或清水将手彻底洗净。② 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。③ 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C,倒入经消毒后的奶瓶中。④ 参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的奶粉倒入奶瓶中。⑤ 奶粉倒入后,盖紧瓶盖摇动至奶粉充分溶解。⑥ 在给宝贝喂养奶粉前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。

### 喂哺建议表

幼儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量(mL)	奶粉用量(量勺数)		
12~24月	210	7	3	4
24~36月	210	7	2	3

每量勺奶粉约4.5g

### 爱心提示

① 调奶时注意参照喂哺建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用过多或过多指定份量的奶粉,会令幼儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。② 请使用罐内专用量勺。③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。④ 冲奶时请按喂哺建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑤ 本喂哺建议表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见酌情增减。⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

### 企业信息

食品生产许可证编号: SC12961011400882  
 产品标准代号: GB10767-2021  
 产品类别: 幼儿配方羊奶粉  
 产品属性: 乳基 粉状  
 生产日期、批号: 见底部喷码 保质期: 24个月  
 生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司  
 地址: 西安市阎良区关山镇  
 产地: 陕西·西安  
 联系电话: 029-86822282  
 全国客服热线: 400-900-6678

### 本公司已通过:

质量管理体系(ISO9001)认证  
 乳制品良好生产规范(GMP)体系认证  
 乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证



# 标签28

393.8x175mm 2023042417

393mm

配料表		营养成分表			
生羊乳、乳糖、食用植物油和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 2-棕桐酸甘油三酯、脱盐乳清粉、羊乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>12</sub> (氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、左旋肉碱、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(磷酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)		项目	单位	每100kJ	每100g
致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。		能量	kJ	100	2051
贮存条件		蛋白质	g	0.60	12.4
本品贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。每次食用后,请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。		脂肪	g	1.18	24.2
企业信息		亚油酸	g	0.15	3.14
食品生产许可证编号: SC12961011400882 产品标准代号: GB10767-2021 产品类别: 幼儿配方羊奶粉 产品属性: 乳基·粉状 保质期: 24个月 生产日期、批号: 见底部喷码 生产商: 陕西秦龙乳业集团有限公司 地址: 西安市阎良区关山镇 产地: 陕西·西安 联系电话: 029-86822282 全国客服热线: 400-900-6678		α-亚麻酸	mg	15	308
企业标志		碳水化合物	g	2.7	54.9
企业标志		维生素			
企业标志		维生素A	μg RE	23	462
企业标志		维生素D	μg	0.60	12.4
企业标志		维生素E	mg α-TE	0.38	7.86
企业标志		维生素K	μg	1.98	40.6
企业标志		维生素B <sub>1</sub>	μg	20	420
企业标志		维生素B <sub>2</sub>	μg	24	493
企业标志		维生素B <sub>6</sub>	μg	15.7	321
企业标志		维生素B <sub>12</sub>	μg	0.054	1.1
企业标志		烟酸(烟酰胺)	μg	138	2821
企业标志		叶酸	μg	3.7	76.1
企业标志		泛酸	μg	140	2875
企业标志		维生素C	mg	3.1	62.8
企业标志		生物素	μg	0.72	14.8
企业标志		矿物质			
企业标志		钠	mg	6.1	125
企业标志		钾	mg	22.5	462
企业标志		钙	μg	15.6	319
企业标志		镁	mg	1.9	38.2
企业标志		铁	mg	0.30	6.16
企业标志		锌	mg	0.14	2.88
企业标志		铜	μg	21.3	436
企业标志		锰	mg	12	236
企业标志		磷	μg	4.2	86.2
企业标志		氯	mg	20	406
企业标志		可选择成分			
企业标志		硒	μg	0.69	14.2
企业标志		胆碱	mg	6.8	139
企业标志		锰	μg	4.81	98.7
企业标志		左旋肉碱	mg	0.5	10.8
企业标志		二十二碳六烯酸	mg	2.2	45.2
企业标志		二十碳四烯酸	mg	2.3	48.0
企业标志		低聚果糖	mg	72.5	1487
企业标志		1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	g	0.12	2.5



## 欧蓓尔

# 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)



国食注字YP20230124  
净含量: 800克



- 1 冲调奶粉前使用肥皂或清水将手彻底洗净。
- 2 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。
- 3 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C,倒入经消毒后的奶瓶中。
- 4 参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的奶粉倒入奶瓶中。
- 5 奶粉倒入后,盖紧瓶盖摇动至奶粉充分溶解。
- 6 在给宝宝喂奶粉前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。

幼儿年龄	喂哺建议表		每日喂哺次数	
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)		
12~24月	210	7	3	4
24~36月	210	7	2	3

每量勺奶粉约4.5g

### 爱心提示

- ① 调奶时注意参照喂哺建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用太少或多指定份量的奶粉,会令幼儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。
- ② 请使用罐内专用量勺。
- ③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。
- ④ 冲奶时请按照喂哺建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。
- ⑤ 本喂哺建议表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- ⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。



### 本公司已通过:

质量管理体系 (ISO9001) 认证  
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证  
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证



6 94 74 02 3 00 5 9 5

175mm