

附件 2：陕西秦龙天润乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签1

258.1x109.5mm 2024032817

配料表

生乳乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、叶黄素、维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、钠（柠檬酸钠）、钾（氯化钾）、铜（硫酸铜）、镁（硫酸镁）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸钙、磷酸三钙）、磷（磷酸三钙）、碘（碘酸钾）、硒（亚硒酸钠）

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2072	钠	毫克	7.4	153
蛋白质	克	0.56	11.6	钾	毫克	20.3	420
脂肪	克	1.23	25.5	铜	毫克	14.3	297
亚油酸	克	0.16	3.39	铁	毫克	1.7	35.4
α-亚麻酸	毫克	15	307	锌	毫克	0.16	3.32
碳水化合物	克	2.6	53.8	钙	毫克	0.16	3.36
维生素				磷	毫克	4.53	93.9
维生素A	微克	18.6	385	碘	毫克	16.1	334
维生素D	微克	0.59	12.2	硒	毫克	10.7	222
维生素E	微克	0.38	7.96	氯	毫克	4.3	88.6
维生素K ₁	微克	2.31	47.8	溴	毫克	17	354
维生素B ₁	微克	27	553	氟	毫克	0.82	17
维生素B ₂	微克	37	773	可溶性成分			
维生素B ₆	微克	16.2	336	二十二碳六烯酸	毫克	4.3	89.3
维生素B ₁₂	微克	0.077	1.6	二十碳四烯酸	毫克	4.8	100
烟酸（烟酰胺）	毫克	157	3263	低聚半乳糖	毫克	57.0	1181
叶酸	微克	4.4	91.7	低聚果糖	毫克	45.8	950
泛酸	微克	152	3156	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	克	0.15	3.13
维生素C	毫克	5.0	103.6	叶黄素	毫克	3.6	74.1
生物素	微克	0.75	15.5	乳铁蛋白	毫克	1.60	33.1
胆碱	毫克	6.7	139				

贮存条件

本品贮于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。每次食用后，请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。

秦龙®

秦龙®

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

1段

净含量:100克

国食注字YP20240053

冲调方法

① 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。
② 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40℃-45℃。
③ 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
④ 参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。
⑤ 将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。
⑥ 在为宝宝喂哺奶液前，请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温，温度适宜即可喂哺。

喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量 平均	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
0~2周	2	60	7~8
2~4周	3	90	6~7
1~2月	4	120	5~6
2~4月	5	150	5~6
4~6月	6	180	5~6

①调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调，用少于或多于指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平均奶粉约为4.5克。②请使用罐内专业量勺。③没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。④冲奶时请按照喂哺用量建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。⑤本喂哺用量建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见酌情增减。⑥喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。

重要声明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

相关信息

生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
地址：陕西省西安市阎良区人民路东延线
产地：陕西·西安
联系电话：029-86251865
食品生产许可证编号：SC10661011408008
产品标准代号：GB 10765-2021
产品类别：婴儿配方羊奶粉

产品属性：乳基·粉状
生产日期、批号：见底部喷码
保质期：24个月

6 973464 881635

标签2

393.8x165mm 2024032817

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2072
蛋白质	克	0.56	11.6
脂肪	克	1.23	25.5
亚油酸	克	0.16	3.39
α-亚麻酸	毫克	15	307
碳水化合物	克	2.6	53.8
维生素A	微克	18.6	385
维生素D	微克	0.59	12.2
维生素E	微克	0.38	7.96
维生素K ₁	微克	2.31	47.8
维生素B ₁	微克	27	553
维生素B ₂	微克	37	773
维生素B ₆	微克	16.2	336
维生素B ₁₂	微克	0.077	1.6
烟酸(烟酰胺)	微克	157	3263
叶酸	微克	4.4	91.7
泛酸	微克	152	3156
维生素C	毫克	5.0	103.6
生物素	微克	0.75	15.5
胆碱	毫克	6.7	139
矿物质			
钠	毫克	7.4	153
钾	毫克	20.3	420
铜	微克	14.3	297
镁	毫克	1.7	35.4
铁	毫克	0.16	3.32
锌	毫克	0.16	3.36
锰	微克	4.53	93.9
钙	毫克	16.1	334
磷	毫克	10.7	222
碘	微克	4.3	88.6
硒	毫克	17	354
维生素	微克	0.82	17
可溶性成分			
二十二碳六烯酸	毫克	4.3	89.3
二十碳四烯酸	毫克	4.8	100
低聚半乳糖	毫克	57.0	1181
低聚果糖	毫克	45.8	950
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	克	0.15	3.13
叶黄素	毫克	3.6	74.1
乳铁蛋白	毫克	1.60	33.1

生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
地址：陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地：陕西·西安
联系电话：029-86251865
食品生产许可证编号：SC10661011408008

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、叶黄素、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(di-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B ₁ (盐酸硫胺素)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素B ₁₂ (氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(磷酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)	
致敏物质提示：本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。	
贮存条件	
本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。每次食用后，请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。	
重要声明	
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。	

产品标准代号：GB 10765-2021
产品类别：婴儿配方羊奶粉
产品属性：乳基·粉状
生产日期、批号：见底部喷码
保质期：24个月



秦龙® 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)

1 段
净含量:400克



国食注字YP20240053

冲调方法



- ①先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。
- ②将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C。
- ③将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
- ④参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。
- ⑤将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。
- ⑥在为宝宝喂哺奶液前，请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温，温度适宜即可喂哺。

喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量 平均	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
0~2周	2	60	7~8
2~4周	3	90	6~7
1~2月	4	120	5~6
2~4月	5	150	5~6
4~6月	6	180	5~6

- ①调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调，用少于或多于指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平均奶粉约为4.5克。
- ②请使用罐内专业量勺。
- ③没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
- ④冲奶时请按照喂哺用量建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
- ⑤本喂哺用量建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- ⑥喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。

咨询电话
400-013-8789



6 973464 881642



标签3

393.8x175mm 2024032817

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2072
蛋白质	克	0.56	11.6
脂肪	克	1.23	25.5
亚油酸	克	0.16	3.39
α-亚麻酸	毫克	15	307
碳水化合物	克	2.6	53.8
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	18.6	385
维生素D	微克	0.59	12.2
维生素E	毫克α-生育酚	0.38	7.96
维生素K ₁	微克	2.31	47.8
维生素B ₁	微克	27	553
维生素B ₂	微克	37	773
维生素B ₆	微克	16.2	336
维生素B ₁₂	微克	0.077	1.6
烟酸(烟酰胺)	微克	157	3263
叶酸	微克	4.4	91.7
泛酸	微克	152	3156
维生素C	毫克	5.0	103.6
生物素	微克	0.75	15.5
胆碱	毫克	6.7	139
矿物质			
钠	毫克	7.4	153
钾	毫克	20.3	420
铜	微克	14.3	297
镁	毫克	1.7	35.4
铁	毫克	0.16	3.32
锌	毫克	0.16	3.36
锰	微克	4.53	93.9
钙	毫克	16.1	334
磷	毫克	10.7	222
碘	微克	4.3	88.6
氯	毫克	17	354
硒	微克	0.82	17
可溶性成分			
二十二碳六烯酸	毫克	4.3	89.3
二十碳四烯酸	毫克	4.8	100
低聚半乳糖	毫克	57.0	1181
低聚果糖	毫克	45.8	950
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	克	0.15	3.13
叶黄素	微克	3.6	74.1
乳铁蛋白	毫克	1.60	33.1

相关信息

生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
地址：陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地：陕西·西安
联系电话：029-86251865
食品生产许可证编号：SC10661011408008

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、叶黄素、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

贮存条件

本品贮于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。每次食用后，请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。

重要声明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



秦龙® 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)

1段
净含量:800克



国食注字YP20240053

冲调方法



- ①先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。
- ②将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C。
- ③将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
- ④参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。
- ⑤将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。
- ⑥在为宝宝喂哺奶液前，请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温，温度适宜即可喂哺。

喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量 平均	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
0~2周	2	60	7~8
2~4周	3	90	6~7
1~2月	4	120	5~6
2~4月	5	150	5~6
4~6月	6	180	5~6

- ①调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调，用少于或多于指定份量的奶粉，会让婴儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。
- ②请使用罐内专业量勺。
- ③没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
- ④冲奶时请按照喂哺用量建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
- ⑤本喂哺用量建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- ⑥喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。



咨询电话
400-013-8789



标签4

393.8x165mm 2024032817

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2016
蛋白质	克	0.64	12.9
脂肪	克	1.15	23.2
亚油酸	克	0.20	4.06
α-亚麻酸	毫克	17	348
碳水化合物	克	2.7	53.9
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	21.6	435
维生素D	微克	0.61	12.2
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.41	8.24
维生素K ₁	微克	2.37	47.8
维生素B ₁	微克	27	549
维生素B ₂	微克	38	763
维生素B ₆	微克	17.2	347
维生素B ₁₂	微克	0.079	1.6
烟酸(烟酰胺)	毫克	162	3264
叶酸	微克	4.2	85.4
泛酸	毫克	160	3228
维生素C	毫克	5.1	103.6
生物素	微克	0.79	16.0
胆碱	毫克	6.7	136
矿物质			
钠	毫克	5.6	112
钾	毫克	24.7	497
铜	微克	12.9	260
镁	毫克	1.7	34.3
铁	毫克	0.27	5.42
锌	毫克	0.16	3.27
锰	毫克	5.01	101
钙	毫克	19.1	386
磷	毫克	12.8	259
碘	微克	4.3	87.3
硒	微克	21	433
氯	毫克	0.74	15
可溶性成分			
二十二碳六烯酸	毫克	4.4	89.3
二十碳四烯酸	毫克	5.1	103
低聚半乳糖	毫克	87.9	1772
低聚果糖	毫克	47.1	950
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	克	0.13	2.59
叶黄素	毫克	10.1	204
乳铁蛋白	毫克	0.99	19.9

生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
地址：陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地：陕西·西安
联系电话：029-86251865
食品生产许可证编号：SC10661011408008

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、乳糖、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、叶黄素、维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B ₁ （盐酸硫胺素）、维生素B ₂ （核黄素）、维生素B ₆ （盐酸吡哆醇）、维生素B ₁₂ （氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、钾（氯化钾）、铜（硫酸铜）、镁（硫酸镁）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸钙、磷酸三钙）、磷（磷酸三钙）、碘（碘酸钾）、硒（亚硒酸钠）	
致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。	
贮存条件	
本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。每次食用后，请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。	
重要声明	
须配合添加辅助食品。	

产品标准代号：GB 10766-2021
产品类别：较大婴儿配方羊奶粉
产品属性：乳基·粉状
生产日期、批号：见底部喷码
保质期：24个月



秦龙®
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)

2段
净含量:400克



国食注字YP20240054

冲调方法



- ①先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。
- ②将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C。
- ③将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
- ④参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。
- ⑤将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇晃至奶粉充分溶解。
- ⑥在为宝宝喂哺奶前，请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温，温度适宜即可喂哺。

喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量 平均	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
6~8月	6	180	4~5
8~12月	7	210	3~4

- ①调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调，用少于或多于指定份量的奶粉，会令较大婴儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。
- ②请使用罐内专业量勺。
- ③没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
- ④冲奶时请按照喂哺用量建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
- ⑤本喂哺用量建议表是参照正常发育较大婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- ⑥喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。



6 973464 881659

咨询电话
400-013-8789



标签5

393.8x175mm 2024032817

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2016
蛋白质	克	0.64	12.9
脂肪	克	1.15	23.2
亚油酸	克	0.20	4.06
α-亚麻酸	毫克	17	348
碳水化合物	克	2.7	53.9
维生素			
维生素A	微克	21.6	435
维生素D	微克	0.61	12.2
维生素E	毫克	0.41	8.24
维生素K ₁	微克	2.37	47.8
维生素B ₁	微克	27	549
维生素B ₂	微克	38	763
维生素B ₆	微克	17.2	347
维生素B ₁₂	微克	0.079	1.6
烟酸(烟酰胺)	微克	162	3264
叶酸	微克	4.2	85.4
泛酸	微克	160	3228
维生素C	毫克	5.1	103.6
生物素	微克	0.79	16.0
胆碱	毫克	6.7	136
矿物质			
钠	毫克	5.6	112
钾	毫克	24.7	497
铜	微克	12.9	260
镁	毫克	1.7	34.3
铁	毫克	0.27	5.42
锌	毫克	0.16	3.27
锰	微克	5.01	101
钙	毫克	19.1	386
磷	毫克	12.8	259
碘	微克	4.3	87.3
氯	毫克	21	433
硒	微克	0.74	15
可溶性成分			
二十二碳六烯酸	毫克	4.4	89.3
二十碳四烯酸	毫克	5.1	103
低聚半乳糖	毫克	87.9	1772
低聚果糖	毫克	47.1	950
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	克	0.13	2.59
叶黄素	微克	10.1	204
乳铁蛋白	毫克	0.99	19.9

生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
地址：陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地：陕西·西安
联系电话：029-86251865
食品生产许可证编号：SC10661011408008

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、叶黄素、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B ₁ (盐酸硫胺素)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素B ₁₂ (氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、磷(磷酸钾)、硒(亚硒酸钠)	
致敏物质提示：本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。	
贮存条件	
本品贮于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。每次食用后，请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。	
重要声明	
须配合添加辅助食品。	

产品标准代号：GB 10766-2021
产品类别：较大婴儿配方羊奶粉
产品属性：乳基·粉状
生产日期、批号：见底部喷码
保质期：24个月



秦龙® 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

2段
净含量:800克



国食注字YP10240054

冲调方法



- ①先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。
- ②将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C。
- ③将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
- ④参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。
- ⑤将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。
- ⑥在为宝宝喂哺奶液前，请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温，温度适宜即可喂哺。

喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量 平勺	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
6~8月	6	180	4~5
8~12月	7	210	3~4

- ①调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调，用少于或多于指定份量的奶粉，会令较大婴儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。
- ②请使用罐内专业量勺。
- ③没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
- ④冲奶时请按照喂哺用量建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
- ⑤本喂哺用量建议表是参照正常发育较大婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- ⑥喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。



咨询电话
400-013-8789



标签6

393.8x165mm 2024032817

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2029
蛋白质	克	0.76	15.5
脂肪	克	1.20	24.3
亚油酸	克	0.17	3.44
α-亚麻酸	克	14	293
碳水化合物	克	2.4	49.7
维生素			
维生素A	微克	21.8	443
维生素D	微克	0.60	12.2
维生素E	毫克	0.40	8.07
维生素K ₁	微克	2.36	47.8
维生素B ₁	毫克	28	565
维生素B ₂	毫克	33	670
维生素B ₆	毫克	17.6	357
维生素B ₁₂	微克	0.099	2.0
烟酸(烟酰胺)	毫克	164	3331
叶酸	微克	4.3	86.3
泛酸	毫克	189	3829
维生素C	毫克	3.8	76.4
生物素	微克	0.91	18.5
矿物质			
钠	毫克	8.2	166
钾	毫克	29.3	594
铜	毫克	14.3	291
铁	毫克	2.2	43.9
锌	毫克	0.30	6.14
锰	毫克	0.14	2.87
氯	毫克	22.4	454
磷	毫克	15.1	307
碘	毫克	3.5	70.9
硒	毫克	24	483
可溶性成分			
钙	毫克	0.79	16
胆碱	毫克	6.6	133
钾	毫克	4.98	101
二十二碳六烯酸	毫克	2.1	42.5
二十碳四烯酸	毫克	2.4	49.3
低聚半乳糖	毫克	87.3	1772
低聚果糖	毫克	46.8	950
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	克	0.13	2.55
叶黄素	毫克	10.1	204
乳铁蛋白	毫克	0.98	19.9

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、叶黄素、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、铜(硫酸铜)、锰(硫酸锰)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、钙(碳酸钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

贮存条件

本品贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。每次食用后,请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。

产品标准代号: GB 10767-2021
产品类别: 幼儿配方羊奶粉
产品属性: 乳基·粉状
生产日期、批号: 见底部喷码
保质期: 24个月

生产高: 陕西秦龙天润乳业有限公司
地址: 陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地: 陕西·西安
联系电话: 029-86251865
食品生产许可证编号: SC10661011408008



秦龙®

幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)

3段

净含量:400克



国食注字YP20240055

冲调方法



- ① 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。
- ② 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C。
- ③ 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
- ④ 参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。
- ⑤ 将量取的奶粉倒入奶瓶中,盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。
- ⑥ 在为宝宝喂哺奶液前,请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温,温度适宜即可喂哺。

喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量 平均	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
12~24月	7	210	3~4
24~36月	7	210	2~3

- ① 调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用少于或多于指定份量的奶粉,会令幼儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平均奶粉约为4.5克。
- ② 请使用罐内专业量勺。
- ③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
- ④ 冲奶时请按照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。
- ⑤ 本喂哺用量建议表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- ⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。



咨询电话
400-013-8789



保护环境
人人有责

标签7

393.8x175mm 2024032817

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2029
蛋白质	克	0.76	15.5
脂肪	克	1.20	24.3
亚油酸	克	0.17	3.44
α-亚麻酸	毫克	14	293
碳水化合物	克	2.4	49.7
维生素			
维生素A	微克	21.8	443
维生素D	微克	0.60	12.2
维生素E	毫克	0.40	8.07
维生素K ₁	微克	2.36	47.8
维生素B ₁	微克	28	565
维生素B ₂	微克	33	670
维生素B ₆	微克	17.6	357
维生素B ₁₂	微克	0.099	2.0
烟酸（烟酰胺）	微克	164	3331
叶酸	微克	4.3	86.3
泛酸	微克	189	3829
维生素C	毫克	3.8	76.4
生物素	微克	0.91	18.5
矿物质			
钠	毫克	8.2	166
钾	毫克	29.3	594
铜	毫克	14.3	291
镁	毫克	2.2	43.9
铁	毫克	0.30	6.14
锌	毫克	0.14	2.87
钙	毫克	22.4	454
磷	毫克	15.1	307
碘	毫克	3.5	70.9
氯	毫克	24	483
可溶性成分			
硒	微克	0.79	16
胆碱	毫克	6.6	133
锰	微克	4.98	101
二十二碳六烯酸	毫克	2.1	42.5
二十碳四烯酸	毫克	2.4	49.3
低聚半乳糖	毫克	87.3	1772
低聚果糖	毫克	46.8	950
1,3-二糖-2-磷酸甘油三酯	克	0.13	2.55
叶黄素	微克	10.1	204
乳铁蛋白	毫克	0.98	19.9

生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
地址：陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地：陕西·西安
联系电话：029-86251865
食品生产许可证编号：SC10661011408008

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油）、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、叶黄素、维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-脂酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B ₁ （盐酸硫胺素）、维生素B ₂ （核黄素）、维生素B ₆ （盐酸吡哆醇）、维生素B ₁₂ （氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、铜（硫酸铜）、锰（硫酸锰）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、钙（碳酸钙）、碘（碘酸钾）、硒（亚硒酸钠）	
致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。	
贮存条件	
本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。每次食用后，请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。	

产品标准代号：GB 10767-2021
产品类别：幼儿配方羊奶粉
产品属性：乳基·粉状
生产日期、批号：见底部喷码
保质期：24个月



秦龙®
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)

3段
净含量:800克



国食注字YP10240055

冲调方法



①先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。
②将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C。
③将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
④参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。
⑤将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。
⑥在为宝宝喂哺奶液前，请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温，温度适宜即可喂哺。

喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量 平均	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
12~24月	7	210	3~4
24~36月	7	210	2~3

①调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调，用少于或多于指定份量的奶粉，会令幼儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。
②请使用罐内专业量勺。
③没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
④冲奶时请按照喂哺用量建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
⑤本喂哺用量建议表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
⑥喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。



6 973464 880836



咨询电话
400-013-8789



保护环境
人人有责

标签8

258.1x109.5mm 2024062615

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、氯化胆碱、左旋肉碱、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2072	碳水化合物	克	7.4	153
蛋白质	克	0.56	11.6	钠	毫克	20.3	420
脂肪	克	1.23	25.5	钾	毫克	14.3	297
亚油酸	克	0.19	3.93	铜	毫克	1.7	35.4
α-亚麻酸	毫克	19	402	铁	毫克	0.16	3.32
碳水化合物	克	2.6	53.8	锌	毫克	0.16	3.36
维生素				锰	毫克	4.53	93.9
维生素A	微克视黄醇当量	18.6	385	钙	毫克	16.1	334
维生素D	微克	0.59	12.2	磷	毫克	10.8	224
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.42	8.70	碘	微克	4.3	88.6
维生素K1	微克	2.31	47.9	氯	毫克	17	354
维生素B1	微克	27	553	硒	微克	0.82	17
维生素B2	微克	37	773	可选择成分			
维生素B6	微克	16.2	336	肌醇	毫克	3.5	73.4
维生素B12	微克	0.077	1.6	牛磺酸	毫克	1.8	36.9
烟酸(烟酰胺)	微克	157	3263	左旋肉碱	毫克	0.95	19.6
叶酸	微克	4.4	91.7	二十二碳六烯酸	毫克	4.4	92.0
泛酸	微克	152	3156	二十碳四烯酸	毫克	4.9	102
维生素C	毫克	5.0	103.6	低聚半乳糖	毫克	57.0	1181
生物素	微克	0.75	15.5	低聚果糖	毫克	45.8	950
胆碱	毫克	6.7	139	叶黄素	微克	3.6	74.1

贮存条件

1、本品贮于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。2、每次食用后，请盖紧罐盖。3、开罐后请于四周内用完。



欧瑞兹®

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)



1段

净含量:100克



国食注字YP20240058

冲调方法



①先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。②将饮用水煮沸5分钟后冷却至40℃-45℃。③将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。④参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。⑤将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。⑥在为宝宝喂哺奶液前，请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温，温度适宜即可喂哺。

喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量 平勺	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
0~2周	2	60	7~8
2~4周	3	90	6~7
1~2月	4	120	5~6
2~4月	5	150	5~6
4~6月	6	180	5~6

①调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调，用少于或多于指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。②请使用罐内专业量勺。③没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。④冲奶时请按照喂哺用量建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。⑤本喂哺用量建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。⑥喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。

相关信息

生产商:陕西秦龙天润乳业有限公司
地址:陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地:陕西·西安
联系电话:0571-88021261
食品生产许可证编号:SC10661011408008
产品标准代号:GB 10765-2021
产品类别:婴儿配方羊奶粉
产品属性:乳基·粉状
生产日期、批号:见底部喷码
保质期:24个月

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

咨询电话

400-0255-108



标签9

393.8x175mm 2024062615

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2072
蛋白质	克	0.56	11.6
脂肪	克	1.23	25.5
亚油酸	克	0.19	3.93
α-亚麻酸	毫克	19	402
碳水化合物	克	2.6	53.8
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	18.6	385
维生素D	微克	0.59	12.2
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.42	8.70
维生素K1	微克	2.31	47.9
维生素B1	微克	27	553
维生素B2	微克	37	773
维生素B6	微克	16.2	336
维生素B12	微克	0.077	1.6
烟酸(烟酰胺)	微克	157	3263
叶酸	微克	4.4	91.7
泛酸	微克	152	3156
维生素C	毫克	5.0	103.6
生物素	微克	0.75	15.5
胆碱	毫克	6.7	139
矿物质			
钠	毫克	7.4	153
钾	毫克	20.3	420
铜	微克	14.3	297
镁	毫克	17	35.4
铁	毫克	0.16	3.32
锌	毫克	0.16	3.36
锰	微克	4.53	93.9
钙	毫克	16.1	334
磷	毫克	10.8	224
碘	微克	4.3	88.6
氯	毫克	17	354
硒	微克	0.82	17
可溶性成分			
肌醇	毫克	3.5	73.4
牛磺酸	毫克	1.8	36.9
左旋肉碱	毫克	0.95	19.6
二十二碳六烯酸	毫克	4.4	92.0
二十碳四烯酸	毫克	4.9	102
低聚半乳糖	毫克	57.0	1181
低聚果糖	毫克	45.8	950
叶黄素	微克	3.6	74.1

相关信息

生产商:陕西秦龙天润乳业有限公司
地址:陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地:陕西·西安
联系电话:0571-88021261
食品生产许可证编号:SC10661011408008

产品标准代号:GB 10765-2021
产品类别:婴儿配方羊奶粉
产品属性:乳基·粉状
生产日期、批号:见底部喷码
保质期:24个月

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、氯化胆碱、左旋肉碱、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

贮存条件

- 1、本品贮于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。
- 2、每次食用后,请盖紧罐盖。
- 3、开罐后请于四周内用完。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



欧瑞兹® 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)



1段
净含量:800克



国食注字 YP20240058

冲调方法



- ①先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。
- ②将饮用水煮沸5分钟后冷却至40℃-45℃。
- ③将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
- ④参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。
- ⑤将量取的奶粉倒入奶瓶中,盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。
- ⑥在为宝宝喂哺奶液前,请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温,温度适宜即可喂哺。

喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量 平均	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
0~2周	2	60	7~8
2~4周	3	90	6~7
1~2月	4	120	5~6
2~4月	5	150	5~6
4~6月	6	180	5~6

- ①调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用少于或多于指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。
- ②请使用罐内专业量勺。
- ③没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
- ④冲奶时请按照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。
- ⑤本喂哺用量建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- ⑥喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。



咨询电话
400-0255-108



标签10

393.8x175mm 2024062615

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2072
蛋白质	克	0.56	11.6
脂肪	克	1.23	25.5
亚油酸	克	0.19	3.93
α-亚麻酸	毫克	19	402
碳水化合物	克	2.6	53.8
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	18.6	385
维生素D	微克	0.59	12.2
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.42	8.70
维生素K1	微克	2.31	47.9
维生素B1	微克	27	553
维生素B2	微克	37	773
维生素B6	微克	16.2	336
维生素B12	微克	0.077	1.6
烟酸(烟酰胺)	微克	157	3263
叶酸	微克	4.4	91.7
泛酸	微克	152	3156
维生素C	毫克	5.0	103.6
生物素	微克	0.75	15.5
胆碱	毫克	6.7	139
矿物质			
钠	毫克	7.4	153
钾	毫克	20.3	420
铜	微克	14.3	297
镁	毫克	17	35.4
铁	毫克	0.16	3.32
锌	毫克	0.16	3.36
锰	微克	4.53	93.9
钙	毫克	16.1	334
磷	毫克	10.8	224
碘	微克	4.3	88.6
氯	毫克	17	354
硒	微克	0.82	17
可溶性成分			
肌醇	毫克	3.5	73.4
牛磺酸	毫克	1.8	36.9
左旋肉碱	毫克	0.95	19.6
二十二碳六烯酸	毫克	4.4	92.0
二十碳四烯酸	毫克	4.9	102
低聚半乳糖	毫克	57.0	1181
低聚果糖	毫克	45.8	950
叶黄素	微克	3.6	74.1

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、氯化胆碱、左旋肉碱、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

贮存条件

- 1、本品贮于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
- 2、每次食用后，请盖紧罐盖。
- 3、开罐后请于四周内用完。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

相关信息

生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
地址：陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地：陕西·西安
联系电话：0571-88021261
食品生产许可证编号：SC10661011408008

产品标准代号：GB 10765-2021
产品类别：婴儿配方羊奶粉
产品属性：乳基·粉状
生产日期、批号：见底部喷码
保质期：24个月



欧瑞兹® 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)



1段
净含量：900克



国食注字 YP20240058

冲调方法



- ①先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。
- ②将饮用水煮沸5分钟后冷却至40℃-45℃。
- ③将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
- ④参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。
- ⑤将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。
- ⑥在为宝宝喂哺奶液前，请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温，温度适宜即可喂哺。

喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量 平均	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
0~2周	2	60	7~8
2~4周	3	90	6~7
1~2月	4	120	5~6
2~4月	5	150	5~6
4~6月	6	180	5~6

- ①调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调，用少于或多于指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。
- ②请使用罐内专业量勺。
- ③没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
- ④冲奶时请按照喂哺用量建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
- ⑤本喂哺用量建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- ⑥喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。



咨询电话
400-0255-108



标签11

393.8x175mm 2024062615

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2034
蛋白质	克	0.64	13.1
脂肪	克	1.19	24.2
亚油酸	克	0.17	3.51
α-亚麻酸	毫克	17	351
碳水化合物	克	2.6	52.6
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	21.6	439
维生素D	微克	0.60	12.2
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.43	8.70
维生素K1	微克	2.35	47.8
维生素B1	微克	27	549
维生素B2	微克	37	746
维生素B6	微克	17.1	347
维生素B12	微克	0.074	1.5
烟酸(烟酰胺)	微克	161	3277
叶酸	微克	4.2	85.3
泛酸	微克	159	3240
维生素C	毫克	5.1	103.6
生物素	微克	0.80	16.2
胆碱	毫克	6.6	135
矿物质			
钠	毫克	5.6	113
钾	毫克	25.5	519
铜	微克	12.8	260
镁	毫克	1.8	35.7
铁	毫克	0.27	5.42
锌	毫克	0.16	3.31
锰	微克	4.97	101
钙	毫克	19.7	400
磷	毫克	13.3	270
碘	微克	4.4	88.8
氯	毫克	22	455
硒	微克	0.74	15
可选择成分			
肌醇	毫克	3.1	63.8
牛磺酸	毫克	1.8	36.3
左旋肉碱	毫克	0.74	15.1
二十二碳六烯酸	毫克	4.4	89.3
二十碳四烯酸	毫克	5.1	103
低聚半乳糖	毫克	87.1	1772
低聚果糖	毫克	46.7	950
叶黄素	微克	10.0	204

- 贮存条件
- 1、本品贮于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。

2、每次食用后，请盖紧罐盖。

3、开罐后请于四周内用完。

重要声明

须配合添加辅助食品。

相关信息

生产商:陕西秦龙天润乳业有限公司

地址:陕西省西安市阎良区人民东路东延线

产地:陕西·西安

联系电话:0571-88021261

食品生产许可证编号:SC10661011408008

产品标准代号:GB 10766-2021

产品类别:较大婴儿配方羊奶粉

产品属性:乳基·粉状

生产日期、批号:见底部喷码

保质期:24个月

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、氯化胆碱、左旋肉碱、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、锰(硫酸锰)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。



欧瑞兹®

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)



2段

净含量:800克



国食注字 YP20240059



- 冲调方法
- ①先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。

②将饮用水煮沸5分钟后冷却至40℃-45℃。

③将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。

④参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。

⑤将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。

⑥在为宝宝喂哺奶液前，请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温，温度适宜即可喂哺。

喂哺用量建议表			
年龄	每次奶粉用量 平均	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
6~8月	6	180	4~5
8~12月	7	210	3~4

- ①调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调，用少于或多于指定份量的奶粉，会令较大婴儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。

②请使用罐内专业量勺。

③没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。

④冲奶时请按照喂哺用量建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。

⑤本喂哺用量建议表是参照正常发育较大婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。

⑥喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。



咨询电话

400-0255-108



标签12

393.8x175mm 2024062615

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2034
蛋白质	克	0.64	13.1
脂肪	克	1.19	24.2
亚油酸	克	0.17	3.51
α-亚麻酸	毫克	17	351
碳水化合物	克	2.6	52.6
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	21.6	439
维生素D	微克	0.60	12.2
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.43	8.70
维生素K1	微克	2.35	47.8
维生素B1	微克	27	549
维生素B2	微克	37	746
维生素B6	微克	17.1	347
维生素B12	微克	0.074	1.5
烟酸(烟酰胺)	微克	161	3277
叶酸	微克	4.2	85.3
泛酸	微克	159	3240
维生素C	毫克	5.1	103.6
生物素	微克	0.80	16.2
胆碱	毫克	6.6	135
矿物质			
钠	毫克	5.6	113
钾	毫克	25.5	519
铜	微克	12.8	260
镁	毫克	1.8	35.7
铁	毫克	0.27	5.42
锌	毫克	0.16	3.31
锰	微克	4.97	101
钙	毫克	19.7	400
磷	毫克	13.3	270
碘	微克	4.4	88.8
氯	毫克	22	455
硒	微克	0.74	15
可选择成分			
肌醇	毫克	3.1	63.8
牛磺酸	毫克	1.8	36.3
左旋肉碱	毫克	0.74	15.1
二十二碳六烯酸	毫克	4.4	89.3
二十碳四烯酸	毫克	5.1	103
低聚半乳糖	毫克	87.1	1772
低聚果糖	毫克	46.7	950
叶黄素	微克	10.0	204

相关信息

生产商:陕西秦龙天润乳业有限公司
地址:陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地:陕西·西安
联系电话:0571-88021261
食品生产许可证编号:SC10661011408008

产品标准代号:GB 10766-2021
产品类别:较大婴儿配方羊奶粉
产品属性:乳基·粉状
生产日期、批号:见底部喷码
保质期:24个月

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、氯化胆碱、左旋肉碱、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、锰(硫酸锰)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

贮存条件

- 1、本品贮于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。
- 2、每次食用后,请盖紧罐盖。
- 3、开罐后请于四周内用完。

重要声明

须配合添加辅助食品。



欧瑞兹®
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)



2 段
净含量:900克



国食注字 YP20240059

冲调方法



- ①先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。
- ②将饮用水煮沸5分钟后冷却至40℃-45℃。
- ③将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
- ④参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。
- ⑤将量取的奶粉倒入奶瓶中,盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。
- ⑥在为宝宝喂哺奶液前,请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温,温度适宜即可喂哺。

喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量 平均	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
6~8月	6	180	4~5
8~12月	7	210	3~4

- ①调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用少于或多于指定份量的奶粉,会令较大婴儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。
- ②请使用罐内专业量勺。
- ③没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
- ④冲奶时请按照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。
- ⑤本喂哺用量建议表是参照正常发育较大婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- ⑥喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。



咨询电话
400-0255-108



标签13

393.8x175mm 2024062615

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2043
蛋白质	克	0.71	14.6
脂肪	克	1.22	24.9
亚油酸	克	0.16	3.32
α-亚麻酸	毫克	16	332
碳水化合物	克	2.5	50.1
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	21.6	441
维生素D	微克	0.60	12.2
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.42	8.61
维生素K1	微克	2.34	47.8
维生素B1	微克	28	562
维生素B2	微克	32	660
维生素B6	微克	17.4	355
维生素B12	微克	0.093	1.9
烟酸(烟酰胺)	微克	163	3325
叶酸	微克	4.2	85.9
泛酸	微克	183	3740
维生素C	毫克	3.7	76.4
生物素	微克	0.89	18.2
矿物质			
钠	毫克	7.5	153
钾	毫克	27.9	570
铜	毫克	14.2	291
镁	毫克	2.0	41.8
铁	毫克	0.30	6.14
锌	毫克	0.14	2.85
钙	毫克	21.8	445
磷	毫克	14.5	296
碘	毫克	3.4	70.1
氯	毫克	23	470
可溶性成分			
硒	微克	0.78	16
胆碱	毫克	6.4	131
锰	微克	4.94	101
肌醇	毫克	2.9	58.6
牛磺酸	毫克	1.7	34.6
左旋肉碱	毫克	0.73	15.0
二十二碳六烯酸	毫克	2.1	42.5
二十碳四烯酸	毫克	2.4	49.0
低聚半乳糖	毫克	86.7	1772
低聚果糖	毫克	46.5	950
叶黄素	微克	10.0	204

相关信息

生产商:陕西秦龙天润乳业有限公司
地址:陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地:陕西·西安
联系电话:0571-88021261
食品生产许可证编号:SC10661011408008

产品标准代号:GB 10767-2021
产品类别:幼儿配方羊奶粉
产品属性:乳基·粉状
生产日期、批号:见底部喷码
保质期:24个月

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸、维生素C(抗坏血酸)、生物素(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、氯化胆碱、左旋肉碱、铜(硫酸铜)、锰(硫酸锰)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、钙(碳酸钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)	
致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。	

贮存条件	
1、本品贮于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。 2、每次食用后,请盖紧罐盖。 3、开罐后请于四周内用完。	



欧瑞兹®
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)



3 段
净含量:800克



国食注字 YP20240060

冲调方法					

- ①先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。
- ②将饮用水煮沸5分钟后冷却至40℃-45℃。
- ③将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
- ④参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。
- ⑤将量取的奶粉倒入奶瓶中,盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。
- ⑥在为宝宝喂哺奶液前,请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温,温度适宜即可喂哺。

喂哺用量建议表			
年龄	每次奶粉用量 平均	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
12~24月	7	210	3~4
24~36月	7	210	2~3

- ①调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用少于或多于指定份量的奶粉,会令幼儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平均奶粉约为4.5克。
- ②请使用罐内专业量勺。
- ③没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
- ④冲奶时请按照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。
- ⑤本喂哺用量建议表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- ⑥喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。



咨询电话
400-0255-108



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2043
蛋白质	克	0.71	14.6
脂肪	克	1.22	24.9
亚油酸	克	0.16	3.32
α-亚麻酸	毫克	16	332
碳水化合物	克	2.5	50.1
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	21.6	441
维生素D	微克	0.60	12.2
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.42	8.61
维生素K1	微克	2.34	47.8
维生素B1	微克	28	562
维生素B2	微克	32	660
维生素B6	微克	17.4	355
维生素B12	微克	0.093	1.9
烟酸(烟酰胺)	微克	163	3325
叶酸	微克	4.2	85.9
泛酸	微克	183	3740
维生素C	毫克	3.7	76.4
生物素	微克	0.89	18.2
矿物质			
钠	毫克	7.5	153
钾	毫克	27.9	570
铜	毫克	14.2	291
镁	毫克	2.0	41.8
铁	毫克	0.30	6.14
锌	毫克	0.14	2.85
钙	毫克	21.8	445
磷	毫克	14.5	296
碘	毫克	3.4	70.1
氯	毫克	23	470
可溶性成分			
硒	微克	0.78	16
胆碱	毫克	6.4	131
锰	毫克	4.94	101
肌醇	毫克	2.9	58.6
牛磺酸	毫克	1.7	34.6
左旋肉碱	毫克	0.73	15.0
二十二碳六烯酸	毫克	2.1	42.5
二十碳四烯酸	毫克	2.4	49.0
低聚半乳糖	毫克	86.7	1772
低聚果糖	毫克	46.5	950
叶黄素	微克	10.0	204

相关信息

生产商:陕西秦龙天润乳业有限公司
地址:陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地:陕西·西安
联系电话:0571-88021261
食品生产许可证编号:SC10661011408008

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、氯化胆碱、左旋肉碱、铜(硫酸铜)、锰(硫酸锰)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、钙(碳酸钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)	
致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。	

贮存条件	
1、本品贮于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。 2、每次食用后,请盖紧罐盖。 3、开罐后请于四周内用完。	



欧瑞兹®
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)



3 段
净含量:900克



国食注字 YP20240060

冲调方法					

- ①先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。
- ②将饮用水煮沸5分钟后冷却至40℃-45℃。
- ③将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
- ④参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。
- ⑤将量取的奶粉倒入奶瓶中,盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。
- ⑥在为宝宝喂哺奶液前,请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温,温度适宜即可喂哺。

喂哺用量建议表			
年龄	每次奶粉用量 平均	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
12~24月	7	210	3~4
24~36月	7	210	2~3

- ①调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用少于或多于指定份量的奶粉,会令幼儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。
- ②请使用罐内专业量勺。
- ③没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
- ④冲奶时请按照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。
- ⑤本喂哺用量建议表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- ⑥喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。



咨询电话
400-0255-108



配料表

乳糖、全脂绵羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、肌醇、氯化胆碱、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)。

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2098	矿物质			
蛋白质	克	0.59	12.3	钠	毫克	7.2	151
脂肪	克	1.28	26.8	钾	毫克	20.1	421
亚油酸	克	0.16	3.45	铜	微克	14.6	307
α-亚麻酸	毫克	15	316	铁	毫克	1.8	37.5
碳水化合物	克	2.5	51.8	锌	毫克	0.17	3.50
维生素				钙	毫克	0.17	3.65
维生素A	微克视黄醇当量	18.4	385	磷	毫克	2.07	43.4
维生素D	微克	0.58	12.2	碘	毫克	16.8	353
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.41	8.54	氯	毫克	11.6	243
维生素K ₁	微克	2.29	48.1	硒	微克	4.1	85.0
维生素B ₁	微克	28	580	可选择成分			
维生素B ₂	微克	34	705	肌醇	毫克	3.5	72.9
维生素B ₆	微克	16.1	338	二十二碳六烯酸	毫克	4.3	91.0
维生素B ₁₂	微克	0.105	2.2	二十碳四烯酸	毫克	5.2	110
烟酸(烟酰胺)	微克	161	3374	低聚半乳糖	毫克	56.3	1181
叶酸	微克	4.5	94.9	低聚果糖	毫克	45.3	950
泛酸	微克	162	3408	1,3-二油酸 2-棕榈酸	克	0.16	3.33
维生素C	毫克	4.8	100.6	甘油三酯	克	0.16	3.33
生物素	微克	0.80	16.8	乳铁蛋白	毫克	1.58	33.1
胆碱	毫克	7.1	148				

贮存条件

● 本品应贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。● 每次食用后,请盖紧罐盖。● 开罐后请于四周内用完。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



贝贝羊爱加®
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)



净含量:100克
国食注字YP 20240056

冲调方法



1先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。2将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C。3将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。4参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。5将量取的奶粉倒入奶瓶中,盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。6在为宝宝喂哺奶液前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。

喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量	加温开水 (毫升)	每天喂哺 次数
	平勺		
0~2周	2	60	7~8
2~4周	3	90	6~7
1~2月	4	120	5~6
2~4月	5	150	5~6
4~6月	6	180	5~6

① 调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用过少或过多指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适当的营养或导致婴儿脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。② 请使用罐内专业量勺。③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。④ 冲奶时请按照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑤ 本喂哺用量建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。

⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

食品生产许可证编号:SC10661011408008

执行标准:GB 10765-2021

产品类别:婴儿配方羊奶粉

产品属性:乳基 粉状

保质期:24个月

生产日期、批号:见底部喷码

生产商:陕西秦龙天润乳业有限公司

地址:陕西省西安市阎良区人民东路东延线

产地:陕西·西安

电话:029-89076181

曾用名:爱典



贝贝羊爱加·咨询电话
400-6331-666

服务时间:周一至周五
(上午 09:00~下午17:30)



6 973464 881802



喂奶用量建议表

年龄	每次奶粉用量	加温开水	每天喂奶次数
	平勺	(毫升)	
0~2周	2	60	7~8
2~4周	3	90	6~7
1~2月	4	120	5~6
2~4月	5	150	5~6
4~6月	6	180	5~6

① 喂奶时注意参照喂奶用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲泡,用过多或过多指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适当的营养或导致婴儿脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。

② 请使用罐内专业量勺。

③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。

④ 冲奶时请按照喂奶用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。

⑤ 本喂奶用量建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。

⑥ 喂奶时多加照顾,以防宝宝呛奶。

冲调方法



1 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。



2 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C。



3 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。



4 参照“喂奶用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。



5 将量取的奶粉倒入奶瓶中,盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。



6 在为宝宝喂奶前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂奶。



贝贝羊爱加®
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)



净含量:350克
国食注字YP 20240056

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2098
蛋白质	克	0.59	12.3
脂肪	克	1.28	26.8
亚油酸	克	0.16	3.45
α-亚麻酸	毫克	15	316
碳水化合物	克	2.5	51.8
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	18.4	385
维生素D	微克	0.58	12.2
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.41	8.54
维生素K ₁	微克	2.29	48.1
维生素B ₁	微克	28	580
维生素B ₂	微克	34	705
维生素B ₆	微克	16.1	338
维生素B ₁₂	微克	0.105	2.2
烟酸(烟酰胺)	微克	161	3374
叶酸	微克	4.5	94.9
泛酸	微克	162	3408
维生素C	毫克	4.8	100.6
生物素	微克	0.80	16.8
胆碱	毫克	7.1	148
矿物质			
钠	毫克	7.2	151
钾	毫克	20.1	421
铜	微克	14.6	307
镁	毫克	1.8	37.5
铁	毫克	0.17	3.50
锌	毫克	0.17	3.65
锰	微克	2.07	43.4
钙	微克	16.8	353
磷	毫克	11.6	243
碘	微克	4.1	85.0
氯	毫克	18	372
硒	微克	0.86	18
可选择成分			
肌醇	毫克	3.5	72.9
二十二碳六烯酸	毫克	4.3	91.0
二十碳四烯酸	毫克	5.2	110
低聚半乳糖	毫克	56.3	1181
低聚果糖	毫克	45.3	950
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	克	0.16	3.33
乳铁蛋白	毫克	1.58	33.1

配料表

乳糖、全脂绵羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、肌醇、氯化胆碱、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

- 本品应贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。
- 每次食用后,请盖紧罐盖。
- 开罐后请于四周内用完。

食品生产许可证编号:SC10661011408008

执行标准:GB 10765-2021

产品类别:婴儿配方羊奶粉

产品属性:乳基粉状

保质期:24个月

生产日期、批号:见底部喷码

生产商:陕西秦龙天润乳业有限公司

地址:陕西省西安市阎良区人民东路东延线

产地:陕西-西安

电话:029-89076181

曾用名:爱真



贝贝羊爱加:咨询电话

400-6331-666

服务时间:周一至周五

(上午 09:00~下午17:30)



喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量		每天喂哺次数
	平均	加温开水(毫升)	
0~2周	2	60	7~8
2~4周	3	90	6~7
1~2月	4	120	5~6
2~4月	5	150	5~6
4~6月	6	180	5~6

① 调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用过多或过少指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适当的营养或导致婴儿脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。

② 请使用罐内专业量勺。

③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。

④ 冲奶时请按照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再用。

⑤ 本喂哺用量建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。

⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

冲调方法



先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。



将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C。



将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。



参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。



将量取的奶粉倒入奶瓶中,盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。



在为宝宝喂哺奶液前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。



贝贝羊爱加® 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)



净含量:800克
国食注字YP 20240056

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2098
蛋白质	克	0.59	12.3
脂肪	克	1.28	26.8
亚油酸	克	0.16	3.45
α-亚麻酸	毫克	15	316
碳水化合物	克	2.5	51.8
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	18.4	385
维生素D	微克	0.58	12.2
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.41	8.54
维生素K ₁	微克	2.29	48.1
维生素B ₁	微克	28	580
维生素B ₂	微克	34	705
维生素B ₆	微克	16.1	338
维生素B ₁₂	微克	0.105	2.2
烟酸(烟酰胺)	微克	161	3374
叶酸	微克	4.5	94.9
泛酸	微克	162	3408
维生素C	毫克	4.8	100.6
生物素	微克	0.80	16.8
胆碱	毫克	7.1	148
矿物质			
钠	毫克	7.2	151
钾	毫克	20.1	421
铜	微克	14.6	307
镁	毫克	1.8	37.5
铁	毫克	0.17	3.50
锌	毫克	0.17	3.65
锰	微克	2.07	43.4
钙	毫克	16.8	353
磷	毫克	11.6	243
碘	微克	4.1	85.0
氯	毫克	18	372
硒	微克	0.86	18
可选择成分			
肌醇	毫克	3.5	72.9
二十二碳六烯酸	毫克	4.3	91.0
二十碳四烯酸	毫克	5.2	110
低聚半乳糖	毫克	56.3	1181
低聚果糖	毫克	45.3	950
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	克	0.16	3.33
乳铁蛋白	毫克	1.58	33.1

配料表

乳糖、全脂绵羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、肌醇、氯化胆碱、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

- 本品应贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。
- 每次食用后,请盖紧罐盖。
- 开罐后请于四周内用完。

食品生产许可证编号:SC10661011408008

执行标准:GB 10765-2021

产品类别:婴儿配方羊奶粉

产品属性:乳基·粉状

保质期:24个月

生产日期、批号:见底部喷码

生产商:陕西秦龙天润乳业有限公司

地址:陕西省西安市阎良区人民东路东延线

产地:陕西·西安

电话:029-89076181

曾用名:爱真



贝贝羊爱加·咨询电话

400-6331-666

服务时间:周一至周五

(上午 09:00~下午 17:30)



喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量	加温开水 (毫升)	每天喂哺 次数
	平勺		
6~8月	6	180	4~5
8~12月	7	210	3~4

① 调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用过多或过少指定份量的奶粉,会令较大婴儿得不到适当的营养,未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。

② 请使用罐内专业量勺。

③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。

④ 冲奶时请按照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。

⑤ 本喂哺用量建议表是参照正常发育较大婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。

⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

冲调方法



先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。



将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C。



将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。



参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。



将量取的奶粉倒入奶瓶中,盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。



在为宝宝喂哺奶液前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。



贝贝羊爱加®
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)



净含量:350克
国食注字YP 20240057

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2050
蛋白质	克	0.60	12.2
脂肪	克	1.21	24.9
亚油酸	克	0.20	4.18
α-亚麻酸	毫克	17	358
碳水化合物	克	2.6	52.9
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	22.1	453
维生素D	微克	0.60	12.2
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.43	8.80
维生素K ₁	微克	2.36	48.3
维生素B ₁	微克	26	535
维生素B ₂	微克	30	615
维生素B ₆	微克	17.3	355
维生素B ₁₂	微克	0.102	2.1
烟酸(烟酰胺)	微克	167	3427
叶酸	微克	4.3	87.4
泛酸	微克	171	3503
维生素C	毫克	4.9	100.6
生物素	微克	0.82	16.9
胆碱	毫克	7.2	148
矿物质			
钠	毫克	3.9	79.0
钾	毫克	25.8	529
铜	毫克	13.0	266
镁	毫克	1.8	36.5
铁	毫克	0.27	5.46
锌	毫克	0.17	3.55
锰	毫克	4.93	101
钙	毫克	20.9	428
磷	毫克	14.4	296
碘	毫克	4.1	83.5
氯	毫克	23	474
硒	微克	0.78	16
可选择成分			
肌醇	毫克	3.5	72.5
二十二碳六烯酸	毫克	4.5	91.5
二十碳四烯酸	毫克	5.6	115
低聚半乳糖	毫克	86.4	1772
低聚果糖	毫克	46.3	950
1,3-二油酸 2-棕榈酸	克	0.16	3.30
甘油三酯	克	0.97	19.9
乳铁蛋白	毫克		

配料表

乳糖、全脂绵羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、肌醇、氯化胆碱、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

重要声明

须配合添加辅助食品。

贮存条件

- 本品应贮存于阴凉、干燥处,请置于冰箱内。
- 每次食用后,请盖紧罐盖。
- 开罐后请于四周内用完。

食品生产许可证编号:SC10661011408008

执行标准:GB 10766-2021

产品类别:较大婴儿配方羊奶粉

产品属性:乳基·粉状

保质期:24个月

生产日期、批号:见底部喷码

生产商:陕西秦龙天润乳业有限公司

地址:陕西省西安市阎良区人民东路东延线

产地:陕西·西安

电话:029-89076181

曾用名:爱真



6 973464 881789

贝贝羊爱加·咨询电话

400-6331-666

服务时间:周一至周五

(上午 09:00~下午17:30)



喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量	加温开水	每天喂哺次数
	平勺	(毫升)	
6~8月	6	180	4~5
8~12月	7	210	3~4

① 调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用过多或过少指定份量的奶粉,会令较大婴儿得不到适当的营养,未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。

② 请使用罐内专业量勺。

③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。

④ 冲奶时请按照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。

⑤ 本喂哺用量建议表是参照正常发育较大婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。

⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

冲调方法



1 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。



2 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C。



3 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。



4 参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。



5 将量取的奶粉倒入奶瓶中,盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。



6 在为宝宝喂哺奶液前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。



贝贝羊爱加®
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)



净含量:800克
国食注字YP 20240057

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2050
蛋白质	克	0.60	12.2
脂肪	克	1.21	24.9
亚油酸	克	0.20	4.18
α-亚麻酸	毫克	17	358
碳水化合物	克	2.6	52.9

维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	22.1	453
维生素D	微克	0.60	12.2
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.43	8.80
维生素K	微克	2.36	48.3
维生素B ₁	微克	26	535
维生素B ₂	微克	30	615
维生素B ₆	微克	17.3	355
维生素B ₁₂	微克	0.102	2.1
烟酸(烟酰胺)	微克	167	3427
叶酸	微克	4.3	87.4
泛酸	微克	171	3503
维生素C	毫克	4.9	100.6
生物素	微克	0.82	16.9
胆碱	毫克	7.2	148

矿物质			
钠	毫克	3.9	79.0
钾	毫克	25.8	529
铜	微克	13.0	266
镁	毫克	1.8	36.5
铁	毫克	0.27	5.46
锌	毫克	0.17	3.55
锰	微克	4.93	101
钙	毫克	20.9	428
磷	毫克	14.4	296
碘	微克	4.1	83.5
氯	毫克	23	474
硒	微克	0.78	16

可选择成分			
肌醇	毫克	3.5	72.5
二十二碳六烯酸	毫克	4.5	91.5
二十碳四烯酸	毫克	5.6	115
低聚半乳糖	毫克	86.4	1772
低聚果糖	毫克	46.3	950
1,3-二油酸 2-棕榈酸	克	0.16	3.30
甘油三酯			
乳铁蛋白	毫克	0.97	19.9

配料表

乳糖、全脂绵羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、肌醇、氯化胆碱、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)。

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

重要声明

须配合添加辅助食品。

贮存条件

- 本品应贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。
- 每次食用后,请盖紧罐盖。
- 开罐后请于四周内用完。

食品生产许可证编号:SC10661011408008

执行标准:GB 10766-2021

产品类别:较大婴儿(配方)羊奶粉

产品属性:乳基-粉状

保质期:24个月

生产日期、批号:见底部喷码

生产商:陕西秦龙天润乳业有限公司

地址:陕西省西安市阎良区人民东路东延线

产地:陕西-西安

电话:029-89076181

曾用名:爱爽



贝贝羊爱加-咨询电话
400-6331-666
服务时间:周一至周五
(上午 09:00~下午 17:30)



喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量	加温开水 (毫升)	每天喂哺 次数
	平勺		
12~24月	7	210	3~4
24~36月	7	210	2~3

① 调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用太少或过多指定份量的奶粉,会令幼儿得不到适当的营养,未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。

② 请使用罐内专业量勺。

③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。

④ 冲奶时请按照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。

⑤ 本喂哺用量建议表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见酌情增减。

⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

冲调方法



1 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。



2 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C。



3 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。



4 参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。



5 将量取的奶粉倒入奶瓶中,盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。



6 在为宝宝喂哺奶液前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。



贝贝羊爱加® 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)



净含量:350克
国食注字YP 20240074

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2044
蛋白质	克	0.60	12.3
脂肪	克	1.20	24.6
亚油酸	克	0.20	4.18
α-亚麻酸	毫克	18	358
碳水化合物	克	2.6	53.1
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	22.2	453
维生素D	微克	0.60	12.2
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.43	8.80
维生素K ₁	微克	2.36	48.3
维生素B ₁	微克	27	542
维生素B ₂	微克	28	564
维生素B ₆	微克	17.6	360
维生素B ₁₂	微克	0.108	2.2
烟酸(烟酰胺)	微克	168	3427
叶酸	微克	4.3	87.7
泛酸	微克	182	3710
维生素C	毫克	3.6	73.4
生物素	微克	0.84	17.1
矿物质			
钠	毫克	4.5	92.0
钾	毫克	26.8	548
铜	毫克	14.4	295
镁	毫克	1.9	38.8
铁	毫克	0.30	6.18
锌	毫克	0.15	3.04
钙	毫克	21.1	431
磷	毫克	14.8	302
碘	微克	3.3	66.8
氯	毫克	23	477
可选择成分			
硒	微克	0.83	17
胆碱	毫克	7.1	146
锰	微克	4.94	101
肌醇	毫克	3.5	70.8
二十二碳六烯酸	毫克	2.2	44.8
二十碳四烯酸	毫克	2.9	59.4
低聚半乳糖	毫克	86.7	1772
低聚果糖	毫克	46.5	950
甘油三酯	克	0.16	3.30
乳铁蛋白	毫克	0.97	19.9

配料表

乳糖、全脂绵羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚果糖、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、乳铁蛋白、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸吡哆醇)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、肌醇、氯化胆碱、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、锰(硫酸锰)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

贮存条件

- 本品应贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。
- 每次食用后,请盖紧罐盖。
- 开罐后请于四周内用完。

食品生产许可证编号:SC10661011408008

执行标准:GB 10767-2021

产品类别:幼儿配方羊奶粉

产品属性:乳基·粉状

保质期:24个月

生产日期、批号:见底部喷码

生产商:陕西秦龙天润乳业有限公司

地址:陕西省西安市阎良区人民东路东延线

产地:陕西·西安

电话:029-89076181

曾用名:爱巢



贝贝羊爱加·咨询电话

400-6331-666

服务时间:周一至周五
(上午 09:00~下午 17:30)



喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量	加温开水	每天喂哺次数
	平均	(毫升)	
12~24月	7	210	3~4
24~36月	7	210	2~3

- 调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用过多或过少指定份量的奶粉,会令幼儿得不到适当的营养,未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平均奶粉约为4.5克。
- 请使用罐内专业量勺。
- 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
- 冲奶时请按照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。
- 本喂哺用量建议表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

冲调方法



先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。



将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C。



将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。



参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。



将量取的奶粉倒入奶瓶中,盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。



在为宝宝喂哺奶液前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。



贝贝羊爱加®
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)



净含量:800克
国食注字YP 20240074

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2044
蛋白质	克	0.60	12.3
脂肪	克	1.20	24.6
亚油酸	克	0.20	4.18
α-亚麻酸	毫克	18	358
碳水化合物	克	2.6	53.1
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	22.2	453
维生素D	微克	0.60	12.2
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.43	8.80
维生素K ₁	微克	2.36	48.3
维生素B ₁	微克	27	542
维生素B ₂	微克	28	564
维生素B ₆	微克	17.6	360
维生素B ₁₂	微克	0.108	2.2
烟酸(烟酰胺)	微克	168	3427
叶酸	微克	4.3	87.7
泛酸	微克	182	3710
维生素C	毫克	3.6	73.4
生物素	微克	0.84	17.1
矿物质			
钠	毫克	4.5	92.0
钾	毫克	26.8	548
铜	毫克	14.4	295
镁	毫克	1.9	38.8
铁	毫克	0.30	6.18
锌	毫克	0.15	3.04
钙	毫克	21.1	431
磷	毫克	14.8	302
碘	微克	3.3	66.8
氯	毫克	23	477
可选择成分			
硒	微克	0.83	17
胆碱	毫克	7.1	146
锰	毫克	4.94	101
肌醇	毫克	3.5	70.8
二十二碳六烯酸	毫克	2.2	44.8
二十碳四烯酸	毫克	2.9	59.4
低聚半乳糖	毫克	86.7	1772
低聚果糖	毫克	46.5	950
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	克	0.16	3.30
乳铁蛋白	毫克	0.97	19.9

配料表

乳糖、全脂绵羊乳粉、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚果糖、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、乳铁蛋白、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、肌醇、氯化胆碱、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、锰(硫酸锰)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

贮存条件

- 本品应贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。
- 每次食用后,请盖紧罐盖。
- 开罐后请于四周内用完。

食品生产许可证编号:SC10661011408008
执行标准:GB 10767-2021
产品类别:幼儿配方羊奶粉
产品属性:乳基 粉状
保质期:24个月

生产日期、批号:见底部喷码
生产商:陕西秦龙天润乳业有限公司
地址:陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地:陕西·西安
电话:029-89076181 曾用名:爱真



贝贝羊爱加 咨询电话
400-6331-666
服务时间:周一至周五
(上午 09:00~下午 17:30)

258.1x109.5mm 2023062917

配料表

生乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、叶黄素、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2093	胆碱	mg	6.3	132
蛋白质	g	0.54	11.2	矿物质			
脂肪	g	1.24	25.9	钠	mg	8.8	184
亚油酸	g	0.16	3.41	钾	mg	21.3	445
α-亚麻酸	mg	18	369	铜	μg	17.9	375
碳水化合物	g	2.6	55.0	镁	mg	1.5	32.3
维生素				铁	mg	0.16	3.32
维生素A	μg RE	18	367	锌	mg	0.15	3.14
维生素D	μg	0.60	12.6	锰	μg	3.29	68.8
维生素E	mg α-TE	0.41	8.55	钙	mg	15.0	314
维生素K1	μg	2.22	46.4	磷	mg	9	197
维生素B1	μg	18	367	碘	μg	4.5	94.2
维生素B2	μg	39	820	氯	mg	17	347
维生素B6	μg	14.2	298	硒	μg	0.90	18.9
维生素B12	μg	0.086	1.8	可选择成分			
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3040	二十二碳六烯酸	mg	4.5	94.2
叶酸	μg	3.7	77.7	二十碳四烯酸	mg	5.2	108
泛酸	μg	164	3430	低聚半乳糖	mg	42.9	898
维生素C	mg	4.1	85.2	低聚果糖	mg	10.8	226
生物素	μg	0.74	15.5	叶黄素	μg	3.65	76.3
				乳铁蛋白	mg	1.30	27.2

贮存条件

- 1.本品贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。
- 2.每次食用后,请盖紧罐盖。
- 3.开罐后请于四周内用完。

重要声明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



杰赋小羊®
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)



国食注字 YP20230116

净含量:100克

奶具消毒及冲调喂养方法



①先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。②将饮用水煮沸5分钟后冷却至40℃-45℃。③将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。④参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的奶粉。⑤将量取的奶粉倒入奶瓶中,盖紧瓶盖后摇晃至奶粉充分溶解。⑥在为宝宝喂哺奶粉前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。

喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量(mL)	奶粉用量(量勺数)		
0~2周	60	2	7	8
2~4周	90	3	6	7
1~2月	120	4	5	6
2~4月	150	5	5	6
4~6月	180	6	5	6

每量勺奶粉约4.5g

①调奶时注意参照喂哺建议表中的奶粉量和温开水用量进行冲调,用过多或过多指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。②请使用罐内专用量勺。③没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。④冲奶时请按照喂哺建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑤本喂哺建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。⑥喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

食品生产许可证编号: SC10661011408008

标准代号: GB10765-2021

产品类别: 婴儿配方羊奶粉

产品属性: 乳基粉状

保质期: 24个月

生产日期、批号: 见底部喷码

生产商: 陕西秦龙天润乳业有限公司

地址: 陕西省西安市阎良区人民东路东延线

产地: 陕西西安

联系电话: 029-86520249

曾用名: 杰赋®

本企业通过ISO9001质量管理体系认证

通过乳制品危害分析关键控制点(HACCP)体系认证

通过乳制品良好生产规范(GMP)体系认证

您可以拨打免费咨询热线,与我们取得联系

400-013-8789

请在工作时间拨打

如果您想了解更多产品信息

请登录官方网站: www.jiefumilk.com



6 973464 881451 >



393.8x165mm 2023062917

奶具消毒及冲调喂养方法



1 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。



3 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。



5 将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。

6 在为宝宝喂养奶粉前，请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温，温度适宜即可喂哺。

贮存条件
1. 本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2. 每次食用后，请盖紧罐盖。
3. 开罐后请于四周内用完。



本企业通过ISO9001质量管理体系认证
通过乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证
通过乳制品良好生产规范(GMP)体系认证

您可以拨打免费咨询热线，与我们取得联系
400-013-8789
请在工作时间拨打
如果你想了解更多信息
请登录官方网址：www.jiefumilk.com

喂哺建议表

婴儿月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)		
0~2周	60	2	7	8
2~4周	90	3	6	7
1~2月	120	4	5	6
2~4月	150	5	5	6
4~6月	180	6	5	6

每量勺奶粉约4.5g

- 1 调奶时注意参照喂哺建议表中的奶粉量和温开水用量进行冲调，用太少或多指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓度。
- 2 请使用罐内专用量勺。
- 3 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。
- 4 冲奶时请按照喂哺建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
- 5 本喂哺建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- 6 喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。

重要声明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



杰赋小羊[®] 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)



国食注字 YP20230116 净含量: 400克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2093
蛋白质	g	0.54	11.2
脂肪	g	1.24	25.9
亚油酸	g	0.16	3.41
α-亚麻酸	mg	18	369
碳水化合物	g	2.6	55.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	367
维生素D	μg	0.60	12.6
维生素E	mg α-TE	0.41	8.55
维生素K ₁	μg	2.22	46.4
维生素B ₁	μg	18	367
维生素B ₂	μg	39	820
维生素B ₆	μg	14.2	298
维生素B ₁₂	μg	0.086	1.8
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3040
叶酸	μg	3.7	77.7
泛酸	μg	164	3430
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.74	15.5
胆碱	mg	6.3	132
矿物质			
钠	mg	8.8	184
钾	mg	21.3	445
铜	μg	17.9	375
镁	mg	1.5	32.3
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.15	3.14
锰	μg	3.29	68.8
钙	mg	15.0	314
磷	mg	9	197
碘	μg	4.5	94.2
氯	mg	17	347
硒	μg	0.90	18.9
可选择成分			
二十二碳六烯酸	mg	4.5	94.2
二十碳四烯酸	mg	5.2	108
低聚半乳糖	mg	42.9	898
低聚果糖	mg	10.8	226
叶黄素	μg	3.65	76.3
乳铁蛋白	mg	1.30	27.2

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、叶黄素、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)

食品生产许可证编号: SC10661011408008
标准代号: GB10765-2021
产品类别: 婴儿配方羊奶粉
产品属性: 乳基粉状
保质期: 24个月
生产日期、批号: 见底部喷码
生产商: 陕西秦龙天润乳业有限公司
地址: 陕西省西安市阎良区人民路东延线
产地: 陕西 西安
联系电话: 029-86520249
曾用名: 杰赋[®]



393.8x175mm 2023062917

奶具消毒及冲调喂养方法



- 1 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗
洗干净，并在沸水中至少煮
5分钟，进行消毒。
- 2 将饮用水煮沸5分钟后冷
却至40℃-45℃。



- 3 将冷却后的饮用水倒入经
消毒后的奶瓶中。
- 4 参照“喂哺建议表”使用
量勺量取适量的奶粉。



- 5 将量取的奶粉倒入奶瓶
中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉
充分溶解。
- 6 在为宝宝喂奶粉前，
请先将一小滴奶液滴至手
腕内侧测试温度，温度适
宜即可喂哺。

贮存条件

- 1 本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
- 2 每次食用后，请盖紧罐盖。
- 3 开罐后请于四周内用完。



6 9 7 3 4 6 4 8 8 1 2 1 5

本企业通过ISO9001质量管理体系认证
通过乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证
通过乳制品良好生产规范(GMP)体系认证

您可以拨打免费咨询热线，与我们取得联系
400-013-8789

请在工作时间拨打
如果您想了解更多产品信息
请登录官方网站：www.jiefumilk.com

喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	
0~2周	60	2	7
2~4周	90	3	6
1~2月	120	4	5
2~4月	150	5	6
4~6月	180	6	5

每量勺奶粉约4.5g

1 喂奶时注意参照喂哺建议表中的奶量和温开水用量
进行冲调，用过多或过少指定份量的奶粉，会令婴儿得不
到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓
度。

- 2 请使用罐内专用量勺。
- 3 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度
均可能会影响宝宝的健康。
- 4 冲奶时请按照喂哺建议表调制，每次只调制一次
的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
- 5 本喂哺建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设
计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见
而酌情增减。
- 6 喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。

重要声明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无
母乳时可食用本产品。



杰赋小羊[®]
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)



国食注字 YP20230116

净含量:800克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2093
蛋白质	g	0.54	11.2
脂肪	g	1.24	25.9
亚油酸	g	0.16	3.41
α-亚麻酸	mg	18	369
碳水化合物	g	2.6	55.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	367
维生素D	μg	0.60	12.6
维生素E	mg α-TE	0.41	8.55
维生素K ₁	μg	2.22	46.4
维生素B ₁	μg	18	367
维生素B ₂	μg	39	820
维生素B ₆	μg	14.2	298
维生素B ₁₂	μg	0.086	1.8
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3040
叶酸	μg	3.7	77.7
泛酸	μg	164	3430
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.74	15.5
胆碱	mg	6.3	132
矿物质			
钠	mg	8.8	184
钾	mg	21.3	445
铜	μg	17.9	375
镁	mg	1.5	32.3
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.15	3.14
锰	μg	3.29	68.8
钙	mg	15.0	314
磷	mg	9	197
碘	μg	4.5	94.2
氯	mg	17	347
硒	μg	0.90	18.9
可选择成分			
二十二碳六烯酸	mg	4.5	94.2
二十碳四烯酸	mg	5.2	108
低聚半乳糖	mg	42.9	898
低聚果糖	mg	10.8	226
叶黄素	μg	3.65	76.3
乳铁蛋白	mg	1.30	27.2

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、叶黄素、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)

食品生产许可证编号: SC10661011408008

标准代号: GB10765-2021

产品类别: 婴儿配方羊奶粉

产品属性: 乳基-粉状

保质期: 24个月

生产日期、批号: 见底部喷码

生产商: 陕西秦龙天润乳业有限公司

地址: 陕西省西安市阎良区人民路东延线

产地: 陕西-西安

联系电话: 029-86520249

曾用名: 杰赋[®]



奶具消毒及冲调喂养方法



1. 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。
2. 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C。



5. 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
6. 参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的奶粉。



7. 将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。
8. 在为宝宝喂养奶粉前，请先将一小滴奶液滴至手掌内侧测试水温，温度适宜即可喂哺。

贮存条件

1. 本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2. 每次食用后，请盖紧罐盖。
3. 开罐后请于四周内用完。



本企业通过ISO9001质量管理体系认证
通过乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证
通过乳制品良好生产规范(GMP)体系认证

您可以拨打免费咨询热线，与我们取得联系
400-013-8789

请在工作时间拨打
如果您想了解更多产品信息
请登录官方网站：www.jiefumilk.com

喂哺建议表

婴儿月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)		
6~8月	180	6	4	5
8~10月	210	7	3	4
10~12月	210	7	3	4

每量勺奶粉约4.5g

1. 调奶时注意参照喂哺建议表中的奶粉量和温开水用量进行冲调，用过多或过少指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶粉的浓度。
2. 请使用罐内专用量勺。
3. 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。
4. 冲奶时请按照喂哺建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
5. 本喂哺建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
6. 喂哺时多加照照，以防宝宝呛奶。

重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。



杰赋小羊[®] 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



国食注字 YP20230117

净含量: 400克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2044
蛋白质	g	0.61	12.4
脂肪	g	1.19	24.4
亚油酸	g	0.15	3.04
α -亚麻酸	mg	15	316
碳水化合物	g	2.6	53.7
维生素			
维生素A	μ g RE	23	460
维生素D	μ g	0.60	12.3
维生素E	mg α -TE	0.44	8.98
维生素K ₁	μ g	2.02	41.2
维生素B ₁	μ g	22	444
维生素B ₂	μ g	39	788
维生素B ₆	μ g	16.1	329
维生素B ₁₂	μ g	0.078	1.6
烟酸(烟酰胺)	μ g	140	2854
叶酸	μ g	3.8	77.2
泛酸	μ g	144	2935
维生素C	mg	4.2	85.2
生物素	μ g	0.72	14.7
胆碱	mg	6.3	128
矿物质			
钠	mg	9.1	186
钾	mg	23.4	479
铜	μ g	15.9	326
镁	mg	1.6	32.6
铁	mg	0.30	6.14
锌	mg	0.15	3.08
锰	μ g	4.68	95.7
钙	mg	21.3	435
磷	mg	11	227
碘	μ g	4.5	92.0
氯	mg	19	385
硒	μ g	0.68	13.8
可选择成分			
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸	mg	5.4	110
低聚半乳糖	mg	87.9	1796
低聚果糖	mg	18.2	371
叶黄素	μ g	7.34	150
乳铁蛋白	mg	0.79	16.1

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl- α -生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、叶黄素、铜(硫酸铜)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)

食品生产许可证编号: SC10661011408008

标准代号: GB10766-2021

产品类别: 较大婴儿配方羊奶粉

产品属性: 乳基粉状

保质期: 24个月

生产日期、批号: 见底部喷码

生产商: 陕西秦龙天润乳业有限公司

地址: 陕西省西安市阎良区人民东路东延线

联系电话: 029-86520249

曾用名: 杰赋[®]



奶具消毒及冲调喂养方法



1. 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。



2. 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40℃-45℃。



3. 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。



4. 参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的奶粉。



5. 将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。



6. 在为宝宝喂养奶粉前，请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温，温度适宜即可喂哺。



7. 将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。



8. 开罐后请于四周内用完。

本企业通过ISO9001质量管理体系认证
通过乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证
通过乳制品良好生产规范(GMP)体系认证

您可以拨打免费咨询热线，与我们取得联系
400-013-8789
请在工作时间拨打
如果您想了解更多产品信息
请登录官方网址：www.jiefumilk.com

喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)		
6~8月	180	6	4	5
8~10月	210	7	3	4
10~12月	210	7	3	4

每量勺奶粉约4.5g

1. 喂奶时注意参照喂哺建议表中的奶量和温开水用量进行冲调，用太少或过多指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓度。
2. 请使用罐内专用量勺。
3. 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。
4. 冲奶时请按照喂哺建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
5. 本喂哺建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
6. 喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。

重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。



杰赋小羊[®]
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)



国食注字 YP20230117

净含量:800克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2044
蛋白质	g	0.61	12.4
脂肪	g	1.19	24.4
亚油酸	g	0.15	3.04
α-亚麻酸	mg	15	316
碳水化合物	g	2.6	53.7
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.60	12.3
维生素E	mg α-TE	0.44	8.98
维生素K ₁	μg	2.02	41.2
维生素B ₁	μg	22	444
维生素B ₂	μg	39	788
维生素B ₆	μg	16.1	329
维生素B ₁₂	μg	0.078	1.6
烟酸(烟酰胺)	μg	140	2854
叶酸	μg	3.8	77.2
泛酸	μg	144	2935
维生素C	mg	4.2	85.2
生物素	μg	0.72	14.7
胆碱	mg	6.3	128
矿物质			
钠	mg	9.1	186
钾	mg	23.4	479
铜	μg	15.9	326
镁	mg	1.6	32.6
铁	mg	0.30	6.14
锌	mg	0.15	3.08
锰	μg	4.68	95.7
钙	mg	21.3	435
磷	mg	11	227
碘	μg	4.5	92.0
氯	mg	19	385
硒	μg	0.68	13.8
可选择成分			
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸	mg	5.4	110
低聚半乳糖	mg	87.9	1796
低聚果糖	mg	18.2	371
叶黄素	μg	7.34	150
乳铁蛋白	mg	0.79	16.1

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、叶黄素、铜(硫酸铜)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)

食品生产许可证编号: SC10661011408008
标准代号: GB10766-2021
产品类别: 较大婴儿配方羊奶粉
产品属性: 乳基粉状
保质期: 24个月
生产日期、批号: 见底部喷码
生产商: 陕西秦龙天润乳业有限公司
地址: 陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产址: 陕西西安
联系电话: 029-86520249
曾用名: 杰赋[®]



奶具消毒及冲调喂养方法



1 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。



3 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。



5 将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。

贮存条件

1. 本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2. 每次食用后，请盖紧瓶盖。
3. 开罐后请于四周内用完。



本企业通过ISO9001质量管理体系认证
通过乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证
通过乳制品良好生产规范(GMP)体系认证

您可以拨打免费咨询热线，与我们取得联系
400-013-8789

请在工作时间拨打
如果你想了解更多产品信息
请登录官方网站：www.jiefumilk.com

喂哺建议表

幼儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)		
12~24月	210	7	3	4
24~36月	210	7	2	3
每量勺奶粉约4.5g				

- 1 调奶时注意参照喂哺建议表中的奶粉量和温开水用量进行冲调，用过多或过多指定份量的奶粉，会令幼儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓度。
- 2 请使用罐内专用量勺。
- 3 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。
- 4 冲奶时请按照喂哺建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
- 5 本喂哺建议表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- 6 喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。



杰赋小羊® 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)



国食注字 YP20230118

净含量: 400克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2041
蛋白质	g	0.69	14.0
脂肪	g	1.20	24.4
亚油酸	g	0.14	2.86
α-亚麻酸	mg	15	307
碳水化合物	g	2.5	52.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.60	12.3
维生素E	mg α-TE	0.44	8.90
维生素K ₁	μg	2.01	41.1
维生素B ₁	μg	22	449
维生素B ₂	μg	37	759
维生素B ₆	μg	16.2	331
维生素B ₁₂	μg	0.078	1.6
烟酸(烟酰胺)	μg	142	2898
叶酸	μg	3.8	77.4
泛酸	μg	148	3012
维生素C	mg	3.1	62.8
生物素	μg	0.72	14.6
矿物质			
钠	mg	9.9	203
钾	mg	26.5	540
铜	μg	16.1	329
镁	mg	1.8	36.5
铁	mg	0.30	6.13
锌	mg	0.14	2.91
钙	mg	21.3	434
磷	mg	13	258
碘	μg	4.0	81.1
氯	mg	22	448
可选择成分			
硒	μg	0.70	14.2
胆碱	mg	6.4	130
锰	μg	4.75	97.0
二十二碳六烯酸	mg	2.2	45.9
二十碳四烯酸	mg	2.4	48.6
低聚半乳糖	mg	80.6	1646
低聚果糖	mg	18.2	371
叶黄素	μg	7.35	150
乳铁蛋白	mg	0.79	16.1

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、叶黄素、铜(硫酸铜)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙)、磷(磷酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)

食品生产许可证编号: SC10661011408008
标准代号: GB10767-2021
产品类别: 幼儿配方羊奶粉
产品属性: 乳基粉状
保质期: 24个月
生产日期、批号: 见底部喷码
生产商: 陕西秦龙天润乳业有限公司
地址: 陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地: 陕西 西安
联系电话: 029-86520249
曾用名: 杰赋®



奶具消毒及冲调喂养方法



1 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。



3 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。



5 将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。

贮存条件

1. 本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2. 每次食用后，请盖紧罐盖。
3. 开罐后请于四周内用完。



本企业通过ISO9001质量管理体系认证
通过乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证
通过乳制品良好生产规范(GMP)体系认证

您可以拨打免费咨询热线，与我们联系
400-013-8789
请在工作时间拨打
如果您想了解更多产品信息
请登录官方网站：www.jiefumilk.com

喂哺建议表

幼儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)		
12~24月	210	7	3	4
24~36月	210	7	2	3
每量勺奶粉约4.5g				

- 1 调奶时注意参照喂哺建议表中的奶粉量和温开水用量进行冲调，用过多或过多指定份量的奶粉，会令幼儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶的浓度。
- 2 请使用罐内专用量勺。
- 3 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。
- 4 冲奶时请按照喂哺建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
- 5 本喂哺建议表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- 6 喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。



杰赋小羊[®]

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄, 3段)



国食注字 YP20230118 净含量: 800克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2041
蛋白质	g	0.69	14.0
脂肪	g	1.20	24.4
亚油酸	g	0.14	2.86
α -亚麻酸	mg	15	307
碳水化合物	g	2.5	52.0
维生素			
维生素A	μ g RE	23	460
维生素D	μ g	0.60	12.3
维生素E	mg α -TE	0.44	8.90
维生素K ₁	μ g	2.01	41.1
维生素B ₁	μ g	22	449
维生素B ₂	μ g	37	759
维生素B ₆	μ g	16.2	331
维生素B ₁₂	μ g	0.078	1.6
烟酸(烟酰胺)	μ g	142	2898
叶酸	μ g	3.8	77.4
泛酸	μ g	148	3012
维生素C	mg	3.1	62.8
生物素	μ g	0.72	14.6
矿物质			
钠	mg	9.9	203
钾	mg	26.5	540
铜	μ g	16.1	329
镁	mg	1.8	36.5
铁	mg	0.30	6.13
锌	mg	0.14	2.91
钙	mg	21.3	434
磷	mg	13	258
碘	μ g	4.0	81.1
氯	mg	22	448
可选择成分			
硒	μ g	0.70	14.2
胆碱	mg	6.4	130
锰	μ g	4.75	97.0
二十二碳六烯酸	mg	2.2	45.9
二十碳四烯酸	mg	2.4	48.6
低聚半乳糖	mg	80.6	1646
低聚果糖	mg	18.2	371
叶黄素	μ g	7.35	150
乳铁蛋白	mg	0.79	16.1

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl- α -醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、叶黄素、铜(硫酸铜)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙)、磷(磷酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)

食品生产许可证编号: SC10661011408008
标准代号: GB10767-2021
产品类别: 幼儿配方羊奶粉
产品属性: 乳基粉状
保质期: 24个月
生产日期、批号: 见底部喷码
生产商: 陕西秦龙天润乳业有限公司
地址: 陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地: 陕西·西安
联系电话: 029-86520249
曾用名: 杰赋[®]



258.1mm

113.5mm

配料表

生乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5-腺苷二磷酸、5'-肌苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸）、维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、钠（柠檬酸钠）、钾（氯化钾）、铜（硫酸铜）、镁（硫酸镁）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（硬脂酸钙、磷酸三钙）、磷（磷酸三钙）、碘（碘酸钾）、硒（亚硒酸钠）

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2080
蛋白质	g	0.55	11.4
脂肪	g	1.22	25.4
亚油酸	g	0.13	2.74
α-亚麻酸	mg	15	312
碳水化合物	g	2.6	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	18	364
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.38	7.97
维生素K	μg	2.21	46.0
维生素B ₁	μg	18	364
维生素B ₂	μg	32	669
维生素B ₆	μg	14.3	298
维生素B ₁₂	μg	0.087	1.8
烟酸（烟酰胺）	μg	146	3042
叶酸	μg	3.7	77.7
泛酸	μg	165	3433
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.75	15.6
胆碱	mg	6.3	132
矿物质			
钠	mg	8.8	182
钾	mg	21.3	442
钙	mg	17.9	372
镁	mg	1.6	32.5
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.15	3.12
锰	μg	3.31	68.9
铜	μg	15.0	312
碘	μg	10	198
硒	μg	4.5	93.6
乳	mg	17	349
糖	μg	0.90	18.8
可选择成分			
肌醇	mg	2.4	50.8
牛磺酸	mg	1.4	29.0
左旋肉碱	mg	0.7	14.7
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
二十碳四烯酸	mg	5.1	107
低聚半乳糖	mg	21.6	449
低聚果糖	mg	37.9	788
13-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.2
叶黄素	μg	3.61	75.0
核苷酸	mg	0.79	16.4
乳铁蛋白	mg	1.31	27.2

贮存条件

1、本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2、每次食用后，请盖紧罐盖。
3、开罐后请于四周内用完。

喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	
0~2周	60	2	7~8
2~4周	90	3	6~7
1~2月	120	4	5~6
2~4月	150	5	5~6
4~6月	180	6	5~6

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要而定，仅供参考。

净含量:120克

国食注字YP20230119

1

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)

卡倍多®

本公司已通过：
质量管理体系 (ISO9001) 认证
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

冲调方法

1 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶盖放入清水中煮沸5分钟。

2 冲调用开水煮沸后冷却至40℃-45℃，在奶量中加入需要量的温开水。

3 用量勺量取准确份量的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。

4 盖严奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后滴一滴奶放在手腕内侧测试温度，温度适宜即可喂哺。

注意事项

1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起婴儿的不适。
2、喂哺时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
4、对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

食品生产许可证编号：SC10661011408008
产品标准代号：GB10765-2021
产品类别：婴儿配方羊奶粉
产品属性：乳基、粉状
保质期：24个月
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西·西安
生产商：陕西盘龙乳业（集团）有限公司
地址：陕西省西安市阎良区人民东路东延线
电话：029-86822282
客服电话：029-81612722
公司网址：www.youjigaoaimilk.com

保持环境清洁 请勿乱扔垃圾

咨询热线
4008-616-909

扫一扫，登录官网，走进卡倍多

6 973464 881338

5.3x7.4=39.22 5.6x7.3=40.88 5.8x7.4=42.92

卡倍多®

商品名称面积=123.02

4.65x16=74.4

卡倍多®

商标总面积=122.42

9.8x4.9=48.02

秦龙®

8x7.8=62.4

8x8=64

8.1x7.4=59.94

8.1x8.3=67.23

8.2x8.4=68.88

7.9x8.2=64.78

8.4x8.3=69.72

3.5x5.9=20.65

3.6x5.8=20.88

5.7x6.8=38.76

7.3x7.1=51.83

1.9x5.7=10.83

7.2x6.9=49.68

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

通用名称面积总计=649.58

312.5mm

140mm

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇棕榈酸酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、钠（柠檬酸钠）、钾（氯化钾）、铜（硫酸铜）、镁（硫酸镁）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸钙、磷酸三钙）、磷（磷酸三钙）、碘（碘酸钾）、硒（亚硒酸钠）

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

贮存条件

1、本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2、每次食用后，请盖紧罐盖。
3、开罐后请于四周内用完。

喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	
0~2周	60	2	7~8
2~4周	90	3	6~7
1~2月	120	4	5~6
2~4月	150	5	5~6
4~6月	180	6	5~6

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2080
蛋白质	g	0.55	11.4
脂肪	g	1.22	25.4
碳水化合物	g	0.13	2.74
α-亚麻酸	mg	15	312
维生素A	μg RE	18	364
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.38	7.97
维生素K	μg	2.21	46.0
维生素B ₁	μg	18	364
维生素B ₂	μg	32	669
维生素B ₆	μg	14.3	298
维生素B ₁₂	μg	0.087	1.8
烟酸（烟酰胺）	μg	146	3042
叶酸	μg	3.7	77.7
泛酸	μg	165	3433
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.75	15.6
胆碱	mg	6.3	132
矿物质			
钠	mg	8.8	182
钾	mg	21.3	442
钙	mg	17.9	372
镁	mg	1.4	32.5
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.15	3.12
锰	μg	3.31	68.9
铜	μg	15.0	312
磷	mg	10	198
碘	μg	4.5	93.6
硒	μg	17	349
维生素	μg	0.90	18.8
可选择成分			
肌醇	mg	2.4	50.8
牛磺酸	mg	1.4	29.0
左旋肉碱	mg	0.7	14.7
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
低聚半乳糖	mg	5.1	107
低聚果糖	mg	21.6	449
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.2
叶黄素	μg	3.61	75.0
核苷酸	mg	0.79	16.4
乳铁蛋白	mg	1.31	27.2

秦龙®

卡倍多®



净含量:350克 国食注字YP20230119

1

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄, 1段)

卡倍多®

本公司已通过：
质量管理体系（ISO9001）认证
乳制品良好生产规范（GMP）体系认证
乳制品危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证

冲泡方法



1 冲泡前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶盖放入清水中煮沸5分钟。



2 冲泡用水煮沸后冷却至40℃-45℃，在奶瓶中加入需要量的温开水。



3 用量勺量取准确的量的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。



4 盖严奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后滴一滴奶液在手腕内侧测试温度，温度适宜即可喂哺。

注意事项

1、水和奶液未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起婴儿的不适。
2、喂哺时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
4、对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

食品生产许可证编号：SC10661011408008
产品标准号：GB10765-2021
产品类型：婴儿配方羊奶粉
产品属性：乳基 粉状
保质期：24个月
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西 西安
生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
地址：陕西省西安市南关区人民东路东延线
电话：029-86822282
客服电话：029-81612722
公司网址：www.youjigaoaimilk.com

保持环境清洁 请勿乱抛空罐

咨询热线
4008-616-909



扫一扫，登录官网，走进卡倍多



6 973464 881369

6x8.3=49.8

6.3x8.3=52.29

6.4x8.3=53.12

卡倍多®

18.9x4.9=92.61

卡倍多®

11x5.5=60.5

秦龙®

8.9x8.7=77.43

8.9x8.9=79.21

9x8.7=77.8

9x9.3=83.7

9.1x9.3=84.63

8.9x9.1=80.99

9.4x9.2=86.48

4x6.5=26

4x6.5=26

6.3x7.5=47.25

8.1x7.9=63.99

2.1x6.4=13.44

8.1x7.8=63.18

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

商品名称面积=155.21 商标总面积=153.11

通用名称面积总计=806.1

393.8mm

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、钠（柠檬酸钠）、钾（氯化钾）、铜（硫酸铜）、镁（硫酸镁）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸钙、磷酸三钙）、磷（磷酸三钙）、碘（碘酸钾）、硒（亚硒酸钠）

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2080
蛋白质	g	0.55	11.4
脂肪	g	1.22	25.4
亚油酸	g	0.13	2.74
α-亚麻酸	mg	15	312
碳水化合物	g	2.6	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	18	364
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.38	7.97
维生素K ₁	μg	2.21	46.0
维生素B ₁	μg	18	364
维生素B ₂	μg	32	669
维生素B ₆	μg	14.3	298
维生素B ₁₂	μg	0.087	1.8
烟酸（烟酰胺）	μg	146	3042
叶酸	μg	3.7	77.7
泛酸	μg	165	3433
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.75	15.6
胆碱	mg	6.3	132
矿物质			
钠	mg	8.8	182
钾	mg	21.3	442
铜	μg	17.9	372
镁	mg	1.6	32.5
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.15	3.12
锰	μg	3.31	68.9
钙	mg	15.0	312
磷	mg	10	198
氯	mg	4.5	93.6
硒	μg	17	349
可选择成分			
肌醇	mg	2.4	50.8
牛磺酸	mg	1.4	29.0
左旋肉碱	mg	0.7	14.7
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
二十碳四烯酸	mg	5.1	107
低聚半乳糖	mg	21.6	449
低聚果糖	mg	37.9	788
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.2
叶黄素	μg	3.61	75.0
核黄素	mg	0.79	16.4
乳铁蛋白	mg	1.31	27.2

贮存条件

1、本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2、每次食用后，请盖紧罐盖。
3、开罐后请于四周内用完。

喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	
0~2周	60	2	7~8
2~4周	90	3	6~7
1~2月	120	4	5~6
2~4月	150	5	5~6
4~6月	180	6	5~6

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。

卡倍多®



净含量:680克 国食注字YP20230119

1

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)

卡倍多®

本公司已通过：
质量管理体系 (ISO9001) 认证
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

冲调方法



1 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶嘴盖放入清水中煮沸5分钟。



2 冲调用水煮沸后冷却至40℃-45℃，在奶瓶中加入需要量的温开水。



3 用量勺量取准确份量的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。



4 盖严奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后滴一滴奶液在手腕内侧测试温度，温度适宜即可喂哺。

注意事项

1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起婴儿的不适。
2、喂哺时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
4、对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

食品生产许可证编号：SC10661011408008
产品标准代号：GB10765-2021
产品类型：婴儿配方羊奶粉
产品属性：乳基、粉状
保质期：24个月
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西·西安
生产商：陕西嘉龙天翔乳业有限公司
地址：陕西省西安市阎良区人民东路东延线
电话：029-86822282
客服电话：029-81612722
公司网址：www.youjigoatmilk.com

保持环境清洁 请勿乱丢垃圾

咨询热线
4008-616-909



扫一扫，登录官网，走进卡倍多



6 973464 881307

175mm

393.8mm

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（玉米油、低芥酸葵花籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、钠（柠檬酸钠）、钾（氯化钾）、铜（硫酸铜）、镁（硫酸镁）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸钙、磷酸三钙）、磷（磷酸三钙）、碘（碘酸钾）、硒（亚硒酸钠）

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2080
蛋白质	g	0.55	11.4
脂肪	g	1.22	25.4
亚油酸	g	0.13	2.74
α-亚麻酸	g	15	312
碳水化合物	g	2.6	55.1
维生素A	μg RE	18	364
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	μg α-TE	0.38	7.97
维生素K ₁	μg	2.21	44.0
维生素B ₁	μg	18	364
维生素B ₂	μg	32	669
维生素B ₆	μg	14.3	298
维生素B ₁₂	μg	0.087	1.8
烟酸（烟酰胺）	μg	146	3042
叶酸	μg	3.7	77.7
泛酸	μg	165	3433
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.75	15.6
胆碱	mg	6.3	132
矿物质			
钠	mg	8.8	182
钾	mg	21.3	442
铜	μg	17.9	372
镁	mg	1.6	32.5
铁	mg	0.16	3.32
锌	μg	0.15	3.12
锰	μg	3.31	68.9
钙	mg	15.0	312
磷	mg	10	198
氯	μg	4.5	93.6
硒	μg	17	349
可选择成分			
肌醇	mg	2.4	50.8
牛磺酸	mg	1.4	29.0
左旋肉碱	mg	0.7	14.7
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
二十碳四烯酸	mg	5.1	107
低聚半乳糖	mg	21.6	449
低聚果糖	mg	37.9	788
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.2
叶黄素	μg	3.61	75.0
核苷酸	mg	0.79	16.4
乳铁蛋白	mg	1.31	27.2

贮存条件

1、本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2、每次食用后，请盖紧罐盖。
3、开罐后请于四周内用完。

喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	
0~2周	60	2	7~8
2~4周	90	3	6~7
1~2月	120	4	5~6
2~4月	150	5	5~6
4~6月	180	6	5~6

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。

秦龙
QINLONG

卡倍多®



净含量:800克 国食注字YP20230119

1

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)

卡倍多®

本公司已通过：
质量管理体系 (ISO9001) 认证
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

冲调方法



1 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5分钟。



2 冲调用水煮沸后冷却至40℃-45℃，在奶瓶中加入需要量的温开水。



3 用量勺量取准确份量的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。



4 盖严奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后滴一滴奶液在手腕内侧测试温度，温度适宜即可喂哺。

注意事项

1、水和奶粉未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起婴儿的不适。
2、喂哺时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
4、对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

食品生产许可证编号：SC10661011408008
产品标准代号：GB10765-2021
产品类别：婴儿配方羊奶粉
产品属性：乳基·粉状
保质期：24个月
生产日期、批号：见罐底破码

产地：陕西·西安
生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
地址：陕西省西安市阎良区人民东路东延线
电话：029-86822282
客服电话：029-81612722
公司网址：www.youjigotmilk.com

保持环境清洁 请勿乱抛空罐

咨询热线
4008-616-909



扫一扫，轻松管理，走进卡倍多



6 973464 881185

8.7x12.3=107.01 9.3x12.2=113.46 9.4x12.3=115.62

卡倍多®

25.8x4.6=119.28 16x8=128

卡倍多® **秦龙**
QINLONG

11.8x11.7=138.06 11.9x11.9=141.61 11.9x11=130.9 12x12.3=147.6 12.1x12.5=151.25 11.7x12.1=141.57 12.4x12.3=152.52 5.2x8.9=45.76 5.3x8.7=46.11 8.4x10.1=84.84 10.7x10.4=111.42 2.8x8.5=23.8 10.7x10.4=111.28

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

商品名称面积=336.09

商标总面积=298.28

通用名称面积总计=1428.72

393.8mm

175mm

配料表

生乳乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、钙（柠檬酸钙）、钾（氯化钾）、铜（硫酸铜）、锰（硫酸锰）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、硒（硫酸硒）、钙（碳酸钙）、磷（磷酸三钙）、磷（磷酸三钙）、碘（碘酸钾）、硒（亚硒酸钠）

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

贮存条件

1、本品应于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2、每次食用后，请盖紧罐盖。
3、开罐后请于四周内用完。

喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	
0~2周	60	2	7~8
2~4周	90	3	6~7
1~2月	120	4	5~6
2~4月	150	5	5~6
4~6月	180	6	5~6

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2080
蛋白质	g	0.55	11.4
脂肪	g	1.22	25.4
亚油酸	g	0.13	2.74
α-亚麻酸	mg	15	312
碳水化合物	g	2.6	55.1
维生素A	μg RE	18	364
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.38	7.97
维生素K ₁	μg	2.21	46.0
维生素B ₁	μg	18	364
维生素B ₂	μg	32	669
维生素B ₆	μg	14.3	298
维生素B ₁₂	μg	0.087	1.8
烟酸（烟酰胺）	μg	146	3042
叶酸	μg	3.7	77.7
泛酸	μg	165	3433
维生素C	μg	4.1	85.2
生物素	μg	0.75	15.6
胆碱	mg	6.3	132
矿物质			
钠	mg	8.8	182
钾	mg	21.3	442
铜	μg	17.9	372
锰	μg	3.6	32.5
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.15	3.12
硒	μg	3.31	68.9
钙	mg	15.0	312
磷	mg	10	198
碘	μg	4.5	93.6
氯	mg	17	349
硒	μg	0.90	18.8
可选择成分			
肌醇	mg	2.4	50.8
牛磺酸	mg	1.4	29.0
左旋肉碱	mg	0.7	14.7
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
二十碳四烯酸	mg	5.1	107
低聚半乳糖	mg	21.6	449
低聚果糖	mg	37.9	788
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.2
叶黄素	μg	3.61	75.0
核苷酸	mg	0.79	16.4
乳铁蛋白	mg	1.31	27.2



卡倍多®



净含量:900克

国食注字YP20230119

1
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)

卡倍多®

本公司已通过:

质量管理体系 (ISO9001) 认证
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

冲调方法



1 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶嘴盖放入沸水中煮沸5分钟。



2 冲调用煮沸后冷却至40°C-45°C的水，在奶瓶中加入需要量的温开水。



3 用量勺量取准确份量的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。



4 盖严奶瓶，摇动至奶粉充分溶解。然后滴一滴奶液在手腕内侧测试温度，温度适宜即可喂哺。

注意事项

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均可引起婴儿的不适。
- 2、喂哺时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝有无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
- 4、对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

食品生产许可证编号: SC10661011408008

产品标准代号: GB10765-2021

产品类别: 婴儿配方羊奶粉

产品属性: 乳基-粉状

保质期: 24个月

生产日期、批号: 见罐底喷码

产地: 陕西-西安

生产商: 陕西秦龙天润乳业有限公司

地址: 陕西省西安市阎良区人民东路东延线

电话: 029-86822282

客服电话: 029-81612722

公司网址: www.youjgoatmilk.com

咨询热线
4008-616-909



扫一扫，登录官网，走进卡倍多



6 973464 881277



11.8x11.7x138.06 11.8x11.9x141.61 11.9x11.1x130.9 12x12.3x147.6 12.1x12.5x181.28 11.7x12.1x141.57 12.4x12.3x152.52 5.2x8.4x5.76 5.3x8.7x46.11 8.4x10.1x84.84 10.7x10.6x113.42 2.8x5.2x3.8 10.7x10.4x111.28

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

商品名称面积=336.09

商标总面积=298.28

通用名称面积总计=1428.72

113.5mm

258.1mm

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物油和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠)、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)。

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2048
蛋白质	g	0.63	13.0
脂肪	g	1.19	24.3
亚油酸	g	0.15	3.16
α-亚麻酸	mg	15	308
碳水化合物	g	2.6	53.6
维生素			
维生素A	μg RE	23	461
维生素D	μg	0.40	12.3
维生素E	mg α-TE	0.38	8.5
维生素K	μg	1.98	40.6
维生素B ₁	μg	21	434
维生素B ₂	μg	27	557
维生素B ₆	μg	15.5	318
维生素B ₁₂	μg	0.068	1.4
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2816
叶酸	μg	3.8	77.0
泛酸	μg	162	3321
维生素C	mg	4.2	85.2
生物素	μg	0.78	15.9
肌醇	mg	6.2	127
矿物质			
钠	mg	6.2	126
钾	mg	22.5	461
钙	mg	15.9	326
镁	mg	11.7	239
铁	mg	0.30	6.15
锌	mg	0.15	3.08
锰	μg	5.22	107
铜	μg	21.3	436
氯	mg	11	227
磷	mg	4.5	92.2
氮	mg	19	384
糖	μg	0.74	15.2
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.6
牛磺酸	mg	1.4	28.7
左旋肉碱	mg	0.7	15.1
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.2
二十碳四烯酸	mg	5.4	110
低聚半乳糖	mg	65.8	1347
低聚果糖	mg	38.1	781
13-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.6
叶黄素	μg	7.32	150
核苷酸	mg	0.89	18.3
乳铁蛋白	mg	0.80	16.4

贮存条件

1、本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2、每次食用后，请盖紧罐盖。
3、开罐后请于四周内用完。

喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(mL)	奶粉用量(量勺数)	
6~8月	180	6	4~5
8~10月	210	7	3~4
10~12月	210	7	3~4

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。



卡倍多®



净含量:120克

国食注字YP20230120

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄, 2段)

卡倍多®

本公司已通过：
质量管理体系 (ISO9001) 认证
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

冲泡方法



1 冲泡前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶盖放入清水中煮沸5分钟。



2 冲泡用水煮沸后冷却至40℃-45℃，在奶瓶中加入需要量的温开水。



3 用量勺量取准确份量的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。



4 盖严奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后滴一滴奶液在手腕内侧测试温度，温度适宜即可喂哺。

注意事项

1、水和奶量未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起婴儿的不适。
2、喂哺时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
4、食用本产品时，须配合添加辅助食品。

食品生产许可证编号：SC10661011408008
产品标准代号：GB10766-2021
产品类别：较大婴儿配方羊奶粉
产品属性：乳基、粉状
保质期：24个月
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西 西安
生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
地址：陕西省西安市阎良区人民东路东延线
电话：029-86822282
客服电话：029-81612722
公司网址：www.youjigotmilk.com

保持环境清洁 请勿乱丢垃圾

咨询热线
4008-616-909



扫一扫，登录官网，走进卡倍多



6 973464 881345

5.3x7.4=39.22 5.6x7.3=40.88 5.8x7.4=42.92

卡倍多®

4.65x16=74.4

卡倍多®

9.8x4.9=48.02

秦龙®

8.4x8.3=69.72 7.7x8.2=63.14 7.9x7.8=61.62 7.9x8=63.2 8x7.4=59.2 8x8.3=66.4 8.1x8.4=68.04 7.8x8.2=63.96 8.3x8.3=68.89 3.5x5.9=20.65 1.9x5.7=10.83 3.5x5.8=20.35 6x6.8=38.08 7.2x7.1=51.12 3.5x5.8=20.3 7.1x6.9=48.99

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

商品名称面积=123.02

商标总面积=122.42

通用名称面积总计=794.44

140mm

312.5mm

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、铜（硫酸铜）、锰（硫酸锰）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、硒（硫酸硒）、钙（碳酸钙）、碘（碘酸钾）、硒（亚硒酸钠）、

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2048
蛋白质	g	0.63	13.0
脂肪	g	1.19	24.3
碳水化合物	g	0.15	3.16
α-生育酚	mg	15	308
碳水化合物	g	2.6	53.6
维生素A	μg RE	23	461
维生素D	μg	0.60	12.3
维生素E	mg α-TE	0.38	7.85
维生素K	μg	1.98	40.6
维生素B ₁	μg	21	434
维生素B ₂	μg	27	557
维生素B ₆	μg	15.5	318
维生素B ₁₂	μg	0.068	1.4
烟酸（烟酰胺）	μg	138	2816
叶酸	μg	3.8	77.0
泛酸	μg	162	3321
维生素C	mg	4.2	85.2
生物素	μg	0.78	15.9
胆碱	mg	6.2	127
矿物质	mg	6.2	126
钠	mg	22.5	461
钾	mg	15.9	326
钙	mg	1.7	34.8
铁	mg	0.30	6.15
锌	μg	0.15	3.08
锰	μg	5.22	107
铜	μg	21.3	436
硒	μg	11	227
碘	μg	4.5	92.2
氯	mg	19	384
可溶性成分	mg	0.74	15.2
乳糖	mg	2.0	40.6
牛磺酸	mg	1.4	28.7
左旋肉碱	mg	0.7	15.1
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.2
二十碳四烯酸	mg	5.4	110
低聚半乳糖	mg	65.8	1347
低聚果糖	mg	38.1	781
13-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.6
叶黄素	μg	7.32	150
核苷酸	mg	0.89	18.3
乳铁蛋白	mg	0.80	16.4

秦龙
QINLONG

卡倍多®



净含量:350克

国食注字YP20230120

2

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)

卡倍多®

本公司已通过：
质量管理体系（ISO9001）认证
乳制品良好生产规范（GMP）体系认证
乳制品危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证

冲泡方法



1 冲泡前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶盖放入沸水中煮沸5分钟。



2 冲泡用水煮沸后冷却至40℃-45℃，在奶瓶中加入定量量的温开水。



3 用量勺量取准确份量的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。



4 盖严奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后滴一滴奶液在手腕内侧测试温度，温度适宜即可喂奶。

注意事项

1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等可能引起婴儿的不适。
2、喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
4、食用本产品时，须配合添加辅食食品。

食品生产许可证编号：SC10661011408008
产品标准代号：GB10766-2021
产品类别：较大婴儿配方羊奶粉
产品属性：乳基 粉状
保质期：24个月
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西 西安
生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
地址：陕西省西安市阎良区人民东路东延线
电话：029-86822282
客服电话：029-81612722
公司网址：www.youjiuqinlong.com

咨询热线
4008-616-909



扫一扫，查看详情，走进卡倍多



6 973464 881376

6x8.3+49.8 6.3x8.3+52.29 6.4x8.3+53.12

卡倍多®

18x6.9+92.61

卡倍多®

11x5.5+60.5

秦龙®

9.4x7.2+86.48 8.6x7.2+79.12 8.7x8.7+75.69 8.8x8.9+78.32 8.9x8.2+72.98 8.9x9.3+82.77 9.9x9.3+83.7 8.8x9.1+80.08 9.3x9.3+86.49 3.9x6.5+25.35 2.1x6.4+13.44 3.9x6.5+25.35 6.3x7.5+47.25 8x8+64 3.9x6.5+25.35 8x7.7+61.6

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

商品名称面积=155.21 商标总面积=153.11

通用名称面积总计=987.97

393.8mm

配料表

生牛乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、铜（硫酸铜）、锰（硫酸锰）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、镁（硫酸镁）、钙（碳酸钙）、碘（碘酸钾）、硒（亚硒酸钠）。

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2048
蛋白质	g	0.63	13.0
脂肪	g	1.19	24.3
亚油酸	g	0.15	3.16
α-亚麻酸	mg	15	308
碳水化合物	g	2.6	53.6
维生素			
维生素A	μg RE	23	461
维生素D	μg	0.60	12.3
维生素E	mg α-TE	0.38	7.95
维生素K ₁	μg	1.98	40.6
维生素B ₁	μg	21	434
维生素B ₂	μg	27	557
维生素B ₆	μg	15.5	318
维生素B ₁₂	μg	0.068	1.4
烟酸（烟酰胺）	μg	138	2816
叶酸	μg	3.8	77.0
泛酸	μg	162	3321
维生素C	mg	4.2	85.2
生物素	μg	0.78	15.9
胆碱	mg	6.2	127
矿物质			
钠	mg	6.2	126
钾	mg	22.5	461
铜	μg	15.9	326
镁	mg	1.7	34.8
铁	mg	0.30	6.15
锌	mg	0.15	3.08
锰	μg	5.22	107
钙	mg	21.3	436
碘	μg	11	227
硒	μg	4.5	92.2
氯	mg	19	384
硫	μg	0.74	15.2
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.6
牛磺酸	mg	1.4	28.7
左旋肉碱	mg	0.7	15.1
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.2
二十碳四烯酸	mg	5.4	110
低聚半乳糖	mg	65.8	1347
低聚果糖	mg	38.1	781
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.6
叶黄素	μg	7.32	150
核苷酸	mg	0.89	18.3
乳铁蛋白	mg	0.80	16.4

贮存条件

1、本品贮于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2、每次食用后，请盖紧瓶盖。
3、开罐后请于四周内用完。

喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	
6~8月	180	6	4 5
8~10月	210	7	3 4
10~12月	210	7	3 4

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。



卡倍多®



净含量:680克

国食注字YP20230120

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)

卡倍多®

本公司已通过：
质量管理体系（ISO9001）认证
乳制品良好生产规范（GMP）体系认证
乳制品危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证

冲调方法



1 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶盖放入清水中煮沸5分钟。



2 冲调用水煮沸后冷却至40℃-45℃，在奶瓶中加入需要量的温开水。



3 用量勺量取准确份量的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。



4 盖严奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后滴一滴奶液在手腕内侧测试温度，温度适宜即可喂哺。

注意事项

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起婴儿的不适。
- 2、喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
- 4、食用本产品时，须配合添加辅食食品。

食品生产许可证编号：SC10661011408008
产品标准代号：GB10766-2021
产品类别：较大婴儿配方羊奶粉
产品属性：乳基-粉状
保质期：24个月
生产日期、批号：见罐底喷码

咨询热线
4008-616-909



扫一扫，登录官网，走进卡倍多

产地：陕西·西安
生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
地址：陕西省西安市阎良区人民东路东延线
电话：029-86822282
客服电话：029-81612722
公司网址：www.youjigoatmilk.com

保持环境清洁
请勿乱丢空罐



6 973464 881314

7.6x10.3=76.28 7.9x10.3=81.27 8x10.3=82.4

卡倍多®

23.5x6.1=143.35

卡倍多®

13.7x6.9=94.53

秦龙®

11.6x11.6=134.56

10.8x11.6=125.28

10.9x10.8=117.72

11x11.1=122.1

11x10.2=112.2

11.1x11.6=128.76

11.2x11.7=131.04

10.9x11.4=124.26

11.5x11.5=132.25

4.9x6.3=30.87

2.6x7.9=20.54

4.8x6.3=30.24

7.8x9.4=73.32

10.9x9.9=107.91

4.8x7.9=37.92

9.8x7.9=77.63

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

商品名称面积=242.05

商标总面积=237.88

通用名称面积总计=1532.58

175mm

393.8mm

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、铜（硫酸铜）、镁（硫酸镁）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸钙）、磷（磷酸钾）、硒（亚硒酸钠）、致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2048
蛋白质	g	0.63	13.0
脂肪	g	1.19	24.3
亚油酸	g	0.15	3.16
α-亚麻酸	mg	15	308
碳水化合物	g	2.6	53.6
维生素			
维生素A	μg RE	23	461
维生素D	μg	0.60	12.3
维生素E	mg α-TE	0.38	7.85
维生素K ₁	μg	1.98	40.6
维生素B ₁	μg	21	434
维生素B ₂	μg	27	557
维生素B ₆	μg	15.5	318
维生素B ₁₂	μg	0.068	1.4
烟酸（烟酰胺）	μg	138	2816
叶酸	μg	3.8	77.0
泛酸	μg	162	3321
维生素C	mg	4.2	85.2
生物素	μg	0.78	15.9
胆碱	mg	6.2	127
矿物质			
钠	mg	6.2	126
钾	mg	22.5	461
铜	μg	15.9	326
镁	mg	1.7	34.8
铁	mg	0.30	6.15
锌	mg	0.15	3.08
锰	μg	5.22	107
钙	mg	21.3	436
磷	mg	11	227
硒	μg	4.5	92.2
氯	mg	19	384
碘	μg	0.74	15.2
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.6
牛磺酸	mg	1.4	28.7
左旋肉碱	mg	0.7	15.1
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.2
二十碳四烯酸	mg	5.4	110
低聚半乳糖	mg	65.8	1347
低聚果糖	mg	38.1	781
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.6
叶黄素	μg	7.32	150
核苷酸	mg	0.89	18.3
乳铁蛋白	mg	0.80	16.4

贮存条件

1、本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2、每次食用后，请盖紧罐盖。
3、开罐后请于四周内用完。

喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	
6~8月	180	6	4 5
8~10月	210	7	3 4
10~12月	210	7	3 4

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。



卡倍多®



净含量:800克

国食注字YP20230120

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)

2

卡倍多®

本公司已通过：

质量管理体系 (ISO9001) 认证
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

冲调方法



1 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶嘴盖放入清水中煮沸5分钟。



2 冲调用水煮沸后冷却至40℃~45℃，在奶瓶中加入需要量的温开水。



3 用量勺量取准确份量的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。



4 盖严奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后滴一滴奶液在手腕内侧测试温度，温度适宜即可喂哺。

注意事项

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等可能引起婴儿的不适。
- 2、喂哺时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
- 4、食用本产品时，须配合添加辅助食品。

食品生产许可证编号：SC10661011408008

产品标准代号：GB10766-2021

产品类别：较大婴儿配方羊奶粉

产品属性：乳基-粉状

保质期：24个月

生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西-西安

生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司

地址：陕西省西安市阎良区人民东路东延线

电话：029-86822282

客服电话：029-81612722

公司网址：www.youjigomilk.com

保持环境清洁
请勿乱丢空罐

咨询热线
4008-616-909



扫一扫，登录官网，走进卡倍多



卡倍多®

卡倍多®

秦龙®

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

商品名称面积=336.09

商标总面积=298.28

通用名称面积总计=1780.4

175mm

393.8mm

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、铜（硫酸铜）、镁（硫酸镁）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸钙）、碘（碘酸钾）、硒（亚硒酸钠）、致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

贮存条件

1、本品贮于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2、每次食用后，请盖紧罐盖。
3、开罐后请于四周内用完。

喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	
6~8月	180	6	4 5
8~10月	210	7	3 4
10~12月	210	7	3 4

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2048
蛋白质	g	0.63	13.0
脂肪	g	1.19	24.3
亚油酸	g	0.15	3.16
α-亚麻酸	mg	15	308
碳水化合物	g	2.6	53.6
维生素			
维生素A	μg RE	23	461
维生素D	μg	0.60	12.3
维生素E	mg α-TE	0.38	7.85
维生素K ₁	μg	1.98	40.6
维生素B ₁	μg	21	434
维生素B ₂	μg	27	557
维生素B ₆	μg	15.5	318
维生素B ₁₂	μg	0.068	1.4
烟酸（烟酰胺）	μg	138	2816
叶酸	μg	3.8	77.0
泛酸	μg	162	3321
维生素C	mg	4.2	85.2
生物素	μg	0.78	15.9
胆碱	mg	6.2	127
矿物质			
钠	mg	6.2	126
钾	mg	22.5	461
钙	mg	15.9	326
镁	mg	1.7	34.8
铁	mg	0.30	6.15
锌	mg	0.15	3.08
锰	μg	5.22	107
铜	mg	21.3	436
碘	mg	11	227
硒	μg	4.5	92.2
氯	mg	19	384
可选择成分	μg	0.74	15.2
肌醇	mg	2.0	40.6
牛磺酸	mg	1.4	28.7
左旋肉碱	mg	0.7	15.1
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.2
二十碳四烯酸	mg	5.4	110
低聚半乳糖	mg	65.8	1347
低聚果糖	mg	38.1	781
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.6
叶黄素	μg	7.32	150
核苷酸	mg	0.89	18.3
乳铁蛋白	mg	0.80	16.4

秦龙®

卡倍多®



净含量:900克

国食注字YP20230120

2

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)

卡倍多®

本公司已通过：
质量管理体系（ISO9001）认证
乳制品良好生产规范（GMP）体系认证
乳制品危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证

冲调方法



1 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5分钟。



2 冲调用水煮沸后冷却至40℃-45℃，在奶瓶中加入需要量的温开水。



3 用量勺量取准确份量的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。



4 盖严奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后滴一滴奶液在手腕内侧测试温度，温度适宜即可哺喂。

注意事项

1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均可引起婴儿的不适。
2、哺喂时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。
3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
4、食用本产品时，须配合添加辅食食品。

食品生产许可证编号：SC10661011408008
产品标准代号：GB10766-2021
产品类别：较大婴儿配方羊奶粉
产品属性：乳基 粉状
保质期：24个月
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西·西安
生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
地址：陕西省西安市周礼区人民东路东延线
电话：029-86822282
客服电话：029-81612722
公司网址：www.youjigostmilk.com

保持环境清洁 请勿乱抛空罐

咨询热线
4008-616-909



扫一扫，登录官网，走进卡倍多



6 973464 881284

卡倍多®

卡倍多®

秦龙®

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

商品名称面积=336.09

商标总面积=298.28

通用名称面积总计=1780.4

113.5mm

258.1mm

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、铜（硫酸铜）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸钙）、磷（磷酸钾）、硒（亚硒酸钠）、

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	0.70	14.3
脂肪	g	1.18	23.9
亚油酸	g	0.15	2.98
α-亚麻酸	g	15	305
碳水化合物	g	2.6	52.4
维生素A	μg RE	23	458
维生素D	μg	0.60	12.2
维生素E	mg α-TE	0.39	7.84
维生素K	μg	2.00	40.6
维生素B ₁	μg	22	451
维生素B ₂	μg	35	718
维生素B ₆	μg	16.3	331
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.6
烟酸（烟酰胺）	μg	143	2913
叶酸	μg	3.8	77.5
泛酸	μg	149	3037
维生素C	mg	31	628
生物素	μg	0.73	14.9
矿物质			
钠	mg	10.2	208
钾	mg	27.6	560
铜	μg	16.3	331
铁	mg	1.9	37.8
锰	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.15	2.95
钙	mg	21.7	440
磷	mg	13	268
硒	μg	4.1	82.5
氯	mg	23	469
可选择成分			
视黄醇	μg	0.70	14.3
胆碱	mg	6.4	131
锰	μg	4.51	91.8
肌醇	mg	2.6	52.6
牛磺酸	mg	1.2	24.5
左旋肉碱	mg	1.1	22.0
二十二碳六烯酸	mg	2.3	46.2
二十碳四烯酸	mg	2.4	49.0
低聚半乳糖	mg	44.2	898
低聚果糖	mg	38.2	777
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.5
叶黄素	μg	738	15.0
核苷酸	mg	0.93	18.9
乳铁蛋白	mg	0.79	16.1

贮存条件

- 1、本品贮于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
- 2、每次食用后，请盖紧罐盖。
- 3、开罐后请于四周内用完。

喂哺建议表			
幼儿年龄	每次喂哺量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	每日喂哺次数
12~24月	210	7	3 4
24~36月	210	7	2 3

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。

秦龙®

卡倍多®



净含量120克 国食注字YP20230121

3

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄，3段)

卡倍多®

本公司已通过：
质量管理体系（ISO9001）认证
乳制品良好生产规范（GMP）体系认证
乳制品危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证

冲调方法



1 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶嘴盖放入清水中煮沸5分钟。



2 冲调用水煮沸后冷却至40℃-45℃，在奶瓶中加入需要量的温开水。



3 用量勺量取准确份量的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶中。



4 盖严奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后滴一滴奶液在手腕内侧测试温度，温度适宜即可喂哺。

注意事项

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起幼儿的不适。
- 2、喂哺时应抱着幼儿，如疏忽照顾可能会引起幼儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。

食品生产许可证编号：SC10661011408008
产品标准代号：GB10767-2021
产品类别：幼儿配方羊奶粉
产品属性：乳基 粉状
保质期：24个月
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西·西安
生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
地址：陕西省西安市阎良区人民东路东延线
电话：029-86822282
客服电话：029-81612722
公司网址：www.youjigostmilk.com

咨询热线
4008-616-909



扫一扫，登录官网，走进卡倍多



保持环境清洁 请勿乱丢空罐

5.3x7.4=39.22 5.6x7.3=40.88 5.8x7.4=42.92

卡倍多®

4.65x16=74.4

卡倍多®

9.8x4.9=48.02

秦龙®

7.7x8.3=63.91

8x8.1=64.8

8x7.4=59.2

8.1x8.4=68.04

8.1x8.4=68.04

7.9x8.3=65.57

8.4x8.3=69.72

7.4x5.8=42.92

8x5.8=46.4

5.6x6.8=38.08 7.2x7.2=51.84

3.5x5.9=20.65 7.2x7.1=51.12

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

商品名称面积=123.02

商标总面积=122.42

通用名称面积总计=710.29

140mm

312.5mm

配料表

生乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、铜（硫酸铜）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸钙）、磷（磷酸钾）、硒（亚硒酸钠）。

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	0.70	14.3
脂肪	g	1.18	23.9
碳水化合物	g	0.15	2.96
α-亚麻酸	g	15	305
维生素A	μg RE	23	458
维生素D	μg	0.40	12.2
维生素E	mg α-TE	0.39	7.84
维生素K	μg	2.00	40.6
维生素B ₁	μg	22	451
维生素B ₂	μg	35	718
维生素B ₆	μg	16.3	331
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.6
烟酸（烟酰胺）	μg	143	2913
叶酸	μg	3.8	77.5
泛酸	μg	149	3037
维生素C	mg	3.1	62.8
生物素	μg	0.73	14.9
矿物质			
钠	mg	10.2	208
钾	mg	27.6	560
钙	mg	16.3	331
镁	mg	1.9	37.8
铁	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.15	2.96
铜	mg	21.7	440
磷	mg	13	268
碘	μg	4.1	82.5
硒	μg	23	469
可选择成分			
胆碱	μg	0.70	14.3
肌醇	mg	6.4	131
泛酸	μg	4.81	97.8
牛磺酸	mg	2.6	52.6
左旋肉碱	mg	1.2	24.5
二十二碳六烯酸	mg	1.1	22.0
二十碳四烯酸	mg	2.3	46.2
低聚半乳糖	mg	2.4	49.0
低聚果糖	mg	44.2	898
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	38.2	777
叶黄素	μg	0.12	2.5
核苷酸	μg	7.38	150
乳铁蛋白	mg	0.93	18.9
	mg	0.79	16.1

卡倍多®



净含量:350克 国食注字YP20230121

3

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)

卡倍多®

本公司已通过：
质量管理体系（ISO9001）认证
乳制品良好生产规范（GMP）体系认证
乳制品危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证

冲调方法



1. 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶嘴盖放入沸水中煮沸5分钟。

2. 冲调用水煮沸后冷却至40℃-45℃，在奶瓶中加入所需量的温开水。

3. 用量勺量取准确份量的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶中。

4. 盖紧奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后滴一滴奶液在手腕内侧测试温度，温度适宜即可喂哺。

注意事项

1. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起幼儿的不适。

2. 喂哺时应抱着幼儿，如疏忽照顾可能会引起幼儿窒息。

3. 换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝有无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。

食品生产许可证编号：SC10661011408008
产品标准代号：GB10767-2021
产品类别：幼儿配方羊奶粉
产品属性：乳基、粉状
保质期：24个月
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西·西安
生产商：陕西秦龙天源乳业有限公司
地址：陕西省西安市南关区人民东路东延线
电话：029-86822282
客服电话：029-81612722
公司网址：www.youjigotmilk.com

保持环境清洁 请勿乱丢空罐

咨询热线
4008-616-909



扫一扫，登录官网，走进卡倍多



6 973464 881383

6x8.3=49.8 6.3x8.3=52.29 6.6x8.3=53.12

18.9x4.9=92.61

11x5.5=60.5

8.6x9.3=79.98

8.9x9=80.1

9x8.3=74.7

9x9.3=83.7

9.1x9.4=85.54

8.8x9.2=80.96

9.3x9.4=87.42

8.3x6.5=53.95

8.9x6.6=58.74

6.3x7.6=47.88

8.1x8.1=65.61

3.9x6.6=25.74

8x7.8=62.4

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)

通用名称面积总计=886.72

商品名称面积=155.21

商标总面积=153.11

393.8mm

158mm

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₃（盐酸吡哆醇）、维生素B₅（泛酸）、维生素B₆（吡哆醇）、维生素B₁₂（钴胺素）、烟酸（烟酰胺）、叶酸（D-泛酸）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、铜（硫酸铜）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸钙）、碘（碘酸钾）、硒（亚硒酸钠）。

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

贮存条件

1、本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2、每次食用后，请盖紧罐盖。
3、开罐后请于四周内用完。

喂哺建议表				
幼儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)		
12~24月	210	7	3	4
24~36月	210	7	2	3

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	0.70	14.3
脂肪	g	1.18	23.9
亚油酸	g	0.15	2.98
α-亚麻酸	mg	15	305
碳水化合物	g	2.6	52.4
维生素			
维生素A	μg RE	23	458
维生素D	μg	0.40	12.2
维生素E	mg α-TE	0.39	7.86
维生素K ₁	μg	2.00	40.6
维生素B ₁	μg	22	451
维生素B ₂	μg	35	718
维生素B ₃	μg	16.3	331
维生素B ₅	μg	0.079	1.6
烟酸（烟酰胺）	μg	143	2913
叶酸	μg	3.8	77.5
泛酸	μg	149	3037
维生素C	mg	3.1	62.8
生物素	μg	0.73	14.9
矿物质			
钠	mg	10.2	208
钾	mg	27.6	560
钙	mg	16.3	331
镁	mg	1.9	37.8
铁	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.15	2.96
铜	mg	21.7	440
锰	mg	13	268
碘	mg	4.1	82.5
硒	mg	23	469
可选择成分			
硒	μg	0.70	14.3
胆碱	mg	6.4	131
锰	μg	4.81	97.8
肌醇	mg	2.6	52.6
牛磺酸	mg	1.2	24.5
左旋肉碱	mg	1.1	22.0
二十二碳六烯酸	mg	2.3	46.2
低聚半乳糖	mg	2.4	49.0
低聚果糖	mg	44.2	898
13-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.5
叶黄素	μg	7.38	150
核苷酸	mg	0.93	18.9
乳铁蛋白	mg	0.79	16.1



卡倍多®



净含量:680克 国食注字YP20230121

3

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)

卡倍多®

本公司已通过：
质量管理体系 (ISO9001) 认证
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

冲调方法



1 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶嘴盖放入清水中煮沸5分钟。



2 冲调用水煮沸后冷却至40℃-45℃，在奶瓶中加入需要量的温开水。



3 用量勺量取准确份量的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶中。



4 盖严奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后滴一滴奶液在手腕内侧测试温度，温度适宜即可哺喂。

注意事项

1、水和奶液未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起幼儿的不适。
2、喂哺时应抱着幼儿，如疏忽照顾可能会引起幼儿窒息。
3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适应再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。

食品生产许可证编号：SC10661011408008
产品标准代号：GB10767-2021
产品类别：幼儿配方羊奶粉
产品属性：乳基-粉状
保质期：24个月
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西-西安
生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
地址：陕西省西安市阎良区人民东路东延线
电话：029-86822282
客服电话：029-81612722
公司网址：www.youjigotmilk.com

咨询热线
4008-616-909

扫一扫，登录官网，走进卡倍多

保持环境清洁 请勿乱抛空罐

6 973464 881321

7.6x10.3=78.28

7.9x10.3=81.37

8x10.3=82.4

卡倍多®

商品名称面积=242.05

23.5x6.1=143.35

卡倍多®

商标总面积=237.88

13.7x6.9=94.53

秦龙®

10.7x11.6=124.12

11.1x11.2=124.32

11.1x10.3=114.33

11.2x11.6=129.92

11.3x11.7=132.21

11x11.5=126.5

11.6x11.6=134.56

10.3x8.1=83.43

11.1x8.2=91.02

7.8x9.4=73.32

10x10=100

5.1x8=40.8

10x7=70

幼儿配方羊奶粉 (12 - 36 月龄, 3 段)

通用名称面积总计=1371.53

393.8mm

175mm

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、铜（硫酸铜）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸盐）、碘（碘酸钾）、硒（亚硒酸钠）。

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	0.70	14.3
脂肪	g	1.18	23.9
亚油酸	g	0.15	2.98
α-亚麻酸	mg	15	305
碳水化合物	g	2.6	52.4
维生素			
维生素A	μg RE	23	458
维生素D	μg	0.60	12.2
维生素E	mg α-TE	0.39	7.86
维生素K ₁	μg	2.00	40.6
维生素B ₁	μg	22	451
维生素B ₂	μg	35	718
维生素B ₆	μg	16.3	331
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.6
烟酸（烟酰胺）	μg	143	2913
叶酸	μg	3.8	77.5
泛酸	μg	169	3037
维生素C	mg	3.1	62.8
生物素	μg	0.73	14.9
矿物质			
钠	mg	10.2	208
钾	mg	27.6	560
钙	mg	16.3	331
镁	mg	1.9	37.8
铁	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.15	2.96
铜	mg	21.7	440
磷	mg	13	268
氯	mg	4.1	82.5
硒	mg	23	469
胆碱	μg	0.70	14.3
肌醇	mg	6.4	131
锰	μg	4.81	97.8
牛磺酸	mg	2.6	52.6
左旋肉碱	mg	1.2	24.5
二十二碳六烯酸	mg	1.1	22.0
二十碳四烯酸	mg	2.4	49.0
低聚半乳糖	mg	44.2	898
低聚果糖	mg	38.2	777
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.5
叶黄素	μg	7.38	150
核苷酸	mg	0.93	18.9
乳铁蛋白	mg	0.79	16.1

贮存条件

1、本品贮存于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2、每次食用后，请盖紧罐盖。
3、开罐后请于四周内用完。

喂哺建议表

幼儿年龄	每次喂哺量	每日喂哺次数		
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)		
12~24月	210	7	3	4
24~36月	210	7	2	3

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。

秦龙 QINLONG

卡倍多®



净含量:800克 国食注字YP20230121

3

幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

卡倍多®

本公司已通过：
质量管理体系（ISO9001）认证
乳制品良好生产规范（GMP）体系认证
乳制品危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证

冲调方法



1. 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5分钟。

2. 冲调用水煮沸后冷却至40℃-45℃，在奶瓶中加入需要量的温开水。

3. 用量勺量取准确份量的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶中。

4. 盖严奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后滴一滴奶液在手腕内侧测试温度，温度适宜即可喂哺。

注意事项

1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起幼儿的不适。
2、喂哺时应抱着幼儿，如疏忽照顾可能会引起幼儿窒息。
3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝先不速再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。

食品生产许可证编号：SC10661011408008
产品标准代号：GB10767-2021
产品类别：幼儿配方羊奶粉
产品属性：乳基、粉状
保质期：24个月
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西 西安
生产商：陕西秦龙天源乳业有限公司
地址：陕西省西安市南关区人民路东延线
电话：029-86822282
客服电话：029-81612722
公司网址：www.youjigotmilk.com

咨询热线
4008-616-909



扫一扫，登录官网，走进卡倍多



6 973464 881208

保持环境清洁 请勿乱丢空罐

8.7x12.3=107.01 9.3x12.2=113.46 9.4x12.3=115.82

卡倍多®

25.8x6.9=178.28 16.8x12.8

卡倍多® 秦龙 QINLONG

11.5x12.4=142.6 11.9x12.1=143.99 11.9x11=130.9 11.9x12.4=147.56 12.2x12.5=152.5 11.7x12.2=142.74 12.4x12.5=155 11x8.7=95.7 11.9x8.7=103.53 8.4x10.1=84.84 10.7x10.4=111.32 5.2x8.9=45.76 10.7x10.4=111.28

幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

商品名称面积=336.09

商标总面积=298.28

通用名称面积总计=1569.82

393.8mm

175mm

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-半磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、维生素A（醋酸视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、铜（硫酸铜）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、锰（硫酸锰）、钙（碳酸钙）、磷（磷酸钾）、硒（亚硒酸钠）。

致敏物质提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

贮存条件

1、本品贮于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。
2、每次食用后，请盖紧罐盖。
3、开罐后请于四周内用完。

喂哺建议表

幼儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)	
12~24月	210	7	3
24~36月	210	7	2

每量勺奶粉约4.5g

注：以上的喂哺量建议表是根据平均的需要量而定，仅供参考。

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	0.70	14.3
脂肪	g	1.18	23.9
碳水化合物	g	0.15	2.98
α-胡萝卜素	mg	15	305
维生素A	μg RE	23	458
维生素D	μg	0.60	12.2
维生素E	mg α-TE	0.39	7.86
维生素K ₁	μg	2.00	40.6
维生素B ₁	μg	22	451
维生素B ₂	μg	35	718
维生素B ₆	μg	16.3	331
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.6
烟酸（烟酰胺）	μg	143	2913
叶酸	μg	3.8	77.5
泛酸	μg	149	3037
维生素C	mg	3.1	62.8
生物素	μg	0.73	14.9
矿物质			
钠	mg	10.2	208
钾	mg	27.6	560
钙	mg	16.3	331
镁	mg	1.9	37.8
铁	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.15	2.96
铜	mg	21.7	440
磷	mg	13	268
碘	mg	4.1	82.5
硒	mg	23	469
可选择成分			
碘	μg	0.70	14.3
胆碱	mg	6.4	131
锰	μg	4.81	97.8
肌醇	mg	2.6	52.6
牛磺酸	mg	1.2	24.5
左旋肉碱	mg	1.1	22.0
二十二碳六烯酸	mg	2.3	46.2
二十碳四烯酸	mg	2.4	49.0
低聚半乳糖	mg	44.2	898
低聚果糖	mg	38.2	777
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.5
叶黄素	μg	7.38	150
核苷酸	mg	0.93	18.9
乳铁蛋白	mg	0.79	16.1



卡倍多®



净含量:900克

国食注字YP20230121

3
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)

卡倍多®

本公司已通过：
质量管理体系（ISO9001）认证
乳制品良好生产规范（GMP）体系认证
乳制品危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证

冲调方法

1 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5分钟。

2 冲调用水煮沸后冷却至40℃-45℃，在奶瓶中加入需要量的温开水。

3 用量勺量取准确份量的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶中。

4 盖严奶瓶，摇动至奶粉充分溶解，然后滴一滴奶液在手腕内侧测试温度，温度适宜即可喂哺。

注意事项

1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均可能引起幼儿的不适。
2、喂哺时应抱着幼儿，如疏忽照顾可能会引起幼儿窒息。
3、换奶时替代品牌要逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。

食品生产许可证编号：SC10661011408008
产品标准代号：GB10767-2021
产品类别：幼儿配方羊奶粉
产品属性：乳基-粉状
保质期：24个月
生产日期、批号：见罐底喷码

产地：陕西 西安
生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
地址：陕西省西安市阎良区人民路东延线
电话：029-86822282
客服电话：029-81612722
公司网址：www.youjiugotmilk.com

服务热线
4008-616-909

扫一扫，登录官网，走进卡倍多

保持环境清洁 请勿乱抛空罐

6 973464 881291



商品名称面积=336.09



商标总面积=298.28

11.5x12.4=142.6 11.9x12.1=143.99 11.9x11=130.9 11.9x12.4=147.56 12.2x12.5=152.5 11.7x12.2=142.74 12.4x12.5=155 11.8x7=95.7 11.9x8.7=103.53 8.4x10.1=84.84 10.7x10.6=113.42 5.2x8.4=43.68 10.7x10.4=111.28
幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)

通用名称面积总计=1569.82

258.1x109.5mm 2023063013

配料表

生羊乳、乳糖、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、羊乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、左旋肉碱、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2102	胆碱	mg	6.7	141
蛋白质	g	0.54	11.3	矿物质			
脂肪	g	1.26	26.4	钠	mg	8.8	184
亚油酸	g	0.13	2.73	钾	mg	21.3	447
α-亚麻酸	mg	15	316	铜	μg	17.9	376
碳水化合物	g	2.6	54.2	镁	mg	1.6	33.7
维生素				铁	mg	0.16	3.35
维生素A	μg RE	18	368	锌	mg	0.15	3.20
维生素D	μg	0.60	12.7	锰	μg	2.70	56.7
维生素E	mg α-TE	0.38	7.96	钙	mg	15.0	316
维生素K ₁	μg	2.19	46.0	磷	mg	9	189
维生素B ₁	μg	18	368	碘	μg	4.5	94.6
维生素B ₂	μg	28	594	氯	mg	18	381
维生素B ₆	μg	14.5	305	硒	μg	0.90	19.0
维生素B ₁₂	μg	0.057	1.2	可选择成分			
烟酸(烟酰胺)	μg	140	2949	左旋肉碱	mg	0.5	9.5
叶酸	μg	3.7	77.0	二十二碳六烯酸	mg	4.5	94.6
泛酸	μg	136	2863	二十四烯酸	mg	5.1	107
维生素C	mg	4.1	85.2	低聚果糖	mg	70.8	1488
生物素	μg	0.71	15.0	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.2

贮存条件

本品贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。每次食用后,请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。

重要声明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



欧蓓尔

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)



食用方法

1

2

3

4

5

6

1 冲调奶粉前使用肥皂或清水将手彻底洗净。2 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。3 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40℃-45℃,倒入经消毒后的奶瓶中。4 参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的奶粉倒入奶瓶中。5 奶粉倒入后,盖紧瓶盖摇动至奶粉充分溶解。6 在给宝喂奶前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。

喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量(mL)	奶粉用量(量勺数)		
0~2周	60	2	7	8
2~4周	90	3	6	7
1~2月	120	4	5	6
2~4月	150	5	5	6
4~6月	180	6	5	6

每量勺奶粉约4.5g

爱心提示

①调奶时注意参照喂哺建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用太少或过多指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。②请使用罐内专用量勺。③没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。④冲奶时请按照喂哺建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑤本喂哺建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。⑥喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

企业信息

食品生产许可证编号: SC10661011408008
产品标准代号: GB10765-2021
产品类别: 婴儿配方羊奶粉
产品属性: 乳基·粉状
生产日期、批号: 见底部喷码 保质期: 24个月
生产商: 陕西秦龙天润乳业有限公司
地址: 陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地: 陕西·西安
联系电话: 029-86822282
全国客服热线: 400-900-6678

本公司已通过:

质量管理体系(ISO9001)认证
乳制品良好生产规范(GMP)体系认证
乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证

6 973464 881390

国食注字YP20230122

净含量:100克

配料表

生羊乳、乳糖、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、羊乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、左旋肉碱、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

贮存条件

本品贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。
每次食用后,请盖紧罐盖。
开罐后请于四周内用完。

企业信息

食品生产许可证编号: SC10661011408008
产品标准代号: GB10765-2021
产品类别: 婴儿配方羊奶粉
产品属性: 乳基、粉状
保质期: 24个月
生产日期、批号: 见底部喷码
生产商: 陕西秦龙天润乳业有限公司
地址: 陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地: 陕西·西安
联系电话: 029-86822282
全国客服热线: 400-900-6678



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2102
蛋白质	g	0.54	11.3
脂肪	g	1.26	26.4
亚油酸	g	0.13	2.73
α-亚油酸	mg	15	316
碳水化合物	g	2.6	54.2
维生素			
维生素A	μg RE	18	368
维生素D	μg	0.60	12.7
维生素E	mg α-TE	0.38	7.96
维生素K ₁	μg	2.19	46.0
维生素B ₁	μg	18	368
维生素B ₂	μg	28	594
维生素B ₆	μg	14.5	305
维生素B ₁₂	μg	0.057	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	140	2949
叶酸	μg	3.7	77.0
泛酸	μg	136	2863
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.71	15.0
胆碱	mg	6.7	141
矿物质			
钠	mg	8.8	184
钾	mg	21.3	447
铜	μg	17.9	376
镁	mg	1.6	33.7
铁	mg	0.16	3.35
锌	mg	0.15	3.20
锰	μg	2.70	56.7
钙	mg	15.0	316
磷	mg	9	189
氯	μg	4.5	94.6
碘	mg	18	381
硒	μg	0.90	19.0
可选择成分			
左旋肉碱	mg	0.5	9.5
二十二碳六烯酸	mg	4.5	94.6
二十碳四烯酸	mg	5.1	107
低聚果糖	mg	70.8	1488
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.2



欧蓓尔
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)



国食注字YP20230122
净含量: 800克

食用方法



- 1 冲调奶粉前使用肥皂或清水将手彻底洗净。
- 2 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。
- 3 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C,倒入经消毒后的奶瓶中。
- 4 参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的奶粉倒入奶瓶中。
- 5 奶粉倒入后,盖紧瓶盖摇动至奶粉充分溶解。
- 6 在给宝宝喂羊奶粉前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。

喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量(mL)	奶粉用量(量勺数)		
0~2周	60	2	7	8
2~4周	90	3	6	7
1~2月	120	4	5	6
2~4月	150	5	5	6
4~6月	180	6	5	6
每量勺奶粉约4.5g				

爱心提示

- ① 调奶时注意参照喂哺建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用过多或过多指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。
- ② 请使用罐内专用量勺。
- ③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。
- ④ 冲奶时请按照喂哺建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。
- ⑤ 本喂哺建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见酌情增减。
- ⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

重要声明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

本公司已通过:

质量管理体系(ISO9001)认证
乳制品良好生产规范(GMP)体系认证
乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证



258.1x109.5mm 2023063013

配料表

生羊乳、乳糖、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、羊乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、左旋肉碱、铜(硫酸铜)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2079	胆碱	mg	6.7	139
蛋白质	g	0.57	11.8	钠	mg	5.9	123
脂肪	g	1.22	25.4	钾	mg	22.5	468
亚油酸	g	0.15	3.20	铜	μg	15.3	318
α-亚麻酸	mg	15	312	镁	mg	1.5	31.2
碳水化合物	g	2.6	54.5	铁	mg	0.30	6.24
维生素				锌	mg	0.15	3.12
维生素A	μg RE	23	468	锰	μg	4.68	97.3
维生素D	μg	0.60	12.5	钙	mg	21.3	442
维生素E	mg α-TE	0.38	7.84	磷	mg	11	227
维生素K ₁	μg	1.95	40.6	碘	μg	4.5	93.6
维生素B ₁	μg	20	420	氯	mg	18	371
维生素B ₂	μg	24	504	硒	μg	0.68	14.1
维生素B ₆	μg	15.5	323	可选择成分			
维生素B ₁₂	μg	0.053	1.1	左旋肉碱	mg	0.6	11.5
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2859	二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
叶酸	μg	3.7	76.3	二十四碳四烯酸	mg	5.3	110
泛酸	μg	138	2863	低聚果糖	mg	71.5	1486
维生素C	mg	4.1	85.2	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	3.0
生物素	μg	0.69	14.3				

贮存条件

本品贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。每次食用后,请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。

声明

食用本产品时,须配合添加辅助食品



欧蓓尔

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)



国食注字YP20230123

净含量:100克

食用方法



1 冲调奶粉前使用肥皂或清水将手彻底洗净。2 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。3 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C,倒入经消毒后的奶瓶中。4 参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的奶粉倒入奶瓶中。5 奶粉倒入后,盖紧瓶盖摇动至奶粉充分溶解。6 在给宝宝喂养奶粉前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。

喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量(mL)	奶粉用量(量勺数)		
6~8月	180	6	4	5
8~10月	210	7	3	4
10~12月	210	7	3	4
每量勺奶粉约4.5g				

爱心提示

①调奶时注意参照喂哺建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用过多或过少指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。②请使用罐内专用量勺。③没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。④冲奶时请按照喂哺建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑤本喂哺建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。⑥喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

企业信息

食品生产许可证编号: SC10661011408008
产品标准代号: GB10766-2021
产品类别: 较大婴儿配方羊奶粉
产品属性: 乳基·粉状
生产日期、批号: 见底部喷码 保质期: 24个月
生产商: 陕西秦龙天润乳业有限公司
地址: 陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地: 陕西·西安
联系电话: 029-86822282
全国客服热线: 400-900-6678

本公司已通过:

质量管理体系(ISO9001)认证
乳制品良好生产规范(GMP)体系认证
乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证



配料表

生羊乳、乳糖、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、羊乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、左旋肉碱、铜(硫酸铜)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2079
蛋白质	g	0.57	11.8
脂肪	g	1.22	25.4
亚油酸	g	0.15	3.20
α-亚麻酸	mg	15	312
碳水化合物	g	2.6	54.5
维生素			
维生素A	μg RE	23	468
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.38	7.84
维生素K ₁	μg	1.95	40.6
维生素B ₁	μg	20	420
维生素B ₂	μg	24	504
维生素B ₆	μg	15.5	323
维生素B ₁₂	μg	0.053	1.1
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2859
叶酸	μg	3.7	76.3
泛酸	μg	138	2863
维生素C	mg	4.1	85.2
生物素	μg	0.69	14.3
胆碱	mg	6.7	139
矿物质			
钠	mg	5.9	123
钾	mg	22.5	468
铜	μg	15.3	318
镁	mg	1.5	31.2
铁	mg	0.30	6.24
锌	mg	0.15	3.12
锰	μg	4.68	97.3
钙	mg	21.3	442
磷	mg	11	227
碘	μg	4.5	93.6
氯	mg	18	371
硒	μg	0.68	14.1
可选择成分			
左旋肉碱	mg	0.6	11.5
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
二十碳四烯酸	mg	5.3	110
低聚果糖	mg	71.5	1486
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	3.0

贮存条件

本品贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。
每次食用后,请盖紧罐盖。
开罐后请于四周内用完。

企业信息

食品生产许可证编号: SC10661011408008
产品标准代号: GB10766-2021
产品类别: 较大婴儿配方羊奶粉
产品属性: 乳基·粉状
保质期: 24个月
生产日期、批号: 见底部喷码 保护环境清洁,请勿乱丢空罐
生产商: 陕西秦龙天润乳业有限公司
地址: 陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地: 陕西·西安
联系电话: 029-86822282
全国客服热线: 400-900-6678

秦龙® 欧蓓尔®

欧蓓尔

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)



国食注字YP20230123
净含量: 800克

食用方法



① 冲调奶粉前使用肥皂或清水将手彻底洗净。
② 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。
③ 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C,倒入经消毒后的奶瓶中。
④ 参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的奶粉倒入奶瓶中。
⑤ 奶粉倒入后,盖紧瓶盖摇动至奶粉充分溶解。
⑥ 在给宝宝喂哺奶粉前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。

喂哺建议表

婴儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量(mL)	奶粉用量(量勺数)		
6~8月	180	6	4	5
8~10月	210	7	3	4
10~12月	210	7	3	4
每量勺奶粉约4.5g				

爱心提示

① 调奶时注意参照喂哺建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用过少或过多指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。
② 请使用罐内专用量勺。
③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。
④ 冲奶时请按照喂哺建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。
⑤ 本喂哺建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

声明

食用本产品时,须配合添加辅助食品

本公司已通过:

质量管理体系(ISO9001)认证
乳制品良好生产规范(GMP)体系认证
乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证



6 973464 881253

258.1x109.5mm 2023063013

配料表

生羊乳、乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、脱盐羊乳清粉、羊乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、左旋肉碱、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2051	矿物质			
蛋白质	g	0.60	12.4	钠	mg	6.1	125
脂肪	g	1.18	24.2	钾	mg	22.5	462
亚油酸	g	0.15	3.14	铜	μg	15.6	319
α-亚麻酸	mg	15	308	镁	mg	1.9	38.2
碳水化合物	g	2.7	54.9	铁	mg	0.30	6.16
维生素				锌	mg	0.14	2.88
维生素A	μg RE	23	462	钙	mg	21.3	436
维生素D	μg	0.60	12.4	磷	mg	12	236
维生素E	mg α-TE	0.38	7.86	碘	μg	4.2	86.2
维生素K ₁	μg	1.98	40.6	氯	mg	20	406
维生素B ₁	μg	20	420	可选择成分			
维生素B ₂	μg	24	493	硒	μg	0.69	14.2
维生素B ₆	μg	15.7	321	胆碱	mg	6.8	139
维生素B ₁₂	μg	0.054	1.1	锰	μg	4.81	98.7
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2821	左旋肉碱	mg	0.5	10.8
叶酸	μg	3.7	76.1	二十二碳六烯酸	mg	2.2	45.2
泛酸	μg	140	2875	二十碳四烯酸	mg	2.3	48.0
维生素C	mg	3.1	62.8	低聚果糖	mg	72.5	1487
生物素	μg	0.72	14.8	1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.5

贮存条件

本品贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。每次食用后,请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。

秦龙® QINLONG

欧蓓尔® OBR

欧蓓尔

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄, 3段)

国食注字YP20230124

净含量: 100克

食用方法

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

① 冲调奶粉前使用肥皂或清水将手彻底洗净。② 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。③ 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C,倒入经消毒后的奶瓶中。④ 参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的奶粉倒入奶瓶中。⑤ 奶粉倒入后,盖紧瓶盖摇动至奶粉充分溶解。⑥ 在给宝宝喂奶粉前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。

喂哺建议表

幼儿年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量 (mL)	奶粉用量 (量勺数)		
12~24月	210	7	3	4
24~36月	210	7	2	3

每量勺奶粉约4.5g

爱心提示

① 调奶时注意参照喂哺建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用过多或过少指定份量的奶粉,会令幼儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。② 请使用罐内专用量勺。③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。④ 冲奶时请按照喂哺建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑤ 本喂哺建议表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

企业信息

食品生产许可证编号: SC10661011408008
产品标准代号: GB10767-2021
产品类别: 幼儿配方羊奶粉
产品属性: 乳基·粉状
生产日期、批号: 见底部喷码 保质期: 24个月
生产商: 陕西秦龙天润乳业有限公司
地址: 陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地: 陕西·西安
联系电话: 029-86822282
全国客服热线: 400-900-6678

本公司已通过:

质量管理体系 (ISO9001) 认证
乳制品良好生产规范 (GMP) 体系认证
乳制品危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证

6 973464 881413

配料表

生羊乳、乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、脱盐羊乳清粉、羊乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、左旋肉碱、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙、磷酸三钙)、磷(磷酸三钙、磷(磷酸钾)、硒(亚硒酸钠)

致敏物质提示:本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

贮存条件

本品贮存于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。
每次食用后,请盖紧罐盖。
开罐后请于四周内用完。

企业信息

食品生产许可证编号: SC10661011408008
产品标准代号: GB10767-2021
产品类别: 幼儿配方羊奶粉
产品属性: 乳基·粉状
保质期: 24个月
生产日期、批号: 见底部喷码
生产商: 陕西秦龙天润乳业有限公司
地址: 陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地: 陕西·西安
联系电话: 029-86822282
全国客服热线: 400-900-6678



保护环境, 请回收空罐

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2051
蛋白质	g	0.60	12.4
脂肪	g	1.18	24.2
亚油酸	g	0.15	3.14
α-亚油酸	mg	15	308
碳水化合物	g	2.7	54.9
维生素			
维生素A	μg RE	23	462
维生素D	μg	0.60	12.4
维生素E	mg α-TE	0.38	7.86
维生素K ₁	μg	1.98	40.6
维生素B ₁	μg	20	420
维生素B ₂	μg	24	493
维生素B ₆	μg	15.7	321
维生素B ₁₂	μg	0.054	1.1
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2821
叶酸	μg	3.7	76.1
泛酸	μg	140	2875
维生素C	mg	3.1	62.8
生物素	μg	0.72	14.8
矿物质			
钠	mg	6.1	125
钾	mg	22.5	462
铜	μg	15.6	319
镁	mg	1.9	38.2
铁	mg	0.30	6.16
锌	mg	0.14	2.88
钙	mg	21.3	436
磷	mg	12	236
碘	μg	4.2	86.2
氯	mg	20	406
可选择成分			
硒	μg	0.69	14.2
胆碱	mg	6.8	139
锰	μg	4.81	98.7
左旋肉碱	mg	0.5	10.8
二十二碳六烯酸	mg	2.2	45.2
二十碳四烯酸	mg	2.3	48.0
低聚果糖	mg	72.5	1487
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12	2.5



欧蓓尔
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)



国食注字YP20230124
净含量: 800克

食用方法



- 1 冲调奶粉前使用肥皂或清水将手彻底洗净。
- 2 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。
- 3 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C,倒入经消毒后的奶瓶中。
- 4 参照“喂哺建议表”使用量勺量取适量的奶粉倒入奶瓶中。
- 5 奶粉倒入后,盖紧瓶盖摇动至奶粉充分溶解。
- 6 在给宝宝喂奶粉前,请先将一小滴奶液滴至手腕内侧测试奶温,温度适宜即可喂哺。

幼儿年龄	喂哺建议表			
	每次喂哺量		每日喂哺次数	
	温开水用量(mL)	奶粉用量(量勺数)	3	4
12~24月	210	7	3	4
24~36月	210	7	2	3
每量勺奶粉约4.5g				

爱心提示

- ① 调奶时注意参照喂哺建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用过多或过多指定份量的奶粉,会令幼儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。
- ② 请使用罐内专用量勺。
- ③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均可能会影响宝宝的健康。
- ④ 冲奶时请按照喂哺建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。
- ⑤ 本喂哺建议表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
- ⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。



本公司已通过:

质量管理体系(ISO9001)认证
乳制品良好生产规范(GMP)体系认证
乳制品危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证



6 973464 881260