

附件 2：陕西省定边县乳品实业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 1

冲调方法

1 5分钟

冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2 50-55℃

冲调用水煮沸后，冷却至50℃-55℃，在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙取准确份量(平匙)的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜之后，即可喂哺婴儿。

喂哺用量建议表

| 月龄     | 每日喂哺次数 | 温开水量(毫升) | 量匙数 |
|--------|--------|----------|-----|
| 第0-2周  | 8-9    | 60       | 2   |
| 第2-4周  | 6-7    | 90       | 3   |
| 第1-2个月 | 5-6    | 120      | 4   |
| 第2-4个月 | 5-6    | 150      | 5   |
| 第4-6个月 | 5-6    | 180      | 6   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉，加水30毫升。

● 注意：未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度，均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶，调好的奶液应立即饮用，不要将未喝完的奶液留存。

● 提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议，否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

制造商：  
陕西省定边县乳品实业有限公司  
制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号：SC12961082500901  
产品标准代号：GB 10765-2021  
产品类别：婴儿配方食品  
产品属性：乳基粉状产品  
产品规格：100克/罐  
保质期：24个月  
生产产地：陕西·榆林 生产日期：见罐底喷码

秦乳

1 段

国食注字：YP20170710

净含量：100克

婴儿配方羊奶粉  
(0-6月龄,1段)

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2074  |
| 蛋白质                | g       | 0.60   | 12.40 |
| 脂肪                 | g       | 1.20   | 24.80 |
| 亚油酸                | g       | 0.15   | 3.11  |
| α-亚麻酸              | g       | 0.15   | 3.11  |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 54.5  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 18     | 373   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.44 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.50  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.88   | 38.99 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 1.8    | 37.3  |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 58     | 788   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 15.2   | 315.3 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.087  | 1.804 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 150    | 3111  |
| 叶酸                 | μg      | 3.7    | 76.7  |
| 泛酸                 | μg      | 152    | 3152  |
| 维生素C               | mg      | 3.1    | 64.3  |
| 生物素                | μg      | 0.70   | 14.52 |
| 胆碱                 | mg      | 6.5    | 134.8 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 9      | 187   |
| 钾                  | mg      | 24     | 498   |
| 铜                  | μg      | 18.2   | 377.5 |
| 镁                  | mg      | 0.8    | 16.3  |
| 铁                  | mg      | 0.22   | 4.56  |
| 锌                  | mg      | 1.60   | 33.3  |
| 钙                  | mg      | 11     | 228   |
| 磷                  | mg      | 5.0    | 103.7 |
| 碘                  | μg      | 1.7    | 35.3  |
| 氯                  | mg      | 0.90   | 18.67 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 3.9    | 80.9  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.4  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 4.5    | 93.3  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 4.9    | 101.6 |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.53  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.19   | 3.94  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、左旋肉碱、肌醇

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

温馨提示

对于0-6月龄的婴儿，最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处，勿置于冰箱内，每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

● 100毫升奶液≈12.9克婴儿配方羊奶粉+90毫升水

标签 2

冲调方法

1

5分钟

冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55℃

冲调用水煮沸后,冷却至50℃-55℃,在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙量取准确份量(平匙)的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜之后,即可喂哺婴儿。

喂哺用量建议表

| 月龄     | 每日喂哺次数 | 温开水量(毫升) | 量匙数 |
|--------|--------|----------|-----|
| 第0-2周  | 8-9    | 60       | 2   |
| 第2-4周  | 6-7    | 90       | 3   |
| 第1-2个月 | 5-6    | 120      | 4   |
| 第2-4个月 | 5-6    | 150      | 5   |
| 第4-6个月 | 5-6    | 180      | 6   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉,加水30毫升。

● 注意:未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度,均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶,调好的奶液应立即饮用,不要将未喝完的奶液留存。

● 提示:请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议,否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

制造商:  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造商地址:陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号:SC12961082500901  
产品标准代号:GB 10765-2021  
产品类别:婴儿配方食品  
产品属性:乳基粉状产品  
产品规格:350克/罐  
食品产地:陕西·榆林 保质期:24个月  
生产日期:见罐底喷码

客服热线:  
**400-029-8838**  
网址:www.sxsby.com

  
6 922886 024472

秦乳



1 段

国食注字:YP20170710 净含量:350克

婴儿配方羊奶粉  
(0-6月龄,1段)

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2074  |
| 蛋白质                | g       | 0.60   | 12.40 |
| 脂肪                 | g       | 1.20   | 24.80 |
| 亚油酸                | g       | 0.15   | 3.11  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 311   |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 54.5  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 18     | 373   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.44 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.50  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.88   | 38.99 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 18     | 373   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 38     | 788   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 15.2   | 315.3 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.087  | 1.804 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 150    | 3111  |
| 叶酸                 | μg      | 3.7    | 76.7  |
| 泛酸                 | μg      | 152    | 3152  |
| 维生素C               | mg      | 3.1    | 64.3  |
| 生物素                | μg      | 0.70   | 14.52 |
| 胆碱                 | mg      | 6.5    | 134.8 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 9      | 187   |
| 钾                  | mg      | 24     | 498   |
| 铜                  | μg      | 18.2   | 377.5 |
| 镁                  | mg      | 1.8    | 37.3  |
| 铁                  | mg      | 0.22   | 4.56  |
| 锌                  | mg      | 0.22   | 4.56  |
| 锰                  | μg      | 1.80   | 37.33 |
| 钙                  | mg      | 17     | 353   |
| 磷                  | mg      | 11     | 228   |
| 氯                  | μg      | 5.0    | 103.7 |
| 硒                  | μg      | 17     | 353   |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 3.9    | 80.9  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.4  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 4.5    | 93.3  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 4.9    | 101.6 |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.53  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.19   | 3.94  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、左旋肉碱、肌醇

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素: 醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

温馨提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处,勿置于冰箱内。每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

◀ 100毫升奶液≈12.9克婴儿配方羊奶粉+90毫升水

标签 3

冲调方法

1

5分钟

冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55℃

冲调用水煮沸后,冷却至50℃-55℃,在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙量取准确份量(平匙)的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜之后,即可喂哺婴儿。

喂哺用量建议表

| 月龄     | 每日喂哺次数 | 温开水量(毫升) | 量匙数 |
|--------|--------|----------|-----|
| 第0-2周  | 8-9    | 60       | 2   |
| 第2-4周  | 6-7    | 90       | 3   |
| 第1-2个月 | 5-6    | 120      | 4   |
| 第2-4个月 | 5-6    | 150      | 5   |
| 第4-6个月 | 5-6    | 180      | 6   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉,加水30毫升。

● 注意: 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度,均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶,调好的奶液应立即饮用,不要将未喝完的奶液留存。

● 提示: 请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议,否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

制造商:  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造商地址:陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号:SC12961082500901  
产品标准代号:GB 10765-2021  
产品类别:婴儿配方食品  
产品属性:乳基粉状产品  
产品规格:400克/罐  
食品产地:陕西·榆林 保质期:24个月  
生产日期:见罐底喷码

客服热线:  
**400-029-8838**  
网址:www.sxsby.com

6 922886 024502

秦乳

1 段

国食注字:YP20170710

净含量:400克

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2074  |
| 蛋白质                | g       | 0.60   | 12.40 |
| 脂肪                 | g       | 1.20   | 24.80 |
| 亚油酸                | g       | 0.15   | 3.11  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 311   |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 54.5  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 18     | 373   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.44 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.50  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.88   | 38.99 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 18     | 373   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 38     | 788   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 15.2   | 315.3 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.087  | 1.804 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 150    | 3111  |
| 叶酸                 | μg      | 3.7    | 76.7  |
| 泛酸                 | μg      | 152    | 3152  |
| 维生素C               | mg      | 3.1    | 64.3  |
| 生物素                | μg      | 0.70   | 14.52 |
| 胆碱                 | mg      | 6.5    | 134.8 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 9      | 187   |
| 钾                  | mg      | 24     | 498   |
| 铜                  | μg      | 18.2   | 377.5 |
| 镁                  | mg      | 1.8    | 37.3  |
| 铁                  | mg      | 0.22   | 4.56  |
| 锌                  | mg      | 0.22   | 4.56  |
| 锰                  | μg      | 1.80   | 37.33 |
| 钙                  | mg      | 17     | 353   |
| 磷                  | mg      | 11     | 228   |
| 碘                  | μg      | 5.0    | 103.7 |
| 氯                  | mg      | 17     | 353   |
| 硒                  | μg      | 0.90   | 18.67 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 3.9    | 80.9  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.4  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 4.5    | 93.3  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 4.9    | 101.6 |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.53  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.19   | 3.94  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、左旋肉碱、肌醇

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素: 醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

温馨提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处,勿置于冰箱内。每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

◀ 100毫升奶液≈12.9克婴儿配方羊奶粉+90毫升水

1

5分钟

冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55°C

冲调用水煮沸后,冷却至50°C-55°C,在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙取准确份量(平匙)的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解。待温度适宜之后,即可喂哺婴儿。

制造商:  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造商地址:陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号:SC12961082500901  
产品标准代号:GB 10765-2021  
产品类别:婴儿配方食品  
产品属性:乳基粉状产品  
产品规格:400克/袋 保质期:18个月  
食品产地:陕西·榆林 生产日期:见喷码

喂哺用量建议表

| 月龄     | 每日<br>喂哺次数 | 温开水量<br>(毫升) | 量匙数 |
|--------|------------|--------------|-----|
| 第0-2周  | 8-9        | 60           | 2   |
| 第2-4周  | 6-7        | 90           | 3   |
| 第1-2个月 | 5-6        | 120          | 4   |
| 第2-4个月 | 5-6        | 150          | 5   |
| 第4-6个月 | 5-6        | 180          | 6   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉,加水30毫升。

● 注意:未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度,均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶,调好的奶液应立即饮用,不要将未喝完的奶液留存。

● 提示:请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议,否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

客服热线:  
**400-029-8838**

网址:www.sxsby.com

6 922886 024533

秦乳

1 段

净含量:400克

国食注字:YP20170710

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2074  |
| 蛋白质                | g       | 0.60   | 12.40 |
| 脂肪                 | g       | 1.20   | 24.80 |
| 亚油酸                | g       | 0.15   | 3.11  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 311   |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 54.5  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 18     | 373   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.44 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.50  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.88   | 38.99 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 18     | 373   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 38     | 788   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 15.2   | 315.3 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.087  | 1.804 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 150    | 3111  |
| 叶酸                 | μg      | 3.7    | 76.7  |
| 泛酸                 | μg      | 152    | 3152  |
| 维生素C               | mg      | 3.1    | 64.3  |
| 生物素                | μg      | 0.70   | 14.52 |
| 胆碱                 | mg      | 6.5    | 134.8 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 9      | 187   |
| 钾                  | mg      | 24     | 498   |
| 铜                  | μg      | 18.2   | 377.5 |
| 镁                  | mg      | 1.8    | 37.3  |
| 铁                  | mg      | 0.22   | 4.56  |
| 锌                  | mg      | 0.22   | 4.56  |
| 锰                  | μg      | 1.80   | 37.33 |
| 钙                  | mg      | 17     | 353   |
| 磷                  | mg      | 11     | 228   |
| 碘                  | μg      | 5.0    | 103.7 |
| 氯                  | mg      | 17     | 353   |
| 硒                  | μg      | 0.90   | 18.67 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 3.9    | 80.9  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.4  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 4.5    | 93.3  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 4.9    | 101.6 |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.53  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.19   | 3.94  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、左旋肉碱、肌醇

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素: 醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

温馨提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处,勿置于冰箱内。每次食用后请封好袋口。开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

◀ 100毫升奶液≈12.9克婴儿配方羊奶粉+90毫升水

冲调方法

1

5分钟

冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55℃

冲调用水煮沸后,冷却至50℃-55℃,在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙量取准确份量(平匙)的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜之后,即可喂哺婴儿。

喂哺用量建议表

| 月龄     | 每日喂哺次数 | 温开水量(毫升) | 量匙数 |
|--------|--------|----------|-----|
| 第0-2周  | 8-9    | 60       | 2   |
| 第2-4周  | 6-7    | 90       | 3   |
| 第1-2个月 | 5-6    | 120      | 4   |
| 第2-4个月 | 5-6    | 150      | 5   |
| 第4-6个月 | 5-6    | 180      | 6   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉,加水30毫升。

● 注意:未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度,均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶,调好的奶液应立即饮用,不要将未喝完的奶液留存。

● 提示:请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议,否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

制造商:  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造商地址:陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号:SC12961082500901  
产品标准代号:GB 10765-2021  
产品类别:婴儿配方食品  
产品属性:乳基粉状产品  
产品规格:700克/罐  
食品产地:陕西·榆林  
保质期:24个月  
生产日期:见罐底喷码

客服热线:  
**400-029-8838**  
网址:www.sxsby.com



秦乳

1 段

国食注字:YP20170710

净含量:700克

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2074  |
| 蛋白质                | g       | 0.60   | 12.40 |
| 脂肪                 | g       | 1.20   | 24.80 |
| 亚油酸                | g       | 0.15   | 3.11  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 311   |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 54.5  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 18     | 373   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.44 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.50  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.88   | 38.99 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 18     | 373   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 38     | 788   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 15.2   | 315.3 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.087  | 1.804 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 150    | 3111  |
| 叶酸                 | μg      | 3.7    | 76.7  |
| 泛酸                 | μg      | 152    | 3152  |
| 维生素C               | mg      | 3.1    | 64.3  |
| 生物素                | μg      | 0.70   | 14.52 |
| 胆碱                 | mg      | 6.5    | 134.8 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 9      | 187   |
| 钾                  | mg      | 24     | 498   |
| 铜                  | μg      | 18.2   | 377.5 |
| 镁                  | mg      | 1.8    | 37.3  |
| 铁                  | mg      | 0.22   | 4.56  |
| 锌                  | mg      | 0.22   | 4.56  |
| 锰                  | μg      | 1.80   | 37.33 |
| 钙                  | mg      | 17     | 353   |
| 磷                  | mg      | 11     | 228   |
| 碘                  | μg      | 5.0    | 103.7 |
| 氯                  | mg      | 17     | 353   |
| 硒                  | μg      | 0.90   | 18.67 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 3.9    | 80.9  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.4  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 4.5    | 93.3  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 4.9    | 101.6 |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.53  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.19   | 3.94  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、左旋肉碱、肌醇

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

维生素: 醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

温馨提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处,勿置于冰箱内。每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

◀ 100毫升奶液≈12.9克婴儿配方羊奶粉+90毫升水

标签 6

冲调方法

1

5分钟

冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55℃

冲调用水煮沸后,冷却至50℃-55℃,在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙量取准确份量(平匙)的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜之后,即可喂哺婴儿。

喂哺用量建议表

| 月龄     | 每日喂哺次数 | 温开水量(毫升) | 量匙数 |
|--------|--------|----------|-----|
| 第0-2周  | 8-9    | 60       | 2   |
| 第2-4周  | 6-7    | 90       | 3   |
| 第1-2个月 | 5-6    | 120      | 4   |
| 第2-4个月 | 5-6    | 150      | 5   |
| 第4-6个月 | 5-6    | 180      | 6   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉,加水30毫升。

● 注意:未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度,均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶,调好的奶液应立即饮用,不要将未喝完的奶液留存。

● 提示:请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议,否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

制造商:  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造商地址:陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号:SC12961082500901  
产品标准代号:GB 10765-2021  
产品类别:婴儿配方食品  
产品属性:乳基粉状产品  
产品规格:800克/罐  
食品产地:陕西·榆林  
保质期:24个月  
生产日期:见罐底喷码

客服热线:  
**400-029-8838**  
网址:www.sxsby.com

6 192288 610241 99

秦乳

1 段

国食注字:YP20170710

净含量:800克

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2074  |
| 蛋白质                | g       | 0.60   | 12.40 |
| 脂肪                 | g       | 1.20   | 24.80 |
| 亚油酸                | g       | 0.15   | 3.11  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 311   |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 54.5  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 18     | 373   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.44 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.50  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.88   | 38.99 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 18     | 373   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 38     | 788   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 15.2   | 315.3 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.087  | 1.804 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 150    | 3111  |
| 叶酸                 | μg      | 3.7    | 76.7  |
| 泛酸                 | μg      | 152    | 3152  |
| 维生素C               | mg      | 3.1    | 64.3  |
| 生物素                | μg      | 0.70   | 14.52 |
| 胆碱                 | mg      | 6.5    | 134.8 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 9      | 187   |
| 钾                  | mg      | 24     | 498   |
| 铜                  | μg      | 18.2   | 377.5 |
| 镁                  | mg      | 1.8    | 37.3  |
| 铁                  | mg      | 0.22   | 4.56  |
| 锌                  | mg      | 0.22   | 4.56  |
| 锰                  | μg      | 1.80   | 37.33 |
| 钙                  | mg      | 17     | 353   |
| 磷                  | mg      | 11     | 228   |
| 碘                  | μg      | 5.0    | 103.7 |
| 氯                  | mg      | 17     | 353   |
| 硒                  | μg      | 0.90   | 18.67 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 3.9    | 80.9  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.4  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 4.5    | 93.3  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 4.9    | 101.6 |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.53  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.19   | 3.94  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、左旋肉碱、肌醇

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

维生素: 醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

温馨提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处,勿置于冰箱内。每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

◀ 100毫升奶液≈12.9克婴儿配方羊奶粉+90毫升水

冲调方法

1

5分钟

冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55℃

冲调用水煮沸后,冷却至50℃-55℃,在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙量取准确份量(平匙)的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜之后,即可喂哺婴儿。

喂哺用量建议表

| 月龄     | 每日喂哺次数 | 温开水量(毫升) | 量匙数 |
|--------|--------|----------|-----|
| 第0-2周  | 8-9    | 60       | 2   |
| 第2-4周  | 6-7    | 90       | 3   |
| 第1-2个月 | 5-6    | 120      | 4   |
| 第2-4个月 | 5-6    | 150      | 5   |
| 第4-6个月 | 5-6    | 180      | 6   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉,加水30毫升。

● 注意:未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度,均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶,调好的奶液应立即饮用,不要将未喝完的奶液留存。

● 提示:请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议,否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

制造商:  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造商地址:陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号:SC12961082500901  
产品标准代号:GB 10765-2021  
产品类别:婴儿配方食品  
产品属性:乳基粉状产品  
产品规格:900克/罐  
食品产地:陕西·榆林 保质期:24个月  
生产日期:见罐底喷码

客服热线:  
**400-029-8838**  
网址:www.sxsby.com

  
6 192288 610242 98

秦乳



1 段

国食注字:YP20170710 净含量:900克

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2074  |
| 蛋白质                | g       | 0.60   | 12.40 |
| 脂肪                 | g       | 1.20   | 24.80 |
| 亚油酸                | g       | 0.15   | 3.11  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 311   |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 54.5  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 18     | 373   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.44 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.50  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.88   | 38.99 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 18     | 373   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 38     | 788   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 15.2   | 315.3 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.087  | 1.804 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 150    | 3111  |
| 叶酸                 | μg      | 3.7    | 76.7  |
| 泛酸                 | μg      | 152    | 3152  |
| 维生素C               | mg      | 3.1    | 64.3  |
| 生物素                | μg      | 0.70   | 14.52 |
| 胆碱                 | mg      | 6.5    | 134.8 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 9      | 187   |
| 钾                  | mg      | 24     | 498   |
| 铜                  | μg      | 18.2   | 377.5 |
| 镁                  | mg      | 1.8    | 37.3  |
| 铁                  | mg      | 0.22   | 4.56  |
| 锌                  | mg      | 0.22   | 4.56  |
| 锰                  | μg      | 1.80   | 37.33 |
| 钙                  | mg      | 17     | 353   |
| 磷                  | mg      | 11     | 228   |
| 碘                  | μg      | 5.0    | 103.7 |
| 氯                  | mg      | 17     | 353   |
| 硒                  | μg      | 0.90   | 18.67 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 3.9    | 80.9  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.4  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 4.5    | 93.3  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 4.9    | 101.6 |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.53  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.19   | 3.94  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、左旋肉碱、肌醇

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素: 醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

温馨提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处,勿置于冰箱内。每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

◀ 100毫升奶液≈12.9克婴儿配方羊奶粉+90毫升水

冲调方法

- 1

5分钟

冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。
- 2

50-55°C

冲调用水煮沸后,冷却至50°C-55°C,在奶瓶中加入需要量温开水。
- 3

用量匙量取准确份量(平匙)的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。
- 4

盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜之后,即可喂哺较大婴儿。

喂哺用量建议表

| 月龄      | 每日喂哺次数 | 温开水量(毫升) | 量匙数 |
|---------|--------|----------|-----|
| 第6-9个月  | 4-5    | 180      | 6   |
| 第9-12个月 | 3-4    | 210      | 7   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉,加水30毫升。

● 注意:未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度,均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶,调好的奶液应立即饮用,不要将未喝完的奶液留存。

● 提示:请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按要求的奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议,否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

制造商:  
陕西省定边县乳品实业有限公司  
制造商地址:陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号:SC12961082500901  
产品标准代号:GB 10766-2021  
产品类别:较大婴儿配方食品  
产品属性:乳基粉状产品  
产品规格:100克/罐  
保质期:24个月  
食品产地:陕西·榆林  
生产日期:见罐底喷码

客服热线:  
400-029-8838  
网址:www.sxsbyr.com



秦乳



2段

国食注字:YP20170711

净含量:100克

较大婴儿配方羊奶粉  
(6-12月龄,2段)

营养成分表

| 项目                | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|-------------------|---------|--------|-------|
| 能量                | kJ      | 100    | 2029  |
| 蛋白质               | g       | 0.69   | 13.90 |
| 脂肪                | g       | 1.13   | 23.00 |
| 亚油酸               | g       | 0.13   | 2.64  |
| α-亚麻酸             | g       | 15     | 304   |
| 碳水化合物             | g       | 2.7    | 54.3  |
| 维生素               |         |        |       |
| 维生素A              | μg RE   | 23     | 467   |
| 维生素D              | μg      | 0.60   | 12.17 |
| 维生素E              | mg α-TE | 0.41   | 8.32  |
| 维生素K <sub>1</sub> | μg      | 1.93   | 39.16 |
| 维生素B <sub>1</sub> | μg      | 43     | 869   |
| 维生素B <sub>2</sub> | μg      | 43     | 877.0 |
| 维生素B <sub>3</sub> | μg      | 17.1   | 347.0 |
| 维生素B <sub>6</sub> | μg      | 0.089  | 1.806 |
| 烟酸(烟酰胺)           | μg      | 156    | 3165  |
| 叶酸                | μg      | 4.3    | 87.0  |
| 泛酸                | μg      | 173    | 3510  |
| 维生素C              | mg      | 4.2    | 84.9  |
| 生物素               | μg      | 0.75   | 15.22 |
| 胆碱                | mg      | 6.7    | 135.9 |
| 矿物质               |         |        |       |
| 钠                 | mg      | 6      | 122   |
| 钾                 | mg      | 23     | 467   |
| 铜                 | μg      | 15.9   | 322.6 |
| 镁                 | mg      | 1.6    | 32.5  |
| 铁                 | mg      | 0.33   | 6.70  |
| 锌                 | mg      | 0.21   | 4.26  |
| 锰                 | μg      | 1.05   | 21.30 |
| 钙                 | mg      | 43     | 869   |
| 磷                 | mg      | 43     | 869   |
| 碘                 | μg      | 4.9    | 98.4  |
| 硒                 | μg      | 1.7    | 34.5  |
| 氯                 | mg      | 0.60   | 12.17 |
| 可选择成分             |         |        |       |
| 肌醇                | mg      | 4.0    | 81.2  |
| 左旋肉碱              | mg      | 0.6    | 12.2  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)      | mg      | 4.5    | 91.3  |
| 二十碳四烯酸(ARA)       | mg      | 5.0    | 101.5 |
| 低聚半乳糖             | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖              | g       | 0.03   | 0.51  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g       | 0.17   | 3.45  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、左旋肉碱、肌醇

矿物质:硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素:醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

温馨提示

食用秦乳较大婴儿配方羊奶粉时必须配合添加辅助食品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处,勿置于冰箱内。每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

● 100毫升奶液≈12.9克较大婴儿配方羊奶粉+90毫升水

冲调方法

1

5分钟

冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55℃

冲调用水煮沸后，冷却至50℃-55℃，在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙量取准确份量（平匙）的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜之后，即可喂哺较大婴儿。

喂哺用量建议表

| 月龄      | 每日喂哺次数 | 温开水量<br>(毫升) | 量匙数 |
|---------|--------|--------------|-----|
| 第6-9个月  | 4-5    | 180          | 6   |
| 第9-12个月 | 3-4    | 210          | 7   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉，加水30毫升。

● 注意：未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度，均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶，调好的奶液应立即饮用，不要将未喝完的奶液留存。

● 提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议，否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

制造商：  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号：SC12961082500901  
产品标准代号：GB 10766-2021  
产品类别：较大婴儿配方食品  
产品属性：乳基粉状产品  
产品规格：350克/罐  
食品产地：陕西·榆林 保质期：24个月  
生产日期：见罐底喷码

客服热线：  
**400-029-8838**  
网址：[www.sxsby.com](http://www.sxsby.com)

6 922886 024489

秦乳

2段

国食注字：YP20170711

净含量：350克

较大婴儿配方羊奶粉  
(6-12月龄, 2段)

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2029  |
| 蛋白质                | g       | 0.69   | 13.90 |
| 脂肪                 | g       | 1.13   | 23.00 |
| 亚油酸                | g       | 0.13   | 2.64  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 304   |
| 碳水化合物              | g       | 2.7    | 54.3  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 467   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.17 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.32  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.93   | 39.16 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 19     | 386   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 43     | 872   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.1   | 347.0 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.089  | 1.806 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 156    | 3165  |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 67.0  |
| 泛酸                 | μg      | 173    | 3510  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.9  |
| 生物素                | μg      | 0.75   | 15.22 |
| 胆碱                 | mg      | 6.7    | 135.9 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 6      | 122   |
| 钾                  | mg      | 23     | 467   |
| 铜                  | μg      | 15.9   | 322.6 |
| 镁                  | mg      | 1.6    | 32.5  |
| 铁                  | mg      | 0.33   | 6.70  |
| 锌                  | mg      | 0.21   | 4.26  |
| 锰                  | μg      | 1.05   | 21.30 |
| 钙                  | mg      | 22     | 446   |
| 磷                  | mg      | 13     | 264   |
| 碘                  | μg      | 4.9    | 99.4  |
| 氯                  | mg      | 17     | 345   |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.17 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 4.0    | 81.2  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.2  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 4.5    | 91.3  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 5.0    | 101.5 |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.51  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.17   | 3.45  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、左旋肉碱、肌醇

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-萘酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

温馨提示

食用秦乳较大婴儿配方羊奶粉时须配合添加辅助食品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处，勿置于冰箱内。每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

◀ 100毫升奶液≈12.9克较大婴儿配方羊奶粉+90毫升水

冲调方法

1

5分钟

冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55℃

冲调用水煮沸后,冷却至50℃-55℃,在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙量取准确份量(平匙)的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜之后,即可喂哺婴儿。

喂哺用量建议表

| 月龄     | 每日喂哺次数 | 温开水量(毫升) | 量匙数 |
|--------|--------|----------|-----|
| 第0-2周  | 8-9    | 60       | 2   |
| 第2-4周  | 6-7    | 90       | 3   |
| 第1-2个月 | 5-6    | 120      | 4   |
| 第2-4个月 | 5-6    | 150      | 5   |
| 第4-6个月 | 5-6    | 180      | 6   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉,加水30毫升。

● 注意: 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度,均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶,调好的奶液应立即饮用,不要将未喝完的奶液留存。

● 提示: 请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议,否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

制造商:  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造商地址:陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号:SC12961082500901  
产品标准代号:GB 10765-2021  
产品类别:婴儿配方食品  
产品属性:乳基粉状产品  
产品规格:400克/罐  
食品产地:陕西·榆林

保质期:24个月  
生产日期:见罐底喷码

客服热线:  
**400-029-8838**  
网址:www.sxsby.com

6 922886 024502

秦乳

1 段

国食注字:YP20170710

净含量:400克

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2074  |
| 蛋白质                | g       | 0.60   | 12.40 |
| 脂肪                 | g       | 1.20   | 24.80 |
| 亚油酸                | g       | 0.15   | 3.11  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 311   |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 54.5  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 18     | 373   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.44 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.50  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.88   | 38.99 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 18     | 373   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 38     | 788   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 15.2   | 315.3 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.087  | 1.804 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 150    | 3111  |
| 叶酸                 | μg      | 3.7    | 76.7  |
| 泛酸                 | μg      | 152    | 3152  |
| 维生素C               | mg      | 3.1    | 64.3  |
| 生物素                | μg      | 0.70   | 14.52 |
| 胆碱                 | mg      | 6.5    | 134.8 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 9      | 187   |
| 钾                  | mg      | 24     | 498   |
| 铜                  | μg      | 18.2   | 377.5 |
| 镁                  | mg      | 1.8    | 37.3  |
| 铁                  | mg      | 0.22   | 4.56  |
| 锌                  | mg      | 0.22   | 4.56  |
| 锰                  | μg      | 1.80   | 37.33 |
| 钙                  | mg      | 17     | 353   |
| 磷                  | mg      | 11     | 228   |
| 碘                  | μg      | 5.0    | 103.7 |
| 氯                  | mg      | 17     | 353   |
| 硒                  | μg      | 0.90   | 18.67 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 3.9    | 80.9  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.4  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 4.5    | 93.3  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 4.9    | 101.6 |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.53  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.19   | 3.94  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、左旋肉碱、肌醇

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素: 醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

温馨提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处,勿置于冰箱内。每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

◀ 100毫升奶液≈12.9克婴儿配方羊奶粉+90毫升水

冲调方法

1

5分钟

冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55℃

冲调用水煮沸后，冷却至50℃-55℃，在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙量取准确份量（平匙）的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜之后，即可喂哺较大婴儿。

制造商：  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号：SC12961082500901  
产品标准代号：GB 10766-2021  
产品类别：较大婴儿配方食品  
产品属性：乳基粉状产品  
产品规格：400克/袋 保质期：18个月  
食品产地：陕西·榆林 生产日期：见喷码

喂哺用量建议表

| 月龄      | 每日喂哺次数 | 温开水量<br>(毫升) | 量匙数 |
|---------|--------|--------------|-----|
| 第6-9个月  | 4-5    | 180          | 6   |
| 第9-12个月 | 3-4    | 210          | 7   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉，加水30毫升。

● 注意：未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度，均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶，调好的奶液应立即饮用，不要将未喝完的奶液留存。

● 提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议，否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

秦乳

2段

国食注字：YP20170711

净含量：400克

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄, 2段)

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2029  |
| 蛋白质                | g       | 0.69   | 13.90 |
| 脂肪                 | g       | 1.13   | 23.00 |
| 亚油酸                | g       | 0.13   | 2.64  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 304   |
| 碳水化合物              | g       | 2.7    | 54.3  |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 467   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.17 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.32  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.93   | 39.16 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 19     | 386   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 43     | 872   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.1   | 347.0 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.089  | 1.806 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 156    | 3165  |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 67.0  |
| 泛酸                 | μg      | 173    | 3510  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.9  |
| 生物素                | μg      | 0.75   | 15.22 |
| 胆碱                 | mg      | 6.7    | 135.9 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 6      | 122   |
| 钾                  | mg      | 23     | 467   |
| 铜                  | μg      | 15.9   | 322.6 |
| 镁                  | mg      | 1.6    | 32.5  |
| 铁                  | mg      | 0.33   | 6.70  |
| 锌                  | mg      | 0.21   | 4.26  |
| 锰                  | μg      | 1.05   | 21.30 |
| 钙                  | mg      | 22     | 446   |
| 磷                  | mg      | 13     | 264   |
| 碘                  | μg      | 4.9    | 99.4  |
| 氯                  | mg      | 17     | 345   |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.17 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 4.0    | 81.2  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.2  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 4.5    | 91.3  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 5.0    | 101.5 |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.51  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.17   | 3.45  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、左旋肉碱、肌醇

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、亚硒酸钠

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

温馨提示

食用秦乳较大婴儿配方羊奶粉时须配合添加辅助食品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处，勿置于冰箱内。每次食用后请封好袋口。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

◀100毫升奶液≈12.9克较大婴儿配方羊奶粉+90毫升水

冲调方法

1

5分钟

冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55℃

冲调用水煮沸后，冷却至50℃-55℃，在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙量取准确份量（平匙）的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜之后，即可喂哺较大婴儿。

喂哺用量建议表

| 月龄      | 每日喂哺次数 | 温开水量<br>(毫升) | 量匙数 |
|---------|--------|--------------|-----|
| 第6-9个月  | 4-5    | 180          | 6   |
| 第9-12个月 | 3-4    | 210          | 7   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉，加水30毫升。

● 注意：未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度，均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶，调好的奶液应立即饮用，不要将未喝完的奶液留存。

● 提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议，否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

制造商：  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号：SC12961082500901  
产品标准代号：GB 10766-2021  
产品类别：较大婴儿配方食品  
产品属性：乳基粉状产品  
产品规格：700克/罐  
食品产地：陕西·榆林 保质期：24个月  
生产日期：见罐底喷码

客服热线：  
**400-029-8838**  
网址：[www.sxsby.com](http://www.sxsby.com)

6 192288 610242 74

秦乳

2段

国食注字：YP20170711

净含量：700克

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄, 2段)

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2029  |
| 蛋白质                | g       | 0.69   | 13.90 |
| 脂肪                 | g       | 1.13   | 23.00 |
| 亚油酸                | g       | 0.13   | 2.64  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 304   |
| 碳水化合物              | g       | 2.7    | 54.3  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 467   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.17 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.32  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.93   | 39.16 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 19     | 386   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 43     | 872   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.1   | 347.0 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.089  | 1.806 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 156    | 3165  |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 67.0  |
| 泛酸                 | μg      | 173    | 3510  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.9  |
| 生物素                | μg      | 0.75   | 15.22 |
| 胆碱                 | mg      | 6.7    | 135.9 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 6      | 122   |
| 钾                  | mg      | 23     | 467   |
| 铜                  | μg      | 15.9   | 322.6 |
| 镁                  | mg      | 1.6    | 32.5  |
| 铁                  | mg      | 0.33   | 6.70  |
| 锌                  | mg      | 0.21   | 4.26  |
| 锰                  | μg      | 1.05   | 21.30 |
| 钙                  | mg      | 22     | 446   |
| 磷                  | mg      | 13     | 264   |
| 碘                  | μg      | 4.9    | 99.4  |
| 氯                  | mg      | 17     | 345   |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.17 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 4.0    | 81.2  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.2  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 4.5    | 91.3  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 5.0    | 101.5 |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.51  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.17   | 3.45  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、左旋肉碱、肌醇

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-萘酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

温馨提示

食用秦乳较大婴儿配方羊奶粉时须配合添加辅助食品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处，勿置于冰箱内。每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

◀ 100毫升奶液≈12.9克较大婴儿配方羊奶粉+90毫升水

冲调方法

1

5分钟

冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55℃

冲调用水煮沸后，冷却至50℃-55℃，在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙量取准确份量（平匙）的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜之后，即可喂哺较大婴儿。

喂哺用量建议表

| 月龄      | 每日喂哺次数 | 温开水量<br>(毫升) | 量匙数 |
|---------|--------|--------------|-----|
| 第6-9个月  | 4-5    | 180          | 6   |
| 第9-12个月 | 3-4    | 210          | 7   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉，加水30毫升。

● 注意：未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度，均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶，调好的奶液应立即饮用，不要将未喝完的奶液留存。

● 提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议，否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

制造商：  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号：SC12961082500901  
产品标准代号：GB 10766-2021  
产品类别：较大婴儿配方食品  
产品属性：乳基粉状产品  
产品规格：800克/罐  
食品产地：陕西·榆林  
保质期：24个月  
生产日期：见罐底喷码

客服热线：  
**400-029-8838**  
网址：[www.sxsby.com](http://www.sxsby.com)

6 192288 610242 051

秦乳

2段

国食注字：YP20170711

净含量：800克

较大婴儿配方羊奶粉  
(6-12月龄, 2段)

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2029  |
| 蛋白质                | g       | 0.69   | 13.90 |
| 脂肪                 | g       | 1.13   | 23.00 |
| 亚油酸                | g       | 0.13   | 2.64  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 304   |
| 碳水化合物              | g       | 2.7    | 54.3  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 467   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.17 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.32  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.93   | 39.16 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 19     | 386   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 43     | 872   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.1   | 347.0 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.089  | 1.806 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 156    | 3165  |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 67.0  |
| 泛酸                 | μg      | 173    | 3510  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.9  |
| 生物素                | μg      | 0.75   | 15.22 |
| 胆碱                 | mg      | 6.7    | 135.9 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 6      | 122   |
| 钾                  | mg      | 23     | 467   |
| 铜                  | μg      | 15.9   | 322.6 |
| 镁                  | mg      | 1.6    | 32.5  |
| 铁                  | mg      | 0.33   | 6.70  |
| 锌                  | mg      | 0.21   | 4.26  |
| 锰                  | μg      | 1.05   | 21.30 |
| 钙                  | mg      | 22     | 446   |
| 磷                  | mg      | 13     | 264   |
| 碘                  | μg      | 4.9    | 99.4  |
| 氯                  | mg      | 17     | 345   |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.17 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 4.0    | 81.2  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.2  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 4.5    | 91.3  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 5.0    | 101.5 |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.51  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.17   | 3.45  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、左旋肉碱、肌醇

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

温馨提示

食用秦乳较大婴儿配方羊奶粉时须配合添加辅助食品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处，勿置于冰箱内。每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

◀ 100毫升奶液≈12.9克较大婴儿配方羊奶粉+90毫升水

冲调方法

1

5分钟

冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55℃

冲调用水煮沸后，冷却至50℃-55℃，在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙量取准确份量（平匙）的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜之后，即可喂哺较大婴儿。

喂哺用量建议表

| 月龄      | 每日喂哺次数 | 温开水量<br>(毫升) | 量匙数 |
|---------|--------|--------------|-----|
| 第6-9个月  | 4-5    | 180          | 6   |
| 第9-12个月 | 3-4    | 210          | 7   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉，加水30毫升。

● 注意：未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度，均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶，调好的奶液应立即饮用，不要将未喝完的奶液留存。

● 提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议，否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

制造商：  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号：SC12961082500901  
产品标准代号：GB 10766-2021  
产品类别：较大婴儿配方食品  
产品属性：乳基粉状产品  
产品规格：900克/罐  
食品产地：陕西·榆林 保质期：24个月  
生产日期：见罐底喷码

客服热线：  
**400-029-8838**  
网址：[www.sxsby.com](http://www.sxsby.com)

6 192288 610243 04

秦乳

2段

国食注字：YP20170711

净含量：900克

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄, 2段)

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2029  |
| 蛋白质                | g       | 0.69   | 13.90 |
| 脂肪                 | g       | 1.13   | 23.00 |
| 亚油酸                | g       | 0.13   | 2.64  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 304   |
| 碳水化合物              | g       | 2.7    | 54.3  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 467   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.17 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.32  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.93   | 39.16 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 19     | 386   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 43     | 872   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.1   | 347.0 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.089  | 1.806 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 156    | 3165  |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 67.0  |
| 泛酸                 | μg      | 173    | 3510  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.9  |
| 生物素                | μg      | 0.75   | 15.22 |
| 胆碱                 | mg      | 6.7    | 135.9 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 6      | 122   |
| 钾                  | mg      | 23     | 467   |
| 铜                  | μg      | 15.9   | 322.6 |
| 镁                  | mg      | 1.6    | 32.5  |
| 铁                  | mg      | 0.33   | 6.70  |
| 锌                  | mg      | 0.21   | 4.26  |
| 锰                  | μg      | 1.05   | 21.30 |
| 钙                  | mg      | 22     | 446   |
| 磷                  | mg      | 13     | 264   |
| 碘                  | μg      | 4.9    | 99.4  |
| 氯                  | mg      | 17     | 345   |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.17 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 4.0    | 81.2  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.2  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 4.5    | 91.3  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 5.0    | 101.5 |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.51  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.17   | 3.45  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、左旋肉碱、肌醇

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

温馨提示

食用秦乳较大婴儿配方羊奶粉时须配合添加辅助食品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处，勿置于冰箱内。每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

◀ 100毫升奶液≈12.9克较大婴儿配方羊奶粉+90毫升水

### 冲调方法



冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。



冲调用水煮沸后,冷却至50°C-55°C,在奶瓶中加入需要量温开水。



用量匙量取准确份量(平匙)的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。



盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜之后,即可喂哺幼儿。

制造商:

陕西省定边县乳品实业有限公司

制造商地址:陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号:SC12961082500901

产品标准代号:GB 10767-2021

产品类别: 幼儿配方食品

产品属性:乳基粉状产品

产品规格:100克/罐

保质期:24个月

食品产地:陕西·榆林

### 喂哺用量建议表

| 月龄       | 每日<br>喂哺次数 | 温开水量<br>(毫升) | 量匙数 |
|----------|------------|--------------|-----|
| 第12-24个月 | 3-4        | 210          | 7   |
| 第24-36个月 | 3-4        | 240          | 8   |

- 每平匙约4.3克羊奶粉,加水30毫升。

● **注意:**未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当浓度,均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶,调好的奶液应立即饮用,不要将未喝完的奶液留存。

● **提示：**请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议，否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

客服热线:

400-029-8838

网址: [www.sxsby.com](http://www.sxsby.com)



6 922886 024250

秦乳



3段

国食注字:YP20170712

净含量:100克

# 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)

### 营养成分表

| 项目                | 单位    | 每100KJ | 每100g |
|-------------------|-------|--------|-------|
| 能量                | kJ    | 100    | 2026  |
| 蛋白质               | g     | 0.70   | 14.10 |
| 脂肪                | g     | 1.15   | 23.30 |
| 亚油酸               | g     | 0.13   | 2.63  |
| α-亚麻酸             | g     | 15     | 304   |
| 碳水化合物             | mg    | 2.6    | 53.3  |
| 维生素               |       |        |       |
| 维生素A              | μg RE | 23     | 466   |
| 维生素E              | mg    | 0.60   | 12.16 |
| 维生素C              | mg    | 0.41   | 8.30  |
| 维生素K <sub>1</sub> | μg    | 1.94   | 39.30 |
| 维生素B <sub>1</sub> | μg    | 34     | 689   |
| 维生素B <sub>2</sub> | μg    | 34     | 689   |
| 维生素B <sub>6</sub> | μg    | 0.094  | 1.904 |
| 烟酸(烟酰胺)           | mg    | 16.2   | 328.2 |
| 叶酸                | μg    | 3.3    | 66.9  |
| 泛酸                | mg    | 196    | 3971  |
| 维生素C              | mg    | 3.2    | 64.8  |
| 生物素               | μg    | 0.77   | 15.60 |
| 矿物质               |       |        |       |
| 钠                 | mg    | 7      | 142   |
| 钾                 | mg    | 24     | 486   |
| 铜                 | μg    | 12.6   | 255.3 |
| 镁                 | mg    | 18     | 36.5  |
| 铁                 | mg    | 0.34   | 6.89  |
| 锌                 | mg    | 0.20   | 4.05  |
| 钙                 | mg    | 22     | 446   |
| 磷                 | mg    | 24     | 484   |
| 碘                 | μg    | 13     | 266.9 |
| 硒                 | μg    | 19     | 385   |
| 可选择成分             |       |        |       |
| 硬脂酸               | μg    | 0.60   | 12.16 |
| 胆固醇               | mg    | 6.8    | 137.8 |
| 胆固醇               | mg    | 3.47   | 70.16 |
| 甘油                | mg    | 3.6    | 73.6  |
| 左旋肉碱              | mg    | 0.6    | 12.1  |
| 十二碳六烯酸(DHA)       | mg    | 0.7    | 14.2  |
| 二十碳四烯酸(ARA)       | mg    | 15     | 30.4  |
| 低聚半乳糖             | mg    | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖              | mg    | 0.03   | 0.51  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | mg    | 0.16   | 3.24  |

### 配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇

矿物质: 硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素: 醋酸视黄酯、胆钙化醇  
dl- $\alpha$ -醋酸生育酚、植物甲萘醌、  
盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆  
醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛  
酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素

### 温馨提示

食用秦乳幼儿配方羊奶粉时须配合添加辅助食品。

### 贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处，勿置于冰箱内。每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

100毫升奶液≈12.9克幼儿配方羊奶粉+90毫升水

冲调方法

1

5分钟

冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55℃

冲调用水煮沸后，冷却至50℃-55℃，在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙量取准确份量（平匙）的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜之后，即可喂哺幼儿。

喂哺用量建议表

| 月龄       | 每日<br>喂哺次数 | 温开水量<br>(毫升) | 量匙数 |
|----------|------------|--------------|-----|
| 第12-24个月 | 3-4        | 210          | 7   |
| 第24-36个月 | 3-4        | 240          | 8   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉，加水30毫升。

● 注意：未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度，均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶，调好的奶液应立即饮用，不要将未喝完的奶液留存。

● 提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议，否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

制造商：  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号：SC12961082500901  
产品标准代号：GB 10767-2021  
产品类别：幼儿配方食品  
产品属性：乳基粉状产品  
产品规格：350克/罐  
食品产地：陕西·榆林  
保质期：24个月  
生产日期：见罐底喷码

客服热线：  
**400-029-8838**  
网址：[www.sxsby.com](http://www.sxsby.com)

  
6 922886 024496

秦乳



3段

国食注字：YP20170712

净含量：350克

幼儿配方羊奶粉  
(12-36月龄,3段)

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2026  |
| 蛋白质                | g       | 0.70   | 14.10 |
| 脂肪                 | g       | 1.15   | 23.30 |
| 亚油酸                | g       | 0.13   | 2.63  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 304   |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 53.3  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 466   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.31  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.94   | 39.30 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 19     | 385   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 34     | 689   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.4   | 352.5 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.094  | 1.904 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 162    | 3282  |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 66.9  |
| 泛酸                 | μg      | 196    | 3971  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.8  |
| 生物素                | μg      | 0.77   | 15.60 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7      | 142   |
| 钾                  | mg      | 24     | 486   |
| 铜                  | μg      | 12.6   | 255.3 |
| 镁                  | mg      | 1.8    | 36.5  |
| 铁                  | mg      | 0.34   | 6.89  |
| 锌                  | mg      | 0.20   | 4.05  |
| 钙                  | mg      | 22     | 446   |
| 磷                  | mg      | 14     | 284   |
| 碘                  | μg      | 3.3    | 66.9  |
| 氯                  | mg      | 19     | 385   |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 胆碱                 | mg      | 6.8    | 137.8 |
| 锰                  | μg      | 1.47   | 29.78 |
| 肌醇                 | mg      | 3.6    | 72.9  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.2  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 0.7    | 14.2  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 1.5    | 30.4  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.51  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.16   | 3.24  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素

温馨提示

食用秦乳幼儿配方羊奶粉时须配合添加辅助食品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处，勿置于冰箱内。每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

◀ 100毫升奶液≈12.9克幼儿配方羊奶粉+90毫升水

冲调方法

1

5分钟

冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55℃

冲调用水煮沸后，冷却至50℃-55℃，在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙量取准确份量（平匙）的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜之后，即可喂哺幼儿。

喂哺用量建议表

| 月龄       | 每日<br>喂哺次数 | 温开水量<br>(毫升) | 量匙数 |
|----------|------------|--------------|-----|
| 第12-24个月 | 3-4        | 210          | 7   |
| 第24-36个月 | 3-4        | 240          | 8   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉，加水30毫升。

● 注意：未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度，均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶，调好的奶液应立即饮用，不要将未喝完的奶液留存。

● 提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议，否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

制造商：  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号：SC12961082500901  
产品标准代号：GB 10767-2021  
产品类别：幼儿配方食品  
产品属性：乳基粉状产品  
产品规格：400克/罐  
食品产地：陕西·榆林  
保质期：24个月  
生产日期：见罐底喷码

客服热线：  
**400-029-8838**  
网址：[www.sxsby.com](http://www.sxsby.com)

6 922886 024526

秦乳

3段

国食注字：YP20170712

净含量：400克

幼儿配方羊奶粉  
(12-36月龄,3段)

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2026  |
| 蛋白质                | g       | 0.70   | 14.10 |
| 脂肪                 | g       | 1.15   | 23.30 |
| 亚油酸                | g       | 0.13   | 2.63  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 304   |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 53.3  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 466   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.31  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.94   | 39.30 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 19     | 385   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 34     | 689   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.4   | 352.5 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.094  | 1.904 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 162    | 3282  |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 66.9  |
| 泛酸                 | μg      | 196    | 3971  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.8  |
| 生物素                | μg      | 0.77   | 15.60 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7      | 142   |
| 钾                  | mg      | 24     | 486   |
| 铜                  | μg      | 12.6   | 255.3 |
| 镁                  | mg      | 1.8    | 36.5  |
| 铁                  | mg      | 0.34   | 6.89  |
| 锌                  | mg      | 0.20   | 4.05  |
| 钙                  | mg      | 22     | 446   |
| 磷                  | mg      | 14     | 284   |
| 碘                  | μg      | 3.3    | 66.9  |
| 氯                  | mg      | 19     | 385   |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 胆碱                 | mg      | 6.8    | 137.8 |
| 锰                  | μg      | 1.47   | 29.78 |
| 肌醇                 | mg      | 3.6    | 72.9  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.2  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 0.7    | 14.2  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 1.5    | 30.4  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.51  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.16   | 3.24  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素

温馨提示

食用秦乳幼儿配方羊奶粉时须配合添加辅助食品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处，勿置于冰箱内。每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

◀ 100毫升奶液≈12.9克幼儿配方羊奶粉+90毫升水

冲调方法

1

5分钟

冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55°C

冲调用水煮沸后，冷却至50°C-55°C，在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙量取准确份量（平匙）的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜之后，即可喂哺幼儿。

制造商：  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号：SC12961082500901  
产品标准代号：GB 10767-2021  
产品类别：幼儿配方食品  
产品属性：乳基粉状产品  
产品规格：400克/袋 保质期：18个月  
食品产地：陕西·榆林 生产日期：见喷码

喂哺用量建议表

| 月龄       | 每日<br>喂哺次数 | 温开水量<br>(毫升) | 量匙数 |
|----------|------------|--------------|-----|
| 第12-24个月 | 3-4        | 210          | 7   |
| 第24-36个月 | 3-4        | 240          | 8   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉，加水30毫升。

● 注意：未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度，均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶，调好的奶液应立即饮用，不要将未喝完的奶液留存。

● 提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议，否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

客服热线：  
**400-029-8838**  
网址：[www.sxsby.com](http://www.sxsby.com)

6 922886 024557

秦乳

3段

国食注字：YP20170712

净含量：400克

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2026  |
| 蛋白质                | g       | 0.70   | 14.10 |
| 脂肪                 | g       | 1.15   | 23.30 |
| 亚油酸                | g       | 0.13   | 2.63  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 304   |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 53.3  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 466   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.31  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.94   | 39.30 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 19     | 385   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 34     | 689   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.4   | 352.5 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.094  | 1.904 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 162    | 3282  |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 66.9  |
| 泛酸                 | μg      | 196    | 3971  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.8  |
| 生物素                | μg      | 0.77   | 15.60 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7      | 142   |
| 钾                  | mg      | 24     | 486   |
| 铜                  | μg      | 12.6   | 255.3 |
| 镁                  | mg      | 1.8    | 36.5  |
| 铁                  | mg      | 0.34   | 6.89  |
| 锌                  | mg      | 0.20   | 4.05  |
| 钙                  | mg      | 22     | 446   |
| 磷                  | mg      | 14     | 284   |
| 碘                  | μg      | 3.3    | 66.9  |
| 氯                  | mg      | 19     | 385   |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 胆碱                 | mg      | 6.8    | 137.8 |
| 锰                  | μg      | 1.47   | 29.78 |
| 肌醇                 | mg      | 3.6    | 72.9  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.2  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 0.7    | 14.2  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 1.5    | 30.4  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.51  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.16   | 3.24  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠

维生素：脂酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素

温馨提示

食用秦乳幼儿配方羊奶粉时须配合添加辅助食品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处，勿置于冰箱内。每次食用后请封好袋口。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

● 100毫升奶液≈12.9克幼儿配方羊奶粉+90毫升水

冲调方法

1

5分钟

冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55℃

冲调用水煮沸后，冷却至50℃-55℃，在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙量取准确份量（平匙）的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜之后，即可喂哺幼儿。

喂哺用量建议表

| 月龄       | 每日<br>喂哺次数 | 温开水量<br>(毫升) | 量匙数 |
|----------|------------|--------------|-----|
| 第12-24个月 | 3-4        | 210          | 7   |
| 第24-36个月 | 3-4        | 240          | 8   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉，加水30毫升。

● 注意：未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度，均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶，调好的奶液应立即饮用，不要将未喝完的奶液留存。

● 提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议，否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

制造商：  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号：SC12961082500901  
产品标准代号：GB 10767-2021  
产品类别：幼儿配方食品  
产品属性：乳基粉状产品  
产品规格：700克/罐  
食品产地：陕西·榆林  
保质期：24个月  
生产日期：见罐底喷码

客服热线：  
**400-029-8838**  
网址：[www.sxsby.com](http://www.sxsby.com)

6 192288 610242 81

秦乳

3段

国食注字：YP20170712

净含量：700克

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2026  |
| 蛋白质                | g       | 0.70   | 14.10 |
| 脂肪                 | g       | 1.15   | 23.30 |
| 亚油酸                | g       | 0.13   | 2.63  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 304   |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 53.3  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 466   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.31  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.94   | 39.30 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 19     | 385   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 34     | 689   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.4   | 352.5 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.094  | 1.904 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 162    | 3282  |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 66.9  |
| 泛酸                 | μg      | 196    | 3971  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.8  |
| 生物素                | μg      | 0.77   | 15.60 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7      | 142   |
| 钾                  | mg      | 24     | 486   |
| 铜                  | μg      | 12.6   | 255.3 |
| 镁                  | mg      | 1.8    | 36.5  |
| 铁                  | mg      | 0.34   | 6.89  |
| 锌                  | mg      | 0.20   | 4.05  |
| 钙                  | mg      | 22     | 446   |
| 磷                  | mg      | 14     | 284   |
| 碘                  | μg      | 3.3    | 66.9  |
| 氯                  | mg      | 19     | 385   |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 胆碱                 | mg      | 6.8    | 137.8 |
| 锰                  | μg      | 1.47   | 29.78 |
| 肌醇                 | mg      | 3.6    | 72.9  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.2  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 0.7    | 14.2  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 1.5    | 30.4  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.51  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.16   | 3.24  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素

温馨提示

食用秦乳幼儿配方羊奶粉时须配合添加辅助食品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处，勿置于冰箱内。每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

100毫升奶液≈12.9克幼儿配方羊奶粉+90毫升水

冲调方法

1

5分钟

冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55℃

冲调用水煮沸后，冷却至50℃-55℃，在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙量取准确份量（平匙）的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜之后，即可喂哺幼儿。

喂哺用量建议表

| 月龄       | 每日<br>喂哺次数 | 温开水量<br>(毫升) | 量匙数 |
|----------|------------|--------------|-----|
| 第12-24个月 | 3-4        | 210          | 7   |
| 第24-36个月 | 3-4        | 240          | 8   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉，加水30毫升。

● 注意：未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度，均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶，调好的奶液应立即饮用，不要将未喝完的奶液留存。

● 提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议，否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

制造商：  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号：SC12961082500901  
产品标准代号：GB 10767-2021  
产品类别：幼儿配方食品  
产品属性：乳基粉状产品  
产品规格：800克/罐  
食品产地：陕西·榆林  
保质期：24个月  
生产日期：见罐底喷码

客服热线：  
**400-029-8838**  
网址：[www.sxsby.com](http://www.sxsby.com)

6 922886 1024212

秦乳

3段

国食注字：YP20170712

净含量：800克

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2026  |
| 蛋白质                | g       | 0.70   | 14.10 |
| 脂肪                 | g       | 1.15   | 23.30 |
| 亚油酸                | g       | 0.13   | 2.63  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 304   |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 53.3  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 466   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.31  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.94   | 39.30 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 19     | 385   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 34     | 689   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.4   | 352.5 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.094  | 1.904 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 162    | 3282  |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 66.9  |
| 泛酸                 | μg      | 196    | 3971  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.8  |
| 生物素                | μg      | 0.77   | 15.60 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7      | 142   |
| 钾                  | mg      | 24     | 486   |
| 铜                  | μg      | 12.6   | 255.3 |
| 镁                  | mg      | 1.8    | 36.5  |
| 铁                  | mg      | 0.34   | 6.89  |
| 锌                  | mg      | 0.20   | 4.05  |
| 钙                  | mg      | 22     | 446   |
| 磷                  | mg      | 14     | 284   |
| 碘                  | μg      | 3.3    | 66.9  |
| 氯                  | mg      | 19     | 385   |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 胆碱                 | mg      | 6.8    | 137.8 |
| 锰                  | μg      | 1.47   | 29.78 |
| 肌醇                 | mg      | 3.6    | 72.9  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.2  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 0.7    | 14.2  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 1.5    | 30.4  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.51  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.16   | 3.24  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘酮、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素

温馨提示

食用秦乳幼儿配方羊奶粉时须配合添加辅助食品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处，勿置于冰箱内。每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

◀ 100毫升奶液≈12.9克幼儿配方羊奶粉+90毫升水

冲调方法

1

5分钟

冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖和量匙放入清水中煮沸5分钟。

2

50-55℃

冲调用水煮沸后，冷却至50℃-55℃，在奶瓶中加入需要量温开水。

3

用量匙量取准确份量（平匙）的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶之中。

4

盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜之后，即可喂哺幼儿。

喂哺用量建议表

| 月龄       | 每日<br>喂哺次数 | 温开水量<br>(毫升) | 量匙数 |
|----------|------------|--------------|-----|
| 第12-24个月 | 3-4        | 210          | 7   |
| 第24-36个月 | 3-4        | 240          | 8   |

● 每平匙约4.3克羊奶粉，加水30毫升。

● 注意：未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度，均会引起婴幼儿不适。每次只需要调一瓶奶，调好的奶液应立即饮用，不要将未喝完的奶液留存。

● 提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照专业人士的指示喂哺婴幼儿或参考喂哺用量建议表以配合婴幼儿食量或胃口。除非有专业人士建议，否则不要改变奶粉比例。不适当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

制造商：  
**陕西省定边县乳品实业有限公司**  
制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

食品生产许可证编号：SC12961082500901  
产品标准代号：GB 10767-2021  
产品类别：幼儿配方食品  
产品属性：乳基粉状产品  
产品规格：900克/罐  
食品产地：陕西·榆林  
保质期：24个月  
生产日期：见罐底喷码

客服热线：  
**400-029-8838**  
网址：[www.sxsby.com](http://www.sxsby.com)

6 192288 610243 11

秦乳

3段

国食注字：YP20170712

净含量：900克

幼儿配方羊奶粉  
(12-36月龄,3段)

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2026  |
| 蛋白质                | g       | 0.70   | 14.10 |
| 脂肪                 | g       | 1.15   | 23.30 |
| 亚油酸                | g       | 0.13   | 2.63  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 304   |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 53.3  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 466   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.41   | 8.31  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.94   | 39.30 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 19     | 385   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 34     | 689   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.4   | 352.5 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.094  | 1.904 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 162    | 3282  |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 66.9  |
| 泛酸                 | μg      | 196    | 3971  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.8  |
| 生物素                | μg      | 0.77   | 15.60 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7      | 142   |
| 钾                  | mg      | 24     | 486   |
| 铜                  | μg      | 12.6   | 255.3 |
| 镁                  | mg      | 1.8    | 36.5  |
| 铁                  | mg      | 0.34   | 6.89  |
| 锌                  | mg      | 0.20   | 4.05  |
| 钙                  | mg      | 22     | 446   |
| 磷                  | mg      | 14     | 284   |
| 碘                  | μg      | 3.3    | 66.9  |
| 氯                  | mg      | 19     | 385   |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 胆碱                 | mg      | 6.8    | 137.8 |
| 锰                  | μg      | 1.47   | 29.78 |
| 肌醇                 | mg      | 3.6    | 72.9  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.2  |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 0.7    | 14.2  |
| 二十碳四烯酸(ARA)        | mg      | 1.5    | 30.4  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.09   | 1.80  |
| 低聚果糖               | g       | 0.03   | 0.51  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.16   | 3.24  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素

温馨提示

食用秦乳幼儿配方羊奶粉时须配合添加辅助食品。

贮存方法

请将奶粉存放在阴凉干燥处，勿置于冰箱内。每次食用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

◀100毫升奶液≈12.9克幼儿配方羊奶粉+90毫升水

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、磷脂、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

维生素：维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱

D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2027  |
| 蛋白质                | g       | 0.61   | 12.30 |
| 脂肪                 | g       | 1.12   | 22.80 |
| 亚油酸                | g       | 0.14   | 2.84  |
| α-亚麻酸              | mg      | 17     | 345   |
| 碳水化合物              | g       | 2.8    | 55.9  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 19     | 385   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.46   | 9.32  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.97   | 39.93 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 21     | 426   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 45     | 912   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.4   | 352.7 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.105  | 2.128 |
| 烟酸（烟酰胺）            | μg      | 147    | 2980  |
| 叶酸                 | μg      | 4.0    | 81.1  |
| 泛酸                 | μg      | 144    | 2919  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.9  |
| 生物素                | μg      | 0.72   | 14.59 |
| 胆碱                 | mg      | 6.9    | 139.9 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 9      | 182   |
| 钾                  | mg      | 23     | 466   |
| 铜                  | μg      | 19.5   | 395.3 |
| 镁                  | mg      | 2.1    | 42.6  |
| 铁                  | mg      | 0.21   | 4.26  |
| 锌                  | mg      | 0.23   | 4.66  |
| 钙                  | μg      | 2.55   | 51.69 |
| 锰                  | mg      | 15     | 304   |
| 磷                  | mg      | 10     | 203   |
| 碘                  | μg      | 4.5    | 91.2  |
| 硒                  | mg      | 17     | 345   |
| 氯                  | μg      | 0.90   | 18.24 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.5    | 10.1  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.5    | 91.2  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.8    | 97.3  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.11   | 2.32  |
| 低聚果糖               | g       | 0.04   | 0.73  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.25   | 5.07  |
| 叶黄素                | μg      | 3.04   | 61.62 |
| 核苷酸                | mg      | 0.88   | 17.84 |

100毫升奶液≈12.9克婴儿配方奶粉+90毫升水

食品生产许可证编号：SC12961082500901

产品标准代号：GB 10765-2021

产品类别：婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品

产品规格：100克/罐

保质期：24个月

生产日期：见罐底喷码

食品产地：陕西·榆林

制造商：陕西省定边县乳品实业有限公司

制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路（工业园区）

网址：www.sxsby.com

全国销售专线：4006-965-789

请保持  
环境清洁

温馨提示：

1. 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的婴儿慎用。

2. 调奶时请用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲调比例。

6 922886 024328

秦益

1段

婴儿配方奶粉（0-6月龄，1段）

净含量：100克【注册号：国食注字YP20230359】

定边乳业官方微信平台

全国客服热线  
4000-976-365  
工作时间：am: 9:30-12:00 pm: 14:00-17:00

注意事项：

1. 水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起婴儿的不适。

2. 喂哺时应采取正确的喂哺方法。

3. 换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

贮藏及食用方法：

1. 本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。

2. 将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前煮沸水中煮3分钟。

3. 根据推荐用量加入水（水温为40°C-50°C）和奶粉，盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可喂哺，喂哺次数参照建议表执行。

喂哺用量建议表

| 月龄     | 喂哺次数/天 | 温开水量（毫升） | 量匙数/次 |
|--------|--------|----------|-------|
| 第0-2周  | 8-9    | 60       | 2     |
| 第2-4周  | 6-7    | 90       | 3     |
| 第1-2个月 | 5-6    | 120      | 4     |
| 第2-4个月 | 5-6    | 150      | 5     |
| 第4-6个月 | 5-6    | 180      | 6     |

每平匙净含量约4.3克

特别提示：

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲调方法：

1. 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。

2. 冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C，在奶瓶中加入需要量温开水。

3. 用量量匙取准确份量（平匙）的婴儿配方奶粉加入奶瓶中。

4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可喂哺婴儿。

**配料表**

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、磷脂、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠）、5'-鸟苷酸二钠

**矿物质：**柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硫酸钠

**维生素：**维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱

**D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱**

**营养成分表**

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2027  |
| 蛋白质                | g       | 0.61   | 12.30 |
| 脂肪                 | g       | 1.12   | 22.80 |
| 亚油酸                | g       | 0.14   | 2.84  |
| α-亚麻酸              | mg      | 17     | 345   |
| 碳水化合物              | g       | 2.8    | 55.9  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 19     | 385   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.46   | 9.32  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.97   | 39.93 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 21     | 426   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 45     | 912   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.4   | 352.7 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.105  | 2.128 |
| 烟酸（烟酰胺）            | μg      | 147    | 2980  |
| 叶酸                 | μg      | 4.0    | 81.1  |
| 泛酸                 | μg      | 144    | 2919  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.9  |
| 生物素                | μg      | 0.72   | 14.59 |
| 胆碱                 | mg      | 6.9    | 139.9 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 9      | 182   |
| 钾                  | mg      | 23     | 466   |
| 铜                  | μg      | 19.5   | 395.3 |
| 镁                  | mg      | 2.1    | 42.6  |
| 铁                  | mg      | 0.21   | 4.26  |
| 锌                  | mg      | 0.23   | 4.66  |
| 锰                  | μg      | 2.55   | 51.69 |
| 钙                  | mg      | 15     | 304   |
| 磷                  | mg      | 10     | 203   |
| 碘                  | μg      | 4.5    | 91.2  |
| 氯                  | mg      | 17     | 345   |
| 硒                  | μg      | 0.90   | 18.24 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.5    | 10.1  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.5    | 91.2  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.8    | 97.3  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.11   | 2.32  |
| 低聚果糖               | g       | 0.04   | 0.73  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | μg      | 0.25   | 5.07  |
| 叶黄素                | μg      | 3.04   | 61.62 |
| 核苷酸                | mg      | 0.88   | 17.84 |

100毫升奶液≈12.9克婴儿配方奶粉+90毫升水

食品生产许可证编号：SC12961082500901

产品标准代号：GB 10765-2021

产品类别：婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状食品

产品规格：350克/罐

保质期：24个月

生产日期：见罐底喷码

食品产地：陕西·榆林

制造商：陕西省定边县乳品实业有限公司

制造商地址：陕西省榆林市定边县

定边镇西环路（工业园区）

网址：www.sxsby.com

全国销售专线：4006-965-789

**温馨提示：**

1.本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的婴儿慎用。

2.调奶时请用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲调比例。

**秦益**

**1段**

**婴儿配方奶粉（0-6月龄，1段）**

净含量：350克【注册号：国食注字YP20230359】

定边乳业官方微信平台

全国客服热线  
4000-976-365  
工作时间：am: 9:30-12:00 pm: 14:00-17:00

**注意事项：**

1.水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起婴儿的不适。

2.喂哺时应采取正确的喂哺方法。

3.换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

**贮藏及食用方法：**

1.本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。

2.将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前煮沸水中煮3分钟。

3.根据推荐用量加入水（水温为40°C-50°C）和奶粉，盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂，哺喂次数参照建议表执行。

**喂哺用量建议表**

| 月龄     | 喂哺次数/天 | 温开水量（毫升） | 量匙数/次 |
|--------|--------|----------|-------|
| 第0-2周  | 8-9    | 60       | 2     |
| 第2-4周  | 6-7    | 90       | 3     |
| 第1-2个月 | 5-6    | 120      | 4     |
| 第2-4个月 | 5-6    | 150      | 5     |
| 第4-6个月 | 5-6    | 180      | 6     |

每平匙净含量约4.3克

**特别提示：**

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

**冲调方法：**

1. 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。

2. 冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C，在奶瓶中加入需要量温开水。

3. 用量匙量取准确份量（平匙）的婴儿配方奶粉加入奶瓶中。

4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可哺喂婴儿。



生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、磷脂、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二磷酸、5'-尿苷酸二磷酸、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二磷酸、5'-鸟苷酸二磷酸）

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

维生素：维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2027  |
| 蛋白质                | g       | 0.61   | 12.30 |
| 脂肪                 | g       | 1.12   | 22.80 |
| 亚油酸                | g       | 0.14   | 2.84  |
| α-亚麻酸              | mg      | 17     | 345   |
| 碳水化合物              | g       | 2.8    | 55.9  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 19     | 385   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.46   | 9.32  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.97   | 39.93 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 21     | 426   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 45     | 912   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.4   | 352.7 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.105  | 2.128 |
| 烟酸（烟酰胺）            | μg      | 147    | 2980  |
| 叶酸                 | μg      | 4.0    | 81.1  |
| 泛酸                 | μg      | 144    | 2919  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.9  |
| 生物素                | μg      | 0.72   | 14.59 |
| 胆碱                 | mg      | 6.9    | 139.9 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 9      | 182   |
| 钾                  | mg      | 23     | 466   |
| 铜                  | μg      | 19.5   | 395.3 |
| 镁                  | mg      | 2.1    | 42.6  |
| 铁                  | mg      | 0.21   | 4.26  |
| 锌                  | mg      | 0.23   | 4.66  |
| 锰                  | μg      | 2.55   | 51.89 |
| 钙                  | mg      | 15     | 304   |
| 磷                  | mg      | 10     | 203   |
| 碘                  | μg      | 4.5    | 91.2  |
| 氯                  | mg      | 17     | 345   |
| 硒                  | μg      | 0.90   | 18.24 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.5    | 10.1  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.5    | 91.2  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.8    | 97.3  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.11   | 2.32  |
| 低聚果糖               | g       | 0.04   | 0.73  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.25   | 5.07  |
| 叶黄素                | μg      | 3.04   | 61.62 |
| 核苷酸                | mg      | 0.88   | 17.84 |

100毫升奶液≈12.9克婴儿配方奶粉+90毫升水

食品生产许可证编号：SC12961082500901

产品标准代号：GB 10765-2021

产品类别：婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状食品

产品规格：400克/罐

保质期：24个月

生产日期：见罐底喷码

食品产地：陕西·榆林

制造商：陕西省定边县乳品实业有限公司

制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路（工业园区）

网址：www.sxsby.com

全国销售专线：4006-965-789

温馨提示：

1.本品含有乳糖和乳蛋白，乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的婴儿慎用。

2.调奶时请用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲调比例。

秦益

1段

婴儿配方奶粉（0-6月龄，1段）

净含量：400克【注册号：国食注字YP20230359】

定边乳业官方微信平台

全国客服热线  
4000-976-365  
工作时间：am: 8:30-12:00 pm: 14:00-17:00

喂哺用量建议表

| 月龄     | 喂哺次数/天 | 温开水量（毫升） | 量匙数/次 |
|--------|--------|----------|-------|
| 第0-2周  | 8-9    | 60       | 2     |
| 第2-4周  | 6-7    | 90       | 3     |
| 第1-2个月 | 5-6    | 120      | 4     |
| 第2-4个月 | 5-6    | 150      | 5     |
| 第4-6个月 | 5-6    | 180      | 6     |

每平匙净含量约4.3克

注意事项：

1.水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起婴儿的不适。

2.喂哺时应采取正确的喂哺方法。

3.换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

贮藏及食用方法：

1.本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。

2.将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前置沸水中煮3分钟。

3.根据推荐用量加入水（水温为40°C-50°C）和奶粉，盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可喂哺，喂哺次数参照建议表执行。

特别提示：

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲调方法：

1.冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。

2.冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C，在奶瓶中加入需要量温开水。

3.用量匙量取准确份量（平匙）的婴儿配方奶粉加入奶瓶中。

4.盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可喂哺婴儿。

[illegible]

定边乳业官方微信平台



**注意事项:**

- 1.水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起婴儿的不适。
- 2.喂哺时应采取正确的喂哺方法。
- 3.换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

**贮藏及食用方法：**

- 1.本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必封好袋口，以防止吸潮或进入异物。
- 2.将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前置沸水中煮3分钟。
- 3.根据推荐用量加入水（水温为40℃-50℃）和奶粉，盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂，哺喂次数参照建议表执行。

### 喂哺用量建议表

| 月龄     | 喂奶次数/天 | 温开水量(毫升) | 量匙数 |
|--------|--------|----------|-----|
| 第0-2周  | 8-9    | 60       | 2   |
| 第2-4周  | 6-7    | 90       | 3   |
| 第1-2个月 | 5-6    | 120      | 4   |
| 第2-4个月 | 5-6    | 150      | 5   |
| 第4-6个月 | 5-6    | 180      | 6   |

每平匙净含量约4.3克

**特别提示:**

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，  
在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

**冲调方法：**

- 

冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。
- 

冲调用水应煮沸后冷却至40℃-50℃，在奶瓶中加入需要量温开水。
- 

用量匙取准确份量（平匙）的婴儿配方奶粉加入奶瓶中。
- 

盖严奶瓶，轻轻至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可哺喂婴儿。

**配料表**

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、磷脂、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二磷酸、5'-尿苷酸二磷酸、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二磷酸、5'-鸟苷酸二磷酸）

**矿物质：**柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

**维生素：**维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱

**D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱**

**营养成分表**

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2027  |
| 蛋白质                | g       | 0.61   | 12.30 |
| 脂肪                 | g       | 1.12   | 22.80 |
| 亚油酸                | g       | 0.14   | 2.84  |
| α-亚麻酸              | mg      | 17     | 345   |
| 碳水化合物              | g       | 2.8    | 55.9  |
| 维生素A               | μg RE   | 19     | 385   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.46   | 9.32  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.97   | 39.93 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 21     | 426   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 45     | 912   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.4   | 352.7 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.105  | 2.128 |
| 烟酸（烟酰胺）            | μg      | 147    | 2980  |
| 叶酸                 | μg      | 4.0    | 81.1  |
| 泛酸                 | μg      | 144    | 2919  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.9  |
| 生物素                | μg      | 0.72   | 14.59 |
| 胆碱                 | mg      | 6.9    | 139.9 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 9      | 182   |
| 钾                  | mg      | 23     | 466   |
| 铜                  | μg      | 19.5   | 395.3 |
| 镁                  | mg      | 2.1    | 42.6  |
| 铁                  | mg      | 0.21   | 4.26  |
| 锌                  | mg      | 0.23   | 4.66  |
| 锰                  | μg      | 2.55   | 51.89 |
| 钙                  | mg      | 15     | 304   |
| 磷                  | mg      | 10     | 203   |
| 碘                  | μg      | 4.5    | 91.2  |
| 氯                  | mg      | 17     | 345   |
| 硒                  | μg      | 0.90   | 18.24 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.5    | 10.1  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.5    | 91.2  |
| 低聚半乳糖              | mg      | 4.8    | 97.3  |
| 低聚果糖               | g       | 0.11   | 2.32  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.04   | 0.73  |
| 叶黄素                | μg      | 0.25   | 5.07  |
| 核苷酸                | mg      | 3.04   | 61.62 |
| 胆碱                 | mg      | 0.88   | 17.84 |

100毫升奶液≈12.9克婴儿配方奶粉+90毫升水

食品生产许可证编号：SC12961082500901

产品标准代号：GB 10765-2021

产品类别：婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状食品

产品规格：700克/罐

保质期：24个月

生产日期：见罐底喷码

食品产地：陕西·榆林

制造商：陕西省定边县乳品实业有限公司

制造厂地址：陕西省榆林市定边县

定边镇西环路（工业园区）

网址：www.sxsby.com

全国销售专线：4006-965-789

**温馨提示：**

1.本品含有乳糖和乳蛋白，乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的婴儿慎用。

2.调奶时请用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲调比例。

**秦益**

**1段**

婴儿配方奶粉（0-6月龄，1段）

净含量：700克【注册号：国食注字YP20230359】

定边乳业官方微信平台

全国客服热线  
4000-976-365  
工作时间：am: 8:30-12:00 pm: 14:00-17:00

**喂哺用量建议表**

| 月龄     | 喂哺次数/天 | 温开水量（毫升） | 量匙数/次 |
|--------|--------|----------|-------|
| 第0-2周  | 8-9    | 60       | 2     |
| 第2-4周  | 6-7    | 90       | 3     |
| 第1-2个月 | 5-6    | 120      | 4     |
| 第2-4个月 | 5-6    | 150      | 5     |
| 第4-6个月 | 5-6    | 180      | 6     |

每平匙净含量约4.3克

**特别提示：**

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

**冲调方法：**

- 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。
- 冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C，在奶瓶中加入需要量温开水。
- 用量匙量取准确份量（平匙）的婴儿配方奶粉加入奶瓶中。
- 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可喂哺婴儿。

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、磷脂、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）  
矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠  
维生素：维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱  
D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2027  |
| 蛋白质                | g       | 0.61   | 12.30 |
| 脂肪                 | g       | 1.12   | 22.80 |
| 亚油酸                | g       | 0.14   | 2.84  |
| α-亚麻酸              | mg      | 17     | 345   |
| 碳水化合物              | g       | 2.8    | 55.9  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 19     | 385   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.46   | 9.32  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.97   | 39.93 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 21     | 426   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 45     | 912   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.4   | 352.7 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.105  | 2.128 |
| 烟酸（烟酰胺）            | μg      | 147    | 2980  |
| 叶酸                 | μg      | 4.0    | 81.1  |
| 泛酸                 | μg      | 144    | 2919  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.9  |
| 生物素                | μg      | 0.72   | 14.59 |
| 胆碱                 | mg      | 6.9    | 139.9 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 9      | 182   |
| 钾                  | mg      | 23     | 466   |
| 铜                  | μg      | 19.5   | 395.3 |
| 镁                  | mg      | 2.1    | 42.6  |
| 铁                  | mg      | 0.21   | 4.26  |
| 锌                  | μg      | 0.23   | 4.66  |
| 锰                  | μg      | 2.55   | 51.69 |
| 钙                  | mg      | 15     | 304   |
| 磷                  | mg      | 10     | 203   |
| 碘                  | μg      | 4.5    | 91.2  |
| 硒                  | μg      | 17     | 345   |
| 维生素                | μg      | 0.90   | 18.24 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.5    | 10.1  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.5    | 91.2  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.8    | 97.3  |
| 低聚果糖               | g       | 0.11   | 2.32  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.04   | 0.73  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | μg      | 0.25   | 5.07  |
| 叶黄素                | μg      | 3.04   | 61.62 |
| 核苷酸                | mg      | 0.88   | 17.84 |

100毫升奶液≈12.9克婴儿配方奶粉+90毫升水

食品生产许可证编号：SC12961082500901

产品标准代号：GB 10765-2021

产品类别：婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状食品

产品规格：800克/罐

保质期：24个月

生产日期：见罐底喷码

食品产地：陕西·榆林

制造商：陕西省定边县乳品实业有限公司

制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路（工业园区）

网址：www.sxsby.com

全国销售专线：4006-965-789

请保持  
环境清洁

温馨提示：  
1.本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的婴儿慎用。  
2.调奶时请用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲调比例。

  
6 192288 6102215 7

秦益



1

婴儿配方奶粉（0-6月龄，1段）

净含量：800克【注册号：国食注字YP20230359】

  
定边乳业官方微信平台

  
全国客服热线  
4000-976-365  
工作时间：am: 9:30-12:00 pm: 14:00-17:00

注意事项：  
1.水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起婴儿的不适。  
2.喂哺时应采取正确的喂哺方法。  
3.换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。  
贮藏及食用方法：  
1.本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。  
2.将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前置沸水中煮3分钟。  
3.根据推荐用量加入水（水温为40℃-50℃）和奶粉，盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可喂哺，喂哺次数参照建议表执行。

喂哺用量建议表

| 月龄     | 喂哺次数/天 | 温开水量（毫升） | 量匙数/次 |
|--------|--------|----------|-------|
| 第0-2周  | 8-9    | 60       | 2     |
| 第2-4周  | 6-7    | 90       | 3     |
| 第1-2个月 | 5-6    | 120      | 4     |
| 第2-4个月 | 5-6    | 150      | 5     |
| 第4-6个月 | 5-6    | 180      | 6     |

每平匙净含量约4.3克

特别提示：  
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲调方法：  
  
冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。  
  
冲调用水应煮沸后冷却至40℃-50℃，在奶瓶中加入需要量温开水。  
  
用量匙量取准确份量（平匙）的婴儿配方奶粉加入奶瓶中。  
  
盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可喂哺婴儿。

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、磷脂、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠）、5'-鸟苷酸二钠

矿物质：柠檬酸钙、氯化钾、硫酸铜、硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸镁、碳酸钾、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

维生素：维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、维生素C、生物素、胆碱、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2027  |
| 蛋白质                | g       | 0.61   | 12.30 |
| 脂肪                 | g       | 1.12   | 22.80 |
| 亚油酸                | g       | 0.14   | 2.84  |
| α-亚麻酸              | mg      | 17     | 345   |
| 碳水化合物              | g       | 2.8    | 55.9  |
| 维生素A               | μg RE   | 19     | 385   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.16 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.46   | 9.32  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.97   | 39.93 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 21     | 426   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 45     | 912   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.4   | 352.7 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.105  | 2.128 |
| 烟酸（烟酰胺）            | μg      | 147    | 2980  |
| 叶酸                 | μg      | 4.0    | 81.1  |
| 维生素C               | mg      | 144    | 2919  |
| 生物素                | μg      | 0.72   | 14.59 |
| 胆碱                 | mg      | 6.9    | 139.9 |
| 矿物质                | mg      |        |       |
| 钠                  | mg      | 9      | 182   |
| 钾                  | mg      | 23     | 466   |
| 铜                  | μg      | 19.5   | 395.3 |
| 镁                  | mg      | 2.1    | 42.6  |
| 铁                  | mg      | 0.21   | 4.26  |
| 锌                  | mg      | 0.23   | 4.66  |
| 锰                  | μg      | 2.55   | 51.69 |
| 钙                  | mg      | 15     | 304   |
| 磷                  | mg      | 10     | 203   |
| 氯                  | mg      | 4.5    | 91.2  |
| 硒                  | μg      | 17     | 345   |
| 可溶性成分              | μg      | 0.90   | 18.24 |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.5    | 10.1  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.5    | 91.2  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.8    | 97.3  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.11   | 2.32  |
| 低聚果糖               | g       | 0.04   | 0.73  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.25   | 5.07  |
| 叶黄素                | μg      | 3.04   | 61.62 |
| 核苷酸                | mg      | 0.88   | 17.84 |

食品生产许可证编号：SC12961082500901

产品标准代号：GB 10765-2021

产品类别：婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品

产品规格：900克/罐

保质期：24个月

生产日期：见罐底喷码

食品产地：陕西·榆林

制造商：陕西省定边县乳品实业有限公司

制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路（工业园区）

网址：www.sxsby.com

全国销售专线：4006-965-789

温馨提示：

1.本品含有乳糖和乳蛋白，乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的婴儿慎用。

2.调奶时请用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲调比例。

秦益

1段

婴儿配方奶粉（0-6月龄，1段）

净含量：900克【注册号：国食注字YP20230359】

定边乳业官方微信平台

全国客服热线  
4000-976-365  
工作时间：am: 9:30-12:00 pm: 14:00-17:00

注意事项：

1.水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起婴儿的不适。

2.喂哺时应采取正确的喂哺方法。

3.换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

贮藏及食用方法：

1.本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。

2.将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前煮沸水中煮3分钟。

3.根据推荐用量加入水（水温为40℃-50℃）和奶粉，盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂，哺喂次数参照建议表执行。

喂哺用量建议表

| 月龄     | 喂哺次数/天 | 温开水量（毫升） | 量匙数/次 |
|--------|--------|----------|-------|
| 第0-2周  | 8-9    | 60       | 2     |
| 第2-4周  | 6-7    | 90       | 3     |
| 第1-2个月 | 5-6    | 120      | 4     |
| 第2-4个月 | 5-6    | 150      | 5     |
| 第4-6个月 | 5-6    | 180      | 6     |

每平匙净含量约4.3克

特别提示：

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲调方法：

1.冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。

2.冲调用水应煮沸后冷却至40℃-50℃，在奶瓶中加入需要量温开水。

3.用量匙量取准确份量（平匙）的婴儿配方奶粉加入奶瓶中。

4.盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可哺喂婴儿。

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、磷脂、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸）

矿物质：氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠

维生素：维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g  |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2025   |
| 蛋白质                | g       | 0.70   | 14.20  |
| 脂肪                 | g       | 1.14   | 23.10  |
| 亚油酸                | g       | 0.11   | 2.23   |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 304    |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 53.2   |
| 维生素                |         |        |        |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 466    |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.15  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.44   | 8.91   |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 2.00   | 40.50  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 22     | 446    |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 46     | 932    |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 16.7   | 338.2  |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.110  | 2.228  |
| 烟酸（烟酰胺）            | μg      | 152    | 3078   |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 66.8   |
| 泛酸                 | μg      | 198    | 4010   |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.8   |
| 生物素                | μg      | 0.78   | 15.80  |
| 胆碱                 | mg      | 7.0    | 141.8  |
| 矿物质                |         |        |        |
| 钠                  | mg      | 6      | 122    |
| 钾                  | mg      | 25     | 506    |
| 铜                  | μg      | 17.2   | 348.3  |
| 镁                  | mg      | 2.4    | 48.6   |
| 铁                  | mg      | 0.33   | 6.68   |
| 锌                  | mg      | 0.21   | 4.25   |
| 锰                  | μg      | 2.38   | 48.20  |
| 钙                  | mg      | 22     | 446    |
| 磷                  | mg      | 15     | 304    |
| 碘                  | μg      | 4.5    | 91.1   |
| 氯                  | mg      | 17     | 344    |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.15  |
| 可选择成分              |         |        |        |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.2   |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.5    | 91.1   |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.8    | 97.2   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.11   | 2.23   |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.04   | 0.73   |
| 叶黄素                | μg      | 0.20   | 4.05   |
| 核苷酸                | mg      | 10.36  | 209.79 |
| 核黄素                | mg      | 0.86   | 17.42  |

食品生产许可证编号：SC12961082500901

产品标准代号：GB 10766-2021

产品类别：较大婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品

产品规格：100克/罐

保质期：24个月

生产日期：见罐底喷码

食品产地：陕西·榆林

制造商：陕西省定边县乳品实业有限公司

制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路（工业园区）

网址：www.sxsby.com

全国销售专线：4006-965-789

温馨提示：

1.本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的婴幼儿慎用。

2.调奶时请用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲调比例。

922866 024366

100毫升奶液≈12.9克较大婴儿配方奶粉+90毫升水

秦益

2段

较大婴儿配方奶粉（6-12月龄，2段）

净含量：100克【注册号：国食注字YP20230360】

定边乳业官方微信平台

全国客服热线  
4000-976-365  
工作时间：am: 8:30-12:00 pm: 14:00-17:00

喂哺用量建议表

| 月龄      | 喂哺次数/天 | 温开水量（毫升） | 量匙数/次 |
|---------|--------|----------|-------|
| 第6-9个月  | 4-5    | 180      | 6     |
| 第9-12个月 | 3-4    | 210      | 7     |

每平匙净含量约4.3克

特别提示：

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

冲调方法：

1.冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。

2.冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C，在奶瓶中加入需要量温开水。

3.用量匙量取准确份量（平匙）的较大婴儿配方奶粉加入奶瓶中。

4.盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可喂较大婴儿。

注意事项：

1.水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起宝宝的不适。

2.喂哺时应采取正确的喂哺方法。

3.换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

贮藏及食用方法：

1.本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。

2.将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前置沸水中煮3分钟。

3.根据推荐用量加入水（水温为40°C-50°C）和奶粉，盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可喂哺，喂哺次数参照建议表执行。

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、磷脂、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）

矿物质：氯化钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

维生素：维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱

维生素：维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g  |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2025   |
| 蛋白质                | g       | 0.70   | 14.20  |
| 脂肪                 | g       | 1.14   | 23.10  |
| 亚油酸                | g       | 0.11   | 2.23   |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 304    |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 53.2   |
| 维生素                |         |        |        |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 466    |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.15  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.44   | 8.91   |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 2.00   | 40.50  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 22     | 446    |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 46     | 932    |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 16.7   | 338.2  |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.110  | 2.228  |
| 烟酸（烟酰胺）            | μg      | 152    | 3078   |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 66.8   |
| 泛酸                 | μg      | 198    | 4010   |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.8   |
| 生物素                | μg      | 0.78   | 15.80  |
| 胆碱                 | mg      | 7.0    | 141.8  |
| 矿物质                |         |        |        |
| 钠                  | mg      | 6      | 122    |
| 钾                  | mg      | 25     | 506    |
| 铜                  | μg      | 17.2   | 348.3  |
| 铁                  | mg      | 2.4    | 48.6   |
| 锌                  | mg      | 0.33   | 6.68   |
| 锰                  | mg      | 0.21   | 4.25   |
| 钙                  | μg      | 2.38   | 48.20  |
| 磷                  | mg      | 22     | 446    |
| 碘                  | μg      | 15     | 304    |
| 氯                  | μg      | 4.5    | 91.1   |
| 硒                  | μg      | 17     | 344    |
| 可选择成分              |         |        |        |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.2   |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.5    | 91.1   |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.8    | 97.2   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.11   | 2.23   |
| 低聚果糖               | g       | 0.04   | 0.73   |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.20   | 4.05   |
| 叶黄素                | μg      | 10.36  | 209.79 |
| 核苷酸                | mg      | 0.86   | 17.42  |

100毫升奶液≈12.9克较大婴儿配方奶粉+90毫升水

食品生产许可证编号：SC12961082500901

产品标准代号：GB 10766-2021

产品类别：较大婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状食品

产品规格：350克/罐

保质期：24个月

生产日期：见罐底喷码

食品产地：陕西·榆林

制造商：陕西省定边县乳品实业有限公司

制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路（工业园区）

网址：www.sxsby.com

全国销售专线：4006-965-789

秦益

2段

较大婴儿配方奶粉（6-12月龄，2段）

净含量：350克【注册号：国食注字YP20230360】

定边乳业官方微信平台

全国客服热线  
4000-976-365  
工作时间：am: 9:30-12:00 pm: 14:00-17:00

喂哺用量建议表

| 月龄      | 喂哺次数/天 | 温开水量（毫升） | 量匙数/次 |
|---------|--------|----------|-------|
| 第6-9个月  | 4-5    | 180      | 6     |
| 第9-12个月 | 3-4    | 210      | 7     |

每平匙净含量约4.3克

特别提示：

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

冲调方法：

1. 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。

2. 冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C，在奶瓶中加入需要量温开水。

3. 用量匙量取准确份量（平匙）的较大婴儿配方奶粉加入奶瓶中。

4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可喂哺较大婴儿。

注意事项：

1. 水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起宝宝的不适。

2. 喂哺时应采取正确的喂哺方法。

3. 换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

贮藏及食用方法：

1. 本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。

2. 将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前置沸水中煮3分钟。

3. 根据推荐用量加入水（水温为40°C-50°C）和奶粉，盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可喂哺，喂哺次数参照建议表执行。

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、磷脂、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸）

矿物质：氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠

维生素：维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>2</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱

D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

| 营养成分表              |         |        |        |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g  |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2025   |
| 蛋白质                | g       | 0.70   | 14.20  |
| 脂肪                 | g       | 1.14   | 23.10  |
| 亚油酸                | g       | 0.11   | 2.23   |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 304    |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 53.2   |
| 维生素                |         |        |        |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 466    |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.15  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.44   | 8.91   |
| 维生素K <sub>2</sub>  | μg      | 2.00   | 40.50  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 22     | 446    |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 46     | 932    |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 16.7   | 338.2  |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.110  | 2.228  |
| 烟酸（烟酰胺）            | μg      | 152    | 3078   |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 66.8   |
| 泛酸                 | μg      | 198    | 4010   |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.8   |
| 生物素                | μg      | 0.78   | 15.80  |
| 胆碱                 | mg      | 7.0    | 141.8  |
| 矿物质                |         |        |        |
| 钠                  | mg      | 6      | 122    |
| 钾                  | mg      | 25     | 506    |
| 铜                  | μg      | 17.2   | 348.3  |
| 镁                  | mg      | 2.4    | 48.6   |
| 铁                  | mg      | 0.33   | 6.68   |
| 锌                  | mg      | 0.21   | 4.25   |
| 锰                  | μg      | 2.38   | 48.20  |
| 钙                  | mg      | 22     | 446    |
| 磷                  | mg      | 15     | 304    |
| 碘                  | μg      | 4.5    | 91.1   |
| 氯                  | mg      | 17     | 344    |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.15  |
| 可选择成分              |         |        |        |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.2   |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.5    | 91.1   |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.8    | 97.2   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.11   | 2.32   |
| 低聚果糖               | g       | 0.04   | 0.73   |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.20   | 4.05   |
| 叶黄素                | μg      | 10.36  | 209.79 |
| 核苷酸                | mg      | 0.86   | 17.42  |

100毫升奶液≈12.9克较大婴儿配方奶粉+90毫升水

食品生产许可证编号：SC12961082500901

产品标准代号：GB 10766-2021

产品类别：较大婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品

产品规格：400克/罐

保质期：24个月

生产日期：见罐底喷码

食品产地：陕西·榆林

制造商：陕西省定边县乳品实业有限公司

制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路（工业园区）

网址：www.sxsby.com

全国销售专线：4006-965-789

温馨提示：

1.本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的婴幼儿慎用。

2.调奶时请用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲调比例。

秦益

2段

较大婴儿配方奶粉（6-12月龄，2段）

净含量：400克【注册号：国食注字YP20230360】

定边乳业官方微信平台

全国客服热线  
4000-976-365  
工作时间：am: 8:30-12:00 pm: 14:00-17:00

喂哺用量建议表

| 月龄      | 喂哺次数/天 | 温开水量（毫升） | 量匙数/次 |
|---------|--------|----------|-------|
| 第6-9个月  | 4-5    | 180      | 6     |
| 第9-12个月 | 3-4    | 210      | 7     |

每平匙净含量约4.3克

特别提示：

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

冲调方法：

1. 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。

2. 冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C，在奶瓶中加入需要量温开水。

3. 用量匙量取准确份量（平匙）的较大婴儿配方奶粉加入奶瓶中。

4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可喂较大婴儿。

注意事项：

1. 水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起宝宝的不适。

2. 喂哺时应采取正确的喂哺方法。

3. 换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

贮藏及食用方法：

1. 本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。

2. 将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前置沸水中煮3分钟。

3. 根据推荐用量加入水（水温为40°C-50°C）和奶粉，盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可喂哺，喂哺次数参照建议表执行。

| 营养成分表                                                                                                                                             |         |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| <b>原料来源：</b> 乳盐乳清粉、食用植物油和油（1,3-二油酸-2-棕榈酰甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低果糖、磷脂、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-鸟苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-腺苷二磷酸、5'-肌苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸） |         |        |        |
| <b>营养物质：</b> 氯化钾、硫酸铜、硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸钴、碳酸钙、磷酸钙、维生素A<br><b>膳食纤维：</b> 膳食纤维素、羟甲基糠醛、dl-α-葡萄糖生育醇、植物甲氧硅烷、盐酸硫氨酸、核黄素、盐酸吡哆醇、羧基肽、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、氯化胆碱    |         |        |        |
| 营养成分表                                                                                                                                             |         |        |        |
| 项目                                                                                                                                                | 单位      | 每100kJ | 每100g  |
| 能量                                                                                                                                                | kJ      | 100    | 2025   |
| 蛋白质                                                                                                                                               | g       | 0.70   | 14.20  |
| 脂肪                                                                                                                                                | g       | 1.14   | 23.10  |
| 亚油酸                                                                                                                                               | g       | 0.11   | 2.23   |
| n-3脂肪酸                                                                                                                                            | mg      | 15     | 304    |
| 碳水化合物                                                                                                                                             | g       | 2.6    | 53.2   |
| 维生素A                                                                                                                                              | μg RE   | 2.3    | 466    |
| 维生素B <sub>1</sub>                                                                                                                                 | μg      | 0.60   | 12.15  |
| 维生素E                                                                                                                                              | mg α-TE | 0.44   | 8.91   |
| 维生素K <sub>1</sub>                                                                                                                                 | μg      | 2.00   | 40.50  |
| 维生素C                                                                                                                                              | mg      | 22     | 446    |
| 维生素B <sub>6</sub>                                                                                                                                 | μg      | 4.6    | 92     |
| 维生素B <sub>12</sub>                                                                                                                                | μg      | 16.7   | 338.2  |
| 维生素H                                                                                                                                              | μg      | 0.110  | 2.228  |
| 胆固醇（总脂肪）                                                                                                                                          | %       | 15.2   | 3078   |
| 叶酸                                                                                                                                                | μg      | 3.3    | 66.8   |
| -泛酸                                                                                                                                               | mg      | 198    | 4010   |
| 维生素C                                                                                                                                              | mg      | 3.2    | 64.8   |
| 生物素                                                                                                                                               | mg      | 0.78   | 15.80  |
| 胆碱                                                                                                                                                | mg      | 7.0    | 141.8  |
| <b>矿物质</b>                                                                                                                                        |         |        |        |
| 钠                                                                                                                                                 | mg      | 6      | 122    |
| 钾                                                                                                                                                 | mg      | 26     | 506    |
| 钙                                                                                                                                                 | mg      | 17.2   | 348.3  |
| 镁                                                                                                                                                 | mg      | 2.4    | 48.6   |
| 铁                                                                                                                                                 | mg      | 0.33   | 6.68   |
| 锌                                                                                                                                                 | mg      | 0.21   | 4.25   |
| 铜                                                                                                                                                 | mg      | 2.38   | 48.20  |
| 锰                                                                                                                                                 | mg      | 22     | 446    |
| 磷                                                                                                                                                 | mg      | 15     | 304    |
| 铬                                                                                                                                                 | mg      | 1.7    | 344    |
| 硒                                                                                                                                                 | mg      | 0.60   | 12.15  |
| <b>可选择成分</b>                                                                                                                                      |         |        |        |
| 左旋肉碱                                                                                                                                              | mg      | 0.6    | 12.1   |
| 二十二碳六烯酸                                                                                                                                           | mg      | 4.5    | 91.1   |
| 二十碳四烯酸                                                                                                                                            | mg      | 4.8    | 97.2   |
| 低聚半乳糖                                                                                                                                             | g       | 0.11   | 2.32   |
| 低果糖浆                                                                                                                                              | g       | 0.04   | 0.73   |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酰甘油三酯                                                                                                                                 | g       | 0.20   | 4.05   |
| 植谷甾醇                                                                                                                                              | μg      | 10.36  | 209.30 |
| 核苷酸                                                                                                                                               | mg      | 0.96   | 17.42  |
| 食品生产许可证编号：SC12961082500901                                                                                                                        |         |        |        |
| 产品标准代号：GB 10766-2021                                                                                                                              |         |        |        |
| 产品类型：较大婴儿配方食品                                                                                                                                     |         |        |        |
| 产品属性：乳基粉状产品                                                                                                                                       |         |        |        |
| 产品规格：400克/罐                                                                                                                                       |         |        |        |
| 保质期：18个月                                                                                                                                          |         |        |        |
| 生产日期：见喷码                                                                                                                                          |         |        |        |
| 食品产地：陕西·榆林                                                                                                                                        |         |        |        |
| 制造商：陕西省定边县乳品实业有限公司                                                                                                                                |         |        |        |
| 制造商地址：陕西省榆林市定边县                                                                                                                                   |         |        |        |
| 定边镇西大街（工业园区）                                                                                                                                      |         |        |        |
| 网址： <a href="http://www.sxsbxy.com">www.sxsbxy.com</a>                                                                                            |         |        |        |
| 全国销售热线：4006-965-789                                                                                                                               |         |        |        |
| <b>温馨提示：</b>                                                                                                                                      |         |        |        |
| 1.本品含有乳糖和乳蛋白，乳糖不耐受者和乳蛋白过敏体质的婴幼儿慎用。                                                                                                                |         |        |        |
| 2.调奶时请用专用量匙。按喷嘴建议剂量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲泡比例。                                                                                                        |         |        |        |
|                                                                                                                                                   |         |        |        |
| 6 922886 023314                                                                                                                                   |         |        |        |
| 100毫升奶液≈12.9克兑水从儿方奶粉中+温水冲开                                                                                                                        |         |        |        |



定边乳业官方微信平台



**注意事项:**

- 1.水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起宝宝的不适。
- 2.喂哺时应采取正确的喂哺方法。
- 3.换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

**贮藏及食用方法：**

1. 本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必封好袋口，以防止吸潮或进入异物。
2. 将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前置沸水中煮3分钟。
3. 根据推荐用量加入水（水温为40℃-50℃）和奶粉，盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂，哺喂次数参照建议表执行。

### 喂哺用量建议表

| 月龄      | 喂奶次数/天 | 温开水量<br>(毫升) | 量匙数/天 |
|---------|--------|--------------|-------|
| 第6-9个月  | 4-5    | 180          | 6     |
| 第9-12个月 | 3-4    | 210          | 7     |

每平匙净含量约4.3克

**特别提示:**

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

**冲调方法：**

- 

冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。
- 

冲调用水应煮沸后冷却至40℃-50℃，在奶瓶中加入需要量温开水。
- 

用量匙取准确份量（平匙）的较大婴儿配方奶粉加入奶瓶中。
- 

盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可哺喂较大婴儿。

**配料表**

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、磷脂、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸）

**矿物质：**氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠

**维生素：**维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>2</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱

**D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱**

**营养成分表**

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g  |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2025   |
| 蛋白质                | g       | 0.70   | 14.20  |
| 脂肪                 | g       | 1.14   | 23.10  |
| 亚油酸                | g       | 0.11   | 2.23   |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 304    |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 53.2   |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 466    |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.15  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.44   | 8.91   |
| 维生素K <sub>2</sub>  | μg      | 2.00   | 40.50  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 22     | 446    |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 46     | 932    |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 16.7   | 338.2  |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.110  | 2.228  |
| 烟酸（烟酰胺）            | μg      | 152    | 3078   |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 66.8   |
| 泛酸                 | μg      | 198    | 4010   |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.8   |
| 生物素                | μg      | 0.78   | 15.80  |
| 胆碱                 | mg      | 7.0    | 141.8  |
| 矿物质                | mg      | 6      | 122    |
| 钠                  | mg      | 25     | 506    |
| 钾                  | mg      | 17.2   | 348.3  |
| 钙                  | mg      | 2.4    | 48.6   |
| 铁                  | mg      | 0.33   | 6.68   |
| 锌                  | mg      | 0.21   | 4.25   |
| 锰                  | μg      | 2.38   | 48.20  |
| 铜                  | μg      | 22     | 446    |
| 磷                  | mg      | 15     | 304    |
| 碘                  | μg      | 4.5    | 91.1   |
| 氯                  | mg      | 17     | 344    |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.15  |
| 可选择成分              | mg      | 0.6    | 12.2   |
| 左旋肉碱               | mg      | 4.5    | 91.1   |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.8    | 97.2   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.11   | 2.23   |
| 低聚果糖               | g       | 0.04   | 0.73   |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.20   | 4.05   |
| 叶黄素                | μg      | 10.36  | 209.79 |
| 核苷酸                | mg      | 0.86   | 17.42  |

100毫升奶液≈12.9克较大婴儿配方奶粉+90毫升水

食品生产许可证编号：SC12961082500901

产品标准代号：GB 10766-2021

产品类别：较大婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品

产品规格：700克/罐

保质期：24个月

生产日期：见罐底喷码

食品产地：陕西·榆林

制造商：陕西省定边县乳品实业有限公司

制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路（工业园区）

网址：www.sxsby.com

全国销售专线：4006-965-789

**温馨提示：**

1.本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的婴幼儿慎用。

2.调奶时请用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲调比例。



6 922886 024427

**秦益**



**2段**

较大婴儿配方奶粉（6-12月龄，2段）

净含量：700克【注册号：国食注字YP20230360】



定边乳业官方微信平台



全国客服热线  
4000-976-365  
工作时间：am: 8:30-12:00 pm: 14:00-17:00

**喂哺用量建议表**

| 月龄      | 喂哺次数/天 | 温开水量（毫升） | 量匙数/次 |
|---------|--------|----------|-------|
| 第6-9个月  | 4-5    | 180      | 6     |
| 第9-12个月 | 3-4    | 210      | 7     |

每平匙净含量约4.3克

**特别提示：**

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

**冲调方法：**

- 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。
- 冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C，在奶瓶中加入需要量温开水。
- 用量匙量取准确份量（平匙）的较大婴儿配方奶粉加入奶瓶中。
- 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可喂较大婴儿。

**注意事项：**

- 水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起宝宝的不适。
- 喂哺时应采取正确的喂哺方法。
- 换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

**贮藏及食用方法：**

- 本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。
- 将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前置沸水中煮3分钟。
- 根据推荐用量加入水（水温为40°C-50°C）和奶粉，盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可喂哺，喂哺次数参照建议表执行。

秦益

2

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

净含量: 800克【注册号: 国食注字YP20230360】

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、磷脂、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)

矿物质: 氯化钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

维生素: 维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱

碳水化合物: 葡萄糖、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g  |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2025   |
| 蛋白质                | g       | 0.70   | 14.20  |
| 脂肪                 | g       | 1.14   | 23.10  |
| α-亚麻酸              | g       | 0.11   | 2.23   |
| 碳水化合物              | g       | 15     | 304    |
| 维生素                |         |        |        |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 466    |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.15  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.44   | 8.91   |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 2.00   | 40.50  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 22     | 446    |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 46     | 932    |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 16.7   | 338.2  |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.110  | 2.228  |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 152    | 3078   |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 66.8   |
| 泛酸                 | μg      | 198    | 4010   |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.8   |
| 生物素                | μg      | 0.78   | 15.80  |
| 胆碱                 | mg      | 7.0    | 141.8  |
| 矿物质                |         |        |        |
| 钠                  | mg      | 6      | 122    |
| 钾                  | mg      | 25     | 506    |
| 铜                  | μg      | 17.2   | 348.3  |
| 镁                  | mg      | 2.4    | 48.6   |
| 铁                  | mg      | 0.33   | 6.68   |
| 锌                  | mg      | 0.21   | 4.25   |
| 锰                  | μg      | 2.38   | 48.20  |
| 钙                  | mg      | 22     | 446    |
| 磷                  | mg      | 15     | 304    |
| 碘                  | μg      | 4.5    | 91.1   |
| 氯                  | mg      | 17     | 344    |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.15  |
| 可选择成分              |         |        |        |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.2   |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.5    | 91.1   |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.8    | 97.2   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.11   | 2.23   |
| 低聚果糖               | g       | 0.04   | 0.73   |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.20   | 4.05   |
| 叶黄素                | μg      | 10.36  | 209.79 |
| 核苷酸                | mg      | 0.86   | 17.42  |

100毫升奶液≈12.9克较大婴儿配方奶粉+90毫升水

食品生产许可证编号: SC12961082500901

产品标准代号: GB 10766-2021

产品类别: 较大婴儿配方食品

产品属性: 乳基粉状产品

产品规格: 800克/罐

保质期: 24个月

生产日期: 见罐底喷码

食品产地: 陕西·榆林

制造商: 陕西省定边县乳品实业有限公司

制造商地址: 陕西省榆林市定边县

定边镇西环路(工业园区)

网址: www.sxsby.com

全国销售专线: 4006-965-789

温馨提示:

1.本品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的婴幼儿慎用。

2.调奶时请用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经专业人士建议,请勿擅自改变冲调比例。

请保持环境清洁

6 922886 1022164

定边乳业官方微信平台

全国客服热线  
4000-976-365  
工作时间: am: 9:30-12:00 pm: 14:00-17:00

喂哺用量建议表

| 月龄      | 喂哺次数/天 | 温开水量(毫升) | 量匙数/次 |
|---------|--------|----------|-------|
| 第6-9个月  | 4-5    | 180      | 6     |
| 第9-12个月 | 3-4    | 210      | 7     |

每平匙净含量约4.3克

特别提示:

食用本产品时,须配合添加辅助食品。

冲调方法:

1. 冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。

2. 冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C,在奶瓶中加入需要量温开水。

3. 用量匙量取准确份量(平匙)的较大婴儿配方奶粉加入奶瓶中。

4. 盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜后即可喂哺较大婴儿。

注意事项:

1.水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起宝宝的不适。

2.喂哺时应采取正确的喂哺方法。

3.换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

贮藏及食用方法:

1.本品宜贮藏于阴凉干燥处,每次食用后请务必盖紧罐盖,以防止吸潮或进入异物。

2.将奶瓶(奶嘴、奶瓶盖)用清水冲洗干净,使用前置沸水中煮3分钟。

3.根据推荐用量加入水(水温为40°C-50°C)和奶粉,盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,即可喂哺,喂哺次数参照建议表执行。

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、磷脂、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸）

矿物质：氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠

维生素：维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱

D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

| 营养成分表              |         |        |        |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g  |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2025   |
| 蛋白质                | g       | 0.70   | 14.20  |
| 脂肪                 | g       | 1.14   | 23.10  |
| 亚油酸                | g       | 0.11   | 2.23   |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 304    |
| 碳水化合物              | g       | 2.6    | 53.2   |
| 维生素                |         |        |        |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 466    |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.15  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.44   | 8.91   |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 2.00   | 40.50  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 22     | 446    |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 46     | 932    |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 16.7   | 338.2  |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.110  | 2.228  |
| 烟酸（烟酰胺）            | μg      | 152    | 3078   |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 66.8   |
| 泛酸                 | μg      | 198    | 4010   |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 64.8   |
| 生物素                | μg      | 0.78   | 15.80  |
| 胆碱                 | mg      | 7.0    | 141.8  |
| 矿物质                |         |        |        |
| 钠                  | mg      | 6      | 122    |
| 钾                  | mg      | 25     | 506    |
| 铜                  | μg      | 17.2   | 348.3  |
| 镁                  | mg      | 2.4    | 48.6   |
| 铁                  | mg      | 0.33   | 6.68   |
| 锌                  | mg      | 0.21   | 4.25   |
| 锰                  | μg      | 2.38   | 48.20  |
| 钙                  | mg      | 22     | 446    |
| 磷                  | mg      | 15     | 304    |
| 碘                  | μg      | 4.5    | 91.1   |
| 氯                  | mg      | 17     | 344    |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.15  |
| 可选择成分              |         |        |        |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 12.2   |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.5    | 91.1   |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.8    | 97.2   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.11   | 2.32   |
| 低聚果糖               | g       | 0.04   | 0.73   |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.20   | 4.05   |
| 叶黄素                | μg      | 10.36  | 209.79 |
| 核苷酸                | mg      | 0.86   | 17.42  |

100毫升奶液≈12.9克较大婴儿配方奶粉+90毫升水

食品生产许可证编号：SC12961082500901

产品标准代号：GB 10766-2021

产品类别：较大婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品

产品规格：900克/罐

保质期：24个月

生产日期：见罐底喷码

食品产地：陕西·榆林

制造商：陕西省定边县乳品实业有限公司

制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路（工业园区）

网址：www.sxsby.com

全国销售专线：4006-965-789

温馨提示：

1.本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的婴幼儿慎用。

2.调奶时请用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲调比例。

秦益

2段

较大婴儿配方奶粉（6-12月龄，2段）

净含量：900克【注册号：国食注字YP20230360】

定边乳业官方微信平台

全国客服热线  
4000-976-365  
工作时间：am: 8:30-12:00 pm: 14:00-17:00

喂哺用量建议表

| 月龄      | 喂哺次数/天 | 温开水量（毫升） | 量匙数/次 |
|---------|--------|----------|-------|
| 第6-9个月  | 4-5    | 180      | 6     |
| 第9-12个月 | 3-4    | 210      | 7     |

每平匙净含量约4.3克

特别提示：

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

冲调方法：

1.冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。

2.冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C，在奶瓶中加入需要量温开水。

3.用量匙量取准确份量（平匙）的较大婴儿配方奶粉加入奶瓶中。

4.盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可喂较大婴儿。

注意事项：

1.水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起宝宝的不适。

2.喂哺时应采取正确的喂哺方法。

3.换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

贮藏及食用方法：

1.本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。

2.将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前置沸水中煮3分钟。

3.根据推荐用量加入水（水温为40°C-50°C）和奶粉，盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可喂哺，喂哺次数参照建议表执行。

**配料表**

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、磷脂、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氧化胆碱、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）

**矿物质：**硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠

**维生素：**维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素

**维生素：**维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素

**维生素：**维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素

| 营养成分表              |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100 1984     |
| 蛋白质                | g       | 0.75 14.90   |
| 脂肪                 | g       | 1.08 21.50   |
| 亚油酸                | g       | 0.11 2.18    |
| α-亚麻酸              | mg      | 15 298       |
| 碳水化合物              | g       | 2.7 53.6     |
| <b>维生素</b>         |         |              |
| 维生素A               | μg RE   | 24 476       |
| 维生素D               | μg      | 0.60 11.90   |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.40 7.94    |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 2.09 41.47   |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 22 436       |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 46 913       |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 16.9 335.3   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.110 2.182  |
| 烟酸（烟酰胺）            | μg      | 152 3016     |
| 叶酸                 | μg      | 3.3 65.5     |
| 泛酸                 | μg      | 203 4028     |
| 维生素C               | mg      | 3.2 63.5     |
| 生物素                | μg      | 0.80 15.87   |
| <b>矿物质</b>         |         |              |
| 钠                  | mg      | 6 119        |
| 钾                  | mg      | 25 496       |
| 铜                  | μg      | 14.1 279.7   |
| 镁                  | mg      | 2.3 45.6     |
| 铁                  | mg      | 0.31 6.15    |
| 锌                  | mg      | 0.20 3.97    |
| 钙                  | mg      | 22 436       |
| 磷                  | mg      | 16 317       |
| 碘                  | μg      | 2.0 39.7     |
| 氯                  | mg      | 16 317       |
| <b>可选择成分</b>       |         |              |
| 硒                  | μg      | 0.60 11.90   |
| 胆碱                 | mg      | 7.0 138.9    |
| 锰                  | μg      | 2.24 44.44   |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6 11.9     |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 0.9 17.9     |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 1.3 25.8     |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.12 2.32    |
| 低聚果糖               | g       | 0.04 0.73    |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.18 3.57    |
| 叶黄素                | μg      | 10.26 203.56 |
| 核苷酸                | mg      | 0.86 17.06   |

100毫升奶液≈12.9克幼儿配方奶粉+90毫升水

食品生产许可证编号：SC12961082500901

产品标准代号：GB 10767-2021

产品类别：幼儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品

产品规格：100克/罐

保质期：24个月

生产日期：见罐底喷码

食品产地：陕西·榆林

制造商：陕西省定边县乳品实业有限公司

制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路（工业园区）

网址：www.sxsby.com

全国销售专线：4006-965-789

**温馨提示：**

1.本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的幼儿慎用。

2.调奶时请用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲调比例。



6 922886 024373

**秦益**



**3段**

幼儿配方奶粉（12-36月龄，3段）

净含量：100克【注册号：国食注字YP20230361】



定边乳业官方微信平台

**全国客服热线**  
4000-976-365  
工作时间：am: 8:30-12:00 pm: 14:00-17:00

**注意事项：**

- 1.水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起幼儿的不适。
- 2.喂哺时应采取正确的喂哺方法。
- 3.换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

**贮藏及食用方法：**

- 1.本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。
- 2.将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前置沸水中煮3分钟。
- 3.根据推荐用量加入水（水温为40°C-50°C）和奶粉，盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可喂哺，喂哺次数参照建议表执行。

**喂哺用量建议表**

| 月龄       | 喂哺次数/天 | 温开水量（毫升） | 量匙数/次 |
|----------|--------|----------|-------|
| 第12-24个月 | 3-4    | 210      | 7     |
| 第24-36个月 | 3-4    | 240      | 8     |

每平匙净含量约4.3克

**特别提示：**

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

**冲调方法：**

- 1.冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。
- 2.冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C，在奶瓶中加入需要量温开水。
- 3.用量匙量取准确份量（平匙）的幼儿配方奶粉加入奶瓶中。
- 4.盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可喂哺喂幼儿。

**配料表**

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、磷脂、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氧化胆碱、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷二钠、5'-尿苷二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二钠、5'-鸟苷二钠）

**矿物质：**硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠

**维生素：**醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素

**营养成分表**

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g  |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 1984   |
| 蛋白质                | g       | 0.75   | 14.90  |
| 脂肪                 | g       | 1.08   | 21.50  |
| 亚油酸                | g       | 0.11   | 2.18   |
| α-亚麻酸              | g       | 15     | 298    |
| 碳水化合物              | g       | 2.7    | 53.6   |
| 维生素                |         |        |        |
| 维生素A               | μg RE   | 24     | 476    |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 11.90  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.40   | 7.94   |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 2.09   | 41.47  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 22     | 436    |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 46     | 913    |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 16.9   | 335.3  |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.110  | 2.182  |
| 烟酸（烟酰胺）            | μg      | 152    | 3016   |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 65.5   |
| 泛酸                 | μg      | 203    | 4028   |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 63.5   |
| 生物素                | μg      | 0.80   | 15.87  |
| 矿物质                |         |        |        |
| 钠                  | mg      | 6      | 119    |
| 钾                  | mg      | 25     | 496    |
| 铜                  | μg      | 14.1   | 279.7  |
| 镁                  | mg      | 2.3    | 45.6   |
| 铁                  | mg      | 0.31   | 6.15   |
| 锌                  | mg      | 0.20   | 3.97   |
| 钙                  | mg      | 22     | 436    |
| 磷                  | mg      | 16     | 317    |
| 氯                  | mg      | 2.0    | 39.7   |
| 可选择成分              |         |        |        |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 11.90  |
| 胆碱                 | mg      | 7.0    | 138.9  |
| 锰                  | μg      | 2.24   | 44.44  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 11.9   |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 0.9    | 17.9   |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 1.3    | 25.8   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.12   | 2.32   |
| 低聚果糖               | g       | 0.04   | 0.73   |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.18   | 3.57   |
| 叶黄素                | μg      | 10.26  | 203.56 |
| 核苷酸                | mg      | 0.86   | 17.06  |

100毫升奶液≈12.9克幼儿配方奶粉+90毫升水

食品生产许可证编号：SC12961082500901

产品标准代号：GB 10767-2021

产品类别：幼儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品

产品规格：350克/罐

保质期：24个月

生产日期：见罐底喷码

食品产地：陕西·榆林

制造商：陕西省定边县乳品实业有限公司

制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路（工业园区）

网址：www.sxsby.com

全国销售专线：4006-965-789

**温馨提示：**

1.本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的幼儿慎用。

2.调奶时请用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲调比例。



6 922886 024359

**秦益**



**3段**

幼儿配方奶粉（12-36月龄，3段）

净含量：350克【注册号：国食注字YP20230361】



定边乳业官方微信平台

**全国客服热线**  
4000-976-365  
工作时间：am: 9:30-12:00 pm: 14:00-17:00

**喂哺用量建议表**

| 月龄       | 喂哺次数/天 | 温开水量（毫升） | 量匙数/次 |
|----------|--------|----------|-------|
| 第12-24个月 | 3-4    | 210      | 7     |
| 第24-36个月 | 3-4    | 240      | 8     |

每平匙净含量约4.3克

**特别提示：**  
食用本产品时，须配合添加辅助食品。

**冲调方法：**

- 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。
- 冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C，在奶瓶中加入需要量温开水。
- 用量匙量取准确份量（平匙）的幼儿配方奶粉加入奶瓶中。
- 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可喂哺幼儿。

**注意事项：**

- 水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起幼儿的不适。
- 喂哺时应采取正确的喂哺方法。
- 换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

**贮藏及食用方法：**

- 本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。
- 将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前置沸水中煮3分钟。
- 根据推荐用量加入水（水温为40°C-50°C）和奶粉，盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可喂哺，喂哺次数参照建议表执行。

**配料表**

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、磷脂、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氧化胆碱、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）

**矿物质：**硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠

**维生素：**维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素

**维生素：**维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素

**维生素：**维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素

**营养成分表**

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g  |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 1984   |
| 蛋白质                | g       | 0.75   | 14.90  |
| 脂肪                 | g       | 1.08   | 21.50  |
| 亚油酸                | g       | 0.11   | 2.18   |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 298    |
| 碳水化合物              | g       | 2.7    | 53.6   |
| 维生素                |         |        |        |
| 维生素A               | μg RE   | 24     | 476    |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 11.90  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.40   | 7.94   |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 2.09   | 41.47  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 22     | 436    |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 46     | 913    |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 16.9   | 335.3  |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.110  | 2.182  |
| 烟酸（烟酰胺）            | μg      | 152    | 3016   |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 65.5   |
| 泛酸                 | μg      | 203    | 4028   |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 63.5   |
| 生物素                | μg      | 0.80   | 15.87  |
| 矿物质                |         |        |        |
| 钠                  | mg      | 6      | 119    |
| 钾                  | mg      | 25     | 496    |
| 铜                  | μg      | 14.1   | 279.7  |
| 镁                  | mg      | 2.3    | 45.6   |
| 铁                  | mg      | 0.31   | 6.15   |
| 锌                  | mg      | 0.20   | 3.97   |
| 钙                  | mg      | 22     | 436    |
| 磷                  | mg      | 16     | 317    |
| 碘                  | μg      | 2.0    | 39.7   |
| 氯                  | mg      | 16     | 317    |
| 可选择成分              |         |        |        |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 11.90  |
| 胆碱                 | mg      | 7.0    | 138.9  |
| 锰                  | μg      | 2.24   | 44.44  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 11.9   |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 0.9    | 17.9   |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 1.3    | 25.8   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.12   | 2.32   |
| 低聚果糖               | g       | 0.04   | 0.73   |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.18   | 3.57   |
| 叶黄素                | μg      | 10.26  | 203.56 |
| 核苷酸                | mg      | 0.86   | 17.06  |

100毫升奶液≈12.9克幼儿配方奶粉+90毫升水

食品生产许可证编号：SC12961082500901

产品标准代号：GB 10767-2021

产品类别：幼儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品

产品规格：400克/罐

保质期：24个月

生产日期：见罐底喷码

食品产地：陕西·榆林

制造商：陕西省定边县乳品实业有限公司

制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路（工业园区）

网址：www.sxsby.com

全国销售专线：4006-965-789

**温馨提示：**

1.本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的幼儿慎用。

2.调奶时请用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲调比例。



6 922886 024403

**秦益**



**3段**

幼儿配方奶粉（12-36月龄，3段）

净含量：400克【注册号：国食注字YP20230361】



定边乳业官方微信平台

**全国客服热线**  
4000-976-365  
工作时间：am: 8:30-12:00 pm: 14:00-17:00

**注意事项：**

- 1.水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起幼儿的不适。
- 2.喂哺时应采取正确的喂哺方法。
- 3.换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

**贮藏及食用方法：**

- 1.本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。
- 2.将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前置沸水中煮3分钟。
- 3.根据推荐用量加入水（水温为40°C-50°C）和奶粉，盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可喂哺，喂哺次数参照建议表执行。

**喂哺用量建议表**

| 月龄       | 喂哺次数/天 | 温开水量（毫升） | 量匙数/次 |
|----------|--------|----------|-------|
| 第12-24个月 | 3-4    | 210      | 7     |
| 第24-36个月 | 3-4    | 240      | 8     |

每平匙净含量约4.3克

**特别提示：**

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

**冲调方法：**

- 1.冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。
- 2.冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C，在奶瓶中加入需要量温开水。
- 3.用量匙量取准确份量（平匙）的幼儿配方奶粉加入奶瓶中。
- 4.盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可喂哺喂哺。


配 方 表

生乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二甘油酯)、硬脂酰甘油、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油、低聚半乳糖、低聚果糖、果胶、花生油、二十二碳六烯酸、氯化钙、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-鸟嘌呤核苷、5'-肌苷核苷、5'-腺苷核苷、5'-鸟苷核苷)、维生素B<sub>2</sub>、硫酸铜、硫酸铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钴、碘酸钾、亚硒酸钠、维生素E、胆酸衍生物、胆钙三醇、d-α生育酚生育醇、植物甲萘醌、盐酸硫氨酸、核黄素、盐酸吡哆醇、羧基肽、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 1984  |
| 蛋白质                | g       | 0.75   | 14.90 |
| 脂肪                 | g       | 1.08   | 21.50 |
| 碳水化合物              | g       | 0.11   | 2.18  |
| 膳食纤维               | mg      | 15     | 298   |
| 总碳水化合物             | g       | 2.7    | 53.6  |
| 维生素类               |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 24     | 476   |
| 维生素D <sub>3</sub>  | μg      | 0.60   | 11.90 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.40   | 7.94  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 2.09   | 41.47 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 22     | 436   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 46     | 913   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 16.9   | 335.3 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.110  | 2.192 |
| 烟酸(尼克酸)            | mg      | 152    | 3036  |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 65.5  |
| D-泛酸               | mg      | 203    | 4028  |
| 维生素C               | mg      | 32     | 63.5  |
| 生物素                | μg      | 0.80   | 15.87 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钾                  | mg      | 6      | 119   |
| 钠                  | mg      | 25     | 496   |
| 钙                  | mg      | 14.1   | 279.7 |
| 镁                  | mg      | 2.3    | 45.6  |
| 磷                  | mg      | 0.31   | 6.15  |
| 氯                  | mg      | 0.20   | 3.97  |
| 铜                  | mg      | 22     | 436   |
| 铁                  | mg      | 16     | 317   |
| 碘                  | mg      | 2.0    | 39.7  |
| 锌                  | mg      | 16     | 317   |
| 可溶性成分              |         |        |       |
| 水                  | g       | 0.60   | 11.90 |
| 蔗糖                 | mg      | 7.0    | 138.9 |
| 淀粉                 | μg      | 2.24   | 44.44 |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.6    | 11.9  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 0.9    | 17.9  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 1.3    | 25.8  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.12   | 2.32  |
| 低聚果糖               | g       | 0.14   | 2.73  |
| 1,3-二甘油酯+棕榈酸甘油三酯   | g       | 0.08   | 0.37  |
| 胆固醇                | mg      | 10.25  | 203.5 |
| 核苷酸                | mg      | 0.85   | 17.06 |

生产食品许可证编号：SC12601082500901  
产品标准代号：GB 10767-2012  
产品类型：幼[儿]配方食品  
产品属性：乳基配方食品  
产品规格：400克/袋  
 请保持环境清洁  
保质期：18个月  
生产日期：见喷码  
产地：陕西·榆林  
制造商：陕西省定边县良民实业有限公司  
制造商地址：陕西省榆林市定边县  
定边镇西环路（工业园区）  
网址：[www.sxsby.com](http://www.sxsby.com)  
全国销售专线：4006-965-789

**温馨提示：**  
1.本品含有乳糖和蛋白质，乳糖不耐受和蛋白过敏体质的幼[儿]慎服。  
2.调奶时请用专用量匙，按罐嘴建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲泡比例。



6 922886 023321

100毫升约含≈12.9毫克幼[儿]配方乳粉+90毫升水

食品生产许可证编号: SC12961082500901  
产品标准代号: GB 10767-2021  
产品类别: 幼儿配方食品  
产品属性: 乳基粉状产品  
产品规格: 400克/袋  
保质期: 18个月  
生产日期: 见喷码  
食品产地: 陕西·榆林  
制造商: 陕西省定边县乳品实业有限公司  
制造商地址: 陕西省榆林市定边县  
定边镇西环路(工业园区)  
网址: [www.sxsby.com](http://www.sxsby.com)  
全国销售专线: 4006-965-789

**温馨提示：**

1.本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的幼儿慎用。

2.调奶时请用专用量匙，按医嘱建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲调比例。



定边乳业官方微信平台



**注意事项:**

- 1.水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起幼儿的不适。
- 2.喂哺时应采取正确的喂哺方法。
- 3.换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

**贮藏及食用方法：**

- 1.本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必封好袋口，以防止吸潮或进入异物。
- 2.将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前置沸水中煮3分钟。
- 3.根据推荐用量加入水（水温为40℃-50℃）和奶粉，盖严奶瓶，轻轻至奶粉充分溶解，即可哺喂，哺喂次数参照建议表执行。

### 喂哺用量建议表

| 月龄       | 喂奶次数/天 | 温开水量<br>(毫升) | 量匙数/ |
|----------|--------|--------------|------|
| 第12~24个月 | 3~4    | 210          | 7    |
| 第24~36个月 | 3~4    | 240          | 8    |

每平匙净含量约4.3克

**特别提示:**

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

**冲调方法：**

- 

冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。
- 

冲调用水应煮沸后冷却至40℃-50℃，在奶瓶中加入需要量温开水。
- 

用量匙取准确份量（平匙）的幼儿配方奶粉加入奶瓶中。
- 

盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可哺喂婴儿。

\_\_\_\_\_

食品生产许可证编号: SC12961082500901  
产品标准代号: GB 10767-2021  
产品类别: 幼儿配方食品  
产品属性: 乳基粉状产品  
产品规格: 700克/罐  
保质期: 24个月  
生产日期: 见罐底喷码  
食品产地: 陕西·榆林  
 请保持  
环境清洁  
制造商: 陕西省定边县榆林实业有限公司  
制造商地址: 陕西省榆林市定边县  
定边镇西环路 (工业园区)  
网址: [www.xsxbxy.com](http://www.xsxbxy.com)  
全国销售专线: 4006-965-789

1.本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的幼儿慎用。

2.调奶时请用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲调比例。



100毫升奶液≈12.9克幼儿配方奶粉+90毫升水

食品生产许可证编号: SC12961082500901  
产品标准代号: GB 10767-2021  
产品分类: 幼儿配方食品  
产品属性: 乳基粉状产品  
产品规格: 700克/罐  
保质期: 24个月  
生产日期: 见罐底喷码  
食品产地: 陕西·榆林  
  
制造商: 陕西省定边县食品实业有限公司  
制造商地址: 陕西省榆林市定边县  
定边镇西环路(工业园区)  
网址: [www.sxsby.com](http://www.sxsby.com)  
全国销售专线: 400-965-789

1.本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的幼儿慎用。

2.调奶时请用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲调比例。



100毫升奶液≈12.9克幼儿配方奶粉+90毫升水

秦益

# 3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

净含量：700克【注册号：国食注字YP20230361】



定边乳业官方微信平台



- 1.水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起幼儿的不适。
- 2.喂哺时应采取正确的喂哺方法。
- 3.换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

- 1.本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。
- 2.将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前置沸水中煮3分钟。
- 3.根据推荐用量加入水（水温为40℃-50℃）和奶粉，盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂，哺喂次数参照建议表执行。

| 月龄       | 喂哺次数/天 | 温开水量(毫升) | 量匙数/次 |
|----------|--------|----------|-------|
| 第12-24个月 | 3-4    | 210      | 7     |
| 第24-36个月 | 3-4    | 240      | 8     |

每平匙净含量约4.3克

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

- 

1 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。
- 

2 冲调用水应煮沸后冷却至40℃-50℃，在奶瓶中加入需要量温开水。
- 

3 用量匙量取准确份量（平匙）的幼儿配方奶粉加入奶瓶中。
- 

4 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可哺喂幼儿。

秦益

3

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

净含量: 800克 [注册号: 国食注字YP20230361]

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、磷脂、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氧化胆碱、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、α-亚麻酸

矿物质: 硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素: 醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g  |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 1984   |
| 蛋白质                | g       | 0.75   | 14.90  |
| 脂肪                 | g       | 1.08   | 21.50  |
| 亚油酸                | g       | 0.11   | 2.18   |
| α-亚麻酸              | g       | 15     | 298    |
| 碳水化合物              | g       | 2.7    | 53.6   |
| 维生素                |         |        |        |
| 维生素A               | μg RE   | 24     | 476    |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 11.90  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.40   | 7.94   |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 2.09   | 41.47  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 22     | 436    |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 46     | 913    |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 16.9   | 335.3  |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.110  | 2.182  |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 152    | 3016   |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 65.5   |
| 泛酸                 | μg      | 203    | 4028   |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 63.5   |
| 生物素                | μg      | 0.80   | 15.87  |
| 矿物质                |         |        |        |
| 钠                  | mg      | 6      | 119    |
| 钾                  | mg      | 25     | 496    |
| 铜                  | μg      | 14.1   | 279.7  |
| 镁                  | mg      | 2.3    | 45.6   |
| 铁                  | mg      | 0.31   | 6.15   |
| 锌                  | mg      | 0.20   | 3.97   |
| 钙                  | mg      | 22     | 436    |
| 磷                  | mg      | 16     | 317    |
| 碘                  | μg      | 2.0    | 39.7   |
| 氯                  | mg      | 16     | 317    |
| 可选择成分              |         |        |        |
| 胆碱                 | μg      | 0.60   | 11.90  |
| 左旋肉碱               | mg      | 7.0    | 138.9  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 2.24   | 44.44  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 0.6    | 11.9   |
| 低聚半乳糖              | mg      | 0.9    | 17.9   |
| 低聚果糖               | mg      | 1.3    | 25.8   |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.12   | 2.32   |
| 叶黄素                | g       | 0.04   | 0.73   |
| 核苷酸                | g       | 0.18   | 3.57   |
| 核黄素                | μg      | 10.26  | 203.56 |
| 氰钴胺                | mg      | 0.86   | 17.06  |

100毫升奶液≈12.9克幼儿配方奶粉+90毫升水

食品生产许可证编号: SC12961082500901

产品标准代号: GB 10767-2021

产品类别: 幼儿配方食品

产品属性: 乳基粉状产品

产品规格: 800克/罐

保质期: 24个月

生产日期: 见罐底喷码

食品产地: 陕西·榆林

制造商: 陕西省定边县乳品实业有限公司

制造商地址: 陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

网址: www.sxsby.com

全国销售专线: 4006-965-789

请保持  
环境清洁

6 1922886102217 1

秦益

3

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

净含量: 800克 [注册号: 国食注字YP20230361]

二维码

定边乳业官方微信平台

全国客服热线

4000-976-365

工作时间: am: 9:30-12:00 pm: 14:00-17:00

注意事项:

1.水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起幼儿的不适。

2.喂奶时应采取正确的喂奶方法。

3.换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

贮藏及食用方法:

1.本品宜贮藏于阴凉干燥处,每次食用后请务必盖紧罐盖,以防止吸潮或进入异物。

2.将奶瓶(奶嘴、奶瓶盖)用清水冲洗干净,使用前置沸水中煮3分钟。

3.根据推荐用量加入水(水温为40°C-50°C)和奶粉,盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,即可哺喂,哺喂次数参照建议表执行。

喂哺用量建议表

| 月龄       | 喂哺次数/天 | 温开水量(毫升) | 量匙数/次 |
|----------|--------|----------|-------|
| 第12-24个月 | 3-4    | 210      | 7     |
| 第24-36个月 | 3-4    | 240      | 8     |

每平匙净含量约4.3克

特别提示:

食用本产品时,须配合添加辅助食品。

冲调方法:

1.冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。

2.冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C,在奶瓶中加入需要量温开水。

3.用量匙量取准确份量(平匙)的幼儿配方奶粉加入奶瓶中。

4.盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜后即可哺喂幼儿。

**配料表**

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、磷脂、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氧化胆碱、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）

**矿物质：**硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠

**维生素：**维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素

**维生素：**维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素

**维生素：**维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素C、生物素

**营养成分表**

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g  |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 1984   |
| 蛋白质                | g       | 0.75   | 14.90  |
| 脂肪                 | g       | 1.08   | 21.50  |
| 亚油酸                | g       | 0.11   | 2.18   |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 298    |
| 碳水化合物              | g       | 2.7    | 53.6   |
| 维生素                |         |        |        |
| 维生素A               | μg RE   | 24     | 476    |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 11.90  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.40   | 7.94   |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 2.09   | 41.47  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 22     | 436    |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 46     | 913    |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 16.9   | 335.3  |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.110  | 2.182  |
| 烟酸（烟酰胺）            | μg      | 152    | 3016   |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 65.5   |
| 泛酸                 | μg      | 203    | 4028   |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 63.5   |
| 生物素                | μg      | 0.80   | 15.87  |
| 矿物质                |         |        |        |
| 钠                  | mg      | 6      | 119    |
| 钾                  | mg      | 25     | 496    |
| 铜                  | μg      | 14.1   | 279.7  |
| 镁                  | mg      | 2.3    | 45.6   |
| 铁                  | mg      | 0.31   | 6.15   |
| 锌                  | mg      | 0.20   | 3.97   |
| 钙                  | mg      | 22     | 436    |
| 磷                  | mg      | 16     | 317    |
| 碘                  | μg      | 2.0    | 39.7   |
| 氯                  | mg      | 16     | 317    |
| 可选择成分              |         |        |        |
| 胆碱                 | μg      | 0.60   | 11.90  |
| 左旋肉碱               | μg      | 7.0    | 138.9  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 0.6    | 11.9   |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 0.9    | 17.9   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.12   | 2.32   |
| 低聚果糖               | g       | 0.04   | 0.73   |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.18   | 3.57   |
| 叶黄素                | μg      | 10.26  | 203.56 |
| 核苷酸                | mg      | 0.86   | 17.06  |

100毫升奶液≈12.9克幼儿配方奶粉+90毫升水

食品生产许可证编号：SC12961082500901

产品标准代号：GB 10767-2021

产品类别：幼儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品

产品规格：900克/罐

保质期：24个月

生产日期：见罐底喷码

食品产地：陕西·榆林

制造商：陕西省定边县乳品实业有限公司

制造商地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路（工业园区）

网址：www.sxsby.com

全国销售专线：4006-965-789

**温馨提示：**

1.本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐受和乳蛋白过敏体质的幼儿慎用。

2.调奶时请用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经专业人士建议，请勿擅自改变冲调比例。

**秦益**

**3段**

**幼儿配方奶粉（12-36月龄，3段）**

净含量：900克【注册号：国食注字YP20230361】

**喂哺用量建议表**

| 月龄       | 喂哺次数/天 | 温开水量（毫升） | 量匙数/次 |
|----------|--------|----------|-------|
| 第12-24个月 | 3-4    | 210      | 7     |
| 第24-36个月 | 3-4    | 240      | 8     |

每平匙净含量约4.3克

**特别提示：**

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

**冲调方法：**

- 冲调前洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸3分钟。
- 冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C，在奶瓶中加入需要量温开水。
- 用量匙量取准确份量（平匙）的幼儿配方奶粉加入奶瓶中。
- 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜后即可喂哺喂幼儿。

**注意事项：**

- 水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当可能会引起幼儿的不适。
- 喂哺时应采取正确的喂哺方法。
- 换奶时替代品牌要逐步适量添加直到宝宝完全适应。

**贮藏及食用方法：**

- 本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止吸潮或进入异物。
- 将奶瓶（奶嘴、奶瓶盖）用清水冲洗干净，使用前置沸水中煮3分钟。
- 根据推荐用量加入水（水温为40°C-50°C）和奶粉，盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可喂哺，喂哺次数参照建议表执行。

**全国客服热线**

**4000-976-365**

工作时间：am: 8:30-12:00 pm: 14:00-17:00

定边乳业官方微信平台

| 营养成分表              |         |        |       |                   |                 |
|--------------------|---------|--------|-------|-------------------|-----------------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g | 项目                | 单位 每100kJ 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2038  | 钠                 | mg 9 183        |
| 蛋白质                | g       | 0.60   | 12.30 | 钾                 | mg 23 469       |
| 脂肪                 | g       | 1.15   | 23.40 | 铜                 | μg 18.6 379.1   |
| 亚油酸                | g       | 0.15   | 3.06  | 镁                 | mg 1.7 34.6     |
| α-亚麻酸              | mg      | 19     | 387   | 铁                 | mg 0.23 4.69    |
| 碳水化合物              | g       | 2.7    | 55.1  | 锌                 | mg 0.24 4.89    |
| 维生素                |         |        |       | 锰                 | μg 2.47 50.34   |
| 维生素A               | μg RE   | 20     | 408   | 钙                 | mg 16 326       |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.23 | 磷                 | mg 11 224       |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.46   | 9.37  | 碘                 | μg 4.9 99.9     |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.98   | 40.35 | 氯                 | mg 16 326       |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 20     | 408   | 硒                 | μg 0.90 18.34   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 42     | 856   | 可选择成分             |                 |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.0   | 346.5 | 牛磺酸               | mg 1.8 36.7     |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.090  | 1.834 | 二十二碳六烯酸           | mg 4.5 91.7     |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 153    | 3118  | 二十碳四烯酸            | mg 4.9 99.9     |
| 叶酸                 | μg      | 4.0    | 81.5  | 低聚半乳糖             | g 0.10 2.04     |
| 泛酸                 | μg      | 155    | 3159  | 低聚果糖              | g 0.06 1.22     |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 65.2  | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g 0.27 5.50     |
| 生物素                | mg      | 0.70   | 14.27 | 叶黄素               | μg 3.01 61.34   |
| 胆碱                 | mg      | 6.7    | 136.5 |                   |                 |
| 矿物质                |         |        |       |                   |                 |

| 配料表                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、牛磺酸、叶黄素 |  |
| 矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠                                                |  |
| 维生素:醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱                 |  |

净含量:75克  
国食注字YP20230365

1段

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

| 喂哺用量建议表 |        |      |              |               |
|---------|--------|------|--------------|---------------|
| 月龄      | 每次奶粉用量 |      | 温开水量<br>(毫升) | 每24小时<br>喂哺次数 |
|         | 平均勺数   | 克    |              |               |
| 0-2星期   | 2      | 8.6  | 60           | 8-9           |
| 2-4星期   | 3      | 12.9 | 90           | 6-7           |
| 1-2个月   | 4      | 17.2 | 120          | 5-6           |
| 2-4个月   | 5      | 21.5 | 150          | 5-6           |
| 4-6个月   | 6      | 25.8 | 180          | 5-6           |

说明:每平均净含量约4.3克  
注:调奶时只可用专用量勺。以上的喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,除非专业人士另有指示,请参照喂哺用量建议表冲调。请勿多加奶粉量,使其浓度过高;也请勿减少奶粉量或增加开水量,使其浓度过低,婴儿得不到适量的营养,可能引起身体不适或虚弱。每次喂哺后剩下的奶水,不要再喂哺宝宝。  
特别提示:  
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

食品生产许可证编号:SC12961082500901  
产品标准代号:GB 10765-2021  
产品类别:婴儿配方食品  
产品属性:乳基粉状产品  
产品规格:75克/罐  
保质期:24个月  
生产日期:见罐底  
食品产地:陕西·榆林  
制造商:陕西省定边县乳品实业有限公司  
制造商地址:陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)  
网址:www.sxsby.com  
全国销售专线:4006-965-789

| 冲调方法 |                                      |
|------|--------------------------------------|
|      | 1、冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5分钟。   |
|      | 2、冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C,在奶瓶中加入需要量温开水。 |
|      | 3、用量匙量取准确份量(平匙)的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。        |
|      | 4、盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜后即可喂哺。         |

贮藏条件  
本品应存放于阴凉干燥洁净处。每次食用完后,请盖紧罐口。请勿放在冰箱内及高温、潮湿的环境中,以免影响产品的品质。

全国客服热线  
400-029-6216

6 922886 023222



1段

净含量:400克  
国食注字YP20230365

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、牛磺酸、叶黄素

矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素:维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸(烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

贮藏条件

本品应存放于阴凉干燥处,每次食用完后,请封好袋口。请勿放在冰箱内及高温、潮湿的环境中,以免影响产品的品质。

食品生产许可证编号:SC12961082500901  
产品标准代号:GB 10765-2021  
产品类别:婴儿配方食品  
产品属性:乳基粉状产品  
产品规格:400克/袋  
保质期:18个月  
生产日期:见喷码  
食品产地:陕西 榆林  
制造商:陕西省定边县乳品实业有限公司  
制造商地址:陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

网址:www.sxsby.com  
全国销售专线:4006-965-789



营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2038  |
| 蛋白质                | g       | 0.60   | 12.30 |
| 脂肪                 | g       | 1.15   | 23.40 |
| 亚油酸                | g       | 0.15   | 3.06  |
| α-亚麻酸              | mg      | 19     | 387   |
| 碳水化合物              | g       | 2.7    | 55.1  |
| 维生素A               | μg RE   | 20     | 408   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.23 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.46   | 9.37  |
| 维生素K               | μg      | 1.98   | 40.35 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 20     | 408   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 42     | 856   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.0   | 346.5 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.090  | 1.834 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 153    | 3118  |
| 叶酸                 | μg      | 4.0    | 81.5  |
| 泛酸                 | μg      | 155    | 3159  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 65.2  |
| 生物素                | μg      | 0.70   | 14.27 |
| 胆碱                 | mg      | 6.7    | 136.5 |

|     |    |      |
|-----|----|------|
| 矿物质 |    |      |
| 钠   | mg | 9    |
| 钾   | mg | 23   |
| 铜   | μg | 18.6 |
| 镁   | mg | 1.7  |
| 铁   | mg | 0.23 |
| 锌   | mg | 0.24 |
| 锰   | μg | 2.47 |
| 钙   | mg | 16   |
| 磷   | mg | 11   |
| 碘   | μg | 4.9  |
| 氯   | mg | 16   |
| 硒   | μg | 0.90 |

|                   |    |      |
|-------------------|----|------|
| 可选择成分             |    |      |
| 牛磺酸               | mg | 1.8  |
| 二十二碳六烯酸           | mg | 4.5  |
| 二十碳四烯酸            | mg | 4.9  |
| 低聚半乳糖             | g  | 0.10 |
| 低聚果糖              | g  | 0.06 |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g  | 0.27 |
| 叶黄素               | μg | 3.01 |

100毫升奶液≈12.9克婴儿配方羊奶粉+90毫升水

全国客服热线  
400-029-6216



喂哺用量建议表

| 月龄    | 每次奶粉用量 |      | 温开水量<br>(毫升) | 每24小时<br>喂哺次数 |
|-------|--------|------|--------------|---------------|
|       | 平均数    | 克    |              |               |
| 0-2星期 | 2      | 8.6  | 60           | 8-9           |
| 2-4星期 | 3      | 12.9 | 90           | 6-7           |
| 1-2个月 | 4      | 17.2 | 120          | 5-6           |
| 2-4个月 | 5      | 21.5 | 150          | 5-6           |
| 4-6个月 | 6      | 25.8 | 180          | 5-6           |

说明:每平均净含量约4.3克

注:调奶时只可用专用量勺。以上的喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,除非专业人士另有指示,请参照喂哺用量建议表冲调。请勿多加奶粉量,使其浓度过高;也请勿减少奶粉量或增加开水量,使其浓度过低,婴儿得不到适量的营养,可能引起身体不适或虚弱。每次喂哺后剩下的奶水,不要再喂哺宝宝。

特别提示:  
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲调方法



1、冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5分钟。



2、冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C,在奶瓶中加入需要量温开水。



3、用量匙量取准确份量(平匙)的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。



4、盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜后即可喂哺。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、牛磺酸、叶黄素

**矿物质:**柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

**维生素:**醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

贮藏条件

本品应存放于阴凉干燥洁净处。每次食用完后,请盖紧罐口。请勿放在冰箱内及高温、潮湿的环境中,以免影响产品的品质。

食品生产许可证编号:SC12961082500901  
产品标准代号:GB 10765-2021  
产品类别:婴儿配方食品  
产品属性:乳基粉状产品  
产品规格:700克/罐  
保质期:24个月  
生产日期:见罐底  
食品产地:陕西·榆林  
制造商:陕西省定边县乳品实业有限公司  
制造商地址:陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)  
网址:www.sxsby.com  
全国销售专线:4006-965-789

6 922886 025059

100毫升奶液≈12.9克婴儿配方羊奶粉+90毫升水

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2038  |
| 蛋白质                | g       | 0.60   | 12.30 |
| 脂肪                 | g       | 1.15   | 23.40 |
| 亚油酸                | g       | 0.15   | 3.06  |
| α-亚麻酸              | mg      | 19     | 387   |
| 碳水化合物              | g       | 2.7    | 55.1  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 20     | 408   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.23 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.46   | 9.37  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.98   | 40.35 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 20     | 408   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 42     | 856   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.0   | 346.5 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.090  | 1.834 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 153    | 3118  |
| 叶酸                 | μg      | 4.0    | 81.5  |
| 泛酸                 | μg      | 155    | 3159  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 65.2  |
| 生物素                | μg      | 0.70   | 14.27 |
| 胆碱                 | mg      | 6.7    | 136.5 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 9      | 183   |
| 钾                  | mg      | 23     | 469   |
| 铜                  | μg      | 18.6   | 379.1 |
| 镁                  | mg      | 1.7    | 34.6  |
| 铁                  | mg      | 0.23   | 4.69  |
| 锌                  | mg      | 0.24   | 4.89  |
| 锰                  | μg      | 2.47   | 50.34 |
| 钙                  | mg      | 16     | 326   |
| 磷                  | mg      | 11     | 224   |
| 碘                  | μg      | 4.9    | 99.9  |
| 氯                  | mg      | 16     | 326   |
| 硒                  | μg      | 0.90   | 18.34 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 牛磺酸                | mg      | 1.8    | 36.7  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.5    | 91.7  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.9    | 99.9  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.10   | 2.04  |
| 低聚果糖               | g       | 0.06   | 1.22  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.27   | 5.50  |
| 叶黄素                | μg      | 3.01   | 61.34 |

爱贝优®

秦悦

1段

净含量:700克  
国食注字YP20230365

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

全国客服热线  
400-029-6216

喂养用量建议表

| 月龄    | 每次奶粉用量 |      | 温开水量<br>(毫升) | 每24小时<br>喂奶次数 |
|-------|--------|------|--------------|---------------|
|       | 平均数    | 克    |              |               |
| 0-2星期 | 2      | 8.6  | 60           | 8-9           |
| 2-4星期 | 3      | 12.9 | 90           | 6-7           |
| 1-2个月 | 4      | 17.2 | 120          | 5-6           |
| 2-4个月 | 5      | 21.5 | 150          | 5-6           |
| 4-6个月 | 6      | 25.8 | 180          | 5-6           |

说明:每平均净含量约4.3克

冲调方法

1、冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5分钟。

2、冲调用水应煮沸后冷却至40℃-50℃,在奶瓶中加入需要量温开水。

3、用量匙量取准确份量(平匙)的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。

4、盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜后即可喂哺。

注:调奶时只可用专用量勺。以上的喂养用量建议表是根据平均的需要量而定,除非专业人士另有指示,请参照喂养用量建议表冲调。请勿多加奶粉量,使其浓度过高;也请勿减少奶粉量或增加开水量,使其浓度过低,婴儿得不到适量的营养,可能引起身体不适或虚弱。每次喂哺后剩下的奶水,不要再喂哺宝宝。

特别提示:

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、牛磺酸、叶黄素

**矿物质:**柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

**维生素:**醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

贮藏条件

本品应存放于阴凉干燥处。每次食用完后,请盖紧罐口。请勿放在冰箱内及高温、潮湿的环境中,以免影响产品的品质。

食品生产许可证编号:SC12961082500901  
产品标准代号:GB 10765-2021  
产品类别:婴儿配方食品  
产品属性:乳基粉状产品  
产品规格:800克/罐  
保质期:24个月  
生产日期:见罐底  
食品产地:陕西·榆林  
制造商:陕西省定边县乳品实业有限公司  
制造商地址:陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)  
网址:www.sxsby.com  
全国销售专线:4006-965-789

6 922886 022201

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2038  |
| 蛋白质                | g       | 0.60   | 12.30 |
| 脂肪                 | g       | 1.15   | 23.40 |
| 亚油酸                | g       | 0.15   | 3.06  |
| α-亚麻酸              | mg      | 19     | 387   |
| 碳水化合物              | g       | 2.7    | 55.1  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 20     | 408   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.23 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.46   | 9.37  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.98   | 40.35 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 20     | 408   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 42     | 856   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 17.0   | 346.5 |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.090  | 1.834 |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 153    | 3118  |
| 叶酸                 | μg      | 4.0    | 81.5  |
| 泛酸                 | μg      | 155    | 3159  |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 65.2  |
| 生物素                | μg      | 0.70   | 14.27 |
| 胆碱                 | mg      | 6.7    | 136.5 |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 9      | 183   |
| 钾                  | mg      | 23     | 469   |
| 铜                  | μg      | 18.6   | 379.1 |
| 镁                  | mg      | 1.7    | 34.6  |
| 铁                  | mg      | 0.23   | 4.69  |
| 锌                  | mg      | 0.24   | 4.89  |
| 锰                  | μg      | 2.47   | 50.34 |
| 钙                  | mg      | 16     | 326   |
| 磷                  | mg      | 11     | 224   |
| 碘                  | μg      | 4.9    | 99.9  |
| 氯                  | mg      | 16     | 326   |
| 硒                  | μg      | 0.90   | 18.34 |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 牛磺酸                | mg      | 1.8    | 36.7  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.5    | 91.7  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.9    | 99.9  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.10   | 2.04  |
| 低聚果糖               | g       | 0.06   | 1.22  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.27   | 5.50  |
| 叶黄素                | μg      | 3.01   | 61.34 |

100毫升奶液≈12.9克婴儿配方羊奶粉+90毫升水

爱贝优®

秦悦

1段

净含量:800克  
国食注字YP20230365

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

全国客服热线  
400-029-6216



喂哺用量建议表

| 月龄    | 每次奶粉用量 |      | 温开水量<br>(毫升) | 每24小时<br>喂哺次数 |
|-------|--------|------|--------------|---------------|
|       | 平均数    | 克    |              |               |
| 0-2星期 | 2      | 8.6  | 60           | 8-9           |
| 2-4星期 | 3      | 12.9 | 90           | 6-7           |
| 1-2个月 | 4      | 17.2 | 120          | 5-6           |
| 2-4个月 | 5      | 21.5 | 150          | 5-6           |
| 4-6个月 | 6      | 25.8 | 180          | 5-6           |

说明:每平均净含量约4.3克

冲调方法



1、冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5分钟。



2、冲调用水应煮沸后冷却至40℃-50℃,在奶瓶中加入需要量温开水。



3、用量匙量取准确份量(平匙)的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。



4、盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜后即可喂哺。

注:调奶时只可用专用量勺。以上的喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,除非专业人士另有指示,请参照喂哺用量建议表冲调。请勿多加奶粉量,使其浓度过高;也请勿减少奶粉量或增加开水量,使其浓度过低,婴儿得不到适量的营养,可能引起身体不适或虚弱。每次喂哺后剩下的奶水,不要再喂哺宝宝。

**特别提示:**  
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



净含量:400克  
国食注字YP20230368

2段

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、牛磺酸、叶黄素

矿物质:硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素:醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl- $\alpha$ -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

贮藏条件

本品应存放于阴凉干燥处。每次食用完后,请封好袋口。请勿放在冰箱内及高温、潮湿的环境中,以免影响产品的品质。

食品生产许可证编号:SC12961082500901  
产品标准代号:GB 10766-2021  
产品类别:较大婴儿配方食品  
产品属性:乳基粉状产品  
产品规格:400克/袋  
保质期:18个月  
生产日期:见喷码  
食品产地:陕西-榆林  
制造商:陕西省定边县乳品实业有限公司  
制造商地址:陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)

网址:www.sxsby.com  
全国销售专线:4006-965-789



营养成分表

| 项目                 | 单位              | 每100kJ | 每100g  |
|--------------------|-----------------|--------|--------|
| 能量                 | kJ              | 100    | 2008   |
| 蛋白质                | g               | 0.69   | 13.90  |
| 脂肪                 | g               | 1.12   | 22.40  |
| 亚油酸                | g               | 0.12   | 2.41   |
| $\alpha$ -亚麻酸      | mg              | 16     | 321    |
| 碳水化合物              | g               | 2.7    | 54.0   |
| 维生素                |                 |        |        |
| 维生素A               | $\mu$ g RE      | 23     | 462    |
| 维生素D               | $\mu$ g         | 0.60   | 12.05  |
| 维生素E               | mg $\alpha$ -TE | 0.44   | 8.84   |
| 维生素K <sub>1</sub>  | $\mu$ g         | 2.04   | 40.96  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | $\mu$ g         | 22     | 442    |
| 维生素B <sub>2</sub>  | $\mu$ g         | 44     | 884    |
| 维生素B <sub>6</sub>  | $\mu$ g         | 16.1   | 323.3  |
| 维生素B <sub>12</sub> | $\mu$ g         | 0.091  | 1.827  |
| 烟酸(烟酰胺)            | $\mu$ g         | 160    | 3213   |
| 叶酸                 | $\mu$ g         | 3.4    | 68.3   |
| 泛酸                 | $\mu$ g         | 202    | 4056   |
| 维生素C               | mg              | 3.3    | 66.3   |
| 生物素                | $\mu$ g         | 0.77   | 15.46  |
| 胆碱                 | mg              | 6.9    | 138.6  |
| 矿物质                |                 |        |        |
| 钠                  | mg              | 6      | 120    |
| 钾                  | mg              | 23     | 462    |
| 铜                  | $\mu$ g         | 17.6   | 353.4  |
| 镁                  | mg              | 1.9    | 38.2   |
| 铁                  | mg              | 0.34   | 6.83   |
| 锌                  | mg              | 0.22   | 4.42   |
| 锰                  | $\mu$ g         | 2.27   | 45.58  |
| 钙                  | mg              | 22     | 442    |
| 磷                  | mg              | 15     | 301    |
| 碘                  | $\mu$ g         | 5.1    | 102.4  |
| 氯                  | mg              | 17     | 341    |
| 硒                  | $\mu$ g         | 0.60   | 12.05  |
| 可选择成分              |                 |        |        |
| 牛磺酸                | mg              | 1.9    | 38.2   |
| 二十二碳六烯酸            | mg              | 4.5    | 90.4   |
| 二十碳四烯酸             | mg              | 5.0    | 100.4  |
| 低聚半乳糖              | g               | 0.10   | 2.07   |
| 低聚果糖               | g               | 0.05   | 1.09   |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g               | 0.23   | 4.62   |
| 叶黄素                | $\mu$ g         | 10.42  | 209.23 |

100毫升奶液 $\approx$ 12.9克较大婴儿配方羊奶粉+90毫升水



喂哺用量建议表

| 月龄     | 每次奶粉用量 |      | 温开水量<br>(毫升) | 每24小时<br>喂哺次数 |
|--------|--------|------|--------------|---------------|
|        | 平均数    | 克    |              |               |
| 6-9个月  | 6      | 25.8 | 180          | 4-5           |
| 9-12个月 | 7      | 30.1 | 210          | 3-4           |

说明:每平均净含量约4.3克

注:调奶时只可用专用量勺。以上的喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,除非专业人士另有指示,请参照喂哺用量建议表冲调。请勿多加奶粉量,使其浓度过高;也请勿减少奶粉量或增加开水量,使其浓度过低。婴儿得不到适量的营养,可能引起身体不适或虚弱。每次喂哺后剩下的奶水,不要再喂哺宝宝。

特别提示:  
食用本产品时,须配合添加辅助食品。

冲调方法

- 1、冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5分钟。
- 2、冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C,在奶瓶中加入需要量温开水。
- 3、用量匙量取准确份量(平匙)的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。
- 4、盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜后即可喂哺。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、牛磺酸、叶黄素

**矿物质:**硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

**维生素:**醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g  |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2008   |
| 蛋白质                | g       | 0.69   | 13.90  |
| 脂肪                 | g       | 1.12   | 22.40  |
| 亚油酸                | g       | 0.12   | 2.41   |
| α-亚麻酸              | mg      | 16     | 321    |
| 碳水化合物              | g       | 2.7    | 54.0   |
| <b>维生素</b>         |         |        |        |
| 维生素A               | μg RE   | 23     | 462    |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.05  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.44   | 8.84   |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 2.04   | 40.96  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 22     | 442    |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 44     | 884    |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 16.1   | 323.3  |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.091  | 1.827  |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 160    | 3213   |
| 叶酸                 | μg      | 3.4    | 68.3   |
| 泛酸                 | μg      | 202    | 4056   |
| 维生素C               | mg      | 3.3    | 66.3   |
| 生物素                | μg      | 0.77   | 15.46  |
| 胆碱                 | mg      | 6.9    | 138.6  |
| <b>矿物质</b>         |         |        |        |
| 钠                  | mg      | 6      | 120    |
| 钾                  | mg      | 23     | 462    |
| 铜                  | μg      | 17.6   | 353.4  |
| 镁                  | mg      | 1.9    | 38.2   |
| 铁                  | mg      | 0.34   | 6.83   |
| 锌                  | mg      | 0.22   | 4.42   |
| 锰                  | μg      | 2.27   | 45.58  |
| 钙                  | mg      | 22     | 442    |
| 磷                  | mg      | 15     | 301    |
| 碘                  | μg      | 5.1    | 102.4  |
| 氯                  | mg      | 17     | 341    |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.05  |
| <b>可选择成分</b>       |         |        |        |
| 牛磺酸                | mg      | 1.9    | 38.2   |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.5    | 90.4   |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 5.0    | 100.4  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.10   | 2.07   |
| 低聚果糖               | g       | 0.05   | 1.09   |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.23   | 4.62   |
| 叶黄素                | μg      | 10.42  | 209.23 |

100毫升奶液≈12.9克较大婴儿配方羊奶粉+90毫升水

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、牛磺酸、叶黄素

**矿物质:**硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

**维生素:**醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱

贮藏条件

本品应存放于阴凉干燥洁净处。每次食用完后,请盖紧罐口。请勿放在冰箱内及高温、潮湿的环境中,以免影响产品的品质。

食品生产许可证编号:SC12961082500901  
产品标准代号:GB 10766-2021  
产品类别:较大婴儿配方食品  
产品属性:乳基粉状产品  
产品规格:700克/罐  
保质期:24个月  
生产日期:见罐底  
食品产地:陕西·榆林  
制造商:陕西省定边县乳品实业有限公司  
制造商地址:陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)  
网址:www.sxsby.com  
全国销售专线:4006-965-789

6 922886 025066

爱贝优®

秦悦

2段

净含量:700克  
国食注字YP20230368

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

全国客服热线  
400-029-6216

喂哺用量建议表

| 月龄     | 每次奶粉用量 |      | 温开水量<br>(毫升) | 每24小时<br>喂哺次数 |
|--------|--------|------|--------------|---------------|
|        | 平均数    | 克    |              |               |
| 6-9个月  | 6      | 25.8 | 180          | 4-5           |
| 9-12个月 | 7      | 30.1 | 210          | 3-4           |

说明:每平均净含量约4.3克

冲调方法

1、冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5分钟。

2、冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C,在奶瓶中加入需要量温开水。

3、用量匙量取准确份量(平匙)的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。

4、盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜后即可喂哺。

注:调奶时只可用专用量勺。以上的喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,除非专业人士另有指示,请参照喂哺用量建议表冲调。请勿多加奶粉量,使其浓度过高;也请勿减少奶粉量或增加开水量,使其浓度过低,婴儿得不到适量的营养,可能引起身体不适或虚弱。每次喂哺后剩下的奶水,不要再喂哺宝宝。

**特别提示:**  
食用本产品时,须配合添加辅助食品。



标签 50

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、磷脂、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氯化胆碱、牛磺酸、叶黄素

矿物质:硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碳酸钾、亚硒酸钠

维生素:醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素

贮藏条件

本品应存放于阴凉干燥处。每次食用完后,请封好袋口。请勿放在冰箱内及高温、潮湿的环境中,以免影响产品的品质。

食品生产许可证编号:SC12961082500901  
产品标准代号:GB 10767-2021  
产品类别:幼儿配方食品  
产品属性:乳基粉状产品  
产品规格:400克/袋  
保质期:18个月  
生产日期:见喷码  
食品产地:陕西-榆林  
制造商:陕西省定边县乳品实业有限公司  
制造商地址:陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区)  
网址:www.sxsby.com  
全国销售专线:4006-965-789

6 922886 023291

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g  |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 1974   |
| 蛋白质                | g       | 0.73   | 14.40  |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.10  |
| 亚油酸                | g       | 0.11   | 2.17   |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 296    |
| 碳水化合物              | g       | 2.8    | 54.3   |
| 维生素                |         |        |        |
| 维生素A               | μg RE   | 25     | 494    |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 11.84  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.43   | 8.49   |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 2.04   | 40.27  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 21     | 415    |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 35     | 691    |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 16.3   | 321.8  |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.095  | 1.875  |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 167    | 3297   |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 65.1   |
| 泛酸                 | μg      | 213    | 4205   |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 63.2   |
| 生物素                | μg      | 0.80   | 15.79  |
| 矿物质                |         |        |        |
| 钠                  | mg      | 8      | 158    |
| 钾                  | mg      | 26     | 513    |
| 铜                  | μg      | 14.7   | 290.2  |
| 镁                  | mg      | 2.0    | 39.5   |
| 铁                  | mg      | 0.35   | 6.91   |
| 锌                  | mg      | 0.20   | 3.95   |
| 钙                  | mg      | 22     | 434    |
| 磷                  | mg      | 14     | 276    |
| 碘                  | μg      | 3.2    | 63.2   |
| 氯                  | mg      | 21     | 415    |
| 可选择成分              |         |        |        |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 11.84  |
| 胆碱                 | mg      | 6.9    | 136.2  |
| 锰                  | μg      | 2.72   | 53.69  |
| 牛磺酸                | mg      | 1.6    | 31.6   |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 0.9    | 17.8   |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 1.7    | 33.6   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.10   | 2.07   |
| 低聚果糖               | g       | 0.06   | 1.10   |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.22   | 4.34   |
| 叶黄素                | μg      | 10.42  | 205.69 |

100毫升奶液≈12.9克幼儿配方羊奶粉+90毫升水

爱贝优  
Aibeiyou

秦悦

3段

净含量:400克  
国食注字YP20230366

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

全国客服热线  
400-029-6216

喂哺用量建议表

| 月龄      | 每次奶粉用量 |      | 温开水量<br>(毫升) | 每24小时<br>喂哺次数 |
|---------|--------|------|--------------|---------------|
|         | 平勺数    | 克    |              |               |
| 12-24个月 | 7      | 30.1 | 210          | 3-4           |
| 24-36个月 | 8      | 34.4 | 240          | 3-4           |

说明:每平均净含量约4.3克

冲调方法

1、冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5分钟。

2、冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C,在奶瓶中加入需要量温开水。

3、用量匙量取准确份量(平匙)的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶中。

4、盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜后即可喂哺。

注:调奶时只可用专用量勺。以上的喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,除非专业人士另有指示,请参照喂哺用量建议表冲调。请勿多加奶粉量,使其浓度过高;也请勿减少奶粉量或增加开水量,使其浓度过低,幼儿得不到适量的营养,可能引起身体不适或虚弱。每次喂哺后剩下的奶水,不要再喂哺宝宝。

特别提示:  
食用本产品时,须配合添加辅助食品。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、磷脂、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氯化胆碱、牛磺酸、叶黄素

矿物质:硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素:醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g  |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 1974   |
| 蛋白质                | g       | 0.73   | 14.40  |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.10  |
| 亚油酸                | g       | 0.11   | 2.17   |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 296    |
| 碳水化合物              | g       | 2.8    | 54.3   |
| 维生素                |         |        |        |
| 维生素A               | μg RE   | 25     | 494    |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 11.84  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.43   | 8.49   |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 2.04   | 40.27  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 21     | 415    |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 35     | 691    |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 16.3   | 321.8  |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.095  | 1.875  |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 167    | 3297   |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 65.1   |
| 泛酸                 | μg      | 213    | 4205   |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 63.2   |
| 生物素                | μg      | 0.80   | 15.79  |
| 矿物质                |         |        |        |
| 钠                  | mg      | 8      | 158    |
| 钾                  | mg      | 26     | 513    |
| 铜                  | μg      | 14.7   | 290.2  |
| 镁                  | mg      | 2.0    | 39.5   |
| 铁                  | mg      | 0.35   | 6.91   |
| 锌                  | mg      | 0.20   | 3.95   |
| 钙                  | mg      | 22     | 434    |
| 磷                  | mg      | 14     | 276    |
| 碘                  | μg      | 3.2    | 63.2   |
| 氯                  | mg      | 21     | 415    |
| 可选择成分              |         |        |        |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 11.84  |
| 胆碱                 | mg      | 6.9    | 136.2  |
| 锰                  | μg      | 2.72   | 53.69  |
| 牛磺酸                | mg      | 1.6    | 31.6   |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 0.9    | 17.8   |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 1.7    | 33.6   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.10   | 2.07   |
| 低聚果糖               | g       | 0.06   | 1.10   |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.22   | 4.34   |
| 叶黄素                | μg      | 10.42  | 205.69 |

100毫升奶液≈12.9克幼儿配方羊奶粉+90毫升水

爱贝优®

秦悦

3段

净含量:700克

国食注字YP20230366

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

全国客服热线

400-029-6216

爱贝优®

秦悦

喂哺用量建议表

| 月龄      | 每次奶粉用量 |      | 温开水量<br>(毫升) | 每24小时<br>喂哺次数 |
|---------|--------|------|--------------|---------------|
|         | 平均数    | 克    |              |               |
| 12-24个月 | 7      | 30.1 | 210          | 3-4           |
| 24-36个月 | 8      | 34.4 | 240          | 3-4           |

说明:每平勺净含量约4.3克

冲调方法

1、冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5分钟。

2、冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C,在奶瓶中加入需要量温开水。

3、用量匙量取准确份量(平匙)的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶中。

4、盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜后即可喂哺。

注:调奶时只可用专用量勺。以上的喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,除非专业人士另有指示,请参照喂哺用量建议表冲调。请勿多加奶粉量,使其浓度过高;也请勿减少奶粉量或增加开水量,使其浓度过低,幼儿得不到适量的营养,可能引起身体不适或虚弱。每次喂哺后剩下的奶水,不要再喂哺宝宝。

特别提示:  
食用本产品时,须配合添加辅助食品。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、磷脂、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氯化胆碱、牛磺酸、叶黄素

矿物质:硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、碘酸钾、亚硒酸钠

维生素:维生素A、维生素D、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸、维生素C、生物素

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g  |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 1974   |
| 蛋白质                | g       | 0.73   | 14.40  |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.10  |
| 亚油酸                | g       | 0.11   | 2.17   |
| α-亚麻酸              | mg      | 15     | 296    |
| 碳水化合物              | g       | 2.8    | 54.3   |
| 维生素A               | μg RE   | 25     | 494    |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 11.84  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.43   | 8.49   |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 2.04   | 40.27  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 21     | 415    |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 35     | 691    |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 16.3   | 321.8  |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.095  | 1.875  |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 167    | 3297   |
| 叶酸                 | μg      | 3.3    | 65.1   |
| 泛酸                 | μg      | 213    | 4205   |
| 维生素C               | mg      | 3.2    | 63.2   |
| 生物素                | μg      | 0.80   | 15.79  |
| 矿物质                |         |        |        |
| 钠                  | mg      | 8      | 158    |
| 钾                  | mg      | 26     | 513    |
| 铜                  | μg      | 14.7   | 290.2  |
| 镁                  | mg      | 2.0    | 39.5   |
| 铁                  | mg      | 0.35   | 6.91   |
| 锌                  | mg      | 0.20   | 3.95   |
| 钙                  | mg      | 22     | 434    |
| 磷                  | mg      | 14     | 276    |
| 碘                  | μg      | 3.2    | 63.2   |
| 氯                  | mg      | 21     | 415    |
| 可选择成分              |         |        |        |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 11.84  |
| 胆碱                 | mg      | 6.9    | 136.2  |
| 锰                  | μg      | 2.72   | 53.69  |
| 牛磺酸                | mg      | 1.6    | 31.6   |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 0.9    | 17.8   |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 1.7    | 33.6   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.10   | 2.07   |
| 低聚果糖               | g       | 0.06   | 1.10   |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.22   | 4.34   |
| 叶黄素                | μg      | 10.42  | 205.69 |

爱贝优®

秦悦

3段

净含量:800克  
国食注字YP20230366

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

全国客服热线  
400-029-6216

爱贝优®

喂哺用量建议表

| 月龄      | 每次奶粉用量 |      | 温开水量<br>(毫升) | 每24小时<br>喂哺次数 |
|---------|--------|------|--------------|---------------|
|         | 平均数    | 克    |              |               |
| 12-24个月 | 7      | 30.1 | 210          | 3-4           |
| 24-36个月 | 8      | 34.4 | 240          | 3-4           |

说明:每平勺净含量约4.3克

冲调方法



1、冲调前洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖放入清水中煮沸5分钟。



2、冲调用水应煮沸后冷却至40°C-50°C,在奶瓶中加入需要量温开水。



3、用量匙量取准确份量(平匙)的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶中。



4、盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜后即可喂哺。



6 922886 022225

100毫升奶液≈12.9克幼儿配方羊奶粉+90毫升水