

附件 2：陕西圣唐乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 1

食用方法

1

2

3

4

5

1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。

2、将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40℃-50℃，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。

3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。

4、盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。

5、滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量(平匙)	温开水量(毫升)	
0-2周	2	60	8
2-4周	3	90	7
1-2个月	4	120	6
2-3个月	5	150	6
3-4个月	6	180	5
4-6个月	7	210	5

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉≈4.4克。

温馨提示

1、对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂哺或加热后超过2小时的奶液勿再食用。

3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

贮存条件

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免阳光直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商：陕西圣唐乳业有限公司

地址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发中安路中段东侧

产地：陕西·渭南

电话：0913-8228385(工厂)

产品标准代号：GB 10765-2021

食品生产许可证编号：SC10561052802876

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品

生产日期/批号：见罐底

保质期：24个月

如需了解更多产品信息，请登录 www.bioshine.cn

营养咨询热线：400-893-8886

6970942487150

倍恩喜

唯尔普思

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

1

净含量：800克

国食注字YP20230217

配 料 表			
生乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、大豆油、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸一钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-胡萝卜素、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化钴、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱；矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠。			
过敏提示：本品含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆及其制品，对其过敏者慎用。			
营 养 成 分 表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2048
蛋白质	g	0.61	12.40
脂肪	g	1.16	23.80
亚油酸	g	0.15	3.07
α-亚麻酸	mg	19	389
碳水化合物	g	2.7	55.0
维生素A	μg RE	22	451
维生素D	μg	0.60	12.29
维生素E	mg α-TE	0.37	7.58
维生素K ₁	μg	1.83	37.48
维生素B ₁	μg	19	389
维生素B ₂	μg	28	573
维生素B ₆	μg	16.8	344.1
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.413
烟酸(烟酰胺)	μg	131	2683
叶酸	μg	4.0	81.9
泛酸	μg	134	2744
维生素C	mg	4.1	84.0
生物素	μg	0.49	10.04
胆碱	mg	6.0	122.9
矿物质	mg	9	184
钠	mg	22	451
钾	mg	18.5	378.9
铜	μg	1.5	30.7
镁	mg	0.19	3.89
铁	mg	0.21	4.30
锌	μg	4.57	93.59
钙	mg	16	328
磷	mg	10	205
碘	μg	4.8	98.3
氯	mg	16	328
硒	μg	0.90	18.43
可选择成分	mg	2.8	57.3
肌醇	mg	1.7	34.8
牛磺酸	mg	0.9	18.4
左旋肉碱	mg	4.5	92.2
二十二碳六烯酸	mg	5.0	102.4
二十碳四烯酸	g	0.04	0.82
低聚半乳糖	g	0.09	1.84
低聚果糖	g	0.24	4.92
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	μg	408	83.56
叶黄素	mg	0.9	18.4
核苷酸	mg	0.9	18.4

100毫升奶液≈13.2克 婴儿配方羊奶粉+90毫升水

- 1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
- 2、将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40°C-50°C，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
- 3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
- 4、盖紧奶瓶，摇晃至奶粉充分溶解。
- 5、滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量(平匙)	温开水量(毫升)	
0-2周	2	60	8
2-4周	3	90	7
1-2个月	4	120	6
2-3个月	5	150	6
3-4个月	6	180	5
4-6个月	7	210	5

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉,一平匙奶粉约4.4克。

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量(平匙)	温开水量(毫升)	
0-2周	2	60	8
2-4周	3	90	7
1-2个月	4	120	6
2-3个月	5	150	6
3-4个月	6	180	5
4-6个月	7	210	5

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉,一平匙奶粉约4.4克。

- 1、对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
- 3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商: 陕西圣唐乳业有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
产地: 陕西·渭南
电话: 0913-8228385(工厂)

产品标准代号: GB 10765-2021
食品生产许可证编号: SC10561052802876
产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品
生产日期/批号: 见罐底

保质期：24个月
如需了解更多产品信息，请登录 www.bioshine.cn
营养咨询热线：

400-893-8886



6 970942 485279



圣唐
SHENG TANG

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)

国食注字YP20230217

[illegible]

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2048
蛋白质	g	0.61	12.40
脂肪	g	1.16	23.80
亚油酸	g	0.15	3.07
α -亚麻酸	g	19	389
碳水化合物	g	2.7	55.0
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	22	451
维生素D	μg	0.60	12.29
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.37	7.58
维生素K ₁	μg	37.48	763
维生素B ₁	μg	19	389
维生素B ₂	μg	28	573
维生素B ₆	μg	16.8	344.1
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.413
烟酸(烟酰胺)	μg	131	2683
叶酸	μg	4.0	81.9
泛酸	μg	134	2744
维生素C	mg	4.1	84.0
生物素	μg	0.49	10.04
胆碱	mg	6.0	122.9
矿物质			
钠	mg	9	184
钾	mg	22	451
铜	μg	18.5	379.9
镁	mg	1.5	30.7
铁	mg	0.19	3.89
锌	mg	0.21	4.30
锰	μg	4.57	93.59
钙	mg	16	328
磷	mg	10	205
碘	μg	4.8	98.3
硒	μg	16	328
氯	μg	0.90	18.43
可选择成分			
乳醇	mg	2.8	57.3
牛磺酸	mg	1.7	34.8
左旋肉碱	mg	0.9	18.4
二十-碳六烯酸	mg	4.5	92.2
二十-碳四烯酸	mg	5.0	102.4
低聚半乳糖	g	0.04	0.82
低聚果糖	g	0.05	1.84
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.92
叶黄素	μg	4.08	83.56
核苷酸	mg	0.9	18.4

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2048
蛋白质	g	0.61	12.40
脂肪	g	1.16	23.80
亚油酸	g	0.15	3.07
α -亚麻酸	g	19	389
碳水化合物	g	2.7	55.0
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	22	451
维生素D	μg	0.60	12.29
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.37	7.58
维生素K ₁	μg	37.48	763
维生素B ₁	μg	19	389
维生素B ₂	μg	28	573
维生素B ₆	μg	16.8	344.1
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.413
烟酸(烟酰胺)	μg	131	2683
叶酸	μg	4.0	81.9
泛酸	μg	134	2744
维生素C	mg	4.1	84.0
生物素	μg	0.49	10.04
胆碱	mg	6.0	122.9
矿物质			
钠	mg	9	184
钾	mg	22	451
铜	μg	18.5	379.9
镁	mg	1.5	30.7
铁	mg	0.19	3.89
锌	mg	0.21	4.30
锰	μg	4.57	93.59
钙	mg	16	328
磷	mg	10	205
碘	μg	4.8	98.3
硒	μg	16	328
氯	μg	0.90	18.43
可选择成分			
乳醇	mg	2.8	57.3
牛磺酸	mg	1.7	34.8
左旋肉碱	mg	0.9	18.4
二十-碳六烯酸	mg	4.5	92.2
二十-碳四烯酸	mg	5.0	102.4
低聚半乳糖	g	0.04	0.82
低聚果糖	g	0.05	1.84
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.92
叶黄素	μg	4.08	83.56
核苷酸	mg	0.9	18.4

1
2
3
4
5

1. 冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
2. 将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40℃-50℃，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
3. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
4. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
5. 滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜后即可喂哺。

喂 哺 建 议 表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量 (平匙)	温开水量 (毫升)	
0-2周	2	60	8
2-4周	3	90	7
1-2个月	4	120	6
2-3个月	5	150	6
3-4个月	6	180	5
4-6个月	7	210	5

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉≈4.4克。

温 馨 提 示

1. 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2. 请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液请勿食用。
3. 密封盖如有遗失或破损请勿食用。

贮 存 方 案

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免阳光直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完毕，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商：陕西圣唐乳业有限公司

地址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发中段东段

产地：陕西-渭南

电话：0913-8228385(工厂)

产品标准代号：GB 10765-2021

食品生产许可证编号：SC10561052802876

产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品

生产日期/批号：见罐底

保质期：24个月

如需了解更多信息，请登录 www.bioshine.cn

营养咨询热线：

400-893-8886



6 1970942 485828

倍恩喜

圣唐®

唯尔普思

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

1

净含量: 428克
国食注字YP20230217

配 料 表

生乳乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、大豆油、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸、5'-胞苷二钠、5'-尿苷二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019;维生素A、维生素E、胆酸肌黄醇、胆钙化醇、dl-α-生育酚生育醇、植物甲萘酚、亚硫酸胺、维生素C、维生素B₁₂、维生素B₆、烟酰胺、维生素B₂、维生素B₅、维生素B₉、维生素B₇、维生素B₈、维生素B₁₀、维生素B₁₁、维生素B₁₃、维生素B₁₄、维生素B₁₅、维生素B₁₆、维生素B₁₇、维生素B₁₈、维生素B₁₉、维生素B₂₀、维生素B₂₁、维生素B₂₂、维生素B₂₃、维生素B₂₄、维生素B₂₅、维生素B₂₆、维生素B₂₇、维生素B₂₈、维生素B₂₉、维生素B₃₀、维生素B₃₁、维生素B₃₂、维生素B₃₃、维生素B₃₄、维生素B₃₅、维生素B₃₆、维生素B₃₇、维生素B₃₈、维生素B₃₉、维生素B₄₀、维生素B₄₁、维生素B₄₂、维生素B₄₃、维生素B₄₄、维生素B₄₅、维生素B₄₆、维生素B₄₇、维生素B₄₈、维生素B₄₉、维生素B₅₀、维生素B₅₁、维生素B₅₂、维生素B₅₃、维生素B₅₄、维生素B₅₅、维生素B₅₆、维生素B₅₇、维生素B₅₈、维生素B₅₉、维生素B₆₀、维生素B₆₁、维生素B₆₂、维生素B₆₃、维生素B₆₄、维生素B₆₅、维生素B₆₆、维生素B₆₇、维生素B₆₈、维生素B₆₉、维生素B₇₀、维生素B₇₁、维生素B₇₂、维生素B₇₃、维生素B₇₄、维生素B₇₅、维生素B₇₆、维生素B₇₇、维生素B₇₈、维生素B₇₉、维生素B₈₀、维生素B₈₁、维生素B₈₂、维生素B₈₃、维生素B₈₄、维生素B₈₅、维生素B₈₆、维生素B₈₇、维生素B₈₈、维生素B₈₉、维生素B₉₀、维生素B₉₁、维生素B₉₂、维生素B₉₃、维生素B₉₄、维生素B₉₅、维生素B₉₆、维生素B₉₇、维生素B₉₈、维生素B₉₉、维生素B₁₀₀、维生素B₁₀₁、维生素B₁₀₂、维生素B₁₀₃、维生素B₁₀₄、维生素B₁₀₅、维生素B₁₀₆、维生素B₁₀₇、维生素B₁₀₈、维生素B₁₀₉、维生素B₁₁₀、维生素B₁₁₁、维生素B₁₁₂、维生素B₁₁₃、维生素B₁₁₄、维生素B₁₁₅、维生素B₁₁₆、维生素B₁₁₇、维生素B₁₁₈、维生素B₁₁₉、维生素B₁₂₀、维生素B₁₂₁、维生素B₁₂₂、维生素B₁₂₃、维生素B₁₂₄、维生素B₁₂₅、维生素B₁₂₆、维生素B₁₂₇、维生素B₁₂₈、维生素B₁₂₉、维生素B₁₃₀、维生素B₁₃₁、维生素B₁₃₂、维生素B₁₃₃、维生素B₁₃₄、维生素B₁₃₅、维生素B₁₃₆、维生素B₁₃₇、维生素B₁₃₈、维生素B₁₃₉、维生素B₁₄₀、维生素B₁₄₁、维生素B₁₄₂、维生素B₁₄₃、维生素B₁₄₄、维生素B₁₄₅、维生素B₁₄₆、维生素B₁₄₇、维生素B₁₄₈、维生素B₁₄₉、维生素B₁₅₀、维生素B₁₅₁、维生素B₁₅₂、维生素B₁₅₃、维生素B₁₅₄、维生素B₁₅₅、维生素B₁₅₆、维生素B₁₅₇、维生素B₁₅₈、维生素B₁₅₉、维生素B₁₆₀、维生素B₁₆₁、维生素B₁₆₂、维生素B₁₆₃、维生素B₁₆₄、维生素B₁₆₅、维生素B₁₆₆、维生素B₁₆₇、维生素B₁₆₈、维生素B₁₆₉、维生素B₁₇₀、维生素B₁₇₁、维生素B₁₇₂、维生素B₁₇₃、维生素B₁₇₄、维生素B₁₇₅、维生素B₁₇₆、维生素B₁₇₇、维生素B₁₇₈、维生素B₁₇₉、维生素B₁₈₀、维生素B₁₈₁、维生素B₁₈₂、维生素B₁₈₃、维生素B₁₈₄、维生素B₁₈₅、维生素B₁₈₆、维生素B₁₈₇、维生素B₁₈₈、维生素B₁₈₉、维生素B₁₉₀、维生素B₁₉₁、维生素B₁₉₂、维生素B₁₉₃、维生素B₁₉₄、维生素B₁₉₅、维生素B₁₉₆、维生素B₁₉₇、维生素B₁₉₈、维生素B₁₉₉、维生素B₂₀₀、维生素B₂₀₁、维生素B₂₀₂、维生素B₂₀₃、维生素B₂₀₄、维生素B₂₀₅、维生素B₂₀₆、维生素B₂₀₇、维生素B₂₀₈、维生素B₂₀₉、维生素B₂₁₀、维生素B₂₁₁、维生素B₂₁₂、维生素B₂₁₃、维生素B₂₁₄、维生素B₂₁₅、维生素B₂₁₆、维生素B₂₁₇、维生素B₂₁₈、维生素B₂₁₉、维生素B₂₂₀、维生素B₂₂₁、维生素B₂₂₂、维生素B₂₂₃、维生素B₂₂₄、维生素B₂₂₅、维生素B₂₂₆、维生素B₂₂₇、维生素B₂₂₈、维生素B₂₂₉、维生素B₂₃₀、维生素B₂₃₁、维生素B₂₃₂、维生素B₂₃₃、维生素B₂₃₄、维生素B₂₃₅、维生素B₂₃₆、维生素B₂₃₇、维生素B₂₃₈、维生素B₂₃₉、维生素B₂₄₀、维生素B₂₄₁、维生素B₂₄₂、维生素B₂₄₃、维生素B₂₄₄、维生素B₂₄₅、维生素B₂₄₆、维生素B₂₄₇、维生素B₂₄₈、维生素B₂₄₉、维生素B₂₅₀、维生素B₂₅₁、维生素B₂₅₂、维生素B₂₅₃、维生素B₂₅₄、维生素B₂₅₅、维生素B₂₅₆、维生素B₂₅₇、维生素B₂₅₈、维生素B₂₅₉、维生素B₂₆₀、维生素B₂₆₁、维生素B₂₆₂、维生素B₂₆₃、维生素B₂₆₄、维生素B₂₆₅、维生素B₂₆₆、维生素B₂₆₇、维生素B₂₆₈、维生素B₂₆₉、维生素B₂₇₀、维生素B₂₇₁、维生素B₂₇₂、维生素B₂₇₃、维生素B₂₇₄、维生素B₂₇₅、维生素B₂₇₆、维生素B₂₇₇、维生素B₂₇₈、维生素B₂₇₉、维生素B₂₈₀、维生素B₂₈₁、维生素B₂₈₂、维生素B₂₈₃、维生素B₂₈₄、维生素B₂₈₅、维生素B₂₈₆、维生素B₂₈₇、维生素B₂₈₈、维生素B₂₈₉、维生素B₂₉₀、维生素B₂₉₁、维生素B₂₉₂、维生素B₂₉₃、维生素B₂₉₄、维生素B₂₉₅、维生素B₂₉₆、维生素B₂₉₇、维生素B₂₉₈、维生素B₂₉₉、维生素B₃₀₀、维生素B₃₀₁、维生素B₃₀₂、维生素B₃₀₃、维生素B₃₀₄、维生素B₃₀₅、维生素B₃₀₆、维生素B₃₀₇、维生素B₃₀₈、维生素B₃₀₉、维生素B₃₁₀、维生素B₃₁₁、维生素B₃₁₂、维生素B₃₁₃、维生素B₃₁₄、维生素B₃₁₅、维生素B₃₁₆、维生素B₃₁₇、维生素B₃₁₈、维生素B₃₁₉、维生素B₃₂₀、维生素B₃₂₁、维生素B₃₂₂、维生素B₃₂₃、维生素B₃₂₄、维生素B₃₂₅、维生素B₃₂₆、维生素B₃₂₇、维生素B₃₂₈、维生素B₃₂₉、维生素B₃₃₀、维生素B₃₃₁、维生素B₃₃₂、维生素B₃₃₃、维生素B₃₃₄、维生素B₃₃₅、维生素B₃₃₆、维生素B₃₃₇、维生素B₃₃₈、维生素B₃₃₉、维生素B₃₄₀、维生素B₃₄₁、维生素B₃₄₂、维生素B₃₄₃、维生素B₃₄₄、维生素B₃₄₅、维生素B₃₄₆、维生素B₃₄₇、维生素B₃₄₈、维生素B₃₄₉、维生素B₃₅₀、维生素B₃₅₁、维生素B₃₅₂、维生素B₃₅₃、维生素B₃₅₄、维生素B₃₅₅、维生素B₃₅₆、维生素B₃₅₇、维生素B₃₅₈、维生素B₃₅₉、维生素B₃₆₀、维生素B₃₆₁、维生素B₃₆₂、维生素B₃₆₃、维生素B₃₆₄、维生素B₃₆₅、维生素B₃₆₆、维生素B₃₆₇、维生素B₃₆₈、维生素B₃₆₉、维生素B₃₇₀、维生素B₃₇₁、维生素B₃₇₂、维生素B₃₇₃、维生素B₃₇₄、维生素B₃₇₅、维生素B₃₇₆、维生素B₃₇₇、维生素B₃₇₈、维生素B₃₇₉、维生素B₃₈₀、维生素B₃₈₁、维生素B₃₈₂、维生素B₃₈₃、维生素B₃₈₄、维生素B₃₈₅、维生素B₃₈₆、维生素B₃₈₇、维生素B₃₈₈、维生素B₃₈₉、维生素B₃₉₀、维生素B₃₉₁、维生素B₃₉₂、维生素B₃₉₃、维生素B₃₉₄、维生素B₃₉₅、维生素B₃₉₆、维生素B₃₉₇、维生素B₃₉₈、维生素B₃₉₉、维生素B₄₀₀、维生素B₄₀₁、维生素B₄₀₂、维生素B₄₀₃、维生素B₄₀₄、维生素B₄₀₅、维生素B₄₀₆、维生素B₄₀₇、维生素B₄₀₈、维生素B₄₀₉、维生素B₄₁₀、维生素B₄₁₁、维生素B₄₁₂、维生素B₄₁₃、维生素B₄₁₄、维生素B₄₁₅、维生素B₄₁₆、维生素B₄₁₇、维生素B₄₁₈、维生素B₄₁₉、维生素B₄₂₀、维生素B₄₂₁、维生素B₄₂₂、维生素B₄₂₃、维生素B₄₂₄、维生素B₄₂₅、维生素B₄₂₆、维生素B₄₂₇、维生素B₄₂₈、维生素B₄₂₉、维生素B₄₃₀、维生素B₄₃₁、维生素B₄₃₂、维生素B₄₃₃、维生素B₄₃₄、维生素B₄₃₅、维生素B₄₃₆、维生素B₄₃₇、维生素B₄₃₈、维生素B₄₃₉、维生素B₄₄₀、维生素B₄₄₁、维生素B₄₄₂、维生素B₄₄₃、维生素B₄₄₄、维生素B₄₄₅、维生素B₄₄₆、维生素B₄₄₇、维生素B₄₄₈、维生素B₄₄₉、维生素B₄₅₀、维生素B₄₅₁、维生素B₄₅₂、维生素B₄₅₃、维生素B₄₅₄、维生素B₄₅₅、维生素B₄₅₆、维生素B₄₅₇、维生素B₄₅₈、维生素B₄₅₉、维生素B₄₆₀、维生素B₄₆₁、维生素B₄₆₂、维生素B₄₆₃、维生素B₄₆₄、维生素B₄₆₅、维生素B₄₆₆、维生素B₄₆₇、维生素B₄₆₈、维生素B₄₆₉、维生素B₄₇₀、维生素B₄₇₁、维生素B₄₇₂、维生素B₄₇₃、维生素B₄₇₄、维生素B₄₇₅、维生素B₄₇₆、维生素B₄₇₇、维生素B₄₇₈、维生素B₄₇₉、维生素B₄₈₀、维生素B₄₈₁、维生素B₄₈₂、维生素B₄₈₃、维生素B₄₈₄、维生素B₄₈₅、维生素B₄₈₆、维生素B₄₈₇、维生素B₄₈₈、维生素B₄₈₉、维生素B₄₉₀、维生素B₄₉₁、维生素B₄₉₂、维生素B₄₉₃、维生素B₄₉₄、维生素B₄₉₅、维生素B₄₉₆、维生素B₄₉₇、维生素B₄₉₈、维生素B₄₉₉、维生素B₅₀₀、维生素B₅₀₁、维生素B₅₀₂、维生素B₅₀₃、维生素B₅₀₄、维生素B₅₀₅、维生素B₅₀₆、维生素B₅₀₇、维生素B₅₀₈、维生素B₅₀₉、维生素B₅₁₀、维生素B₅₁₁、维生素B₅₁₂、维生素B₅₁₃、维生素B₅₁₄、维生素B₅₁₅、维生素B₅₁₆、维生素B₅₁₇、维生素B₅₁₈、维生素B₅₁₉、维生素B₅₂₀、维生素B₅₂₁、维生素B₅₂₂、维生素B₅₂₃、维生素B₅₂₄、维生素B₅₂₅、维生素B₅₂₆、维生素B₅₂₇、维生素B₅₂₈、维生素B₅₂₉、维生素B₅₃₀、维生素B₅₃₁、维生素B₅₃₂、维生素B₅₃₃、维生素B₅₃₄、维生素B₅₃₅、维生素B₅₃₆、维生素B₅₃₇、维生素B₅₃₈、维生素B₅₃₉、维生素B₅₄₀、维生素B₅₄₁、维生素B₅₄₂、维生素B₅₄₃、维生素B₅₄₄、维生素B₅₄₅、维生素B₅₄₆、维生素B₅₄₇、维生素B₅₄₈、维生素B₅₄₉、维生素B₅₅₀、维生素B₅₅₁、维生素B₅₅₂、维生素B₅₅₃、维生素B₅₅₄、维生素B₅₅₅、维生素B₅₅₆、维生素B₅₅₇、维生素B₅₅₈、维生素B₅₅₉、维生素B₅₆₀、维生素B₅₆₁、维生素B₅₆₂、维生素B₅₆₃、维生素B₅₆₄、维生素B₅₆₅、维生素B₅₆₆、维生素B₅₆₇、维生素B₅₆₈、维生素B₅₆₉、维生素B₅₇₀、维生素B₅₇₁、维生素B₅₇₂、维生素B₅₇₃、维生素B₅₇₄、维生素B₅₇₅、维生素B₅₇₆、维生素B₅₇₇、维生素B₅₇₈、维生素B₅₇₉、维生素B₅₈₀、维生素B₅₈₁、维生素B₅₈₂、维生素B₅₈₃、维生素B₅₈₄、维生素B₅₈₅、维生素B₅₈₆、维生素B₅₈₇、维生素B₅₈₈、维生素B₅₈₉、维生素B₅₉₀、维生素B₅₉₁、维生素B₅₉₂、维生素B₅₉₃、维生素B₅₉₄、维生素B₅₉₅、维生素B₅₉₆、维生素B₅₉₇、维生素B₅₉₈、维生素B₅₉₉、维生素B₆₀₀、维生素B₆₀₁、维生素B₆₀₂、维生素B₆₀₃、维生素B₆₀₄、维生素B₆₀₅、维生素B₆₀₆、维生素B₆₀₇、维生素B₆₀₈、维生素B₆₀₉、维生素B₆₁₀、维生素B₆₁₁、维生素B₆₁₂、维生素B₆₁₃、维生素B₆₁₄、维生素B₆₁₅、维生素B₆₁₆、维生素B₆₁₇、维生素B₆₁₈、维生素B₆₁₉、维生素B₆₂₀、维生素B₆₂₁、维生素B₆₂₂、维生素B₆₂₃、维生素B₆₂₄、维生素B₆₂₅、维生素B₆₂₆、维生素B₆₂₇、维生素B₆₂₈、维生素B₆₂₉、维生素B₆₃₀、维生素B₆₃₁、维生素B₆₃₂、维生素B₆₃₃、维生素B₆₃₄、维生素B₆₃₅、维生素B₆₃₆、维生素B₆₃₇、维生素B₆₃₈、维生素B₆₃₉、维生素B₆₄₀、维生素B₆₄₁、维生素B₆₄₂、维生素B₆₄₃、维生素B₆₄₄、维生素B₆₄₅、维生素B₆₄₆、维生素B₆₄₇、维生素B₆₄₈、维生素B₆₄₉、维生素B₆₅₀、维生素B₆₅₁、维生素B₆₅₂、维生素B₆₅₃、维生素B₆₅₄、维生素B₆₅₅、维生素B₆₅₆、维生素B₆₅₇、维生素B₆₅₈、维生素B₆₅₉、维生素B₆₆₀、维生素B₆₆₁、维生素B₆₆₂、维生素B₆₆₃、维生素B₆₆₄、维生素B₆₆₅、维生素B₆₆₆、维生素B₆₆₇、维生素B₆₆₈、维生素B₆₆₉、维生素B₆₇₀、维生素B₆₇₁、维生素B₆₇₂、维生素B₆₇₃、维生素B₆₇₄、维生素B₆₇₅、维生素B₆₇₆、维生素B₆₇₇、维生素B₆₇₈、维生素B₆₇₉、维生素B₆₈₀、维生素B₆₈₁、维生素B₆₈₂、维生素B₆₈₃、维生素B₆₈₄、维生素B₆₈₅、维生素B₆₈₆、维生素B₆₈₇、维生素B₆₈₈、维生素B₆₈₉、维生素B₆₉₀、维生素B₆₉₁、维生素B₆₉₂、维生素B₆₉₃、维生素B₆₉₄、维生素B₆₉₅、维生素B₆₉₆、维生素B₆₉₇、维生素B₆₉₈、维生素B₆₉₉、维生素B₇₀₀、维生素B₇₀₁、维生素B₇₀₂、维生素B₇₀₃、维生素B₇₀₄、维生素B₇₀₅、维生素B₇₀₆、维生素B₇₀₇、维生素B₇₀₈、维生素B₇₀₉、维生素B₇₁₀、维生素B₇₁₁、维生素B₇₁₂、维生素B₇₁₃、维生素B₇₁₄、维生素B₇₁₅、维生素B₇₁₆、维生素B₇₁₇、维生素B₇₁₈、维生素B₇₁₉、维生素B₇₂₀、维生素B₇₂₁、维生素B₇₂₂、维生素B₇₂₃、维生素B₇₂₄、维生素B₇₂₅、维生素B₇₂₆、维生素B₇₂₇、维生素B₇₂₈、维生素B₇₂₉、维生素B₇₃₀、维生素B₇₃₁、维生素B₇₃₂、维生素B₇₃₃、维生素B₇₃₄、维生素B₇₃₅、维生素B₇₃₆、维生素B₇₃₇、维生素B₇₃₈、维生素B₇₃₉、维生素B₇₄₀、维生素B₇₄₁、维生素B₇₄₂、维生素B₇₄₃、维生素B₇₄₄、维生素B₇₄₅、维生素B₇₄₆、维生素B₇₄₇、维生素B₇₄₈、维生素B₇₄₉、维生素B₇₅₀、维生素B₇₅₁、维生素B₇₅₂、维生素B₇₅₃、维生素B₇₅₄、维生素B₇₅₅、维生素B₇₅₆、维生素B₇₅₇、维生素B₇₅₈、维生素B₇₅₉、维生素B₇₆₀、维生素B₇₆₁、维生素B₇₆₂、维生素B₇₆₃、维生素B₇₆₄、维生素B₇₆₅、维生素B₇₆₆、维生素B₇₆₇、维生素B₇₆₈、维生素B₇₆₉、维生素B₇₇₀、维生素B₇₇₁、维生素B₇₇₂、维生素B₇₇₃、维生素B₇₇₄、维生素B₇₇₅、维生素B₇₇₆、维生素B₇₇₇、维生素B₇₇₈、维生素B₇₇₉、维生素B₇₈₀、维生素B₇₈₁、维生素B₇₈₂、维生素B₇₈₃、维生素B₇₈₄、维生素B₇₈₅、维生素B₇₈₆、维生素B₇₈₇、维生素B₇₈₈、维生素B₇₈₉、维生素B₇₉₀、维生素B₇₉₁、维生素B₇₉₂、维生素B₇₉₃、维生素B₇₉₄、维生素B₇₉₅、维生素B₇₉₆、维生素B₇₉₇、维生素B₇₉₈、维生素B₇₉₉、维生素B₈₀₀、维生素B₈₀₁、维生素B₈₀₂、维生素B₈₀₃、维生素B₈₀₄、维生素B₈₀₅、维生素B₈₀₆、维生素B₈₀₇、维生素B₈₀₈、维生素B₈₀₉、维生素B₈₁₀、维生素B₈₁₁、维生素B₈₁₂、维生素B₈₁₃、维生素B₈₁₄、维生素B₈₁₅、维生素B₈₁₆、维生素B₈₁₇、维生素B₈₁₈、维生素B₈₁₉、维生素B₈₂₀、维生素B₈₂₁、维生素B₈₂₂、维生素B₈₂₃、维生素B₈₂₄、维生素B₈₂₅、维生素B₈₂₆、维生素B₈₂₇、维生素B₈₂₈、维生素B₈₂₉、维生素B₈₃₀、维生素B₈₃₁、维生素B₈₃₂、维生素B₈₃₃、维生素B₈₃₄、维生素B₈₃₅、维生素B₈₃₆、维生素B₈₃₇、维生素B₈₃₈、维生素B₈₃₉、维生素B₈₄₀、维生素B₈₄₁、维生素B₈₄₂、维生素B₈₄₃、维生素B₈₄₄、维生素B₈₄₅、维生素B₈₄₆、维生素B₈₄₇、维生素B₈₄₈、维生素B₈₄₉、维生素B₈₅₀、维生素B₈₅₁、维生素B₈₅₂、维生素B₈₅₃、维生素B₈₅₄、维生素B₈₅₅、维生素B₈₅₆、维生素B₈₅₇、维生素B₈₅₈、维生素B₈₅₉、维生素B₈₆₀、维生素B₈₆₁、维生素B₈₆₂、维生素B₈₆₃、维生素B₈₆₄、维生素B₈₆₅、维生素B₈₆₆、维生素B₈₆₇、维生素B₈₆₈、维生素B₈₆₉、维生素B₈₇₀、维生素B₈₇₁、维生素B₈₇₂、维生素B₈₇₃、维生素B₈₇₄、维生素B₈₇₅、维生素B₈₇₆、维生素B₈₇₇、维生素B₈₇₈、维生素B₈₇₉、维生素B₈₈₀、维生素B₈₈₁、维生素B₈₈₂、维生素B₈₈₃、维生素B₈₈₄、维生素B₈₈₅、维生素B₈₈₆、维生素B₈₈₇、维生素B₈₈₈、维生素B₈₈₉、维生素B₈₉₀、维生素B₈₉₁、维生素B₈₉₂、维生素B₈₉₃、维生素B₈₉₄、维生素B₈₉₅、维生素B₈₉₆、维生素B₈₉₇、维生素B₈₉₈、维生素B₈₉₉、维生素B₉₀₀、维生素B₉₀₁、维生素B₉₀₂、维生素B₉₀₃、维生素B₉₀₄、维生素B₉₀₅、维生素B₉₀₆、维生素B₉₀₇、维生素B₉₀₈、维生素B₉₀₉、维生素B₉₁₀、维生素B₉₁₁、维生素B₉₁₂、维生素B₉₁₃、维生素B₉₁₄、维生素B₉₁₅、维生素B₉₁₆、维生素B₉₁₇、维生素B₉₁₈、维生素B₉₁₉、维生素B₉₂₀、维生素B₉₂₁、维生素B₉₂₂、维生素B₉₂₃、维生素B₉₂₄、维生素B₉₂₅、维生素B₉₂₆、维生素B₉₂₇、维生素B₉₂₈、维生素B₉₂₉、维生素B₉₃₀、维生素B₉₃₁、维生素B₉₃₂、维生素B₉₃₃、维生素B₉₃₄、维生素B₉₃₅、维生素B₉₃₆、维生素B₉₃₇、维生素B₉₃₈、维生素B₉₃₉、维生素B₉₄₀、维生素B₉₄₁、维生素B₉₄₂、维生素B₉₄₃、维生素B₉₄₄、维生素B₉₄₅、维生素B₉₄₆、维生素B₉₄₇、维生素B₉₄₈、维生素B₉₄₉、维生素B₉₅₀、维生素B₉₅₁、维生素B₉₅₂、维生素B₉₅₃、维生素B₉₅₄、维生素B₉₅₅、维生素B₉₅₆、维生素B₉₅₇、维生素B₉₅₈、维生素B₉₅₉、维生素B₉₆₀、维生素B₉₆₁、维生素B₉₆₂、维生素B₉₆₃、维生素B₉₆₄、维生素B₉₆₅、维生素B₉₆₆、维生素B₉₆₇、维生素B₉₆₈、维生素B₉₆₉、维生素B₉₇₀、维生素B₉₇₁、维生素B₉₇₂、维生素B₉₇₃、维生素B₉₇₄、维生素B₉₇₅、维生素B₉₇₆、维生素B₉₇₇、维生素B₉₇₈、维生素B₉₇₉、维生素B₉₈₀、维生素B₉₈₁、维生素B₉₈₂、维生素B₉₈₃、维生素B₉₈₄、维生素B₉₈₅、维生素B₉₈₆、维生素B₉₈₇、维生素B₉₈₈、维生素B₉₈₉、维生素B₉₉₀、维生素B₉₉₁、维生素B₉₉₂、维生素B₉₉₃、维生素B₉₉₄、维生素B₉₉₅、维生素B₉₉₆、维生素B₉₉₇、维生素B₉₉₈、维生素B₉₉₉、维生素B₁₀₀₀、维生素B₁₀₀₁、维生素B₁₀₀₂、维生素B₁₀₀₃、维生素B₁₀₀₄、维生素B₁₀₀₅、维生素B₁₀₀₆、维生素B₁₀₀₇、维生素B₁₀₀₈、维生素B₁₀₀₉、维生素B₁₀₁₀、维生素B₁₀₁₁、维生素B₁₀₁₂、维生素B₁₀₁₃、维生素B₁₀₁₄、维生素B₁₀₁₅、维生素B₁₀₁₆、维生素B₁₀₁₇、维生素B₁₀₁₈、维生素B₁₀₁₉、维生素B₁₀₂₀、维生素B₁₀₂₁

- | 月龄 | 每次喂哺量 | | 每天喂哺次数 |
|-------|-----------|-----------|--------|
| | 奶粉用量 (平匙) | 温开水量 (毫升) | |
| 0-2周 | 2 | 60 | 8 |
| 2-4周 | 3 | 90 | 7 |
| 1-2个月 | 4 | 120 | 6 |
| 2-3个月 | 5 | 150 | 6 |
| 3-4个月 | 6 | 180 | 5 |
| 4-6个月 | 7 | 210 | 5 |
- 每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉≈4.4克。

1. 对于0-6月龄的婴儿最理想食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2. 请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
3. 密封盖如有遗失或破损请勿食用。

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

保质期: 24个月
如需了解更多产品信息, 请登录 www.bioshine.cn
营养咨询热线:



6 9780942485859

倍恩喜

唯尔普思

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)

1



净含量：150克
国食注字YP20230217

[illegible]

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2048
脂肪	g	0.61	12.40
碳水化合物	g	1.16	23.80
蛋白质	g	0.15	3.00
维生素A	μg RE	9	183
维生素D	μg	2.7	55.0
维生素E	mg α-TE	22	451
维生素K ₁	μg	0.90	17.29
维生素B ₁	μg	0.37	7.58
维生素B ₂	μg	1.83	37.48
维生素B ₆	μg	28	569
维生素B ₁₂	μg	28	573
维生素C	mg	15.8	324.1
烟酸(烟酰胺)	mg	0.069	1.413
泛酸	mg	131	2683
叶酸	μg	4.0	81.9
维生素B ₉	μg	134	2744
维生素B ₁₂	μg	4.1	84.0
维生素C	mg	0.49	10.04
维生素E	mg	6.0	122.9
矿物质	mg	9	184
钙	mg	2	45
铁	mg	18.5	378.9
锌	mg	15	307
铜	mg	0.19	3.89
锰	mg	0.21	4.30
钾	mg	4.57	93.39
钠	mg	16	328
镁	mg	10	205
磷	mg	48	983
氯	mg	16	328
硒	μg	16	328
碘	μg	0.90	18.43
可溶性成分	mg	2.8	57.3
乳糖	mg	1.7	34.8
蔗糖	mg	0.9	18.5
麦芽糖	mg	4.5	92.2
葡萄糖	mg	5.0	102.4
果糖	mg	0.04	0.82
二糖-2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.06	1.24
三糖-2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.24	4.92
四糖-2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.28	5.65
五糖-2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.9	18.4

100毫升奶液 $\approx$ 13.2克婴儿配方羊奶粉+90毫升水

- 1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
- 2、将饮用温水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40℃-50℃，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
- 3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
- 4、盖紧奶瓶，摇晃至奶粉充分溶解。
- 5、滴一滴滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量 (平匙)	温开水量 (毫升)	
0-2周	2	60	8
2-4周	3	90	7
1-2个月	4	120	6
2-3个月	5	150	6
3-4个月	6	180	5
4-6个月	7	210	5

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉, 一平匙奶粉 $\approx$ 4.4克。

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉 ≈ 4.4 克。

1. 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2. 请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
3. 密封盖如有遗失或破损请勿食用。

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商：陕西圣唐乳业有限公司
地址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发泰安路中段东侧

产地：陕西·渭南

电话: 0913-8228385(工厂)

产品标准代号: GB 10765-2021

食品生产许可证编号: SC10561052802876

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品

生产日期/批号：见罐底

保质期：24个月

如需了解更多产品信息，请登录 www.bioshine.cn

营养咨询热线:

400-893-8886



6 970942 485378

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)

国食注字YP20230217

[illegible]

【注意】本品含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆及其制品,对其过敏者慎用。

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2048
脂肪	g	0.81	16.40
碳水化合物	g	1.16	23.80
蛋白质	g	0.15	3.07
维生素A	μg RE	1.7	34.9
维生素B1	mg	2.7	55.0
维生素B2	μg RE	22	451
维生素B6	μg	0.50	12.29
维生素C	mg	0.37	7.58
维生素E	mg α-TE	1.83	37.48
维生素K	μg	19	388
维生素P	μg	28	564
维生素B12	μg	16.8	341.1
维生素B3	μg	0.069	1.413
维生素B5	μg	131	2683
维生素B7	μg	4.0	81.9
维生素B9	μg	134	2744
维生素C	mg	4.7	94.0
维生素D	μg	0.49	10.04
维生素E	mg	6.0	122.9
维生素K	mg	0	1.84
维生素P	mg	22	451
维生素B1	mg	18.5	378.9
维生素B2	mg	1.5	30.7
维生素B6	mg	0.70	14.1
维生素C	mg	2.7	55.0
维生素E	mg	4.7	94.0
维生素K	mg	16	328
维生素B12	μg	10	205
维生素B3	μg	4.8	98.3
维生素B5	μg	16	328
维生素B7	μg	0.90	18.43
选择成分	mg		
维生素A	mg	2.8	57.3
维生素B1	mg	1.7	34.9
维生素B2	mg	0.9	18.4
维生素B6	mg	4.5	91.7
维生素C	mg	5.0	102.4
维生素E	mg	0.04	0.82
维生素K	mg	0.09	1.84
维生素P	mg	0.24	4.95
维生素B12	μg	0.28	5.64
维生素B3	μg	0.78	15.64
维生素B5	μg	0.9	18.4

100毫升奶液 $\approx$ 13.2克婴儿配方羊奶粉+90毫升水

- 1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
- 2、将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40°C-50°C，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
- 3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
- 4、盖紧奶瓶，摇晃至奶粉充分溶解。
- 5、滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量(平匙)	温开水量(毫升)	
0-2周	2	60	8
2-4周	3	90	7
1-2个月	4	120	6
2-3个月	5	150	6
3-4个月	6	180	5
4-6个月	7	210	5

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉,一平匙奶粉约4.4克。

温馨提示

- 1、对于0-6月龄的婴儿最理想食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
- 3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

贮存条件

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商：陕西圣唐乳业有限公司

地址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发园区泰安路中段东侧

产地：陕西·渭南

电话: 0913-8228385(工厂)

产品标准代号: GB 10765-2021

食品生产许可证编号: SC10561052802876

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品

生产日期/批号：见罐底

保质期：24个月

如需了解更多产品信息，请登录 www.bioshine.cn

营养咨询热线:

400-893-8886



6 970942 484715

倍恩喜

唯尔普思

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)



净含量:1千克

国食注字YP20230217

配 料 表

[illegible]

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2048
蛋白质	g	0.61	12.40
脂肪	g	1.16	23.80
亚油酸	g	0.15	3.07
α-亚麻酸	mg	19	389
碳水化合物	g	2.7	55.0
维生素			
维生素A	μg RE	22	451
维生素D	μg	0.60	12.29
维生素E	mg α-TE	0.37	7.58
维生素K ₁	μg	1.83	37.48
维生素B ₁	μg	19	389
维生素B ₂	μg	28	573
维生素B ₆	μg	16.8	344.1
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.413
烟酸(烟酰胺)	μg	131	2683
叶酸	μg	4.0	81.9
泛酸	μg	134	2744
维生素C	mg	4.1	84.0
生物素	μg	0.49	10.04
胆碱	mg	6.0	122.9
矿物质			
钠	mg	9	184
钾	mg	22	451
铜	μg	18.5	378.9
镁	mg	1.5	30.7
铁	mg	0.19	3.89
锌	mg	0.21	4.30
锰	μg	4.57	93.59
钙	mg	16	328
磷	mg	10	205
碘	μg	4.8	98.3
硒	μg	16	328
可选择成分			
肌醇	mg	2.8	57.3
牛磺酸	mg	1.7	34.8
左旋肉碱	mg	0.9	18.4
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.7
二十碳四烯酸	mg	5.0	102.4
低聚半乳糖	g	0.04	0.82
低聚果糖	g	0.09	1.84
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.92
叶黄素	μg	4.08	83.56
核苷酸	mg	0.9	18.4

100毫升奶液≈13.2克 婴儿配方羊奶粉+90毫升水

食用方法

① ② ③ ④ ⑤

- | 月龄 | 每次喂哺量 | | 每天喂哺次数 |
|--------|----------|----------|--------|
| | 奶粉用量(平匙) | 温开水量(毫升) | |
| 6-8个月 | 7 | 210 | 5 |
| 8-12个月 | 8 | 240 | 4 |
- 每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉,一平匙奶粉 ≈ 4.4 克。

- 1、对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
- 3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

400-893-8886



6 970942 487167

倍恩喜



圣唐
SHENG TANG

唯尔普思

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄,2段)

2



净含量：800克

国食注字YP20230218

主乳料:脱脂牛乳糖(来原牛乳)、食用植物油和油、(1.3)二油醇-2-棕榈酸甘油-二酯、葵花子乳粉、椰子油、亚麻籽油、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、三己酸的酯、二十六碳一酸、硬脂酸、硬脂酰基、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、维生素E(8-癸基甘油-3'、5'-癸基甘油-3'、5'-单磷酸甘油-5'-肌甘苷甘油-5'、5'-乌甘甘油-6')、动物双歧杆菌乳亚种bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Hn019;维生素A:醋酸视黄醇;维生素D₃:胆钙化醇;dl-α生育酚生育酯、植物甲萜烯、生物素、硫胺素、核黄素、烟酰胺吡啶、富马酸、烟酰胺、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-葡萄糖、D-甘露糖、D-山梨醇;矿物质:氯化钠、氯化钾、硫酸钾、硫酸镁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠。过敏提示:本品含有乳及制品(包括乳脂)。大豆及其制品。对此过敏者慎用。

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1998
蛋白质	g	0.72	14.40
脂肪	g	1.09	21.80
亚油酸	g	0.11	2.20
α -亚麻酸	mg	16	320
碳水化合物	g	2.7	54.3
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	26	519
维生素D	μg	0.60	11.99
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.38	7.59
维生素K ₁	μg	2.09	41.76
维生素B ₁	μg	19	380
维生素B ₂	μg	24	480
维生素B ₆	μg	16.0	319.7
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.379
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2757
叶酸	μg	3.9	77.9
泛酸	μg	141	2817
维生素C	mg	4.3	85.9
生物素	μg	0.54	10.79
胆碱	mg	6.0	119.9
矿物质			
钠	mg	7	140
钾	mg	24	480
铜	μg	14.3	285.7
铁	mg	1.5	30.0
锌	mg	0.30	5.99
锰	mg	0.21	4.20
钙	μg	4.38	87.51
镁	mg	22	440
磷	mg	14	280
碘	μg	4.6	91.9
硒	mg	20	400
氯	μg	0.68	13.59
可选择成分			
肌酸	mg	2.9	57.9
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	1.0	20.0
二十二碳六烯酸	mg	4.5	89.9
二十碳四烯酸	mg	5.2	103.9
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.78
油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
叶黄素	mg	10.14	202.60
核苷酸	mg	0.9	18.0

100毫升奶液 $\approx$ 13.2克较大婴儿配方羊奶粉+90毫升水

- | 月 龄 | 每次喂哺量 | | 每天喂哺次数 |
|--------|----------|----------|--------|
| | 奶粉用量(平匙) | 温开水量(毫升) | |
| 6-8个月 | 7 | 210 | 5 |
| 8-12个月 | 8 | 240 | 4 |
- 每30毫升温开水中加入一平匙配方牛奶粉,一平匙奶粉 $\approx$ 4.4克。

- 1、对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
- 3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

400-893-8886



6 970942 485293



圣唐
SHENG TANG

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄,2段)

2



国食注字YP20230218

生乳乳、**脱脂乳清粉**(来源羊乳)、**食用植物油和油**(1,3-二油酸-2-棕榈酰甘油三酯、葵花子油、椰子油、豆油、亚麻籽油)、**维生素A**(全反式视黄醇)、**维生素E**(α-生育酚)、**维生素K₁**(2-甲萘醌)、**牛磺酸**、**左旋赖氨酸·叶黄素**、**核苷酸**(5'-肌苷酸、5'-尿苷酸)、**单磷酸腺苷·5'-肌苷酸**、**5'-鸟苷酸**、**动物双链核糖核酸Bc-12**、**动物双链核糖核酸HNO19**、**维生素C**、**脂肪酸乙酸钠**、**硬脂钙盐**、**α-磷酸氢钙**、**维生素D₃**、**维生素D₂**、**生物素**、**核黄素**、**盐酸吡哆素**、**氯化钴**、**烟酰胺**、**dL-泛酸钙**、**L-抗坏血酸**、**D-生物素**、**羧基化铝**、**矿物质**:硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸钾、硫酸镁、硫酸钠、硒亚硒酸钠。
 过敏提示：本品含有及/或乳制品(包括牛奶)、大豆及其制品，对过敏者慎用。

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1998
蛋白质	g	0.72	14.40
脂肪	g	1.09	21.80
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	mg	16	320
碳水化合物	g	2.7	54.3
维生素			
维生素A	μg RE	26	519
维生素D	μg	0.60	11.99
维生素E	mg α-TE	0.38	7.59
维生素K ₁	μg	2.09	41.76
维生素B ₁	μg	19	380
维生素B ₂	μg	24	480
维生素B ₆	μg	16.0	319.7
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.379
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2757
叶酸	μg	3.9	77.9
泛酸	μg	141	2817
维生素C	mg	4.3	85.9
生物素	μg	0.54	10.79
胆固醇	mg	6.50	119.9
矿物质			
钠	mg	7	140
钾	mg	24	480
铜	μg	14.3	285.7
镁	mg	1.5	30.0
铁	mg	0.30	5.99
锰	mg	0.21	4.20
锌	mg	4.38	87.51
钙	mg	22	440
磷	mg	14	280
碘	mg	4.6	91.9
氯	mg	20	400
硒	μg	0.68	13.59
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	57.9
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	1.0	20.0
二十—碳六烯酸	mg	4.5	89.9
二十二—碳六烯酸	mg	5.2	103.9
低聚果糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
叶黄素	μg	10.14	202.60
核苷酸	μg	0.9	18.0

100毫升奶液≈13.2克较大婴儿配方羊奶粉+90毫升水



- 食用方法
- 1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
 - 2、将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40°C-50°C，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
 - 3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
 - 4、盖紧奶瓶，提匀至奶粉充分溶解。
 - 5、滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

喂哺建议表			
月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量（平匙）	温开水量（毫升）	
6-8个月	7	210	5
8-12个月	8	240	4

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉≈4.4克。

- 温馨提示
- 1、对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
 - 2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
 - 3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

贮存条件

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商：陕西圣唐乳业有限公司
地址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发中安路中段东侧
产地：陕西·渭南
电话：0913-8228385(工厂)
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC10561052802876
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期/批号：见罐底
保质期：24个月
如需了解更多产品信息，请登录 www.bioshine.cn
营养咨询热线：
400-893-8886



唯尔普思

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)

2

净含量：428克
国食注字YP20230218

配料表			
生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019；维生素：醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-维生素生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱；矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、碘酸钾、亚硒酸钠。			
过敏提示：本品含有乳及乳制品（包括乳糖）、大豆及其制品，对其过敏者慎用。			
营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1998
蛋白质	g	0.72	14.40
脂肪	g	1.09	21.80
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	g	0.16	3.20
碳水化合物	g	2.7	54.3
维生素			
维生素A	μg RE	26	519
维生素D	μg	0.60	11.99
维生素E	mg α-TE	0.38	7.59
维生素K ₁	μg	2.09	41.76
维生素B ₁	μg	19	380
维生素B ₂	μg	24	480
维生素B ₆	μg	16.0	319.7
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.379
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2757
叶酸	μg	3.9	77.9
泛酸	μg	141	2817
维生素C	mg	4.3	85.9
生物素	μg	0.54	10.79
胆碱	mg	6.0	119.9
矿物质			
钠	mg	7	140
钾	mg	24	480
铜	μg	14.3	285.7
铁	mg	1.5	30.0
锌	mg	0.30	5.99
锰	mg	0.21	4.20
钴	μg	4.58	87.51
硒	μg	22	440
碘	μg	14	280
氯	μg	4.6	91.9
氢	mg	20	400
钙	μg	0.68	13.59
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	57.9
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	1.0	20.0
二十二碳六烯酸	mg	4.5	89.9
二十碳四烯酸	mg	5.2	103.9
低聚果糖	g	0.06	1.18
低聚半乳糖	g	0.09	1.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
叶黄素	μg	10.14	202.60
核黄素	mg	0.9	18.0

100毫升奶液≈13.2克较大婴儿配方羊奶粉+90毫升水

- 1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
- 2、将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40°C-50°C，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
- 3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
- 4、盖紧奶瓶，摇晃至奶粉充分溶解。
- 5、滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

每次喂哺量

月齡	每次喂哺量		每天喂哺次數
	奶粉用量 (平匙)	溫開水量 (毫升)	
6-8個月	7	210	5
8-12個月	8	240	4

每30毫升溫開水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉≈4.4克。

温馨提示

1. 对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
2. 请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
3. 密封盖如有遗失或破损请勿食用。

贮存条件

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商：陕西圣唐乳业有限公司
地址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区中段东侧
产地：陕西·渭南
电话：0913-8228385(工厂)
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC10561052802876
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期/批号：见罐底

保质期: 24个月
如需了解更多产品信息, 请登录 www.bioshine.cn
营养咨询热线:

400-893-8886



倍恩喜

唯尔普思

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄,2段)

2



净含量：150克
国食注字YP20230218

配料表

生乳、脱盐乳清粉(未原羊乳)、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯;葵花籽油、椰子油、亚麻籽油、低聚半乳糖、低果糖、大豆油、花型四油酸、十二碳正庚酸、硬脂酸、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核黄素)1-80批号二油、5-尿苷二磷酸、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸、动物双链核苷酸中Bb-12、动物双链核苷酸基类H9N19;维生素:熊胆视黄醇、胆钙化醇、d-α-胆甾醇乙酸酯、植物甲萘酚、植物生育酚、核黄素、吡硫醇吡啶素、精氨酸、肌酐酸、叶酸、D-泛酸、L-抗坏血酸、D-生物素、果糖及乳糖;矿物质:硫酸铜、硝酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碘酸钾、硫酸钾、亚硒酸钠。过酸处理:本品含有乳及乳制品(包括乳脂)、大量及其制品,对其过酸处理。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	KJ	100	1998
蛋白质	g	0.72	14.40
脂肪	g	1.09	21.80
碳水化合物	g	0.1	2.20
维生素A	μg RE	26	519
维生素D	μg TE	0.60	11.99
维生素E	mg TE	0.38	7.59
维生素K ₁	μg	2.09	41.76
维生素B ₁	μg	19	380
维生素B ₂	μg	24	480
维生素B ₆	μg	16.0	319.7
维生素B ₁₂	μg	1.38	27.59
维生素C	mg	0.069	1.379
维生素E	mg	3.9	77.9
维生素K ₁	μg	14	281.7
维生素B ₁	μg	19	380
维生素B ₂	μg	24	480
维生素B ₆	μg	16.0	319.7
维生素B ₁₂	μg	1.38	27.59
维生素C	mg	0.54	10.79
维生素E	mg	6.0	119.9
矿物质	mg	7	140
钙	mg	24	480
磷	mg	14.3	285.7
钾	mg	1.5	30.0
钠	mg	0.30	5.98
氯	mg	0.21	4.20
镁	mg	4.38	87.51
铁	mg	22	440
锌	mg	14	280
铜	mg	4.6	90.9
锰	mg	20	400
硒	μg	0.68	13.59
可选择成分	mg	2.9	57.9
维生素A	μg RE	1.9	38.0
维生素D	μg TE	1.0	20.0
维生素E	mg TE	1.0	20.0
维生素K ₁	μg	4.5	89.8
维生素B ₁	μg	5.2	103.9
维生素B ₂	μg	0.06	1.18
维生素B ₆	μg	0.09	1.78
维生素B ₁₂	μg	0.15	3.00
维生素C	mg	0.14	2.78
维生素E	mg	0.9	18.0

- | 月龄 | 每次喂哺量 | | 每天喂哺次数 |
|--------|-----------|-----------|--------|
| | 奶粉用量 (平匙) | 温开水量 (毫升) | |
| 6-8个月 | 7 | 210 | 5 |
| 8-12个月 | 8 | 240 | 4 |
- 每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉 ≈ 4.4 克。

1. 对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
2. 请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
3. 密封盖如有遗失或破损请勿食用。

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。



6 970942 485385

400-893-8886

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄,2段)

2

净含量：138克
国食注字YP20230218

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花四萜醇)、二十六碳一烯酸、磷酸、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核黄素(维生素B₂)、5-尿苷二磷酸、5-单磷酸腺苷、5'-肌苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸、动物双链核黄嘌呤核苷酸-B₂、动物双链核黄嘌呤核苷酸-HN019;维生素A:视紫红质、胆钙化醇、d-α-生育酚生育酚、植物甲萘醌-β-胡萝卜素、核黄素、盐酸吡哆醇、维生素E:α-生育酚、γ-生育酚、d-α-生育酚-D-生物素、维生素K₁及物质G:棕榈酸、硬脂酸乙酯、硫胺醇、硫胺醇二酯、硫胺醇、硫胺醇、亚硫酸钠;过硫酸钠:本品含有乳剂及辅料(包括乳剂)、大量及其制品,对其过敏者慎用。

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1998
脂肪	g	0.72	14.40
蛋白质	g	1.09	21.80
碳水化合物	g	0.11	2.20
维生素A	μg RE	16	320
维生素D	μg TE	2.7	54.3
维生素E	mg TE	26	519
维生素K	μg	0.60	11.99
维生素B ₁	mg	0.38	7.59
维生素B ₂	mg	2.09	41.76
维生素B ₆	mg	19	380
维生素B ₁₂	μg	24	480
维生素C	mg	16.0	319.7
维生素A	μg RE	0.069	1.379
维生素D	μg TE	138	2757
维生素E	mg TE	3.9	77.9
维生素K	μg	141	2819
维生素B ₁	mg	4.3	85.9
维生素B ₂	mg	0.54	10.79
维生素B ₆	mg	6.0	119.9
矿物质	mg	7	140
钙	mg	24	480
磷	mg	14.3	285.7
钾	mg	1.5	30.0
钠	mg	0.30	5.98
氯	mg	0.21	4.20
镁	mg	4.38	87.51
铁	mg	22	440
锌	mg	14	280
铜	mg	4.6	91.9
锰	mg	20	400
硒	μg	0.68	13.59
可选择成分	mg	2.9	57.9
维生素A	μg RE	1.9	38.0
维生素D	μg TE	1.0	20.0
维生素E	mg TE	1.0	20.0
维生素K	μg	4.5	89.9
维生素B ₁	mg	5.2	103.9
维生素B ₂	mg	0.06	1.18
维生素B ₆	mg	0.09	1.78
维生素C	mg	0.15	2.99
维生素A	μg RE	10.4	207.9
维生素D	μg TE	0.9	18.0

1

2

3

4

5

1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。

2、将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40°C-50°C，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。

3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。

4、盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。

5、滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量(平匙)	温开水量(毫升)	
6-8个月	7	210	5
8-12个月	8	240	4

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉≈4.4克。

温馨提示

1、对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂哺或加热后超过2小时的奶液勿再食用。

3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

贮存条件

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商：陕西圣唐乳业有限公司

地址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发中段东段

产地：陕西·渭南

电话：0913-8228385(工厂)

产品标准代号：GB 10766-2021

食品生产许可证编号：SC10561052802876

产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品

生产日期/批号：见罐底

保质期：24个月

如需了解更多产品信息，请登录 www.bioshine.cn

营养咨询热线：400-893-8886

6197094214847391

倍恩喜

唯尔普思

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)

2

净含量:1千克

国食注字YP20230218

配 料 表			
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-胡萝卜素、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱；矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、碘酸钾、亚硒酸钠。			
过敏提示：本品含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆及其制品，对其过敏者慎用。			
营 养 成 分 表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1998
蛋白质	g	0.72	14.40
脂肪	g	1.09	21.80
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	mg	16	320
碳水化合物	g	2.7	54.3
维生素A	μg RE	26	519
维生素D	μg	0.60	11.99
维生素E	mg α-TE	0.38	7.59
维生素K ₁	μg	2.09	41.76
维生素B ₁	μg	19	380
维生素B ₂	μg	24	480
维生素B ₆	μg	16.0	319.7
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.379
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2757
叶酸	μg	3.9	77.9
泛酸	μg	141	2817
维生素C	mg	4.3	85.9
生物素	μg	0.54	10.79
胆碱	mg	6.0	119.9
矿物质			
钠	mg	7	140
钾	mg	24	480
铜	μg	14.3	285.7
镁	mg	1.5	30.0
铁	mg	0.30	5.99
锌	mg	0.21	4.20
锰	μg	4.38	87.51
钙	mg	22	440
磷	mg	14	280
碘	μg	4.6	91.9
氯	mg	20	400
硒	μg	0.68	13.59
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	57.9
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	1.0	20.0
二十二碳六烯酸	mg	4.5	89.9
二十碳四烯酸	mg	5.2	103.9
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
叶黄素	μg	10.14	202.60
核苷酸	mg	0.9	18.0
100毫升奶液≈13.2克较大婴儿配方羊奶粉+90毫升水			



- 1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
- 2、将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40°C-50°C，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
- 3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
- 4、盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
- 5、滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

喂哺建议表			
月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量(平匙)	温开水量(毫升)	
12-36个月	8	240	3

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉≈4.4克。

- 温馨提示**
- 1、对于12~36月龄的幼儿食用本品时，须配合添加辅助食品。
- 2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
- 3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

贮存条件

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商：陕西圣唐乳业有限公司
地址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发中泰安路中段东侧
产地：陕西·渭南
电话：0913-8228385(工厂)
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC10561052802876
产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品
生产日期/批号：见罐底

保质期：24个月
如需了解更多产品信息，请登录 www.bioshine.cn
营养咨询热线：

400-893-8886



6 970942 487174

倍恩喜®



唯尔普思

幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)

3



净含量：800克
国食注字YP20230219

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、磷脂、肌醇、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HNO19；维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-维生素E、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素；矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、碘酸钾、亚硒酸钠。

过敏提示：本品含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆及其制品，对其过敏者慎用。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.76	15.30
脂肪	g	1.15	23.10
亚油酸	g	0.11	2.22
α-亚麻酸	mg	16	323
碳水化合物	g	2.6	51.6
维生素A	μg RE	26	524
维生素D	μg	0.60	12.10
维生素E	mg α-TE	0.38	7.66
维生素K	μg	2.08	41.93
维生素B ₁	μg	20	403
维生素B ₂	μg	24	484
维生素B ₆	μg	15.8	318.5
维生素B ₁₂	μg	0.066	1.331
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2762
叶酸	μg	3.6	72.6
泛酸	μg	144	2903
维生素C	mg	3.7	74.6
生物素	μg	0.52	10.48
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	26	524
铜	μg	10.8	217.7
镁	mg	1.8	36.3
铁	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.20	4.03
钙	mg	22	444
磷	mg	14	282
碘	μg	4.2	84.7
氯	mg	22	444
可选择成分			
酒	μg	0.60	12.10
胆碱	mg	6.0	121.0
肌醇	μg	4.39	88.50
牛磺酸	mg	2.7	54.4
左旋肉碱	mg	1.8	36.3
二十二碳六烯酸	mg	1.0	20.2
二-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	4.2	84.7
低聚半乳糖	g	4.6	92.7
低聚果糖	g	0.06	1.18
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.09	1.79
叶黄素	g	0.15	3.02
核苷酸	μg	10.04	202.41
	mg	0.9	18.1

100毫升奶液≈13.2克幼儿配方羊奶粉+90毫升水

- 1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
- 2、将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40℃-50℃，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
- 3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
- 4、盖紧奶瓶，摇晃至奶粉充分溶解。
- 5、滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量(平匙)	温开水量(毫升)	
12-36个月	8	240	3

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉,一平匙奶粉≈4.4克。

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量(平匙)	温开水量(毫升)	
12-36个月	8	240	3

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉,一平匙奶粉≈4.4克。

- 1、对于12-36月龄的幼儿食用本品时，须配合添加辅助食品。
- 2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
- 3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

- 1、对于12-36月龄的幼儿食用本品时，须配合添加辅助食品。
- 2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
- 3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产厂商：陕西圣唐乳业有限公司
 地址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区秦安路中段东侧
 产地：陕西·渭南
 电话：0913-8228385(工厂)
 产品标准代号：GB 10767-2021
 食品生产许可证编号：SC10561052802876
 产品类别及属性：乳基 粉状 幼/配方食品
 生产日期/批号：见罐底
 保质期：24个月
 如需了解更多信息，请登录 www.bioshine.cn
 营养咨询热线：



6 9709421485286

6 970942 485286

唯尔普思

幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)

3



净含量：750克
国食注字YP20230219

生乳、**脱脂全乳粉(聚落干乳)**、**食用植物油脂和油**(1)三油二酸：硬脂酸、棕榈酸、椰子油、亚麻籽油、低亚甲基半乳糖、低亚基果糖、大豆油、花生油等。二十二碳六烯酸、磷脂、卵黄、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、β-胡萝卜素、α-(8'-磷酸甘油)、5'-腺苷二磷酸、5'-核苷酸衍生物、3'-肌苷二磷酸、5'-鸟苷二酸)。动物双歧杆菌乳链球菌Bb-12、动物双歧杆菌乳剂株HN019;膳食纤维;醋酐类物质、硬脂化脂肪、dL-α-葡萄糖生育醇、植物甲氧基、盐酸赖氨酸、维生素E、维生素K、富马酸钙、富马酸钠、富马酸盐、D-泛酰素、D-抗坏血酸、D-生物素;矿物质：硫酸铝、硫酸亚铁、硫磺、碘酸钾、碘酸铯、碘酸钾、碘酸钾、亚硒酸钠。

过敏提示：本品含有乳制品及乳制品成分(包括乳蛋白)，大及其制品，对过敏者慎用。

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.76	15.30
脂肪	g	1.15	23.10
亚油酸	g	0.11	2.22
α -亚麻酸	g	16	3.23
碳水化合物	g	2.6	51.6
维生素A	$\mu\text{g RE}$	26	524
维生素D	μg	0.60	12.10
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.38	7.66
维生素K ₁	μg	2.08	41.93
维生素B ₁	μg	20	403
维生素B ₂	μg	24	484
维生素B ₆	μg	15.8	318.5
维生素B ₁₂	μg	0.066	1.331
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2782
叶酸	μg	3.6	72.6
泛酸	μg	144	2903
维生素C	mg	3.7	74.6
生物素	μg	0.52	10.48
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	26	524
铜	μg	10.8	217.7
镁	mg	1.8	36.3
钙	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.20	4.03
铁	mg	22	444
磷	mg	14	282
碘	μg	4.2	84.7
硒	mg	22	444
可选择成分			
维生素D ₃	μg	0.60	12.10
维生素E	mg	6.0	121.0
维生素K ₁	μg	4.39	88.50
肌醇	mg	2.7	54.4
牛磺酸	mg	1.8	36.3
左旋肉碱	mg	1.0	20.2
二十二碳六烯酸	mg	4.2	84.7
二十碳四烯酸	mg	4.6	92.7
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.79
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.02
叶黄素	μg	10.04	202.41
核苷酸	g	0.9	18.1

100毫升奶液 $\approx$ 13.2克(1岁配方羊奶粉)+90毫升水

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.76	15.30
脂肪	g	1.15	23.10
亚油酸	g	0.11	2.22
α -亚麻酸	g	16	3.23
碳水化合物	g	2.6	51.6
维生素A	$\mu\text{g RE}$	26	524
维生素D	μg	0.60	12.10
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.38	7.66
维生素K ₁	μg	2.08	41.93
维生素B ₁	μg	20	403
维生素B ₂	μg	24	484
维生素B ₆	μg	15.8	318.5
维生素B ₁₂	μg	0.066	1.331
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2782
叶酸	μg	3.6	72.6
泛酸	μg	144	2903
维生素C	mg	3.7	74.6
生物素	μg	0.52	10.48
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	26	524
铜	μg	10.8	217.7
镁	mg	1.8	36.3
钙	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.20	4.03
铁	mg	22	444
磷	mg	14	282
碘	μg	4.2	84.7
硒	mg	22	444
可选择成分			
维生素D ₃	μg	0.60	12.10
维生素E	mg	6.0	121.0
维生素K ₁	μg	4.39	88.50
肌醇	mg	2.7	54.4
牛磺酸	mg	1.8	36.3
左旋肉碱	mg	1.0	20.2
二十二碳六烯酸	mg	4.2	84.7
二十碳四烯酸	mg	4.6	92.7
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.79
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.02
叶黄素	μg	10.04	202.41
核苷酸	g	0.9	18.1

100毫升奶液 $\approx$ 13.2克(1岁配方羊奶粉)+90毫升水

1. 冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
2. 将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40°C-50°C，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
3. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
4. 温熟奶粉，摇晃至奶粉充分溶解。
5. 滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量(平匙)	温开水量(毫升)	
12-36个月	8	240	3

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉。一平匙奶粉≈4.4克。

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉 $\approx$ 4.4克。

1. 对于12~36月龄的幼儿食用本品时，须配合添加辅助食品。
2. 请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
3. 密封盖如有遗失或破损请勿食用。

1. 对于12~36月龄的幼儿食用本品时，须配合添加辅助食品。
2. 请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
3. 密封盖如有遗失或破损请勿食用。

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商：陕西圣唐乳业有限公司
地址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发中安路中段东侧
产地：陕西·渭南
电话：0913-8228385(工厂)
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC10561052802876
产品类别及属性：乳基粉类 幼儿配方食品
生产日期/批号：见罐底

保质期: 24个月
如需了解更多产品信息, 请登录 www.bioshine.cn
营养咨询热线:

400-893-8886



6 970942 485842

倍恩喜®

唯尔普思

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)

3



净含量: 428克
国食注字YP20230219

[illegible]

项目	单位	每100kJ	每100g
能量		100	2016
蛋白质	kJ	0.76	15.30
脂肪	g	1.15	23.10
亚油酸	g	0.11	2.22
α -亚麻酸	mg	16	323
碳水化合物	g	2.6	51.6
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	26	524
维生素D	μg	0.60	12.10
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.38	7.66
维生素K ₁	μg	2.08	41.93
维生素B ₁	μg	20	403
维生素B ₂	μg	24	484
维生素B ₆	μg	15.8	318.3
维生素B ₁₂	μg	0.066	1.331
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2782
叶酸	μg	138	27.6
泛酸	μg	144	2903
维生素C	mg	3.7	74.6
生物素	μg	0.52	10.48
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	26	524
钙	mg	10.8	217.7
镁	mg	1.8	36.3
铁	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.20	4.03
铜	μg	7	444
锰	μg	14	282
碘	μg	4.2	84.7
氯	mg	22	444
可选择成分			
烟	μg	0.60	12.10
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	4.39	88.50
肌醇	mg	2.7	54.4
牛磺酸	mg	1.0	36.3
左旋肉碱	mg	1.0	20.2
二十二碳六烯酸	μg	4.2	84.7
二十碳四烯酸	mg	6.6	92.7
低聚果糖	g	0.06	1.18
低聚异糖	g	0.09	1.79
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.02
叶黄素	μg	10.04	202.41
核白酸	mg	0.90	18.1

项目	单位	每100kJ	每100g
能量		100	2016
蛋白质	kJ	0.76	15.30
脂肪	g	1.15	23.10
亚油酸	g	0.11	2.22
α -亚麻酸	mg	16	323
碳水化合物	g	2.6	51.6
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	26	524
维生素D	μg	0.60	12.10
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.38	7.66
维生素K ₁	μg	2.08	41.93
维生素B ₁	μg	20	403
维生素B ₂	μg	24	484
维生素B ₆	μg	15.8	318.3
维生素B ₁₂	μg	0.066	1.331
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2782
叶酸	μg	138	27.6
泛酸	μg	144	2903
维生素C	mg	3.7	74.6
生物素	μg	0.52	10.48
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	26	524
钙	mg	10.8	217.7
镁	mg	1.8	36.3
铁	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.20	4.03
铜	μg	7	144
锰	μg	14	282
碘	μg	4.2	84.7
氯	mg	22	444
可选择成分			
烟	μg	0.60	12.10
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	4.39	88.50
肌醇	mg	2.7	54.4
牛磺酸	mg	1.0	36.3
左旋肉碱	mg	1.0	20.2
二十二碳六烯酸	μg	4.2	84.7
二十二碳五烯酸	mg	6.6	92.7
低聚果糖	g	0.06	1.18
低聚异糖	g	0.09	1.79
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.02
叶黄素	μg	10.04	202.41
核白酸	mg	0.90	18.1

100毫升奶液 $\approx$ 13.2克幼儿配方羊奶粉+90毫升水

- 1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
- 2、将饮用温水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40℃-50℃，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
- 3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
- 4、盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
- 5、滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

喂哺建议表

月龄	每次喂奶量		每天喂奶次数
	奶粉用量 (平匙)	温开水量 (毫升)	
12-36个月	8	240	3

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉, 一平匙奶粉 $\approx$ 4.4克。

温馨提示

- 1、对于12-36月龄的幼儿食用本品时，须配合添加辅助食品。
- 2、请遵照喂哺建议冲泡奶粉，不正确的冲泡浓度不利于您孩子的健康。冲泡好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
- 3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

贮存条件

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商：陕西圣唐乳业有限公司
地址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发 区泰安路中段东侧
产地：陕西·渭南

电话: 0913-8228385(工厂)
产品标准代号: GB 10767-2021
食品生产许可证编号: SC10561052802876
产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品

生产日期/批号：见罐底
保质期：24个月
如需了解更多产品信息，请登录 www.bioshine.cn
营养咨询热线：

400-893-8886



6 970942 485873

倍恩喜®

唯尔普思

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)

3



净含量：150克
国食注字YP20230219

配料表

生乳、脱盐乳清粉(来原牛乳)、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油、低聚干酪素、焦聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、磷脂、肌醇、氯化钠、牛磺酸、左旋赖氨酸、叶黄素、核黄素(维生素B₂)、5-羟色胺(血清素)、5-单磷酸腺苷、β-胡萝卜素D₂-马日酸D₂)、动物双歧杆菌乳种菌株BB-12、动物双歧杆菌乳种菌株HN019; 维生素A: 视黄醇醋酸酯、胆钙化醇D₃、α-脂酸生酮素、维生素E: 生育酚、生育酚琥珀酸盐、生育酚乙酸酯、生育酚、维生素K: 亚乙基二噻吩、L-抗坏血酸D-生物素; 矿物质: 硫酸铝、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

注意: 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。大豆及其制品。对其过敏者慎用。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.76	15.30
脂肪	g	1.15	23.10
碳水化合物	g	1.15	23.10
膳食纤维	g	15	300
维生素A	μg RE	26	524
维生素B1	mg	0.60	12.10
维生素B2	mg	0.28	5.68
维生素B6	mg	2.08	41.93
维生素C	mg	20	403
维生素E	mg α-TE	15.8	318.6
烟酰胺	mg	0.066	1.331
维生素K	μg	138	2762
维生素D	μg	3.6	72.6
维生素K2	μg	144	2880
维生素K3	μg	3.7	74.0
维生素K4	μg	0.52	10.48
维生素K5	μg	7	141
维生素K6	μg	26	524
维生素K7	μg	10.8	217.7
维生素K8	μg	1.8	36.3
维生素K9	μg	0.30	6.05
维生素K10	μg	0.20	4.03
维生素K11	μg	22	444
维生素K12	μg	12	242
维生素K13	μg	22	444
维生素K14	μg	22	444
维生素K15	μg	0.60	12.10
维生素K16	μg	6.0	121.0
维生素K17	μg	4.39	88.50
维生素K18	μg	2.7	54.4
维生素K19	μg	1.8	36.3
维生素K20	μg	1.7	34.2
维生素K21	μg	4.7	94.7
维生素K22	μg	4.6	92.7
维生素K23	μg	0.06	1.21
维生素K24	μg	0.09	1.8
维生素K25	μg	0.05	1.01
维生素K26	μg	10.04	202.4
维生素K27	μg	0.9	18.1

100毫升奶液≈13.2克幼儿配方羊奶粉+90毫升水

100毫升奶液 $\approx$ 13.2克幼儿配方羊奶粉+90毫升水

1. 冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
2. 将饮用温水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40℃-50℃，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
3. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
4. 盖紧奶瓶，摇晃至奶粉充分溶解。
5. 滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量 (平匙)	温开水量 (毫升)	
12-36个月	8	240	3

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉, 一平匙奶粉 $\approx$ 4.4克。

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量 (平匙)	温开水量 (毫升)	
12-36个月	8	240	3

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉, 一平匙奶粉 $\approx$ 4.4克。

- 1、对于12-36月龄的幼儿食用本品时，须配合添加辅助食品。
- 2、请遵照罐身建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
- 3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

- 1、对于12-36月龄的幼儿食用本品时，须配合添加辅助食品。
- 2、请遵照哺喂建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
- 3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在周内食用完，且勿放入冰箱内存存。请在保质期内食用本产品。

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商：陕西圣唐乳业有限公司
地址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发 区泰安路中段东侧
产地：陕西·渭南

电话: 0913-8228385(工厂)
产品标准代号: GB 10767-2021
食品生产许可证编号: SC10561052802876
产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
生产日期(批号): 见罐底

保质期: 24个月
如需了解更多产品信息, 请登录 www.bioshine.cn

营养咨询热线:

400-893-8886



幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)

3



净含量：138克
国食注字YP20230219

生乳、脱盐乳清粉(未灭菌)、食用植物油和油[13-二油酸-2-顺烯酸甘油三酯、硬化牛油、椰子油、亚麻籽油]、低聚半乳糖、低果糖浆、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、磷脂、肌醇、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核黄素、β-胡萝卜素-2'、β-胡萝卜素-2、单磷酸腺苷-5'-肌苷白核苷-5'、鸟嘌呤-3'、动物双歧杆菌亚种BB-12、动物双歧杆菌乳剂HN019;维生素：烟酰胺葡萄糖、胆钙化醇、α-胡萝卜素、生育酚混合形式、盐酸硫胺素、核黄素、维生素B6、维生素C、维生素E、泛酸、尼克酸、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素；矿物质：硫酸铝、磷酰钾、碘酸钾、硫酸钴、磷酸铁、磷酸铜、磷酸锌、过硫酸铵。

过敏提示：本品含有乳及乳制品（包括乳脂）、大豆及其制品，对其过敏者慎用。

生乳、脱盐乳清粉(来乳干)、食用植物油和油(1,3-二甘油酯)和硬脂酸甘三醇、硬化牛油、椰子油、亚麻籽油、低聚半乳糖、低果糖浆、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、磷脂、肌醇、氧化氢碱、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核黄素、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酰胺、维生素C、肌苷、氯化钾、L-鸟氨酸、动物双歧杆菌乳剂BB-12、动物双歧杆菌乳剂HN019; 维生素E: 硬脂酰基、胆钙化醇、胆钙化醇-d₇-胆固醇衍生物、植物甾醇类、鱼肝油浓缩物、核黄素、维生素A、维生素D₃、维生素K₁、维生素K₂、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素; 矿物质: 磷酸钙、磷酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸铜、碘酸钾、过硫酸胺。上述成分: 本品含有乳及乳制品(包括乳脂肪)、大豆及其制品, 对其过敏者慎用。

项目	单位	每100g	每100g
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.16	15.30
脂肪	g	1.15	23.40
碳水化合物	g	0.11	2.22
膳食纤维	g	16	322
维生素A	μg RE	26	524
维生素D	μg	0.50	12.10
维生素E	mg α-TE	0.38	7.66
维生素K1	μg	2.08	41.93
维生素B1	mg	20	403
维生素B2	mg	15	484
维生素B6	mg	15.8	318.5
维生素B12	μg	0.066	1.33
维生素C	mg	138	2782
维生素K2	μg	3.6	72.6
维生素K3	mg	14	2903
维生素K4	μg	3.7	74.6
维生素K5	μg	0.52	10.48
维生素K6	mg	7	141
维生素K7	mg	26	524
维生素K8	mg	10.8	217.7
维生素K9	mg	1.8	36.3
维生素K10	mg	0.30	6.05
维生素K11	mg	0.20	4.03
维生素K12	mg	22	444
维生素K13	mg	14	287
维生素K14	mg	4.2	84.7
维生素K15	mg	22	444
选择成分	μg	0.60	12.10
维生素K16	mg	6.0	121.0
维生素K17	μg	4.36	88.50
维生素K18	mg	2.7	54.4
维生素K19	mg	1.8	36.3
维生素K20	mg	1.0	20.2
维生素K21	mg	4.2	84.7
维生素K22	mg	4.6	92.7
维生素K23	mg	0.06	1.18
维生素K24	mg	0.09	1.78
维生素K25	mg	0.09	1.78
维生素K26	mg	0.09	1.78
维生素K27	mg	0.09	1.78
维生素K28	mg	0.09	1.78
维生素K29	mg	0.09	1.78
维生素K30	mg	0.09	1.78
维生素K31	mg	0.09	1.78
维生素K32	mg	0.09	1.78
维生素K33	mg	0.09	1.78
维生素K34	mg	0.09	1.78
维生素K35	mg	0.09	1.78
维生素K36	mg	0.09	1.78
维生素K37	mg	0.09	1.78
维生素K38	mg	0.09	1.78
维生素K39	mg	0.09	1.78
维生素K40	mg	0.09	1.78
维生素K41	mg	0.09	1.78
维生素K42	mg	0.09	1.78
维生素K43	mg	0.09	1.78
维生素K44	mg	0.09	1.78
维生素K45	mg	0.09	1.78
维生素K46	mg	0.09	1.78
维生素K47	mg	0.09	1.78
维生素K48	mg	0.09	1.78
维生素K49	mg	0.09	1.78
维生素K50	mg	0.09	1.78
维生素K51	mg	0.09	1.78
维生素K52	mg	0.09	1.78
维生素K53	mg	0.09	1.78
维生素K54	mg	0.09	1.78
维生素K55	mg	0.09	1.78
维生素K56	mg	0.09	1.78
维生素K57	mg	0.09	1.78
维生素K58	mg	0.09	1.78
维生素K59	mg	0.09	1.78
维生素K60	mg	0.09	1.78
维生素K61	mg	0.09	1.78
维生素K62	mg	0.09	1.78
维生素K63	mg	0.09	1.78
维生素K64	mg	0.09	1.78
维生素K65	mg	0.09	1.78
维生素K66	mg	0.09	1.78
维生素K67	mg	0.09	1.78
维生素K68	mg	0.09	1.78
维生素K69	mg	0.09	1.78
维生素K70	mg	0.09	1.78
维生素K71	mg	0.09	1.78
维生素K72	mg	0.09	1.78
维生素K73	mg	0.09	1.78
维生素K74	mg	0.09	1.78
维生素K75	mg	0.09	1.78
维生素K76	mg	0.09	1.78
维生素K77	mg	0.09	1.78
维生素K78	mg	0.09	1.78
维生素K79	mg	0.09	1.78
维生素K80	mg	0.09	1.78
维生素K81	mg	0.09	1.78
维生素K82	mg	0.09	1.78
维生素K83	mg	0.09	1.78
维生素K84	mg	0.09	1.78
维生素K85	mg	0.09	1.78
维生素K86	mg	0.09	1.78
维生素K87	mg	0.09	1.78
维生素K88	mg	0.09	1.78
维生素K89	mg	0.09	1.78
维生素K90	mg	0.09	1.78
维生素K91	mg	0.09	1.78

项目	单位	每100g	每100g
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.16	15.30
脂肪	g	1.15	23.40
碳水化合物	g	0.11	2.22
膳食纤维	g	16	322
维生素A	μg RE	26	524
维生素D	μg	0.50	12.10
维生素E	mg α-TE	0.38	7.66
维生素K1	μg	2.08	41.93
维生素B1	mg	20	403
维生素B2	mg	15	484
维生素B6	mg	15.8	318.5
维生素B12	μg	0.066	1.33
维生素C	mg	138	2782
维生素K2	μg	3.6	72.6
维生素D3	μg	14	2903
维生素E	mg	3.7	74.6
维生素K1	μg	0.52	10.48
维生素D	mg	7	141
维生素E	mg	26	524
维生素K1	μg	10.8	217.7
维生素B1	mg	1.8	36.3
维生素B2	mg	0.30	6.05
维生素B6	mg	0.20	4.03
维生素B12	μg	22	444
维生素C	mg	14	287
维生素K2	μg	4.7	94.7
维生素D3	μg	22	444
选择成分			
维生素A	μg	0.60	12.10
维生素D	μg	6.0	121.0
维生素E	μg	4.36	88.50
维生素K1	μg	2.7	54.4
维生素B1	mg	1.8	36.3
维生素B2	mg	1.0	20.2
维生素B6	mg	4.2	84.7
维生素B12	μg	0.6	12.1
维生素C	mg	0.06	1.21
维生素K2	μg	0.09	1.78
维生素D3	μg	0.15	3.02
维生素E	μg	0.15	3.02
维生素K1	μg	0.15	3.02
维生素D	μg	0.9	18.1

100毫升奶液 $\approx$ 13.2克幼儿配方羊奶粉+90毫升水

标签 18



- 1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
- 2、将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40°C-50°C，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
- 3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶量加入奶瓶中。
- 4、盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
- 5、滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

喂 哺 建 议 表			
月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量(平匙)	温开水量(毫升)	
12-36个月	8	240	3
每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉≈4.4克。			

- 温 馨 提 示**
- 1、对于12-36月龄的幼儿食用本品时，须配合添加辅助食品。
 - 2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂哺或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
 - 3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

贮 存 条 件

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商：陕西圣唐乳业有限公司
地址：陕西省渭南市富平县高新技术产业园区泰安路中段东侧

产地：陕西·渭南
电话：0913-8228385(工厂)
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC10561052802876
产品类别及属性：乳基 粉状 幼儿配方食品

生产日期/批号：见罐底
保质期：24个月
如需了解更多产品信息，请登录 www.bioshine.cn
营养咨询热线：

400-893-8886



倍恩喜®

圣唐®
BIOSHINE

唯尔普思

幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)

3



净含量:1千克
国食注字YP20230219

配 料 表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、磷脂、肌醇、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019；维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素；矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

过敏提示：本品含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆及其制品，对其过敏者慎用。

营 养 成 分 表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.76	15.30
脂肪	g	1.15	23.10
亚油酸	g	0.11	2.22
α-亚麻酸	mg	16	323
碳水化合物	g	2.6	51.6
维生素			
维生素A	μg RE	26	524
维生素D	μg	0.60	12.10
维生素E	mg α-TE	0.38	7.66
维生素K ₁	μg	2.08	41.93
维生素B ₁	μg	20	403
维生素B ₂	μg	24	484
维生素B ₆	μg	15.8	318.5
维生素B ₁₂	μg	0.066	1.331
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2782
叶酸	μg	3.6	72.6
泛酸	μg	144	2903
维生素C	mg	3.7	74.6
生物素	μg	0.52	10.48
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	26	524
铜	μg	10.8	217.7
镁	mg	1.8	36.3
铁	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.20	4.03
钙	mg	22	444
磷	mg	14	282
碘	μg	4.2	84.7
氯	mg	22	444
可选择成分			
硒	μg	0.60	12.10
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	4.39	88.50
肌醇	mg	2.7	54.4
牛磺酸	mg	1.8	36.3
左旋肉碱	mg	1.0	20.2
二十二碳六烯酸	mg	4.2	84.7
二十碳四烯酸	mg	4.6	92.7
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.79
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.02
叶黄素	mg	10.04	202.41
核苷酸	mg	0.9	18.1

100毫升奶液≈13.2克幼儿配方羊奶粉+90毫升水

食用方法



1 冲调配方奶粉之前须洗手，奶具须在开水中消毒。



2 将饮用水倒入干净容器中煮沸后冷却至40°C-50°C，将喂哺表中正确数量的水倒入奶瓶中。



3 慢慢用量勺将配方奶粉倒入水中（请参照喂哺表）。



4 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。



5 滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

贮藏方法

请置于阴凉干燥洁净处保存。开封后，盖好罐盖，并建议四周内食用完。请勿放置在冰箱内及高温、潮湿的环境中，以免影响产品的品质。

销售服务热线

400-801-9397

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽。

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

喂哺表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平均)	
0-2周	60	2	8
2-4周	90	3	7
1-2个月	120	4	6
2-3个月	150	5	6
3-4个月	180	6	5
4-6个月	210	7	5

温馨提示

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。
- 冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。



圣唐美可羊
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)



净含量: 800克
注册号: 国食注字 YP20230220



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2054
蛋白质	g	0.59	12.20
脂肪	g	1.17	24.10
亚油酸	g	0.15	3.08
α-亚麻酸	mg	19	390
碳水化合物	g	2.7	54.9
维生素			
维生素A	μg RE	22	452
维生素D	μg	0.60	12.32
维生素E	mg α-TE	0.36	7.39
维生素K ₁	μg	1.82	37.38
维生素B ₁	μg	19	390
维生素B ₂	μg	28	575
维生素B ₆	μg	16.8	345.1
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.417
烟酸(烟酰胺)	μg	131	2691
叶酸	μg	4.0	82.2
泛酸	μg	134	2752
维生素C	mg	4.1	84.2
生物素	μg	0.49	10.06
胆碱	mg	6.0	123.2
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	22	452
铜	μg	18.5	380.0
镁	mg	1.5	30.8
铁	mg	0.19	3.90
锌	mg	0.21	4.31
锰	μg	4.57	93.87
钙	mg	16	329
磷	mg	10	205
碘	μg	4.8	98.6
氯	mg	16	329
硒	μg	0.90	18.49
可选择成分			
肌醇	mg	2.7	55.5
牛磺酸	mg	1.7	34.9
左旋肉碱	mg	0.9	18.5
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.4
低聚半乳糖	g	0.04	0.89
低聚果糖	g	0.09	1.87
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.93
叶黄素	μg	4.08	83.80
乳铁蛋白	mg	0.76	15.61
酪蛋白磷酸肽	mg	1.59	32.66

100毫升奶液≈13.2克婴儿1段配方奶粉+90毫升水



食品生产许可证编号: SC10561052802876
产品标准代号: GB 10765-2021
产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品
保质期: 24个月
生产日期/批号: 见罐底
生产商: 陕西圣唐乳业有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县高新技术产业园区泰安路中段东侧
产地: 陕西·渭南
销售热线: 400-801-9397
网址: www.shengtangruiye.com



6 970942 487211

食用方法



冲调配方奶粉之前须
洗手，奶具须在开水中
消毒。



将饮用水倒入干净容器
中煮沸后冷却至40°C-50
°C，将喂哺表中正确数量
的水倒入奶瓶中。



慢慢用量勺将配方奶
粉倒入水中（请参照喂
哺表）。



盖紧奶瓶，摇匀至奶粉
充分溶解。



滴一滴奶液在手背测试
温度，确定适宜时即可喂
哺。

贮藏方法

请置于阴凉干燥处保存。开封后，盖好罐盖，并建议四周内食用完。请勿放置在冰箱内及高温、潮湿的环境中，以免影响产品的品质。

销售热线
400-801-9397

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽。

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠。

喂哺表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平均)	
0-2周	60	2	8
2-4周	90	3	7
1-2个月	120	4	6
2-3个月	150	5	6
3-4个月	180	6	5
4-6个月	210	7	5

温馨提示

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。
- 冲调好的奶液应及时饮用，剩剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。



圣唐美可羊
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)



净含量: 400克
注册号: 国食注字 YP20230220



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2054
蛋白质	g	0.59	12.20
脂肪	g	1.17	24.10
亚油酸	g	0.15	3.08
α-亚麻酸	mg	19	390
碳水化合物	g	2.7	54.9
维生素			
维生素A	μg RE	22	452
维生素D	μg	0.60	12.32
维生素E	mg α-TE	0.36	7.39
维生素K	μg	1.82	37.38
维生素B ₁	μg	19	390
维生素B ₂	μg	28	575
维生素B ₆	μg	16.8	345.1
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.417
烟酸(烟酰胺)	μg	131	2691
叶酸	μg	4.0	82.2
泛酸	μg	134	2752
维生素C	mg	4.1	84.2
生物素	μg	0.49	10.06
胆碱	mg	6.0	123.2
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	22	452
铜	μg	18.5	380.0
镁	mg	1.5	30.8
铁	mg	0.19	3.90
锌	mg	0.21	4.31
锰	μg	4.57	93.87
钙	mg	16	329
磷	mg	10	205
碘	μg	4.8	98.6
硒	μg	16	329
氯	μg	0.90	18.49
可选择成分			
肌醇	mg	2.7	55.5
牛磺酸	mg	1.7	34.9
左旋肉碱	mg	0.9	18.5
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.4
低聚半乳糖	g	5.0	102.7
低聚果糖	g	0.04	0.89
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.09	1.87
叶黄素	μg	0.24	4.93
乳铁蛋白	mg	4.08	83.80
酪蛋白磷酸肽	mg	0.76	15.61
	mg	1.59	32.66

100毫升奶液≈13.2克婴儿配方奶粉+90毫升水



食品生产许可证编号: SC10561052802876
产品标准代号: GB 10765-2021
产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品
保质期: 24个月
生产日期/批号: 见罐底
生产商: 陕西圣唐乳业有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县高新技术产业
开发区泰安路中段东侧
产地: 陕西·渭南
销售热线: 400-801-9397
网 址: www.shengtangruiye.com



6 970942 485552

食用方法

1 冲调配方奶粉之前须洗手，奶具须在开水中消毒。

2 将饮用水倒入干净容器中煮沸后冷却至40℃-50℃，将喂哺表中正确数量的水倒入奶瓶中。

3 慢慢用量勺将配方奶粉倒入水中（请参照喂哺表）。

4 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。

5 滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

贮藏方法

请置于阴凉干燥洁净处保存。开封后，盖好罐盖，并建议四周内食用完。请勿放置在冰箱内及高温、潮湿的环境中，以免影响产品的品质。

销售热线
400-801-9397

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽。

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

喂哺表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量（毫升）	量勺数（平勺）	
6-8个月	210	7	5
8-12个月	240	8	4

温馨提示

- 对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。
- 冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。



圣唐美可羊
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)



净含量：800克
注册号：国食注字 YP20230221



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1998
蛋白质	g	0.72	14.30
脂肪	g	1.09	21.80
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	54.4
维生素			
维生素A	μg RE	26	519
维生素D	μg	0.60	11.99
维生素E	mg α-TE	0.33	6.59
维生素K ₁	μg	2.03	40.56
维生素B ₁	μg	19	380
维生素B ₂	μg	24	480
维生素B ₆	μg	16.0	319.7
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.379
烟酸（烟酰胺）	μg	138	2757
叶酸	μg	3.9	77.9
泛酸	μg	147	2937
维生素C	mg	4.3	85.9
生物素	μg	0.54	10.79
胆碱	mg	6.0	119.9
矿物质			
钠	mg	7	140
钾	mg	24	480
铜	μg	14.3	285.7
镁	mg	1.6	32.0
铁	mg	0.30	5.99
锌	mg	0.21	4.20
锰	μg	4.39	87.71
钙	mg	22	440
磷	mg	14	280
碘	μg	4.6	91.9
氯	mg	20	400
硒	μg	0.68	13.59
可选择成分			
肌醇	mg	2.4	48.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	1.0	20.0
二十二碳六烯酸	mg	4.5	89.9
二十碳四烯酸	mg	4.9	97.9
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
叶黄素	μg	10.15	202.80
乳铁蛋白	mg	0.79	15.78
酪蛋白磷酸肽	mg	2.46	49.15

100毫升奶液≈13.2克较大婴儿配方奶粉+90毫升水



食品生产许可证编号：SC10561052802876
产品标准代号：GB 10766-2021
产品类型及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
保质期：24个月
生产日期/批号：见罐底
生产商：陕西圣唐乳业有限公司
地址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发中街中段东段
产地：陕西·渭南
销售热线：400-801-9397
网址：www.shengtangruiye.com



6 970942 487228

食用方法



冲调配方奶粉之前须洗手，奶具须在开水中消毒。



将饮用水倒入干净容器中煮沸后冷却至40°C-50°C，将喂哺表中正确数量的水倒入奶瓶中。



慢慢用量勺将配方奶粉倒入水中（请参照喂哺表）。



盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。



滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

贮藏方法

请置于阴凉干燥洁净处保存。开封后，盖好罐盖，并建议四周内食用完。请勿放置在冰箱内及高温、潮湿的环境中，以免影响产品的品质。

销售热线
400-801-9397

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽。

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碳酸钾、亚硒酸钠。

喂哺表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平勺)	
6-8个月	210	7	5
8-12个月	240	8	4

温馨提示

- 对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。
- 冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。



圣唐美可羊

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)



净含量: 400克
注册号: 国食注字 YP20230221



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1998
蛋白质	g	0.72	14.30
脂肪	g	1.09	21.80
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	54.4
维生素			
维生素A	μg RE	26	519
维生素D	μg	0.60	11.99
维生素E	mg α-TE	0.33	6.59
维生素K ₁	μg	2.03	40.56
维生素B ₁	μg	19	380
维生素B ₂	μg	24	480
维生素B ₆	μg	16.0	319.7
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.379
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2757
叶酸	μg	3.9	77.9
泛酸	μg	147	2937
维生素C	mg	4.3	85.9
生物素	μg	0.54	10.79
胆碱	mg	6.0	119.9
矿物质			
钠	mg	7	140
钾	mg	24	480
铜	μg	14.3	285.7
镁	mg	1.6	32.0
铁	mg	0.30	5.99
锌	mg	0.21	4.20
锰	μg	4.39	87.71
钙	mg	22	440
磷	mg	14	280
碘	μg	4.6	91.9
硒	μg	20	400
可选择成分			
肌醇	mg	2.4	48.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	1.0	20.0
二十二碳六烯酸	mg	4.5	89.9
二十碳四烯酸	mg	4.9	97.9
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
叶黄素	μg	10.15	202.80
乳铁蛋白	mg	0.79	15.78
酪蛋白磷酸肽	g	2.46	49.15

100毫升奶液≈13.2克较大婴儿配方奶粉+90毫升水



食品生产许可证编号: SC10561052802876
产品标准代号: GB 10766-2021
产品类别及属性: 乳基粉状较大婴儿配方食品
保质期: 24个月
生产日期/批号: 见罐底
生产商: 陕西圣唐乳业有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县高新技术产业园区秦安路中段东侧
产地: 陕西·渭南
销售热线: 400-801-9397
网址: www.shengtangruiye.com



6 970942 485569

食用方法



冲调配方奶粉之前须洗手，奶具须在开水中消毒。



将饮用水倒入干净容器中煮沸后冷却至40°C-50°C，将喂哺表中正确数量的水倒入奶瓶中。



慢慢用量勺将配方奶粉倒入水中(请参照喂哺表)。



盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。



滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

贮藏方法

请置于阴凉干燥洁净处保存。开封后，盖好罐盖，并建议四周内食用完。请勿放置在冰箱内及高温、潮湿的环境中，以免影响产品的品质。

销售热线
400-801-9397

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、肌醇、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽。

维生素: 醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘酚、硫酸胡萝卜素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素。

矿物质: 硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

喂哺表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平勺)	
12-36个月	240	8	3

温馨提示

- 对于12-36月龄的幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。
- 冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。



圣唐美可羊
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)



净含量: 800克
注册号: 国食注字 YP20230222



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.73	14.80
脂肪	g	1.15	23.10
亚油酸	g	0.11	2.22
α-亚麻酸	mg	15	302
碳水化合物	g	2.6	52.1
维生素			
维生素A	μg RE	26	524
维生素D	μg	0.60	12.10
维生素E	mg α-TE	0.33	6.65
维生素K ₁	μg	2.02	40.72
维生素B ₁	μg	20	403
维生素B ₂	μg	24	484
维生素B ₆	μg	15.8	318.5
维生素B ₁₂	μg	0.066	1.331
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2782
叶酸	μg	3.6	72.6
泛酸	μg	144	2903
维生素C	mg	3.8	76.6
生物素	μg	0.52	10.48
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	26	524
铜	μg	10.8	217.7
镁	mg	1.8	36.3
铁	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.20	4.03
钙	mg	22	444
磷	mg	14	282
碘	μg	4.2	84.7
氯	mg	22	444
可选择成分			
硒	μg	0.60	12.10
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	4.40	88.70
肌醇	mg	2.3	46.4
牛磺酸	mg	1.8	36.3
左旋肉碱	mg	1.0	20.2
二十二碳六烯酸	mg	4.2	84.7
二十碳四烯酸	mg	4.6	92.7
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.79
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.02
叶黄素	μg	10.07	203.01
乳铁蛋白	mg	0.79	15.93
酪蛋白磷酸肽	mg	2.52	50.80
100毫升奶液≈13.2克幼儿配方奶粉+90毫升水			



食品生产许可证编号: SC10561052802876
产品标准代号: GB 10767-2021
产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
保质期: 24个月
生产日期/批号: 见罐底
生产商: 陕西圣唐乳业有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县高新技术产业
开发区泰安路中段东侧
产地: 陕西·渭南
销售热线: 400-801-9397
网址: www.shengtangruiye.com



6 970942 487235

食用方法



冲调配方奶粉之前须洗手，奶具须在开水中消毒。



将饮用水倒入干净容器中煮沸后冷却至40°C-50°C，将喂哺表中正确数量的水倒入奶瓶中。



慢慢用量勺将配方奶粉倒入水中（请参照喂哺表）。



盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。



滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

贮藏方法

请置于阴凉干燥处保存。开封后，盖好罐盖，并建议四周内食用完。请勿放置在冰箱内及高温、潮湿的环境中，以免影响产品的品质。



销售服务热线
400-801-9397

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、肌醇、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽。

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素。

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

喂哺表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量（毫升）	量勺数（平勺）	
12-36个月	240	8	3

温馨提示

- 对于12-36月龄的幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。
- 冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。



圣唐美可羊

幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)



净含量: 400克
注册号: 国食注字 YP20230222



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.73	14.80
脂肪	g	1.15	23.10
亚油酸	g	0.11	2.22
α-亚麻酸	g	15	302
碳水化合物	g	2.6	52.1
维生素			
维生素A	μg RE	26	524
维生素D	μg	0.60	12.10
维生素E	mg α-TE	0.33	6.65
维生素K ₁	μg	2.02	40.72
维生素B ₁	μg	20	403
维生素B ₂	μg	24	484
维生素B ₆	μg	15.8	318.5
维生素B ₁₂	μg	0.066	1.331
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2782
叶酸	μg	3.6	72.6
泛酸	μg	144	2903
维生素C	mg	3.8	76.6
生物素	μg	0.52	10.48
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	26	524
铜	μg	10.8	217.7
镁	mg	1.8	36.3
铁	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.20	4.03
钙	mg	22	444
磷	mg	14	282
碘	μg	4.2	84.7
氯	mg	22	444
可选择成分			
硒	μg	0.60	12.10
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	4.40	88.70
肌醇	mg	2.3	46.4
牛磺酸	mg	1.8	36.3
左旋肉碱	mg	1.0	20.2
二十二碳六烯酸	mg	4.2	84.7
二十碳四烯酸	mg	4.6	92.7
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.79
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.02
叶黄素	μg	10.07	203.01
乳铁蛋白	mg	0.79	15.93
酪蛋白磷酸肽	mg	2.52	50.80
100毫升奶液≈13.2克幼儿配方奶粉+90毫升水			



食品生产许可证编号: SC10561052802876
产品标准代号: GB 10767-2021
产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
保质期: 24个月
生产日期/批号: 见罐底
生产商: 陕西圣唐乳业有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县高新技术产业
开发区秦安路中段东侧
产地: 陕西·渭南
销售热线: 400-801-9397
网址: www.shengtangruiye.com



6 970942 485576

食用方法

1 冲调配方奶粉之前须洗手，奶具须在开水中消毒。

2 将饮用水倒入干净容器中煮沸后冷却至40℃-50℃，将喂哺表中正确数量的水倒入奶瓶中。

3 慢慢用量勺将配方奶粉倒入水中（请参照喂哺表）。

4 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。

5 滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

贮藏方法

请置于阴凉干燥处保存。开封后，盖好罐盖，并建议四周内食用完。请勿放置在冰箱内及高温、潮湿的环境中，以免影响产品的品质。

销售热线
400-801-9397

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、肌醇、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽。

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素。

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

喂哺表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平勺)	
12-36个月	240	8	3

温馨提示

- 对于12-36月龄的幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。
- 冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。



圣唐美可羊
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)



净含量: 100克
注册号: 国食注字 YP20230222



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.73	14.80
脂肪	g	1.15	23.10
亚油酸	g	0.11	2.22
α-亚麻酸	g	15	302
碳水化合物	g	2.6	52.1
维生素			
维生素A	μg RE	26	524
维生素D	μg α-TE	0.60	12.10
维生素E	mg	0.33	6.65
维生素K ₁	μg	2.02	40.72
维生素B ₁	μg	20	403
维生素B ₂	μg	24	484
维生素B ₆	μg	15.8	318.5
维生素B ₁₂	μg	0.066	1.331
烟酸(烟酰胺)	mg	138	2782
叶酸	μg	3.6	72.6
泛酸	mg	144	2903
维生素C	mg	3.8	76.6
生物素	μg	0.52	10.48
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	26	524
铜	μg	10.8	217.7
镁	mg	1.8	36.3
铁	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.20	4.03
钙	mg	22	444
磷	mg	14	282
碘	μg	4.2	84.7
氯	mg	22	444
可选择成分			
硒	μg	0.60	12.10
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	4.40	88.70
肌醇	mg	2.3	46.4
牛磺酸	mg	1.8	36.3
左旋肉碱	mg	1.0	20.2
二十二碳六烯酸	mg	4.2	84.7
二十碳四烯酸	mg	4.6	92.7
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.79
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.02
叶黄素	mg	10.07	203.01
乳铁蛋白	mg	0.79	15.93
酪蛋白磷酸肽	mg	2.52	50.80

100毫升奶液≈13.2克幼儿配方奶粉+90毫升水



食品生产许可证编号: SC10561052802876
产品标准代号: GB 10767-2021
产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
保质期: 24个月
生产日期/批号: 见罐底
生产商: 陕西圣唐乳业有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
产地: 陕西·渭南
销售热线: 400-801-9397
网址: www.shengtangruye.com



6 970942 485545

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、大豆油、磷脂、肌醇、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

维生素: 醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠。

贮存条件

请置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内冷藏。产品开封后,请于1个月内食用完毕,每次食用后请务必密封封余乳粉,以免吸潮或掺入异物。

官方微信公众号

扫码关注
了解更多
获得更多资讯和会员权益

6 970942 487181

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2068
蛋白质	g	0.58	11.90
脂肪	g	1.20	24.80
亚油酸	g	0.15	3.10
α-亚麻酸	mg	19	393
碳水化合物	g	2.6	54.5
维生素			
维生素A	μg RE	22	455
维生素D	μg	0.60	12.41
维生素E	mg α-TE	0.37	7.65
维生素K ₁	μg	1.83	37.84
维生素B ₁	μg	20	414
维生素B ₂	μg	28	579
维生素B ₆	μg	16.8	347.4
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.448
烟酸(烟酰胺)	μg	131	2709
叶酸	μg	4.0	82.7
泛酸	μg	134	2771
维生素C	mg	4.1	84.8
生物素	μg	0.49	10.13
胆碱	mg	6.0	124.1
矿物质			
钠	mg	9	186
钾	mg	22	455
铜	μg	18.5	382.6
镁	mg	1.5	31.0
铁	mg	0.19	3.93
锌	mg	0.21	4.34
锰	μg	4.57	94.51
钙	mg	16	331
磷	mg	10	207
碘	μg	4.8	99.3
氯	mg	16	331
硒	μg	0.90	18.61
可选择成分			
肌醇	mg	3.2	66.2
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.1
二十碳四烯酸	mg	4.9	101.3
低聚半乳糖	g	0.04	0.89
低聚果糖	g	0.09	1.87
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.96
叶黄素	μg	4.08	84.37
乳铁蛋白	mg	0.76	15.72
100毫升奶液≈13.2克婴儿配方乳粉+90毫升水			

宝乐滋

1

净含量: 800克 国食注字YP20230223

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄, 1段)

奶具消毒及食用方法

1. 调奶之前请先洗手。

2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,放入沸水中煮5分钟消毒。

3. 饮用水煮沸,冷却至40°C-50°C,预备使用。

4. 参照“喂哺用量建议表”将正确数量的水倒入奶瓶,使用专用的量勺加入乳粉。

5. 盖紧奶瓶,摇匀至乳粉充分溶解。

6. 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

温馨提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可用本产品。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平勺)	
0-2周	60	2	8
2-4周	90	3	7
1-2个月	120	4	6
2-3个月	150	5	6
3-4个月	180	6	5
4-6个月	210	7	5

温馨提示

未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。冲调好的奶液应及时饮用,喂哺或加热超过2小时的奶液勿再食用。

食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品标准代号:GB 10765-2021
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
保质期:24个月
生产日期/批号:见罐底
生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发
泰安路中段东侧
网站:www.shengtangruiye.com
产地:陕西·渭南
销售热线:029-85733375

产品咨询热线

400-034-0899

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、大豆油、磷脂、肌醇、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

维生素: 醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

贮存条件

请置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内冷藏。产品开封后,请于1个月内食用完毕,每次食用后请务必密封剩余乳粉,以免吸潮或掉入异物。

官方微信公众号

扫码关注
了解更多
获得更多资讯和会员权益

6 970942 485767



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2068
蛋白质	g	0.58	11.90
脂肪	g	1.20	24.80
亚油酸	g	0.15	3.10
α-亚麻酸	mg	19	393
碳水化合物	g	2.6	54.5
维生素			
维生素A	μg RE	22	455
维生素D	μg	0.60	12.41
维生素E	mg α-TE	0.37	7.65
维生素K ₁	μg	1.83	37.84
维生素B ₁	μg	20	414
维生素B ₂	μg	28	579
维生素B ₆	μg	16.8	347.4
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.448
烟酸(烟酰胺)	μg	131	2709
叶酸	μg	4.0	82.7
泛酸	μg	134	2771
维生素C	mg	4.1	84.8
生物素	mg	0.49	10.13
胆碱	mg	6.0	124.1
矿物质			
钠	mg	9	186
钾	mg	22	455
铜	μg	18.5	382.6
镁	mg	1.5	31.0
铁	mg	0.19	3.93
锌	mg	0.21	4.34
锰	μg	4.57	94.51
钙	mg	16	331
磷	mg	10	207
碘	μg	4.8	99.3
硒	μg	16	331
氯	mg	0.90	18.61
可选择成分			
肌醇	mg	3.2	66.2
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.1
二十碳四烯酸	mg	4.9	101.3
低聚半乳糖	g	0.04	0.89
低聚果糖	g	0.09	1.87
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.96
叶黄素	μg	4.08	84.37
乳铁蛋白	mg	0.76	15.72
100毫升奶液≈13.2克婴儿配方乳粉+90毫升水			



净含量: 300克 国食注字YP20230223

1

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄, 1段)

奶具消毒及食用方法



1. 调奶之前请先洗手。

2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,放入沸水中煮5分钟消毒。

3. 饮用水煮沸,冷却至40°C-50°C,预备使用。

4. 参照“喂哺用量建议表”将正确数量的水倒入奶瓶,使用专用的量勺加入乳粉。

5. 盖紧奶瓶,摇匀至乳粉充分溶解。

6. 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

温馨提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

喂哺用量建议表			
月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平勺)	
0-2周	60	2	8
2-4周	90	3	7
1-2个月	120	4	6
2-3个月	150	5	6
3-4个月	180	6	5
4-6个月	210	7	5
温馨提示			
未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。冲调好的奶液应及时饮用,喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。			

食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品标准代号:GB 10765-2021
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
保质期:24个月
生产日期/批号:见罐底
生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发
泰安路中段东侧
网站:www.shengtangruiye.com
产地:陕西·渭南
销售热线:029-85733375

 产品咨询热线
400-034-0899

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、大豆油、磷脂、肌醇、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

维生素: 醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2068
蛋白质	g	0.58	11.90
脂肪	g	1.20	24.80
亚油酸	g	0.15	3.10
α-亚麻酸	mg	19	393
碳水化合物	g	2.6	54.5
维生素			
维生素A	μg RE	22	455
维生素D	μg	0.60	12.41
维生素E	mg α-TE	0.37	7.65
维生素K ₁	μg	1.83	37.84
维生素B ₁	μg	20	414
维生素B ₂	μg	28	579
维生素B ₆	μg	16.8	347.4
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.448
烟酸(烟酰胺)	μg	131	2709
叶酸	μg	4.0	82.7
泛酸	μg	134	2771
维生素C	mg	4.1	84.8
生物素	μg	0.49	10.13
胆碱	mg	6.0	124.1
矿物质			
钠	mg	9	186
钾	mg	22	455
铜	μg	18.5	382.6
镁	mg	1.5	31.0
铁	mg	0.19	3.93
锌	mg	0.21	4.34
锰	μg	4.57	94.51
钙	mg	16	331
磷	mg	10	207
碘	μg	4.8	99.3
氯	mg	16	331
硒	μg	0.90	18.61
可选择成分			
肌醇	mg	3.2	66.2
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.1
二十碳四烯酸	mg	4.9	101.3
低聚半乳糖	g	0.04	0.89
低聚果糖	g	0.09	1.87
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.96
叶黄素	μg	4.08	84.37
乳铁蛋白	mg	0.76	15.72

贮存条件

请置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏。产品开封后，请于1个月内食用完毕，每次食用后请务必密封剩余乳粉，以免吸潮或掉入异物。

官方微信公众

扫码关注
了解更多
获得更多资讯和会员权益

6 970942 485798



圣唐乳业



宝乐滋

净含量: 100克 国食注字YP20230223

1

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄, 1段)

奶具消毒及食用方法

1. 调奶之前请先洗手。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净，放入沸水中煮5分钟消毒。
3. 饮用水煮沸，冷却至40℃-50℃，预备使用。
4. 参照“喂哺用量建议表”将正确数量的水倒入奶瓶，使用专用的量勺加入乳粉。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至乳粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度，确定温度适宜时即可喂哺。

温馨提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平勺)	
0-2周	60	2	8
2-4周	90	3	7
1-2个月	120	4	6
2-3个月	150	5	6
3-4个月	180	6	5
4-6个月	210	7	5

温馨提示

未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。

食品生产许可证编号: SC10561052802876
产品标准代号: GB 10765-2021
产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品
保质期: 24个月
生产日期/批号: 见罐底
生产商: 陕西圣唐乳业有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县高新技术产业开发
泰安路中段东侧
网站: www.shengtangruiye.com
产地: 陕西·渭南
销售热线: 029-85733375

产品咨询热线
400-034-0899

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、大豆油、磷脂、肌醇、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。
维生素: 醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。
矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

贮存条件

请置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内冷藏。产品开封后,请于1个月内食用完毕,每次食用后请务必密封剩余乳粉,以免吸潮或掉入异物。

官方微信公众号

扫码关注
了解更多
获得更多资讯和会员权益

6 970942 485156



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2068
蛋白质	g	0.58	11.90
脂肪	g	1.20	24.80
亚油酸	g	0.15	3.10
α-亚麻酸	mg	19	393
碳水化合物	g	2.6	54.5
维生素			
维生素A	μg RE	22	455
维生素D	μg	0.60	12.41
维生素E	mg α-TE	0.37	7.65
维生素K ₁	μg	1.83	37.84
维生素B ₁	μg	20	414
维生素B ₂	μg	28	579
维生素B ₆	μg	16.8	347.4
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.448
烟酸(烟酰胺)	μg	131	2709
叶酸	μg	4.0	82.7
泛酸	μg	134	2771
维生素C	mg	4.1	84.8
生物素	μg	0.49	10.13
胆碱	mg	6.0	124.1
矿物质			
钠	mg	9	186
钾	mg	22	455
铜	μg	18.5	382.6
镁	mg	1.5	31.0
铁	mg	0.19	3.93
锌	mg	0.21	4.34
锰	μg	4.57	94.51
钙	mg	16	331
磷	mg	10	207
碘	μg	4.8	99.3
氯	mg	16	331
硒	μg	0.90	18.61
可选择成分			
肌醇	mg	3.2	66.2
二十碳六烯酸	mg	4.5	93.1
二十碳四烯酸	mg	4.9	101.3
低聚半乳糖	g	0.04	0.89
低聚果糖	g	0.09	1.87
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.96
叶黄素	μg	4.08	84.37
乳铁蛋白	mg	0.76	15.72

100毫升奶液≈13.2克婴儿配方乳粉+90毫升水



净含量: 75克 国食注字YP20230223

1

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄, 1段)

奶具消毒及食用方法



1. 调奶之前请先洗手。



2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,放入沸水中煮5分钟消毒。



3. 饮用水煮沸,冷却至40°C-50°C,预备使用。



4. 参照“喂哺用量建议表”将正确数量的水倒入奶瓶,使用专用的量勺加入乳粉。



5. 盖紧奶瓶,摇匀至乳粉充分溶解。



6. 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

温馨提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

喂哺用量建议表			
月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平均)	
0-2周	60	2	8
2-4周	90	3	7
1-2个月	120	4	6
2-3个月	150	5	6
3-4个月	180	6	5
4-6个月	210	7	5

温馨提示

未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。冲调好的奶液应及时饮用,喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。

食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品标准代号:GB 10765-2021
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
保质期:24个月
生产日期/批号:见罐底
生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发
泰安路中段东侧
网站:www.shengtangruiye.com
产地:陕西·渭南
销售热线:029-85733375

 产品咨询热线
400-034-0899

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、磷脂、肌醇、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

维生素: 醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质: 硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠。

贮存条件

请置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏。产品开封后，请于1个月内食用完毕，每次食用后请务必密封剩余乳粉，以免吸潮或掉入异物。

官方微信公众号
扫码关注
了解更多
获得更多资讯和会员权益

6 970942 1487198



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.70	14.10
脂肪	g	1.10	22.00
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	mg	16	321
碳水化合物	g	2.7	54.5
维生素A	μg RE	26	521
维生素D	μg	0.60	12.02
维生素E	mg α-TE	0.38	7.62
维生素K ₁	μg	2.09	41.88
维生素B ₁	μg	19	381
维生素B ₂	μg	24	481
维生素B ₆	μg	16.0	320.6
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.383
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2766
叶酸	μg	3.9	78.2
泛酸	μg	141	2826
维生素C	mg	4.3	86.2
生物素	μg	0.54	10.82
胆碱	mg	6.0	120.2
矿物质			
钠	mg	7	140
钾	mg	24	481
铜	μg	14.3	286.6
镁	mg	1.5	30.1
铁	mg	0.30	6.01
锌	mg	0.21	4.21
锰	μg	4.38	87.78
钙	mg	22	441
磷	mg	14	281
碘	μg	4.6	92.2
氯	mg	20	401
硒	μg	0.68	13.63
可选择成分			
肌醇	mg	3.2	64.1
二十二碳六烯酸	mg	4.7	94.2
二十碳四烯酸	mg	5.3	106.2
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.77
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.01
叶黄素	μg	10.15	203.41
乳铁蛋白	mg	0.79	15.83

100毫升奶液≈13.2克较大婴儿配方乳粉+90毫升水




宝乐滋

净含量: 800克 国食注字YP20230224

2

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄, 2段)

奶具消毒及食用方法



1. 调奶之前请先洗手。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,放入沸水中煮5分钟消毒。
3. 饮用开水煮沸,冷却至40°C-50°C,预备使用。
4. 参照“喂哺用量建议表”将正确数量的水倒入奶瓶,使用专用的量勺加入乳粉。
5. 盖紧奶瓶,摇匀至乳粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

温馨提示

对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平勺)	
6-8个月	210	7	5
8-12个月	240	8	4

温馨提示

未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。冲调好的奶液应及时饮用,喂哺或加热超过2小时的奶液勿再食用。

食品生产许可证编号: SC10561052802876
产品标准代号: GB 10766-2021
产品类别及属性: 乳基粉状较大婴儿配方食品
保质期: 24个月
生产日期/批号: 见罐底
生产商: 陕西圣唐乳业有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区
泰安路中段东侧
网站: www.shengtangruye.com
产地: 陕西·渭南
销售热线: 029-85733375

产品咨询热线
400-034-0899

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、磷脂、肌醇、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

维生素: 醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质: 硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、碘酸钾、亚硒酸钠。

贮存条件

请置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内冷藏。产品开封后,请于1个月内食用完毕,每次食用后请务必密封剩余乳粉,以免吸潮或掉入异物。

官方微信公众号

扫码关注
了解更多
获得更多资讯和会员权益

6 970942 485774



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.70	14.10
脂肪	g	1.10	22.00
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	mg	16	321
碳水化合物	g	2.7	54.5
维生素			
维生素A	μg RE	26	521
维生素D	μg	0.60	12.02
维生素E	mg α-TE	0.38	7.62
维生素K ₁	μg	2.09	41.88
维生素B ₁	μg	19	381
维生素B ₂	μg	24	481
维生素B ₆	μg	16.0	320.6
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.383
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2766
叶酸	μg	3.9	78.2
泛酸	μg	141	2826
维生素C	mg	4.3	86.2
生物素	μg	0.54	10.82
胆碱	mg	6.0	120.2
矿物质			
钠	mg	7	140
钾	mg	24	481
铜	μg	14.3	286.6
镁	mg	1.5	30.1
铁	mg	0.30	6.01
锌	mg	0.21	4.21
锰	μg	4.38	87.78
钙	mg	22	441
磷	mg	14	281
碘	μg	4.6	92.2
氯	mg	20	401
硒	μg	0.68	13.63
可选择成分			
肌醇	mg	3.2	64.1
二十二碳六烯酸	mg	4.7	94.2
二十碳四烯酸	mg	5.3	106.2
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.77
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.01
叶黄素	μg	10.15	203.41
乳铁蛋白	mg	0.79	15.83
100毫升奶液≈13.2克较大婴儿配方乳粉+90毫升水			



净含量: 300克 国食注字YP20230224

2

较大婴儿配方羊乳粉

(6-12月龄, 2段)

奶具消毒及食用方法



1. 调奶之前请先洗手。



2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,放入沸水中煮5分钟消毒。



3. 饮用水煮沸,冷却至40°C-50°C,预备使用。



4. 参照“喂哺用量建议表”将正确数量的水倒入奶瓶,使用专用的量勺加入乳粉。



5. 盖紧奶瓶,摇匀至乳粉充分溶解。



6. 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

温馨提示

对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

喂哺用量建议表			
月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平勺)	
6-8个月	210	7	5
8-12个月	240	8	4
温馨提示			
未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。冲调好的奶液应及时饮用,喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。			

食品生产许可证编号:SC10561052802876

产品标准代号:GB 10766-2021

产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品

保质期:24个月

生产日期/批号:见罐底

生产商:陕西圣唐乳业有限公司

地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发

泰安路中段东侧

网站:www.shengtangruiye.com

产地:陕西·渭南

销售热线:029-85733375

 产品咨询热线
400-034-0899

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、磷脂、肌醇、氯化胆碱、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

维生素: 醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素。

矿物质: 硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

贮存条件

请置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内冷藏。产品开封后,请于1个月内食用完毕,每次食用后请务必密封剩余乳粉,以免吸潮或掉入异物。

官方微信公众号

扫码关注
了解更多
获得更多资讯和会员权益

6 970942 487204




营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2028
蛋白质	g	0.72	14.70
脂肪	g	1.17	23.70
亚油酸	g	0.11	2.23
α-亚麻酸	mg	15	304
碳水化合物	g	2.5	51.6
维生素			
维生素A	μg RE	26	527
维生素D	μg	0.60	12.17
维生素E	mg α-TE	0.38	7.71
维生素K ₁	μg	2.08	42.18
维生素B ₁	μg	20	406
维生素B ₂	μg	24	487
维生素B ₆	μg	15.8	320.4
维生素B ₁₂	μg	0.066	1.338
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2799
叶酸	μg	3.6	73.0
泛酸	μg	141	2859
维生素C	mg	3.8	77.1
生物素	μg	0.52	10.55
矿物质			
钠	mg	7	142
钾	mg	26	527
铜	μg	10.8	219.0
镁	mg	1.8	36.5
铁	mg	0.30	6.08
锌	mg	0.20	4.06
钙	mg	22	446
磷	mg	14	284
碘	μg	4.2	85.2
氯	mg	22	446
可选择成分			
硒	μg	0.60	12.17
胆碱	mg	6.0	121.7
锰	μg	4.40	89.23
肌醇	mg	3.1	62.9
二十二碳六烯酸	mg	4.6	93.3
二十碳四烯酸	mg	5.0	101.4
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.79
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.04
叶黄素	μg	10.06	204.02
乳铁蛋白	mg	0.78	15.82
100毫升奶液≈13.2克幼儿配方乳粉+90毫升水			



宝乐滋



净含量: 800克 国食注字YP20230225

3

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

奶具消毒及食用方法

- ① 调奶之前请先洗手。
- ② 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,放入沸水中煮5分钟消毒。
- ③ 饮用水煮沸,冷却至40°C-50°C,预备使用。
- ④ 参照“喂哺用量建议表”将正确数量的水倒入奶瓶,使用专用的量勺加入乳粉。
- ⑤ 盖紧奶瓶,摇匀至乳粉充分溶解。
- ⑥ 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

温馨提示

对于12-36月龄的幼儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

喂哺用量建议表			
月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量 (毫升)	量勺数 (平勺)	
12-36个月	240	8	3

温馨提示

未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。冲调好的奶液应及时饮用,喂哺或加热超过2小时的奶液勿再食用。

食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品标准代号:GB 10767-2021
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
保质期:24个月
生产日期/批号:见罐底
生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发
泰安路中段东侧
网站:www.shengtangruiye.com
产地:陕西·渭南
销售热线:029-85733375

 产品咨询热线
400-034-0899

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、磷脂、肌醇、氯化胆碱、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

维生素:醋酸视黄酯、胆钙化醇、d1-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素。

矿物质:硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、碘酸钾、亚硒酸钠。

贮存条件

请置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内冷藏。产品开封后,请于1个月内食用完毕,每次食用后请务必密封剩余乳粉,以免吸潮或掉入异物。

官方微信公众号

扫码关注
了解更多
获得更多资讯和会员权益

6 970942 485781



营养成分表				
项目	单位	每100kJ	每100g	
能量	kJ	100	2028	
蛋白质	g	0.72	14.70	
脂肪	g	1.17	23.70	
亚油酸	g	0.11	2.23	
α-亚麻酸	mg	15	304	
碳水化合物	g	2.5	51.6	
维生素				
维生素A	μg RE	26	527	
维生素D	μg	0.60	12.17	
维生素E	mg α-TE	0.38	7.71	
维生素K ₁	μg	2.08	42.18	
维生素B ₁	μg	20	406	
维生素B ₂	μg	24	487	
维生素B ₆	μg	15.8	320.4	
维生素B ₁₂	μg	0.066	1.338	
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2799	
叶酸	μg	3.6	73.0	
泛酸	μg	141	2859	
维生素C	mg	3.8	77.1	
生物素	μg	0.52	10.55	
矿物质				
钠	mg	7	142	
钾	mg	26	527	
铜	μg	10.8	219.0	
镁	mg	1.8	36.5	
铁	mg	0.30	6.08	
锌	mg	0.20	4.06	
钙	mg	22	446	
磷	mg	14	284	
碘	μg	4.2	85.2	
氯	mg	22	446	
可选择成分				
硒	μg	0.60	12.17	
胆碱	mg	6.0	121.7	
锰	μg	4.40	89.23	
肌醇	mg	3.1	62.9	
二十二碳六烯酸	mg	4.6	93.3	
二十碳四烯酸	mg	5.0	101.4	
低聚半乳糖	g	0.06	1.18	
低聚果糖	g	0.09	1.79	
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.04	
叶黄素	μg	10.06	204.02	
乳铁蛋白	mg	0.78	15.82	
100毫升奶液≈13.2克幼儿配方乳粉+90毫升水				



净含量: 300克 国食注字YP20230225

3

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

奶具消毒及食用方法



1. 调奶之前请先洗手。

2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,放入沸水中煮5分钟消毒。

3. 饮用水煮沸,冷却至40°C-50°C,预备使用。

4. 参照“喂哺用量建议表”将正确数量的水倒入奶瓶,使用专用的量勺加入乳粉。

5. 盖紧奶瓶,摇匀至乳粉充分溶解。

6. 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

温馨提示

对于12-36月龄的幼儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平勺)	
12-36个月	240	8	3

温馨提示

未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。冲调好的奶液应及时饮用,喂哺或加热超过2小时的奶液勿再食用。

食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品标准代号:GB 10767-2021
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
保质期:24个月
生产日期/批号:见罐底
生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发
泰安路中段东侧
网站:www.shengtangruiye.com
产地:陕西·渭南
销售热线:029-85733375

 产品咨询热线
400-034-0899