

附件 2：陕西优利士乳业集团有限责任公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 1

奶具消毒及食用方法



1 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。



2 将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。



3 调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。



4 依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。



5 再依推荐喂哺表的指示，加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。



6 摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6 949008 404790

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数
	温开水 (mL)	乳粉 (g) (平匙)	
0-1周	60	9	2
1-2周	90	13.5	3
2-4周	120	18	4
1-2月	150	22.5	5
2-4月	180	27	6
4-6月	210	31.5	7

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳



金瑞优®



段

净含量:100克 国食注字 YP20170648

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2081	镁	mg	1.7	34.8
蛋白质	g	0.49	10.20	铁	mg	0.19	3.90
脂肪	g	1.18	24.50	锌	mg	0.19	3.90
亚油酸	g	0.15	3.16	锰	μg	2.78	57.94
α-亚麻酸	mg	20	410	钙	mg	16	325
碳水化合物	g	2.8	57.82	磷	mg	11	226
维生素				碘	μg	4.5	93.6
维生素A	μg RE	18	383	氯	mg	15	321
维生素D	μg	0.60	12.49	硒	μg	0.90	18.73
维生素E	mg α-TE	0.27	5.71	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.85	38.60	肌醇	mg	3.2	66.8
维生素B ₁	μg	25	510	牛磺酸	mg	1.7	36.2
维生素B ₂	μg	39	815	左旋肉碱	mg	1.5	31.8
维生素B ₆	μg	15.1	313.9	二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.725	二十碳四烯酸	mg	5.4	111.8
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3090	膳食纤维			
叶酸	μg	4.3	90.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	158	3296	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.7	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.71	14.82	1,3-二油酸-2-棕	g	0.26	5.33
胆碱	mg	6.0	124.9	桐酸甘油三酯			
矿物质				叶黄素	μg	1.9	40.0
钠	mg	9	182	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	21	442	酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	62.3
铜	μg	17.9	372.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂(ARA)、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。

标签 2

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残留奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉		乳粉 (次)
		(g)	(平匙)	
0-1周	60	9	2	8
1-2周	90	13.5	3	6
2-4周	120	18	4	5
1-2月	150	22.5	5	5
2-4月	180	27	6	5
4-6月	210	31.5	7	5

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限公司
产地：陕西 咸阳
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状
保质期：24个月

产品信息及产品研发商
www.sxruyo.com

产品服务热线
400-692-8998

优利士®

金瑞优®

1

段

净含量:300克 国食注字 YP20170648

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2081	镁	mg	1.7	34.8
蛋白质	g	0.49	10.20	铁	mg	0.19	3.90
脂肪	g	1.18	24.50	锌	mg	0.19	3.90
亚油酸	g	0.15	3.16	锰	μg	2.78	57.94
α-亚麻酸	mg	20	410	钙	mg	16	325
碳水化合物	g	2.8	57.82	磷	mg	11	226
维生素				碘	μg	4.5	93.6
维生素A	μg RE	18	383	氯	mg	15	321
维生素D	μg	0.60	12.49	硒	μg	0.90	18.73
维生素E	mg α-TE	0.27	5.71	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.85	38.60	肌醇	mg	3.2	66.8
维生素B ₁	μg	25	510	牛磺酸	mg	1.7	36.2
维生素B ₂	μg	39	815	左旋肉碱	mg	1.5	31.8
维生素B ₆	μg	15.1	313.9	二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.725	二十碳四烯酸	mg	5.4	111.8
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3090	膳食纤维			
叶酸	μg	4.3	90.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	158	3296	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.7	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.71	14.82	1,3-二油酸-2-棕	g	0.26	5.33
胆碱	mg	6.0	124.9	棕榈酸甘油三酯			
矿物质				叶黄素	μg	1.9	40.0
钠	mg	9	182	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	21	442	酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	62.3
铜	μg	17.9	372.0				

说明:每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、葡萄糖、花生四烯酸油脂(ARA)、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。

标签 3

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残留奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉		乳粉 (次)
		(g)	(平匙)	
0-1周	60	9	2	8
1-2周	90	13.5	3	6
2-4周	120	18	4	5
1-2月	150	22.5	5	5
2-4月	180	27	6	5
4-6月	210	31.5	7	5

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
产地：陕西 咸阳
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状
保质期：24个月

产品信息及产品材料查询
www.sxruyo.com

产品服务热线
400-692-8998

优利士®

金瑞优®

1

段

净含量: 350克 国食注字 YP20170648

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄, 1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2081	镁	mg	1.7	34.8
蛋白质	g	0.49	10.20	铁	mg	0.19	3.90
脂肪	g	1.18	24.50	锌	mg	0.19	3.90
亚油酸	g	0.15	3.16	锰	μg	2.78	57.94
α-亚麻酸	mg	20	410	钙	mg	16	325
碳水化合物	g	2.8	57.82	磷	mg	11	226
维生素				碘	μg	4.5	93.6
维生素A	μg RE	18	383	氯	mg	15	321
维生素D	μg	0.60	12.49	硒	μg	0.90	18.73
维生素E	mg α-TE	0.27	5.71	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.85	38.60	肌醇	mg	3.2	66.8
维生素B ₁	μg	25	510	牛磺酸	mg	1.7	36.2
维生素B ₂	μg	39	815	左旋肉碱	mg	1.5	31.8
维生素B ₆	μg	15.1	313.9	二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.725	二十碳四烯酸	mg	5.4	111.8
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3090	膳食纤维			
叶酸	μg	4.3	90.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	158	3296	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.7	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.71	14.82	1,3-二油酸-2-棕	g	0.26	5.33
胆碱	mg	6.0	124.9	棕榈酸甘油三酯			
矿物质				叶黄素	μg	1.9	40.0
钠	mg	9	182	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	21	442	酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	62.3
铜	μg	17.9	372.0				

说明: 每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、葡萄糖、花生四烯酸油脂(ARA)、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、酪酸初黄脂(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。

标签 4

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残留奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉		乳粉 (次)
		(g)	(平匙)	
0-1周	60	9	2	8
1-2周	90	13.5	3	6
2-4周	120	18	4	5
1-2月	150	22.5	5	5
2-4月	180	27	6	5
4-6月	210	31.5	7	5

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品

产品标准代号：GB 10765-2021

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司

产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状

保质期：24个月

产品信息及原料查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

优利士®

金瑞优®

1

段

净含量: 400克 国食注字 YP20170648

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄, 1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2081	镁	mg	1.7	34.8
蛋白质	g	0.49	10.20	铁	mg	0.19	3.90
脂肪	g	1.18	24.50	锌	mg	0.19	3.90
亚油酸	g	0.15	3.16	锰	μg	2.78	57.94
α-亚麻酸	mg	20	410	钙	mg	16	325
碳水化合物	g	2.8	57.82	磷	mg	11	226
维生素				碘	μg	4.5	93.6
维生素A	μg RE	18	383	氯	mg	15	321
维生素D	μg	0.60	12.49	硒	μg	0.90	18.73
维生素E	mg α-TE	0.27	5.71	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.85	38.60	肌醇	mg	3.2	66.8
维生素B ₁	μg	25	510	牛磺酸	mg	1.7	36.2
维生素B ₂	μg	39	815	左旋肉碱	mg	1.5	31.8
维生素B ₆	μg	15.1	313.9	二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.725	二十碳四烯酸	mg	5.4	111.8
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3090	膳食纤维			
叶酸	μg	4.3	90.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	158	3296	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.7	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.71	14.82	1,3-二油酸-2-棕			
胆碱	mg	6.0	124.9	桐酸甘油三酯	g	0.26	5.33
矿物质				叶黄素	μg	1.9	40.0
钠	mg	9	182	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	21	442	酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	62.3
铜	μg	17.9	372.0				

说明: 每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油酯(ARA)、核桃油、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、维生素A、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、泛酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。

标签 5

奶具消毒及食用方法



1 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。



2 将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。



3 调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。



4 依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。



5 再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。



6 摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉		乳粉 (次)
		(g)	(平匙)	
0-1周	60	9	2	8
1-2周	90	13.5	3	6
2-4周	120	18	4	5
1-2月	150	22.5	5	5
2-4月	180	27	6	5
4-6月	210	31.5	7	5

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品信息

产品类别：婴儿配方食品 产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10765-2021 保质期：24个月
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司 产地：陕西 咸阳
地址：陕西省咸阳市乾县县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

优利士

金瑞优



段

净含量：700克 国食注字 YP20170648

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄, 1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2081	镁	mg	1.7	34.8
蛋白质	g	0.49	10.20	铁	mg	0.19	3.90
脂肪	g	1.18	24.50	锌	mg	0.19	3.90
亚油酸	g	0.15	3.16	锰	μg	2.78	57.94
α-亚麻酸	mg	20	410	钙	mg	16	325
碳水化合物	g	2.8	57.82	磷	mg	11	226
维生素				碘	μg	4.5	93.6
维生素A	μg RE	18	383	氯	mg	15	321
维生素D	μg	0.60	12.49	硒	μg	0.90	18.73
维生素E	mg α-TE	0.27	5.71	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.85	38.60	肌醇	mg	3.2	66.8
维生素B ₁	μg	25	510	牛磺酸	mg	1.7	36.2
维生素B ₂	μg	39	815	左旋肉碱	mg	1.5	31.8
维生素B ₆	μg	15.1	313.9	二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.6
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.725	二十碳四烯酸	mg	5.4	111.8
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3090	膳食纤维			
叶酸	μg	4.3	90.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	158	3296	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.7	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.71	14.82	1,3-二油酸-2-棕			
胆碱	mg	6.0	124.9	桐酸甘油三酯	g	0.26	5.33
矿物质				叶黄素	μg	1.9	40.0
钠	mg	9	182	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	21	442	酸蛋白磷酸肽	mg	3.0	62.3
铜	μg	17.9	372.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、葡萄糖、花生四烯酸油酯(ARA)、核桃油、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、胆碱视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育酚(维生素E)、植物甲萘酚(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钾、磷酸三钙、柠檬酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷酯。

产品信息及资料查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998





6 949008 405032

标签 7

奶具消毒及食用方法



① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。



② 将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。



③ 调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。



④ 依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。



⑤ 再依推荐喂哺表的指示，加入准确份量(平匙)的乳粉。只可用专用量匙。



⑥ 摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示： 调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

6~12月龄较大婴儿食用本产时，须配合添加辅助食品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉 (g) (平匙)	乳粉 (次)	
6-12月	210	31.5	7	3-4

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：较大婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10766-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳



6 949008 403779



产品信息及产品资料查询
www.sxruyo.com



产品咨询热线
400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

优利士®

金瑞优®



段

净含量:100克 国食注字 YP20170649
较大婴儿配方羊乳粉
(6—12月龄,2段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2078	镁	mg	1.9	40.0
蛋白质	g	0.58	12.10	铁	mg	0.30	6.23
脂肪	g	1.18	24.60	锌	mg	0.18	3.82
亚油酸	g	0.13	2.74	锰	μg	3.02	62.80
α-亚麻酸	mg	17	361	钙	mg	21	442
碳水化合物	g	2.7	55.52	磷	mg	14	292
维生素				碘	μg	4.5	93.5
维生素A	μg RE	23	468	氯	mg	19	405
维生素D	μg	0.60	12.47	硒	μg	0.69	14.27
维生素E	mg α-TE	0.27	5.53	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.88	39.07	肌醇	mg	3.0	61.8
维生素B ₁	μg	25	514	牛磺酸	mg	1.7	35.3
维生素B ₂	μg	35	718	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μg	14.8	308.0	二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.5
维生素B ₁₂	μg	0.125	2.602	二十碳四烯酸	mg	5.5	114.1
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3069	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	157	3265	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.8	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.73	15.19	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.33
胆碱	mg	6.0	124.7	叶黄素	μg	7.8	162.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钠	mg	6	123	酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	68.2
钾	mg	24	503				
铜	μg	13.4	277.9				

说明:每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂(ARA)、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。

标签 8

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉		乳粉 (次)
		(g)	(平匙)	
6-12月	210	31.5	7	3-4

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：较大婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状

产品标准代号：GB 10766-2021

保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司

产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

产品信息及产品资料查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

优利士

金瑞优



段

净含量:300克 国食注字 YP20170649

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2078	镁	mg	1.9	40.0
蛋白质	g	0.58	12.10	铁	mg	0.30	6.23
脂肪	g	1.18	24.60	锌	mg	0.18	3.82
亚油酸	g	0.13	2.74	锰	μg	3.02	62.80
α-亚麻酸	mg	17	361	钙	mg	21	442
碳水化合物	g	2.7	55.52	磷	mg	14	292
维生素				碘	μg	4.5	93.5
维生素A	μg RE	23	468	氯	mg	19	405
维生素D	μg	0.60	12.47	硒	μg	0.69	14.27
维生素E	mg α-TE	0.27	5.53	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.88	39.07	肌醇	mg	3.0	61.8
维生素B ₁	μg	25	514	牛磺酸	mg	1.7	35.3
维生素B ₂	μg	35	718	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μg	14.8	308.0	二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.5
维生素B ₁₂	μg	0.125	2.602	二十碳四烯酸	mg	5.5	114.1
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3069	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	157	3265	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.8	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.73	15.19	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.33
胆碱	mg	6.0	124.7	叶黄素	μg	7.8	162.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钠	mg	6	123	酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	68.2
钾	mg	24	503				
铜	μg	13.4	277.9				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂(ARA)、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷酯。

变

标签 9

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人士建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉		
		(g)		(平匙)
6-12月	210	31.5	7	3-4

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：较大婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10766-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限公司 产地：陕西 咸阳
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

产品信息及产品资料查询
www.sxruyo.com

产品服务热线
400-692-8998

优利士

金瑞优



段

净含量:350克 国食字注 YP20170649

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2078	镁	mg	1.9	40.0
蛋白质	g	0.58	12.10	铁	mg	0.30	6.23
脂肪	g	1.18	24.60	锌	mg	0.18	3.82
亚油酸	g	0.13	2.74	锰	μg	3.02	62.80
α-亚麻酸	mg	17	361	钙	mg	21	442
碳水化合物	g	2.7	55.52	磷	mg	14	292
维生素				碘	μg	4.5	93.5
维生素A	μg RE	23	468	氯	mg	19	405
维生素D	μg	0.60	12.47	硒	μg	0.69	14.27
维生素E	mg α-TE	0.27	5.53	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.88	39.07	肌醇	mg	3.0	61.8
维生素B ₁	μg	25	514	牛磺酸	mg	1.7	35.3
维生素B ₂	μg	35	718	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μg	14.8	308.0	二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.5
维生素B ₁₂	μg	0.125	2.602	二十碳四烯酸	mg	5.5	114.1
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3069	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	157	3265	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.8	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.73	15.19	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.33
胆碱	mg	6.0	124.7	叶黄素	μg	7.8	162.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钠	mg	6	123	酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	68.2
钾	mg	24	503				
铜	μg	13.4	277.9				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂(ARA)、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D₃)、dl-α-胆酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、磷酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。

标签 10

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

6949008404370

奶具消毒及食用方法

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉	乳粉 (次)	
		(g)		
6-12月	210	31.5	7	3-4

说明：每平匙乳粉约4.5g

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：较大婴儿配方食品 产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10766-2021 保质期：24个月
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司 产地：陕西 咸阳
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

产品信息及产品资料查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998



净含量:400克 国食注字 YP20170649

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2078	镁	mg	1.9	40.0
蛋白质	g	0.58	12.10	铁	mg	0.30	6.23
脂肪	g	1.18	24.60	锌	mg	0.18	3.82
亚油酸	g	0.13	2.74	锰	μg	3.02	62.80
α-亚麻酸	mg	17	361	钙	mg	21	442
碳水化合物	g	2.7	55.52	磷	mg	14	292
维生素				碘	μg	4.5	93.5
维生素A	μg RE	23	468	氯	mg	19	405
维生素D	μg	0.60	12.47	硒	μg	0.69	14.27
维生素E	mg α-TE	0.27	5.53	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.88	39.07	肌醇	mg	3.0	61.8
维生素B ₁	μg	25	514	牛磺酸	mg	1.7	35.3
维生素B ₂	μg	35	718	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μg	14.8	308.0	二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.5
维生素B ₁₂	μg	0.125	2.602	二十碳四烯酸	mg	5.5	114.1
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3069	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	157	3265	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.8	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.73	15.19	1,3-二油酸-2-棕	g	0.21	4.33
胆碱	mg	6.0	124.7	桐酸甘油三酯			
矿物质				叶黄素	μg	7.8	162.0
钠	mg	6	123	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	24	503	酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	68.2
铜	μg	13.4	277.9				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂(ARA)、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、酯化视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钾、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、碘盐。

标签 11

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉		乳粉 (次)
		(g)	(平匙)	
6-12月	210	31.5	7	3-4

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：较大婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状

产品标准代号：GB 10766-2021

保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司

产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

优利士

金瑞优[®]



段

净含量：700克 国食注字 YP20170649

较大婴儿配方羊乳粉

(6-12月龄, 2段)

产品信息及资料查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

营养成分表


项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2078	镁	mg	1.9	40.0
蛋白质	g	0.58	12.10	铁	mg	0.30	6.23
脂肪	g	1.18	24.60	锌	mg	0.18	3.82
亚油酸	g	0.13	2.74	锰	μg	3.02	62.80
α-亚麻酸	mg	17	361	钙	mg	21	442
碳水化合物	g	2.7	55.52	磷	mg	14	292
维生素				碘	μg	4.5	93.5
维生素A	μg RE	23	468	氟	mg	19	405
维生素D	μg	0.60	12.47	硒	μg	0.69	14.27
维生素E	mg α-TE	0.27	5.53	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.88	39.07	肌醇	mg	3.0	61.8
维生素B ₁	μg	25	514	牛磺酸	mg	1.7	35.3
维生素B ₂	μg	35	718	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μg	14.8	308.0	二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.5
维生素B ₁₂	μg	0.125	2.602	二十碳四烯酸	mg	5.5	114.1
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3069	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	157	3265	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.8	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.73	15.19	1,3-二油酸-2-棕			
胆碱	mg	6.0	124.7	桐酸甘油三酯	g	0.21	4.33
矿物质				叶黄素	μg	7.8	162.0
钠	mg	6	123	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	24	503	酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	68.2
铜	μg	13.4	277.9				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油酯(ARA)、核桃油、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、磷酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷酯。





6 949008 405049

标签 12

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残留奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉		乳粉 (次)
		(g)	(平匙)	
6-12月	210	31.5	7	3-4

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：较大婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状

产品标准代号：GB 10766-2021

保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司

产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县杨洪工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品信息及产品资料查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

优利士

金瑞优



段

净含量: 800克 国食注字 YP20170649

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄, 2段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2078	镁	mg	1.9	40.0
蛋白质	g	0.58	12.10	铁	mg	0.30	6.23
脂肪	g	1.18	24.60	锌	mg	0.18	3.82
亚油酸	g	0.13	2.74	锰	μg	3.02	62.80
α-亚麻酸	mg	17	361	钙	mg	21	442
碳水化合物	g	2.7	55.52	磷	mg	14	292
维生素				碘	μg	4.5	93.5
维生素A	μg RE	23	468	氯	mg	19	405
维生素D	μg	0.60	12.47	硒	μg	0.69	14.27
维生素E	mg α-TE	0.27	5.53	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.88	39.07	肌醇	mg	3.0	61.8
维生素B ₁	μg	25	514	牛磺酸	mg	1.7	35.3
维生素B ₂	μg	35	718	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μg	14.8	308.0	二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.5
维生素B ₁₂	μg	0.125	2.602	二十碳四烯酸	mg	5.5	114.1
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3069	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	157	3265	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.8	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.73	15.19	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.33
胆碱	mg	6.0	124.7	叶黄素	μg	7.8	162.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钠	mg	6	123	酸蛋白磷酸肽	mg	3.3	68.2
钾	mg	24	503				
铜	μg	13.4	277.9				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油酯(ARA)、核桃油、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、低聚半乳糖、低聚果糖、酸蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、磷酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷酸。





标签 13

奶具消毒及食用方法



1 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。



2 将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。



3 调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45°C左右。



4 依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。



5 再依推荐喂哺表的指示，加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。



6 摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：

调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲泡乳粉，请勿随意改变冲泡比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

产品信息及产品资料查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

推荐喂哺表				
月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉 (g) (平匙)	乳粉 (次)	
12个月起	210	31.5	7	3

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品
产品标准代号：GB 10767-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳

优利士®

金瑞优®



段

净含量:100克

国食注字 YP20170650

幼儿配方羊乳粉

(12-36月龄,3段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2053	铁	mg	0.30	6.16
蛋白质	g	0.74	15.20	锌	mg	0.16	3.21
脂肪	g	1.17	24.00	钙	mg	25	521
亚油酸	g	0.09	1.90	磷	mg	17	349
α-亚麻酸	mg	12	246	碘	μg	2.5	51.5
碳水化合物	g	2.5	52.25	氯	mg	24	499
维生素				可选择成分			
维生素A	μg RE	23	462	硒	μg	0.75	15.32
维生素D	μg	0.60	12.32	胆碱	mg	6.0	123.6
维生素E	mg α-TE	0.26	5.27	锰	μg	3.31	68.05
维生素K ₁	μg	1.93	39.63	肌醇	mg	3.1	63.3
维生素B ₁	μg	25	518	牛磺酸	mg	1.8	37.9
维生素B ₂	μg	35	710	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μg	14.9	305.1	二十二碳六烯酸	mg	2.9	60.2
维生素B ₁₂	μg	0.127	2.608	二十碳四烯酸	mg	4.6	94.9
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3086	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.7	低聚半乳糖	g	0.028	0.575
泛酸	μg	164	3376	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	3.9	80.0	聚葡萄糖	g	0.08	1.62
生物素	μg	0.78	16.01	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
矿物质				叶黄素	μg	7.9	162.0
钠	mg	7	151	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	29	595	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	80.5
铜	μg	13.8	282.4				
镁	mg	1.9	39.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油脂(ARA)、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、核桃油、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、磷脂。

奶具消毒及食用方法



调奶之前请洗手，彻底洗净
奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残
奶。



将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。



调奶用水应煮沸五分钟,冷却至45℃左右。



依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示,先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。




再依**推荐喂哺表**指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。



摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！



6 949008 405025



推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉		乳粉 (次)
		(g)	(平匙)	
12个月起	210	31.5	7	3

说明：每平匙乳粉约4.5g

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品	产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10767-2021	保质期：24个月
制造商：陕西优利乳乳业集团有限责任公司	产地：陕西 咸阳
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区	
生产日期及批号：见罐底	
检验合格证号：同生产日期	
食品生产许可证编号：SC12961042400829	

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



产品信息及产品资料查询

www.sxruvo.com



产品咨询热线

400-692-8998

优利士

金瑞优®



段

净含量:300克 国食注字 YP20170650

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2053	铁	mg	0.30	6.16
蛋白质	g	0.74	15.20	锌	mg	0.16	3.21
脂肪	g	1.17	24.00	钙	mg	25	521
亚油酸	g	0.09	1.90	磷	mg	17	349
α -亚麻酸	mg	12	246	碘	μ g	2.5	51.5
碳水化合物	g	2.5	52.25	氯	mg	24	499
维生素				可选择成分			
维生素A	μ g RE	23	462	硒	μ g	0.75	15.32
维生素D	μ g	0.60	12.32	硒碱	mg	6.0	123.6
维生素E	mg α -TE	0.26	5.27	锰	μ g	3.31	68.05
维生素K ₁	μ g	1.93	39.63	肌醇	mg	3.1	63.3
维生素B ₁	μ g	25	518	牛磺酸	mg	1.8	37.9
维生素B ₂	μ g	35	710	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μ g	14.9	305.1	二十二碳六烯酸	mg	2.9	60.2
维生素B ₁₂	μ g	0.127	2.608	二十碳四烯酸	mg	4.6	94.9
烟酸(烟酰胺)	μ g	150	3086	膳食纤维			
叶酸	μ g	3.5	72.7	低聚半乳糖	g	0.028	0.575
泛酸	μ g	164	3376	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	3.9	80.0	聚葡萄糖	g	0.08	1.62
维生素	μ g	0.78	16.01	1,3-二油酸-2-棕	g	0.15	3.00
矿物质				桐酸甘油三酯			
钠	mg	7	151	叶黄素	μ g	7.9	162.0
钾	mg	29	595	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
镁	μ g	13.8	282.4	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	80.5
铜	mg	1.9	39.0				

说明:每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生乳乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油和(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、葡萄糖、低聚果糖、低聚木糖、四水葡萄糖(ARA)、二十二碳六烯酸酯(DHA)、核黄素、低聚果糖、酪蛋白酸钠、乳铁蛋白、动物双歧杆菌亚种02、L-左旋肉碱、羧甲基纤维素钠、维生素E、胆钙化醇、维生素K₁、α-生育酚生育酚(维生素E)、植物甲萘酚(维生素K₁)、抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、钴胺(维生素B₁₂)、叶酸素、肌醇、维生素D₃、泛酸钙(泛酸)、烟酸、D-生物素(生物素)、牛磺酸、酪氨酸、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸钴。

标签 15

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉	乳粉 (次)	
		(g)		
12个月起	210	31.5	7	3

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品 产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10767-2021 保质期：24个月
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司 产地：陕西 咸阳
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

优利士®

金瑞优®



段

净含量：350克 国食注字 YP20170650

幼儿配方羊乳粉

(12-36月龄,3段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2053	铁	mg	0.30	6.16
蛋白质	g	0.74	15.20	锌	mg	0.16	3.21
脂肪	g	1.17	24.00	钙	mg	25	521
亚油酸	g	0.09	1.90	磷	mg	17	349
α-亚麻酸	mg	12	246	碘	μg	2.5	51.5
碳水化合物	g	2.5	52.25	氯	mg	24	499
维生素				可选择成分			
维生素A	μg RE	23	462	硒	μg	0.75	15.32
维生素D	μg	0.60	12.32	胆碱	mg	6.0	123.6
维生素E	mg α-TE	0.26	5.27	锰	μg	3.31	68.05
维生素K ₁	μg	1.93	39.63	肌醇	mg	3.1	63.3
维生素B ₁	μg	25	518	牛磺酸	mg	1.8	37.9
维生素B ₂	μg	35	710	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μg	14.9	305.1	二十二碳六烯酸	mg	2.9	60.2
维生素B ₁₂	μg	0.127	2.608	二十碳四烯酸	mg	4.6	94.9
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3086	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.7	低聚半乳糖	g	0.028	0.575
泛酸	μg	164	3376	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	3.9	80.0	聚葡萄糖	g	0.08	1.62
生物素	μg	0.78	16.01	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
矿物质				叶黄素	μg	7.9	162.0
钠	mg	7	151	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	29	595	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	80.5
铜	μg	13.8	282.4				
镁	mg	1.9	39.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油脂(ARA)、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、核桃油、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-脂酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、磷酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、磷脂。

标签 16

奶具消毒及食用方法

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残留奶。

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉，只可用专用量匙。

摇匀奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量调乳粉，请勿随意改变冲泡比例，除非有专业人士建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉	乳粉 (次)	
		(g) (平匙)		
12个月起	210	31.5	7	3

说明：每平匙乳粉约4.5g

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内；开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品

产品属性：乳基粉状

产品标准号：GB 10767-2021

保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业集团有限公司 产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产日期

食品生产许可证编号：SC12961042400829

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

产品信息及产品质量查询

www.sxruyo.com

产品追溯热线

400-692-8998

优利士®

金瑞优®

3

段

净含量:400克 国食注字 YP20170650

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

营养成分表							
项目	单位	每100KJ	每100g	项目	单位	每100KJ	每100g
能量	kJ	100	2053	铁	mg	0.30	6.16
蛋白质	g	0.74	15.20	锌	mg	0.16	3.21
脂肪	g	1.17	24.00	钙	mg	25	521
亚油酸	g	0.09	1.90	磷	mg	17	349
α -亚麻酸	mg	12	246	硒	μ g	2.5	51.5
碳水化合物	g	2.5	52.25	氯	mg	24	499
维生素				可选择成分			
维生素A	μ g RE	23	462	硒	μ g	0.75	15.32
维生素D	μ g	0.60	12.32	胆碱	mg	6.0	123.6
维生素E	mg α -TE	0.26	5.27	锰	μ g	3.31	68.05
维生素K ₁	μ g	1.93	39.63	肌醇	mg	3.1	63.3
维生素B ₁	μ g	25	518	牛磺酸	mg	1.8	37.9
维生素B ₂	μ g	35	710	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μ g	14.9	305.1	二十二碳六烯酸	mg	2.9	60.2
维生素B ₁₂	μ g	0.127	2.608	二十碳四烯酸	mg	4.6	94.9
烟酸(烟酰胺)	μ g	150	3086	膳食纤维			
叶酸	μ g	3.5	72.7	低聚半乳糖	g	0.028	0.575
泛酸	μ g	164	3376	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	3.9	80.0	聚葡萄糖	g	0.08	1.62
生物素	μ g	0.78	16.01	1,3-二油酸-2-棕 桐酸甘油三酯	g	0.15	3.00
矿物质				叶黄素	μ g	7.9	162.0
钠	mg	7	151	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	29	595	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	80.5
铜	μ g	13.8	282.4				
镁	mg	1.9	39.0				

说明:每100mL奶液含乳粉13.5g。

标签 17

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉	乳粉 (次)	
		(g)	(平匙)	
12个月起	210	31.5	7	3

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品

产品属性：乳基粉状

产品标准代号：GB 10767-2021

保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司

产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

优利士

金瑞优®



段

净含量：700克 国食注字 YP20170650

幼儿配方羊乳粉

(12-36月龄,3段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2053	铁	mg	0.30	6.16
蛋白质	g	0.74	15.20	锌	mg	0.16	3.21
脂肪	g	1.17	24.00	钙	mg	25	521
亚油酸	g	0.09	1.90	磷	mg	17	349
α-亚麻酸	mg	12	246	碘	μg	2.5	51.5
碳水化合物	g	2.5	52.25	氯	mg	24	499
维生素				可选择成分			
维生素A	μg RE	23	462	硒	μg	0.75	15.32
维生素D	μg	0.60	12.32	胆碱	mg	6.0	123.6
维生素E	mg α-TE	0.26	5.27	锰	μg	3.31	68.05
维生素K ₁	μg	1.93	39.63	肌醇	mg	3.1	63.3
维生素B ₁	μg	25	518	牛磺酸	mg	1.8	37.9
维生素B ₂	μg	35	710	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μg	14.9	305.1	二十二碳六烯酸	mg	2.9	60.2
维生素B ₁₂	μg	0.127	2.608	二十碳四烯酸	mg	4.6	94.9
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3086	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.7	低聚半乳糖	g	0.028	0.575
泛酸	μg	164	3376	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	3.9	80.0	聚葡萄糖	g	0.08	1.62
生物素	μg	0.78	16.01	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
矿物质				叶黄素	μg	7.9	162.0
钠	mg	7	151	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	29	595	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	80.5
铜	μg	13.8	282.4				
镁	mg	1.9	39.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油脂(ARA)、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、核桃油、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、硬脂酸、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、磷酸。





6 949008 465656

标签 18

1

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

4

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

5

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

6

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

奶具消毒及食用方法

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉	乳粉 (次)	
		(g)		
12个月起	210	31.5	7	3

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品
产品标准代号：GB 10767-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳

优利士

金瑞优



段

净含量：800克 国食注字 YP20170650

幼儿配方羊乳粉

(12-36月龄,3段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2053	铁	mg	0.30	6.16
蛋白质	g	0.74	15.20	锌	mg	0.16	3.21
脂肪	g	1.17	24.00	钙	mg	25	521
亚油酸	g	0.09	1.90	磷	mg	17	349
α-亚麻酸	mg	12	246	碘	μg	2.5	51.5
碳水化合物	g	2.5	52.25	氯	mg	24	499
维生素				可选择成分			
维生素A	μg RE	23	462	硒	μg	0.75	15.32
维生素D	μg	0.60	12.32	胆碱	mg	6.0	123.6
维生素E	mg α-TE	0.26	5.27	锰	μg	3.31	68.05
维生素K ₁	μg	1.93	39.63	肌醇	mg	3.1	63.3
维生素B ₁	μg	25	518	牛磺酸	mg	1.8	37.9
维生素B ₂	μg	35	710	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μg	14.9	305.1	二十二碳六烯酸	mg	2.9	60.2
维生素B ₁₂	μg	0.127	2.608	二十碳四烯酸	mg	4.6	94.9
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3086	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.7	低聚半乳糖	g	0.028	0.575
泛酸	μg	164	3376	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	3.9	80.0	聚葡萄糖	g	0.08	1.62
生物素	μg	0.78	16.01	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
矿物质				叶黄素	μg	7.9	162.0
钠	mg	7	151	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	29	595	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	80.5
铜	μg	13.8	282.4				
镁	mg	1.9	39.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油酯(ARA)、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、核桃油、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育酚(维生素E)、植物甲萘酚(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、磷酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、磷酸。

产品信息及产品质量查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯





营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2096	钾	mg 21 445
蛋白质	g	0.50	10.40	铜	μg 17.9 374.7
脂肪	g	1.21	25.40	镁	mg 1.7 36.3
亚油酸	g	0.16	3.37	铁	mg 0.19 3.95
α-亚麻酸	mg	18	386	锌	mg 0.18 3.74
碳水化合物	g	2.7	56.4	锰	μg 2.6 54.1
维生素				钙	mg 16 330
维生素A	μg RE	18	374	磷	mg 11 228
维生素D	μg	0.60	12.58	碘	μg 4.5 94.3
维生素E	mg α-TE	0.25	5.14	氯	mg 15 322
维生素K ₁	μg	1.81	37.97	硒	μg 0.90 18.86
维生素B ₁	μg	25	523	可选择成分	
维生素B ₂	μg	39	807	肌醇	mg 3.3 68.2
维生素B ₆	μg	15.0	314.6	牛磺酸	mg 1.8 37.0
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.743	左旋肉碱	mg 1.3 26.3
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3138	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 4.5 94.3
叶酸	μg	4.3	90.4	二十碳四烯酸(ARA)	mg 5.2 109.5
泛酸	μg	161	3369	膳食纤维	
维生素C	mg	4.2	87.3	低聚半乳糖	g 0.08 1.68
生物素	μg	0.71	14.79	低聚果糖	g 0.04 0.93
胆碱	mg	6.0	125.8	核苷酸	mg 0.6 12.0
矿物质				乳铁蛋白	mg 1.2 25.0
钠	mg	9	183	酪蛋白磷酸肽	mg 2.9 61.7

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylshi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 周二至周五 AM08:30 PM05:30



净含量:100克 国食注字 YP20230162

1段
婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂）、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂（DHA）、花生四烯酸油脂（ARA）、醋酸视黄酯、胆钙化醇、*dl-α*-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸（5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸、5'-肌苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸）、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水 (ml)	
0-1周	2	9	60	8
1-2周	3	13.5	90	6
2-4周	4	18	120	5
1-2个月	5	22.5	150	5
2-4个月	6	27	180	5
4-6个月	7	31.5	210	5

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法

1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。

2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。

3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。

4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。

5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。

6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位
能量	kJ	100	2096	钾	mg
蛋白质	g	0.50	10.40	铜	μg
脂肪	g	1.21	25.40	镁	mg
亚油酸	g	0.16	3.37	铁	mg
α-亚麻酸	mg	18	386	锌	mg
碳水化合物	g	2.7	56.4	锰	μg
维生素				钙	mg
维生素A	μg RE	18	374	磷	mg
维生素D	μg	0.60	12.58	碘	μg
维生素E	mg α-TE	0.25	5.14	氯	mg
维生素K ₁	μg	1.81	37.97	硒	μg
维生素B ₁	μg	25	523	可选择成分	
维生素B ₂	μg	39	807	肌醇	mg
维生素B ₆	μg	15.0	314.6	牛磺酸	mg
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.743	左旋肉碱	mg
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3138	二十二碳六烯酸(DHA)	mg
叶酸	μg	4.3	90.4	二十碳四烯酸(ARA)	mg
泛酸	μg	161	3369	膳食纤维	g
维生素C	mg	4.2	87.3	低聚半乳糖	g
生物素	μg	0.71	14.79	低聚果糖	g
胆碱	mg	6.0	125.8	核苷酸	mg
矿物质				乳铁蛋白	mg
钠	mg	9	183	酪蛋白磷酸肽	mg

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylshi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类型：婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 9:00-18:00 AM08:30 PM05:30



净含量:300克 国食注字 YP20230162

1段
婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
0-1周	2	9	60	8
1-2周	3	13.5	90	6
2-4周	4	18	120	5
1-2个月	5	22.5	150	5
2-4个月	6	27	180	5
4-6个月	7	31.5	210	5

注：一优能佳平罐本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位
能量	kJ	100	2096	钾	mg
蛋白质	g	0.50	10.40	铜	μg
脂肪	g	1.21	25.40	镁	mg
亚油酸	g	0.16	3.37	铁	mg
α-亚麻酸	mg	18	386	锌	mg
碳水化合物	g	2.7	56.4	锰	μg
维生素				钙	mg
维生素A	μg RE	18	374	磷	mg
维生素D	μg	0.60	12.58	碘	μg
维生素E	mg α-TE	0.25	5.14	氯	mg
维生素K ₁	μg	1.81	37.97	硒	μg
维生素B ₁	μg	25	523	可选择成分	
维生素B ₂	μg	39	807	肌醇	mg
维生素B ₆	μg	15.0	314.6	牛磺酸	mg
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.743	左旋肉碱	mg
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3138	二十二碳六烯酸(DHA)	mg
叶酸	μg	4.3	90.4	二十碳四烯酸(ARA)	mg
泛酸	μg	161	3369	膳食纤维	g
维生素C	mg	4.2	87.3	低聚半乳糖	g
生物素	μg	0.71	14.79	低聚果糖	g
胆碱	mg	6.0	125.8	核苷酸	mg
矿物质				乳铁蛋白	mg
钠	mg	9	183	酪蛋白磷酸肽	mg

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类型：婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 9:00-18:00 AM08:30 PM05:30



6 949008 406640



净含量:400克 国食注字 YP20230162

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
0-1周	2	9	60	8
1-2周	3	13.5	90	6
2-4周	4	18	120	5
1-2个月	5	22.5	150	5
2-4个月	6	27	180	5
4-6个月	7	31.5	210	5

注：一优能佳平罐产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2096	钾	mg 21 445
蛋白质	g	0.50	10.40	铜	μg 17.9 374.7
脂肪	g	1.21	25.40	镁	mg 1.7 36.3
亚油酸	g	0.16	3.37	铁	mg 0.19 3.95
α-亚麻酸	mg	18	386	锌	mg 0.18 3.74
碳水化合物	g	2.7	56.4	锰	μg 2.6 54.1
维生素				钙	mg 16 330
维生素A	μg RE	18	374	磷	mg 11 228
维生素D	μg	0.60	12.58	碘	μg 4.5 94.3
维生素E	mg α-TE	0.25	5.14	氯	mg 15 322
维生素K ₁	μg	1.81	37.97	烟	μg 0.90 18.86
维生素B ₁	μg	25	523	可选择成分	
维生素B ₂	μg	39	807	肌醇	mg 3.3 68.2
维生素B ₆	μg	15.0	314.6	牛磺酸	mg 1.8 37.0
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.743	左旋肉碱	mg 1.3 26.3
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3138	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 4.5 94.3
叶酸	μg	4.3	90.4	二十碳四烯酸(ARA)	mg 5.2 109.5
泛酸	μg	161	3369	膳食纤维	
维生素C	mg	4.2	87.3	低聚半乳糖	g 0.08 1.68
生物素	μg	0.71	14.79	低聚果糖	g 0.04 0.93
胆碱	mg	6.0	125.8	核苷酸	mg 0.6 12.0
矿物质				乳铁蛋白	mg 1.2 25.0
钠	mg	9	183	酪蛋白磷酸肽	mg 2.9 61.7

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内存食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 周一至周日 AM08:30 PM05:30



优利士®

优能佳



1段

净含量:600克 国食注字 YP 20230162

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种Bif-12、磷脂。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
0-1周	2	9	60	8
1-2周	3	13.5	90	6
2-4个月	4	18	120	5
4-6个月	5	22.5	150	5
6-12个月	6	27	180	5
1-2岁	7	31.5	210	5

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2096	钾	mg 21 445
蛋白质	g	0.50	10.40	铜	μg 17.9 374.7
脂肪	g	1.21	25.40	镁	mg 1.7 36.3
亚油酸	g	0.16	3.37	铁	mg 0.19 3.95
α-亚油酸	mg	18	386	锌	mg 0.18 3.74
碳水化合物	g	2.7	56.4	锰	μg 2.6 54.1
维生素				钙	mg 16 330
维生素A	μg RE	18	374	磷	mg 11 228
维生素D	μg	0.60	12.58	碘	μg 4.5 94.3
维生素E	mg α-TE	0.25	5.14	氯	mg 15 322
维生素K ₁	μg	1.81	37.97	硒	μg 0.90 18.86
维生素B ₁	μg	25	523	可选择成分	
维生素B ₂	μg	39	807	肌醇	mg 3.3 68.2
维生素B ₆	μg	15.0	314.6	牛磺酸	mg 1.8 37.0
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.743	左旋肉碱	mg 1.3 26.3
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3138	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 4.5 94.3
叶酸	μg	4.3	90.4	二十碳四烯酸(ARA)	mg 5.2 109.5
泛酸	μg	161	3369	膳食纤维	
维生素C	mg	4.2	87.3	低聚半乳糖	g 0.08 1.68
生物素	μg	0.71	14.79	低聚果糖	g 0.04 0.93
胆碱	mg	6.0	125.8	核苷酸	mg 0.6 12.0
矿物质				乳铁蛋白	mg 1.2 25.0
钠	mg	9	183	酪蛋白磷酸肽	mg 2.9 61.7

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



优利士®

优能佳



1段

净含量:800克 国食注字 YP20230162

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
0-1周	2	9	60	8
1-2周	3	13.5	90	6
2-4周	4	18	120	5
1-2个月	5	22.5	150	5
2-4个月	6	27	180	5
4-6个月	7	31.5	210	5

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

营养成分表						
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ
能量	kJ	100	2083	钾	mg	25
蛋白质	g	0.60	12.40	铜	μg	14.3
脂肪	g	1.20	25.00	镁	mg	2.1
亚油酸	g	0.13	2.80	铁	mg	0.30
α-亚麻酸	mg	16	327	锌	mg	0.20
碳水化合物	g	2.6	54.5	锰	μg	2.90
维生素				钙	mg	22
维生素A	μg RE	23	469	磷	mg	15
维生素D	μg	0.60	12.50	碘	μg	4.5
维生素E	mg α-TE	0.24	4.93	氯	mg	20
维生素K ₁	μg	1.85	38.51	硒	μg	0.66
维生素B ₁	μg	25	527	可选择成分		
维生素B ₂	μg	32	668	肌醇	mg	2.9
维生素B ₆	μg	14.7	306.6	牛磺酸	mg	1.7
维生素B ₁₂	μg	0.123	2.555	左旋肉碱	mg	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	149	3101	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5
叶酸	μg	3.5	72.5	二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.4
泛酸	μg	158	3290	膳食纤维		
维生素C	mg	4.2	87.4	低聚半乳糖	g	0.08
生物素	μg	0.73	15.11	低聚果糖	g	0.04
胆碱	mg	6.0	125.0	核苷酸	mg	0.6
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.2
钠	mg	6	127	酪蛋白磷酸肽	mg	3.4

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 周二至周五 AM08:30 PM05:30



6 949008 406688



优利士®

优能佳



2段

净含量:100克 国食注字 YP20230163

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、视黄醇、胆钙化醇、dl-α-维生素生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种BI-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
6-12个月	7	31.5	210	3-4

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位
能量	kJ	100	2083	钾	mg
蛋白质	g	0.60	12.40	铜	μg
脂肪	g	1.20	25.00	镁	mg
亚油酸	g	0.13	2.80	铁	mg
α-亚麻酸	mg	16	327	锌	mg
碳水化合物	g	2.6	54.5	锰	μg
维生素				钙	mg
维生素A	μg RE	23	469	磷	mg
维生素D	μg	0.60	12.50	碘	μg
维生素E	mg α-TE	0.24	4.93	氯	mg
维生素K ₁	μg	1.85	38.51	硒	μg
维生素B ₁	μg	25	527	可选择成分	
维生素B ₂	μg	32	668	肌醇	mg
维生素B ₆	μg	14.7	306.6	牛磺酸	mg
维生素B ₁₂	μg	0.123	2.555	左旋肉碱	mg
烟酸(烟酰胺)	μg	149	3101	二十二碳六烯酸(DHA)	mg
叶酸	μg	3.5	72.5	二十碳四烯酸(ARA)	mg
泛酸	μg	158	3290	膳食纤维	
维生素C	mg	4.2	87.4	低聚半乳糖	g
生物素	μg	0.73	15.11	低聚果糖	g
胆碱	mg	6.0	125.0	核苷酸	mg
矿物质				乳铁蛋白	mg
钠	mg	6	127	酪蛋白磷酸肽	mg

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 9:00-18:00 AM08:30 PM05:30



6 949008 407425



净含量:300克 国食注字 YP20230163

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-脂酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种BI-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
6-12个月	7	31.5	210	3-4

注：一优能佳平配本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位
能量	kJ	100	2083	钾	mg
蛋白质	g	0.60	12.40	铜	μg
脂肪	g	1.20	25.00	镁	mg
亚油酸	g	0.13	2.80	铁	mg
α-亚麻酸	mg	16	327	锌	mg
碳水化合物	g	2.6	54.5	锰	μg
维生素				钙	mg
维生素A	μg RE	23	469	磷	mg
维生素D	μg	0.60	12.50	碘	μg
维生素E	mg α-TE	0.24	4.93	氯	mg
维生素K ₁	μg	1.85	38.51	硒	μg
维生素B ₁	μg	25	527	可选择成分	
维生素B ₂	μg	32	668	肌醇	mg
维生素B ₆	μg	14.7	306.6	牛磺酸	mg
维生素B ₁₂	μg	0.123	2.555	左旋肉碱	mg
烟酸(烟酰胺)	μg	149	3101	二十二碳六烯酸(DHA)	mg
叶酸	μg	3.5	72.5	二十碳四烯酸(ARA)	mg
泛酸	μg	158	3290	膳食纤维	
维生素C	mg	4.2	87.4	低聚半乳糖	g
生物素	μg	0.73	15.11	低聚果糖	g
胆碱	mg	6.0	125.0	核苷酸	mg
矿物质				乳铁蛋白	mg
钠	mg	6	127	酪蛋白磷酸肽	mg

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylshi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 9:00-18:00 AM08:30 PM05:30



6 949008 406657



净含量:400克 国食注字 YP20230163

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-脂酰生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种BI-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
6-12个月	7	31.5	210	3-4

注：一优能佳平配本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2083	钾	mg 25 516
蛋白质	g	0.60	12.40	铜	μg 14.3 298.7
脂肪	g	1.20	25.00	镁	mg 2.1 44.0
亚油酸	g	0.13	2.80	铁	mg 0.30 6.25
α-亚麻酸	mg	16	327	锌	mg 0.20 4.07
碳水化合物	g	2.6	54.5	锰	μg 2.90 60.31
维生素				钙	mg 22 448
维生素A	μg RE	23	469	磷	mg 15 303
维生素D	μg	0.60	12.50	碘	μg 4.5 93.7
维生素E	mg α-TE	0.24	4.93	氯	mg 20 425
维生素K ₁	μg	1.85	38.51	硒	μg 0.66 13.73
维生素B ₁	μg	25	527	可选择成分	
维生素B ₂	μg	32	668	肌醇	mg 2.9 60.2
维生素B ₆	μg	14.7	306.6	牛磺酸	mg 1.7 34.8
维生素B ₁₂	μg	0.123	2.555	左旋肉碱	mg 1.2 24.8
烟酸(烟酰胺)	μg	149	3101	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 4.5 93.7
叶酸	μg	3.5	72.5	二十碳四烯酸(ARA)	mg 5.4 112.3
泛酸	μg	158	3290	膳食纤维	
维生素C	mg	4.2	87.4	低聚半乳糖	g 0.08 1.68
生物素	μg	0.73	15.11	低聚果糖	g 0.04 0.93
胆碱	mg	6.0	125.0	核苷酸	mg 0.6 12.0
矿物质				乳铁蛋白	mg 1.2 25.0
钠	mg	6	127	酪蛋白磷酸肽	mg 3.4 71.3

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 周二至周五 AM08:30 PM05:30



6 949008 404776



净含量:600克 国食注字 YP 20230163

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

配料表		喂哺用量建议表			
生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。		每次乳粉用量			每天喂哺次数
		量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
6-12个月		7	31.5	210	3-4
注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。					
喂哺及注意事项					
请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。					

奶具消毒及调奶方法					
	1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。		4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。		5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。
	2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。		3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。		6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。
温馨提示：对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。					

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位
能量	kJ	100	2083	钾	mg
蛋白质	g	0.60	12.40	铜	μg
脂肪	g	1.20	25.00	镁	mg
亚油酸	g	0.13	2.80	铁	mg
α-亚麻酸	mg	16	327	锌	mg
碳水化合物	g	2.6	54.5	锰	μg
维生素				钙	mg
维生素A	μg RE	23	469	磷	mg
维生素D	μg	0.60	12.50	碘	μg
维生素E	mg α-TE	0.24	4.93	氯	mg
维生素K ₁	μg	1.85	38.51	硒	μg
维生素B ₁	μg	25	527	可选择成分	
维生素B ₂	μg	32	668	肌醇	mg
维生素B ₆	μg	14.7	306.6	牛磺酸	mg
维生素B ₁₂	μg	0.123	2.555	左旋肉碱	mg
烟酸(烟酰胺)	μg	149	3101	二十二碳六烯酸(DHA)	mg
叶酸	μg	3.5	72.5	二十碳四烯酸(ARA)	mg
泛酸	μg	158	3290	膳食纤维	
维生素C	mg	4.2	87.4	低聚半乳糖	g
生物素	μg	0.73	15.11	低果聚糖	g
胆碱	mg	6.0	125.0	核苷酸	mg
矿物质				乳铁蛋白	mg
钠	mg	6	127	酪蛋白磷酸肽	mg

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类型：较大婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间：上午 08:30 - 下午 05:30



优利士®

优能佳



2段

净含量:800克 国食注字 YP20230163

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-脂酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
6-12个月	7	31.5	210	3-4

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位
能量	kJ	100	2067	铜	μg
蛋白质	g	0.73	15.00	镁	mg
脂肪	g	1.20	24.80	铁	mg
亚油酸	g	0.10	2.08	锌	mg
α-亚麻酸	mg	12	250	钙	mg
碳水化合物	g	2.5	51.4	磷	mg
维生素				碘	μg
维生素A	μg RE	22	465	氯	mg
维生素D	μg	0.60	12.40	可选择成分	
维生素E	mg α-TE	0.23	4.70	硒	μg
维生素K ₁	μg	1.88	38.96	胆碱	mg
维生素B ₁	μg	26	531	锰	μg
维生素B ₂	μg	33	684	肌醇	mg
维生素B ₆	μg	14.8	305.1	牛磺酸	mg
维生素B ₁₂	μg	0.126	2.595	左旋肉碱	mg
烟酸(烟酰胺)	μg	151	3124	二十二碳六烯酸(DHA)	mg
叶酸	μg	3.5	72.7	二十碳四烯酸(ARA)	mg
泛酸	μg	165	3413	膳食纤维	g
维生素C	mg	4.1	83.9	低聚乳糖	g
生物素	μg	0.77	15.88	低聚果糖	g
矿物质				核苷酸	mg
钠	mg	7	137	乳铁蛋白	mg
钾	mg	28	582	酪蛋白磷酸肽	mg

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：幼儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 9:00-18:00 AM08:30 PM05:30



优利士®

优能佳



3段

净含量:100克 国食注字 YP 20230164

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、胆碱视黄醇、胆钙化醇、*dl*-α-脂酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸、5'-肌苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸)、动物双歧杆菌乳亚种Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb-12、磷酯。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
12-36个月	7	31.5	210	3

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量量过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

标签 30

150.0 mm

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2067	铜	μg 14.6 302.7
蛋白质	g	0.73	15.00	镁	mg 2.0 41.0
脂肪	g	1.20	24.80	铁	mg 0.30 6.20
亚油酸	g	0.10	2.08	锌	mg 0.15 3.20
α-亚麻酸	mg	12	250	钙	mg 25 517
碳水化合物	g	2.5	51.4	磷	mg 17 343
维生素				碘	μg 2.8 56.9
维生素A	μg RE	22	465	氯	mg 24 492
维生素D	μg	0.60	12.40	可选择成分	
维生素E	mg α-TE	0.23	4.70	硒	μg 0.71 14.72
维生素K ₁	μg	1.88	38.96	胆碱	mg 6.0 124.0
维生素B ₁	μg	26	531	锰	μg 3.09 63.88
维生素B ₂	μg	33	684	肌醇	mg 3.1 63.1
维生素B ₆	μg	14.8	305.1	牛磺酸	mg 1.8 37.7
维生素B ₁₂	μg	0.126	2.595	左旋肉碱	mg 1.2 25.4
烟酸(烟酰胺)	μg	151	3124	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 2.2 45.6
叶酸	μg	3.5	72.7	二十碳四烯酸(ARA)	mg 3.3 68.8
泛酸	μg	165	3413	膳食纤维	
维生素C	mg	4.1	83.9	低聚半乳糖	g 0.08 1.68
生物素	μg	0.77	15.88	低聚果糖	g 0.04 0.93
矿物质				核苷酸	mg 0.6 12.0
钠	mg	7	137	乳铁蛋白	mg 1.1 23.5
钾	mg	28	582	酪蛋白磷酸肽	mg 3.9 81.6

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylshi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：幼儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB10767-2021
产品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 上午 9:00-12:00 下午 13:00-18:00



6 949008 407432



优利士®

优能佳



净含量:300克 国食注字 YP 20230164

3段

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂）、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂（DHA）、花生四烯酸油脂（ARA）、酪酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、核苷酸（5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠）、动物双歧杆菌乳亚种 Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水 (ml)	
12-36个月	7	31.5	210	3

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

398.8 mm

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位
能量	kJ	100	2067	铜	μg
蛋白质	g	0.73	15.00	镁	mg
脂肪	g	1.20	24.80	铁	mg
亚油酸	g	0.10	2.08	锌	mg
α-亚麻酸	mg	12	250	钙	mg
碳水化合物	g	2.5	51.4	磷	mg
维生素				碘	μg
维生素A	μg RE	22	465	氯	mg
维生素D	μg	0.60	12.40	可选择成分	
维生素E	mg α-TE	0.23	4.70	硒	μg
维生素K ₁	μg	1.88	38.96	胆碱	mg
维生素B ₁	μg	26	531	锰	μg
维生素B ₂	μg	33	684	肌醇	mg
维生素B ₆	μg	14.8	305.1	牛磺酸	mg
维生素B ₁₂	μg	0.126	2.595	左旋肉碱	mg
烟酸(烟酰胺)	μg	151	3124	二十二碳六烯酸(DHA)	mg
叶酸	μg	3.5	72.7	二十碳四烯酸(ARA)	mg
泛酸	μg	165	3413	膳食纤维	g
维生素C	mg	4.1	83.9	低聚半乳糖	g
生物素	μg	0.77	15.88	低聚果糖	g
矿物质				核苷酸	mg
钠	mg	7	137	乳铁蛋白	mg
钾	mg	28	582	酪蛋白磷酸肽	mg

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内存食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylshi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：幼儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 上午 08:30 PM 05:30



6 949008 406664



优利士®

优能佳

3段

净含量:400克 国食注字 YP 20230164

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酯化视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
12-36个月	7	31.5	210	3

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法

1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。

2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。

3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。

4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。

5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。

6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位
能量	kJ	100	2067	铜	μg
蛋白质	g	0.73	15.00	镁	mg
脂肪	g	1.20	24.80	铁	mg
亚油酸	g	0.10	2.08	锌	mg
α-亚油酸	mg	12	250	钙	mg
碳水化合物	g	2.5	51.4	磷	mg
维生素				碘	μg
维生素A	μg RE	22	465	氯	mg
维生素D	μg	0.60	12.40	可选择成分	
维生素E	mg α-TE	0.23	4.70	硒	μg
维生素K ₁	μg	1.88	38.96	胆碱	mg
维生素B ₁	μg	26	531	锰	μg
维生素B ₂	μg	33	684	肌醇	mg
维生素B ₆	μg	14.8	305.1	牛磺酸	mg
维生素B ₁₂	μg	0.126	2.595	左旋肉碱	mg
烟酸(烟酰胺)	μg	151	3124	二十二碳六烯酸(DHA)	mg
叶酸	μg	3.5	72.7	二十碳四烯酸(ARA)	mg
泛酸	μg	165	3413	膳食纤维	g
维生素C	mg	4.1	83.9	低聚半乳糖	g
生物素	μg	0.77	15.88	低聚果糖	g
矿物质				核苷酸	mg
钠	mg	7	137	乳铁蛋白	mg
钾	mg	28	582	酪蛋白磷酸肽	mg

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：幼儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 周一至周日 AM08:30 PM05:30



优利士®

优能佳

3段

净含量:600克 国食注字 YP 20230164

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

配料表		喂哺用量建议表			
生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油 (葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大 豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果 糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二 十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸脂 肪(ARA)、酯化视黄醇、胆钙化醇、dl-α- 醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、 核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物 素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌 醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、 左旋肉碱、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫 酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、核苷 酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟 苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二 钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双 歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。	月龄	每次乳粉用量			每天喂哺 次数
		量匙 数量	乳粉 克数	温开水 (ml)	
	12-36个月	7	31.5	210	3
注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑 30毫升温开水为标准稀释法。					
喂哺及注意事项					
请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业 资质人员建议。不当配制和使用不当可能 引起健康危害！切记不要将冲调好喝的奶 液留到下次食用。请在保质期内食用。					

奶具消毒及调奶方法

1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。

2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。

3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。

4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。

5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。

6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位
能量	kJ	100	2067	铜	μg
蛋白质	g	0.73	15.00	镁	mg
脂肪	g	1.20	24.80	铁	mg
亚油酸	g	0.10	2.08	锌	mg
α-亚麻酸	mg	12	250	钙	mg
碳水化合物	g	2.5	51.4	磷	mg
维生素				碘	μg
维生素A	μg RE	22	465	氯	mg
维生素D	μg	0.60	12.40	可选择成分	
维生素E	mg α-TE	0.23	4.70	硒	μg
维生素K ₁	μg	1.88	38.96	胆碱	mg
维生素B ₁	μg	26	531	锰	μg
维生素B ₂	μg	33	684	肌醇	mg
维生素B ₆	μg	14.8	305.1	牛磺酸	mg
维生素B ₁₂	μg	0.126	2.595	左旋肉碱	mg
烟酸(烟酰胺)	μg	151	3124	二十二碳六烯酸(DHA)	mg
叶酸	μg	3.5	72.7	二十碳四烯酸(ARA)	mg
泛酸	μg	165	3413	膳食纤维	
维生素C	mg	4.1	83.9	低聚半乳糖	g
生物素	μg	0.77	15.88	低聚果糖	g
矿物质				核苷酸	mg
钠	mg	7	137	乳铁蛋白	mg
钾	mg	28	582	酪蛋白磷酸肽	mg

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内在食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：幼儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 上午 9:00-12:00 下午 13:00-18:00



净含量:800克 国食注字 YP 20230164

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

配料表		喂哺用量建议表			
生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂）、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂（DHA）、花生四烯酸油脂（ARA）、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'胞苷酸二钠、5'鸟苷酸二钠、5'肌苷酸二钠、5'尿苷酸二钠）、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。	每次乳粉用量			每天喂哺次数	
	月龄	量匙数量	乳粉克数		温开水（ml）
	12-36个月	7	31.5	210	3
注：一优能佳平匙本产品（约4.5克）兑30毫升温开水为标准稀释法。					
喂哺及注意事项					
请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。					

奶具消毒及调奶方法

1.在调配乳粉之前，
请洗净、擦干双手。

2.清洗奶杯/奶瓶、
奶嘴、瓶盖。

3.把奶杯/奶瓶放在
沸水中至少煮5分钟。

4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至
45℃左右，将正确量煮开过的
温水(45℃左右)倒入消毒后的奶
杯/奶瓶中。

5.用优能佳专用量勺，参照喂哺
表加入正确份量乳粉。

6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，
冷却到适合宝宝饮用的温度，可
以滴一滴出来到手腕处测试温度。

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2109	钾	mg 21 448
蛋白质	g	0.49	10.27	铜	µg 17.9 377.0
脂肪	g	1.22	25.82	镁	mg 1.6 34.7
亚油酸	g	0.16	3.46	铁	mg 0.19 4.02
α-亚麻酸	mg	20	425	锌	mg 0.18 3.73
碳水化合物	g	2.7	56.58	锰	µg 2.49 52.43
维生素				钙	mg 16 330
维生素A	µg RE	17	367	磷	mg 10 215
维生素D	µg	0.60	12.65	碘	µg 4.5 94.9
维生素E	mg α-TE	0.27	5.79	氯	mg 15 324
维生素K ₁	µg	1.71	36.12	硒	µg 0.90 18.98
维生素B ₁	µg	25	524	可选择成分	
维生素B ₂	µg	35	734	肌醇	mg 3.0 62.8
维生素B ₆	µg	13.5	283.7	牛磺酸	mg 1.6 34.2
维生素B ₁₂	µg	0.124	2.620	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 4.5 94.9
烟酸(烟酰胺)	µg	144	3031	二十碳四烯酸(ARA)	mg 5.2 109.6
叶酸	µg	4.3	90.5	膳食纤维	
泛酸	µg	171	3615	低聚半乳糖	g 0.03 0.56
维生素C	mg	4.3	91.3	聚葡萄糖	g 0.07 1.57
生物素	µg	0.69	14.51	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 0.2 3.8
胆碱	mg	6.0	126.5	乳铁蛋白	mg 1.5 32.6
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg 2.9 60.2
钠	mg	9	185	说明：每100mL奶液含乳粉13.5g	

配料表	
生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、酪蛋白磷酸肽、酪蛋白磷酸肽(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘酚(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。	

优利士®

贝博儿®



1 段

净含量:100克 国食注字 YP20230165

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

喂哺用量建议表			
婴儿月龄	每次乳粉用量		每24小时 喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
0-1周	60	2	8
1-2周	90	3	6
2-4周	120	4	5
1-2月	150	5	5
2-4月	180	6	5
4-6月	210	7	5
说明：每平匙净含量约4.5克			
温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！ 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。			

产品类别：婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

1



调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残留。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

2



依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

3



取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

4



盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。





6 949008 404516

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2109	钾	mg 21 448
蛋白质	g	0.49	10.27	铜	µg 17.9 377.0
脂肪	g	1.22	25.82	镁	mg 1.6 34.7
亚油酸	g	0.16	3.46	铁	mg 0.19 4.02
α-亚麻酸	mg	20	425	锌	mg 0.18 3.73
碳水化合物	g	2.7	56.58	锰	µg 2.49 52.43
维生素				钙	mg 16 330
维生素A	µg RE	17	367	磷	mg 10 215
维生素D	µg	0.60	12.65	碘	µg 4.5 94.9
维生素E	mg α-TE	0.27	5.79	氯	mg 15 324
维生素K ₁	µg	1.71	36.12	硒	µg 0.90 18.98
维生素B ₁	µg	25	524	可选择成分	
维生素B ₂	µg	35	734	肌醇	mg 3.0 62.8
维生素B ₆	µg	13.5	283.7	牛磺酸	mg 1.6 34.2
维生素B ₁₂	µg	0.124	2.620	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 4.5 94.9
烟酸(烟酰胺)	µg	144	3031	二十碳四烯酸(ARA)	mg 5.2 109.6
叶酸	µg	4.3	90.5	膳食纤维	
泛酸	µg	171	3615	低聚半乳糖	g 0.03 0.56
维生素C	mg	4.3	91.3	聚葡萄糖	g 0.07 1.57
生物素	µg	0.69	14.51	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 0.2 3.8
胆碱	mg	6.0	126.5	乳铁蛋白	mg 1.5 32.6
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg 2.9 60.2
钠	mg	9	185	说明：每100mL奶液含乳粉13.5g	

配料表	
生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、乳糖、葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、酪蛋白磷酸肽、酪酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、柠檬酸钠、磷酸三钙、磷酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。	



净含量:200克 国食注字 YP20230165

1 段

婴儿配方羊乳粉 (0-6月龄,1段)

喂哺用量建议表			
婴儿月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
0-1周	60	2	8
1-2周	90	3	6
2-4周	120	4	5
1-2月	150	5	5
2-4月	180	6	5
4-6月	210	7	5
说明：每平匙净含量约4.5克			
温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！ 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。			

产品类别：婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

品牌官方网址
www.beiboer.cn
产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法	
①	调奶之前请洗手；彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残留。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
②	依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
③	取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。
④	盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。



6 1949008 404394

配料表
生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、酪蛋白磷酸肽、酪蛋白磷酸肽(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

产品类别：婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042040829



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2109
蛋白质	g	0.49	10.27
脂肪	g	1.22	25.82
亚油酸	g	0.16	3.46
α-亚麻酸	mg	20	425
碳水化合物	g	2.7	56.58
维生素			
维生素A	μg RE	17	367
维生素D	μg	0.60	12.65
维生素E	mg α-TE	0.27	5.79
维生素K ₁	μg	1.71	36.12
维生素B ₁	μg	25	524
维生素B ₂	μg	35	734
维生素B ₆	μg	13.5	283.7
维生素B ₁₂	μg	0.124	2.620
烟酸(烟酰胺)	μg	144	3031
叶酸	μg	4.3	90.5
泛酸	μg	171	3615
维生素C	mg	4.3	91.3
生物素	μg	0.69	14.51
胆碱	mg	6.0	126.5
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	21	448
铜	μg	17.9	377.0
镁	mg	1.6	34.7
铁	mg	0.19	4.02
锌	mg	0.18	3.73
锰	μg	2.49	52.43
钙	mg	16	330
磷	mg	10	215
碘	μg	4.5	94.9
氯	mg	15	324
硒	μg	0.90	18.98
可选择成分			
肌醇	mg	3.0	62.8
牛磺酸	mg	1.6	34.2
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.9
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.2	109.6
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.07	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.8
乳铁蛋白	mg	1.5	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	60.2

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®



净含量：700克 国食注字 YP20230165

1段

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄, 1段)


品牌官方网址
www.beiboer.cn


产品咨询热线
400-029-8003



奶具消毒及食用方法

①

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残留。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

②

依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③

取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④

盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
0-1周	60	2	8
1-2周	90	3	6
2-4周	120	4	5
1-2月	150	5	5
2-4月	180	6	5
4-6月	210	7	5

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

配料表
生乳乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氯化钴(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、柠檬酸钠、磷酸三钙、磷酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

产品类别：婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县乾县工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2109
蛋白质	g	0.49	10.27
脂肪	g	1.22	25.82
亚油酸	g	0.16	3.46
α-亚麻酸	mg	20	425
碳水化合物	g	2.7	56.58
维生素			
维生素A	μg RE	17	367
维生素D	μg	0.60	12.65
维生素E	mg α-TE	0.27	5.79
维生素K ₁	μg	1.71	36.12
维生素B ₁	μg	25	524
维生素B ₂	μg	35	734
维生素B ₆	μg	13.5	283.7
维生素B ₁₂	μg	0.124	2.620
烟酸(烟酰胺)	μg	144	3031
叶酸	μg	4.3	90.5
泛酸	μg	171	3615
维生素C	mg	4.3	91.3
生物素	μg	0.69	14.51
胆碱	mg	6.0	126.5
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	21	448
铜	μg	17.9	377.0
镁	mg	1.6	34.7
铁	mg	0.19	4.02
锌	mg	0.18	3.73
锰	μg	2.49	52.43
钙	mg	16	330
磷	mg	10	215
碘	μg	4.5	94.9
氯	mg	15	324
硒	μg	0.90	18.98
可选择成分			
肌醇	mg	3.0	62.8
牛磺酸	mg	1.6	34.2
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.9
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.2	109.6
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.07	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.8
乳铁蛋白	mg	1.5	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	60.2
说明：每100mL奶富含乳粉13.5g			

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®

1段

净含量:800克 国食注字 YP20230165

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

- 调奶之前请洗手,彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
- 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示,将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
- 取下固定在罐盖上的量匙,量取奶粉,依照喂哺表的指示,加入准确份量的奶粉。
- 盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧,并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
0-1周	60	2	8
1-2周	90	3	6
2-4周	120	4	5
1-2月	150	5	5
2-4月	180	6	5
4-6月	210	7	5

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙,建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉,请勿随意改变冲调比例,除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害!

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

营养成分表							
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2093	钾	mg	23	488
蛋白质	g	0.58	12.10	铜	µg	14.1	294.8
脂肪	g	1.21	25.30	镁	mg	2.0	41.5
亚油酸	g	0.13	2.81	铁	mg	0.30	6.28
α-亚麻酸	mg	16	340	锌	mg	0.18	3.67
碳水化合物	g	2.6	54.97	锰	µg	2.74	57.27
维生素				钙	mg	21	445
维生素A	µg RE	23	471	磷	mg	13	280
维生素D	µg	0.60	12.56	碘	µg	4.5	94.2
维生素E	mg α-TE	0.27	5.56	氯	mg	20	421
维生素K ₁	µg	1.75	36.60	硒	µg	0.66	13.77
维生素B ₁	µg	25	528	可选择成分			
维生素B ₂	µg	30	627	肌醇	mg	2.7	57.0
维生素B ₆	µg	13.8	287.8	牛磺酸	mg	1.6	33.0
维生素B ₁₂	µg	0.117	2.458	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.2
烟酸(烟酰胺)	µg	144	3005	二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.4	112.1
叶酸	µg	3.5	72.5	膳食纤维			
泛酸	µg	170	3566	低聚半乳糖	g	0.03	0.56
维生素C	mg	4.4	91.4	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	µg	0.71	14.89	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.6
胆碱	mg	6.0	125.6	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	69.5
钠	mg	6	123	说明：每100mL奶液含乳粉13.5g			

配料表	
生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。	



净含量:100克 国食注字 YP20230166

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

喂哺用量建议表			
月龄	每次乳粉用量		每24小时 喂哺次数
	温开水量 (毫升)	平匙数	
6-12个月	210	7	3-4
说明：每平匙净含量约4.5克			
温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！ 6-12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。			

产品类别：较大婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

品牌官方网址
www.beiboer.cn
产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法	
①	调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
②	依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
③	取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。
④	盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件
置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。



营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2093	钾	mg 23 488
蛋白质	g	0.58	12.10	铜	µg 14.1 294.8
脂肪	g	1.21	25.30	镁	mg 2.0 41.5
亚油酸	g	0.13	2.81	铁	mg 0.30 6.28
α-亚麻酸	mg	16	340	锌	mg 0.18 3.67
碳水化合物	g	2.6	54.97	锰	µg 2.74 57.27
维生素				钙	mg 21 445
维生素A	µg RE	23	471	磷	mg 13 280
维生素D	µg	0.60	12.56	碘	µg 4.5 94.2
维生素E	mg α-TE	0.27	5.56	氯	mg 20 421
维生素K ₁	µg	1.75	36.60	硒	µg 0.66 13.77
维生素B ₁	µg	25	528	可选择成分	
维生素B ₂	µg	30	627	肌醇	mg 2.7 57.0
维生素B ₆	µg	13.8	287.8	牛磺酸	mg 1.6 33.0
维生素B ₁₂	µg	0.117	2.458	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 4.5 94.2
烟酸(烟酰胺)	µg	144	3005	二十碳四烯酸(ARA)	mg 5.4 112.1
叶酸	µg	3.5	72.5	膳食纤维	
泛酸	µg	170	3566	低聚半乳糖	g 0.03 0.56
维生素C	mg	4.4	91.4	聚葡萄糖	g 0.08 1.57
生物素	µg	0.71	14.89	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 0.1 2.6
胆碱	mg	6.0	125.6	乳铁蛋白	mg 1.6 32.6
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg 3.3 69.5
钠	mg	6	123	说明：每100mL奶液含乳粉13.5g	

配料表	
生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。	



净含量:200克 国食注字 YP20230166 **2**段
较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

喂哺用量建议表			
月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
6-12个月	210	7	3-4
说明：每平匙净含量约4.5克			
温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！ 6-12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。			

产品类别：较大婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

品牌官方网址 www.beiboer.cn
产品咨询热线 400-029-8003

奶具消毒及食用方法

①

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残留。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

②

依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③

取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④

盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。



6 949008 140440 01

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2093	钾	mg 23 488
蛋白质	g	0.58	12.10	铜	μg 14.1 294.8
脂肪	g	1.21	25.30	镁	mg 2.0 41.5
亚油酸	g	0.13	2.81	铁	mg 0.30 6.28
α-亚麻酸	mg	16	340	锌	mg 0.18 3.67
碳水化合物	g	2.6	54.97	锰	μg 2.74 57.27
维生素				钙	mg 21 445
维生素A	μg RE	23	471	磷	mg 13 280
维生素D	μg	0.60	12.56	碘	μg 4.5 94.2
维生素E	mg α-TE	0.27	5.56	氟	mg 20 421
维生素K ₁	μg	1.75	36.60	硒	μg 0.66 13.77
维生素B ₁	μg	25	528	可选择成分	
维生素B ₂	μg	30	627	肌醇	mg 2.7 57.0
维生素B ₆	μg	13.8	287.8	牛磺酸	mg 1.6 33.0
维生素B ₁₂	μg	0.117	2.458	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 4.5 94.2
烟酸(烟酰胺)	μg	144	3005	二十碳四烯酸(ARA)	mg 5.4 112.1
叶酸	μg	3.5	72.5	膳食纤维	
泛酸	μg	170	3566	低聚半乳糖	g 0.03 0.56
维生素C	mg	4.4	91.4	聚葡萄糖	g 0.08 1.57
生物素	μg	0.71	14.89	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 0.1 2.6
胆碱	mg	6.0	125.6	乳铁蛋白	mg 1.6 32.6
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg 3.3 69.5
钠	mg	6	123	说明：每100mL奶液含乳粉13.5g	

配料表	
生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、酪蛋白磷酸肽、酪蛋白磷酸肽(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三钙、磷酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。	



净含量:400克 国食注字 YP20230166

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

喂哺用量建议表			
月龄	每次乳粉用量		每24小时 喂哺次数
	温开水量 (毫升)	平匙数	
6-12个月	210	7	3-4
说明：每平匙净含量约4.5克			
温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！ 6-12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。			

贮存条件
置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

奶具消毒及食用方法	
①	调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残留。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
②	依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
③	取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。
④	盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。



品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003



产品类别：较大婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

配料表
生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、酯化视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-脂酸生育醇(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三钙、碳酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

产品类别：较大婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2093
蛋白质	g	0.58	12.10
脂肪	g	1.21	25.30
亚油酸	g	0.13	2.81
α-亚麻酸	mg	16	340
碳水化合物	g	2.6	54.97
维生素			
维生素A	μg RE	23	471
维生素D	μg	0.60	12.56
维生素E	mg α-TE	0.27	5.56
维生素K ₁	μg	1.75	36.60
维生素B ₁	μg	25	528
维生素B ₂	μg	30	627
维生素B ₆	μg	13.8	287.8
维生素B ₁₂	μg	0.117	2.458
烟酸(烟酰胺)	μg	144	3005
叶酸	μg	3.5	72.5
泛酸	μg	170	3566
维生素C	mg	4.4	91.4
生物素	μg	0.71	14.89
胆碱	mg	6.0	125.6
矿物质			
钠	mg	6	123
钾	mg	23	488
铜	μg	14.1	294.8
镁	mg	2.0	41.5
铁	mg	0.30	6.28
锌	mg	0.18	3.67
锰	μg	2.74	57.27
钙	mg	21	445
磷	mg	13	280
碘	μg	4.5	94.2
氯	mg	20	421
硒	μg	0.66	13.77
可选择成分			
肌醇	mg	2.7	57.0
牛磺酸	mg	1.6	33.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.2
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.4	112.1
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.08	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.6
乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	69.5

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®

净含量：700克 国食注字 YP20230166

2段

较大婴儿配方羊乳粉

(6-12月龄, 2段)

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

2

依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

3

取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

4

盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
6-12个月	210	7	3-4

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
6-12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

配料表
生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三钙、碳酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

产品类别：较大婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2093
蛋白质	g	0.58	12.10
脂肪	g	1.21	25.30
亚油酸	g	0.13	2.81
α-亚麻酸	mg	16	340
碳水化合物	g	2.6	54.97
维生素			
维生素A	μg RE	23	471
维生素D	μg	0.60	12.56
维生素E	mg α-TE	0.27	5.56
维生素K ₁	μg	1.75	36.60
维生素B ₁	μg	25	528
维生素B ₂	μg	30	627
维生素B ₆	μg	13.8	287.8
维生素B ₁₂	μg	0.117	2.458
烟酸(烟酰胺)	μg	144	3005
叶酸	μg	3.5	72.5
泛酸	μg	170	3566
维生素C	mg	4.4	91.4
生物素	μg	0.71	14.89
胆碱	mg	6.0	125.6
矿物质			
钠	mg	6	123
钾	mg	23	488
铜	μg	14.1	294.8
铁	mg	2.0	41.5
锌	mg	0.30	6.28
锰	mg	0.18	3.67
钙	μg	2.74	57.27
磷	mg	21	445
碘	mg	13	280
氯	μg	4.5	94.2
硒	μg	20	421
可选择成分			
肌醇	mg	2.7	57.0
牛磺酸	mg	1.6	33.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.2
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.4	112.1
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.08	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.6
乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	69.5
说明：每100mL奶液含乳粉13.5g			

优利士®

贝博儿®

净含量:800克 国食注字 YP20230166

2段

较大婴儿配方羊乳粉

(6-12月龄,2段)

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

①

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

②

依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③

取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④

盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
6-12个月	210	7	3-4

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2067	铜	μg 14.4 298.6
蛋白质	g	0.72	14.80	镁	mg 1.9 38.3
脂肪	g	1.19	24.60	铁	mg 0.30 6.20
亚油酸	g	0.11	2.25	锌	mg 0.15 3.04
α-亚麻酸	mg	12	248	钙	mg 24 503
碳水化合物	g	2.5	52.27	磷	mg 17 354
维生素				碘	μg 2.7 55.7
维生素A	μg RE	23	466	氯	mg 23 484
维生素D	μg	0.60	12.40	可选择成分	
维生素E	mg α-TE	0.26	5.36	硒	μg 0.71 14.74
维生素K ₁	μg	1.79	37.01	胆碱	mg 6.0 124.0
维生素B ₁	μg	26	531	锰	μg 2.91 60.25
维生素B ₂	μg	32	659	肌醇	mg 2.9 60.9
维生素B ₆	μg	13.8	284.3	牛磺酸	mg 1.8 36.4
维生素B ₁₂	μg	0.122	2.519	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 1.5 30.8
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3033	二十碳四烯酸(ARA)	mg 2.6 53.4
叶酸	μg	3.5	72.7	膳食纤维	
泛酸	μg	180	3723	低聚半乳糖	g 0.03 0.56
维生素C	mg	3.9	81.5	聚葡萄糖	g 0.08 1.57
生物素	μg	0.76	15.68	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 0.1 2.4
矿物质				乳铁蛋白	mg 1.6 32.6
钠	mg	7	143	酪蛋白磷酸肽	mg 3.9 79.6
钾	mg	27	560	说明：每100mL奶液含乳粉13.5g	

配料表	
生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油(DHA)、花生四烯酸油(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。	



净含量:100克 国食注字 YP20230167

3段

幼儿配方羊乳粉

(12-36月龄,3段)

喂哺用量建议表			
月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
12-36个月	210	7	3
说明：每平匙净含量约4.5克			
温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！			

产品类别：幼儿配方食品

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

销售热线：029-81776389

产品属性：乳基粉状

保质期：24个月

产地：陕西 咸阳

产品标准代号：GB 10767-2021

食品生产许可证编号：SC12961042400829

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法	
①	调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
②	依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
③	取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。
④	盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。



营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2067	铜	μg 14.4 298.6
蛋白质	g	0.72	14.80	镁	mg 1.9 38.3
脂肪	g	1.19	24.60	铁	mg 0.30 6.20
亚油酸	g	0.11	2.25	锌	mg 0.15 3.04
α-亚麻酸	mg	12	248	钙	mg 24 503
碳水化合物	g	2.5	52.27	磷	mg 17 354
维生素				碘	μg 2.7 55.7
维生素A	μg RE	23	466	氯	mg 23 484
维生素D	μg	0.60	12.40	可选择成分	
维生素E	mg α-TE	0.26	5.36	硒	μg 0.71 14.74
维生素K ₁	μg	1.79	37.01	胆碱	mg 6.0 124.0
维生素B ₁	μg	26	531	锰	μg 2.91 60.25
维生素B ₂	μg	32	659	肌醇	mg 2.9 60.9
维生素B ₆	μg	13.8	284.3	牛磺酸	mg 1.8 36.4
维生素B ₁₂	μg	0.122	2.519	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 1.5 30.8
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3033	二十碳四烯酸(ARA)	mg 2.6 53.4
叶酸	μg	3.5	72.7	膳食纤维	
泛酸	μg	180	3723	低聚半乳糖	g 0.03 0.56
维生素C	mg	3.9	81.5	聚葡萄糖	g 0.08 1.57
生物素	μg	0.76	15.68	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 0.1 2.4
矿物质				乳铁蛋白	mg 1.6 32.6
钠	mg	7	143	酪蛋白磷酸肽	mg 3.9 79.6
钾	mg	27	560	说明：每100mL奶液含乳粉13.5g	

配料表	
生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D ₃)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。	

优利士®

贝博儿®



3段

净含量:200克 国食注字 YP20230167

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

喂哺用量建议表			
月龄	每次乳粉用量		每24小时 喂哺次数
	温开水量 (毫升)	平匙数	
12-36个月	210	7	3
说明：每平匙净含量约4.5克			
温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！			

产品类别：幼儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

品牌官方网址
www.beiboer.cn
产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法



① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。



② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。



③ 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。



④ 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内存用。



营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2067	铜	μg 14.4 298.6
蛋白质	g	0.72	14.80	镁	mg 1.9 38.3
脂肪	g	1.19	24.60	铁	mg 0.30 6.20
亚油酸	g	0.11	2.25	锌	mg 0.15 3.04
α-亚麻酸	mg	12	248	钙	mg 24 503
碳水化合物	g	2.5	52.27	磷	mg 17 354
维生素				碘	μg 2.7 55.7
维生素A	μg RE	23	466	氯	mg 23 484
维生素D	μg	0.60	12.40	可选择成分	
维生素E	mg α-TE	0.26	5.36	硒	μg 0.71 14.74
维生素K ₁	μg	1.79	37.01	胆碱	mg 6.0 124.0
维生素B ₁	μg	26	531	锰	μg 2.91 60.25
维生素B ₂	μg	32	659	肌醇	mg 2.9 60.9
维生素B ₆	μg	13.8	284.3	牛磺酸	mg 1.8 36.4
维生素B ₁₂	μg	0.122	2.519	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 1.5 30.8
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3033	二十碳四烯酸(ARA)	mg 2.6 53.4
叶酸	μg	3.5	72.7	膳食纤维	
泛酸	μg	180	3723	低聚半乳糖	g 0.03 0.56
维生素C	mg	3.9	81.5	聚葡萄糖	g 0.08 1.57
生物素	μg	0.76	15.68	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯	g 0.1 2.4
矿物质				乳铁蛋白	mg 1.6 32.6
钠	mg	7	143	酪蛋白磷酸肽	mg 3.9 79.6
钾	mg	27	560		

配料表
生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、酪蛋白磷酸肽、酪蛋白磷酸肽(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-脂酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。



净含量:400克 国食注字 YP20230167

3段

幼儿配方羊乳粉

(12-36月龄,3段)

喂哺用量建议表			
月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
12-36个月	210	7	3
说明:每平匙净含量约4.5克			
温馨提示:调奶时请使用罐内专用量匙。建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉,请勿随意改变冲调比例,除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害!			
贮存条件			
置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧,并在一个月内用完。			

奶具消毒及食用方法	
①	调奶之前请洗手,彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
②	依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示,将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
③	取下固定在罐盖上的量匙,量取奶粉,依照喂哺表的指示,加入准确份量的奶粉。
④	盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

产品类别:幼儿配方食品

生产日期及批号:见罐底

检验合格证号:同生产批号

生产者:陕西优利士乳业集团有限责任公司

地址:陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

销售热线:029-81776389

产品属性:乳基粉状

保质期:24个月

产地:陕西 咸阳

产品标准代号:GB 10767-2021

食品生产许可证编号:SC12961042400829



品牌官方网站
www.beiboer.cn



产品咨询热线
400-029-8003



6 949008 404509

配料表
生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、胆碱、维生素A、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

产品类别：幼儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.72	14.80
脂肪	g	1.19	24.60
亚油酸	g	0.11	2.25
α-亚麻酸	mg	12	248
碳水化合物	g	2.5	52.27
维生素			
维生素A	μg RE	23	466
维生素D	μg	0.60	12.40
维生素E	mg α-TE	0.26	5.36
维生素K ₁	μg	1.79	37.01
维生素B ₁	μg	26	531
维生素B ₂	μg	32	659
维生素B ₆	μg	13.8	284.3
维生素B ₁₂	μg	0.122	2.519
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3033
叶酸	μg	3.5	72.7
泛酸	μg	180	3723
维生素C	mg	3.9	81.5
生物素	μg	0.76	15.68
矿物质			
钠	mg	7	143
钾	mg	27	560
铜	μg	14.4	298.6
镁	mg	1.9	38.3
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.15	3.04
钙	mg	24	503
磷	mg	17	354
碘	μg	2.7	55.7
氯	mg	23	484
可选择成分			
硒	μg	0.71	14.74
胆碱	mg	6.0	124.0
锰	μg	2.91	60.25
肌醇	mg	2.9	60.9
牛磺酸	mg	1.8	36.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.5	30.8
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.6	53.4
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.08	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.4
乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	79.6
说明：每100mL奶液含乳粉13.5g			

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®

净含量：700克 国食注字 YP20230167

3段

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③ 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④ 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
12-36个月	210	7	3

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

配料表
生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、维生素A(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-维生素E(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K)、盐酸硫胺素(维生素B1)、核黄素(维生素B2)、盐酸吡哆醇(维生素B6)、氯化钴(维生素B12)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

产品类别：幼儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.72	14.80
脂肪	g	1.19	24.60
亚油酸	g	0.11	2.25
α-亚麻酸	mg	12	248
碳水化合物	g	2.5	52.27
维生素			
维生素A	μg RE	23	466
维生素D	μg	0.60	12.40
维生素E	mg α-TE	0.26	5.36
维生素K1	μg	1.79	37.01
维生素B1	μg	26	531
维生素B2	μg	32	659
维生素B6	μg	13.8	284.3
维生素B12	μg	0.122	2.519
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3033
叶酸	μg	3.5	72.7
泛酸	μg	180	3723
维生素C	mg	3.9	81.5
生物素	μg	0.76	15.68
矿物质			
钠	mg	7	143
钾	mg	27	560
铜	μg	14.4	298.6
镁	mg	1.9	38.3
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.15	3.04
钙	mg	24	503
磷	mg	17	354
氯	mg	2.7	55.7
可选择成分			
硒	μg	0.71	14.74
胆碱	mg	6.0	124.0
锰	μg	2.91	60.25
肌醇	mg	2.9	60.9
牛磺酸	mg	1.8	36.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.5	30.8
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.6	53.4
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.08	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.4
乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	79.6

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®

3段

净含量：800克 国食注字 YP20230167

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

- ① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残留。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
- ② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
- ③ 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。
- ④ 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
12-36个月	210	7	3

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！





直径：105mm

