

标签 1

标签 2

● 配料表

生绵羊乳、脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、乳糖、全脂绵羊乳粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、氯化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氯化钾;矿物质:氯化钾、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

● 贮存条件

1. 本品应存放于阴凉干燥处, 开封后请密封存放, 避免阳光直射, 请勿置于冰箱内保存。
2. 请尽量在开封后四周内食用完。

曾用名:百跃谱恩
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西北段
电话:029-86823388 邮编:710089
销售中心电话:029-86268180
咨询热线:400-999-7100
网址:www.baiyuepuen.com
产地:陕西 西安
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区



百跃谱恩官方微言

● 营养成分表		
项目	单位	每100kJ 每100g
能量	kJ	100 2043
蛋白质	g	0.61 12.5
脂肪	g	1.15 23.5
亚油酸	g	0.09 1.80
α-亚油酸	mg	15 300
碳水化合物	g	2.7 55.20
维生素		
维生素A	μg RE	23 460
维生素D	μg	0.59 12.0
维生素E	mg α-TE	0.24 5.00
维生素K ₁	μg	1.71 35.0
维生素B ₁	μg	25 600
维生素B ₂	μg	34 700
维生素B ₆	μg	17.1 350
维生素B ₁₂	μg	0.059 1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	147 3000
叶酸	μg	3.9 80.0
泛酸	μg	122 2500
维生素C	mg	4.9 100.0
生物素	μg	0.59 12.0
胆碱	mg	6.4 130
矿物质		
钠	mg	6 120
钾	mg	23 460
铜	μg	14.7 300
镁	mg	1.7 35.0
铁	mg	0.31 6.30
锌	mg	0.15 3.00
锰	μg	2.45 50.0
钙	mg	21 425
磷	mg	12 240
碘	μg	3.9 80.0
氯	mg	14 280
硒	μg	0.64 13.0
可选择成分		
肌醇	mg	1.7 35.0
牛磺酸	mg	1.5 30.0
左旋肉碱	mg	0.4 9.00
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9 80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6 115
低聚果糖	mg	39 800
低聚果糖	mg	98 2000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20 4.0
叶黄素	μg	9.8 200
乳铁蛋白	mg	1.5 30.0



国食注字YP20170607

谱恩

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)



2
净含量:900克



● 特别提示

- 6-12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾以防较大婴儿吃奶或其他不适。
- 哺乳期间建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度可能引起不适。

● 冲调方法

——为了较大婴儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。



1. 将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟,然后盖好直至使用时;
2. 将饮用水煮沸5分钟后,降至45°C-55°C;
3. 参照喂哺用量建议表,取所需冲调水量加入奶瓶或奶杯中;
4. 用专用量匙将正确的奶粉份量加入到奶瓶或奶杯中,量取奶粉时请勿刻意压平;
5. 盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂哺。

● 喂哺用量建议表

——每一平匙奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

较大婴儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
6-9月	7	210	4~5
9-12月	8	240	3~4



6 931708 015345

标签 3

配料表

生绵羊乳、脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、乳糖、全脂绵羊乳粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、氯化胆碱、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、dl-α-脂酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘酚、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺;矿物质:氯化钾、碳酸钾、柠檬酸钠、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

贮存条件

- 1、本品应存放于阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免阳光直射，请勿置于冰箱内保存。
- 2、请尽量在开封后四周内食用完。

曾用名:百跃谱恩
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电话:029-86223388 邮编:710089
销售中心电话:029-86268180
咨询热线:400-999-7100
网址:www.baiyuepuen.com
产地:陕西 西安
保质期:24个月
产品类型及属性:乳基粉状幼/乳配方食品
产品标准代号:GB 10767-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区



图跃:请留意官方微信

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2006
蛋白质	g	0.70	14.0
脂肪	g	1.12	22.5
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	53.70
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K ₁	μg	1.65	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	37	750
维生素B ₆	μg	19.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	155	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	140	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
钙	mg	15.5	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
铜	mg	22	440
磷	mg	12	250
碘	μg	2.2	45.0
氯	mg	14	280
可选择成分			
酒	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.49	50.0
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.00
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚半乳糖	mg	40	800
低聚果糖	mg	100	2000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6
叶黄素	μg	10.2	205
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0



国食注字YP20170608

谱恩

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)



3
净含量:900克



特别提示

- 母乳是幼儿最好的食物,请全力支持母乳喂养。
- 每次请只准备一次的奶量,并及时给幼儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾以防幼儿呛奶或其他不适。
- 哺乳用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

冲调方法 为了幼儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。



- 1.将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟,然后盖好直至使用时;
- 2.将饮用水煮沸5分钟后,降至45°C-55°C;
- 3.参照哺育用量建议表,取所需冲调水量加入奶瓶或奶杯中;
- 4.用专用量匙将正确的奶粉份量加入到奶瓶或奶杯中,量取奶粉时请勿刻意压平;
- 5.盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂奶。

哺育用量建议表 每一平匙奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

幼儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日哺育次数(次)
12-24月	8	240	3
24-36月	8	240	2



6 931708 015352

标签 4

配料表
生绵羊乳、脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、全脂绵羊乳粉、低聚果糖、低聚半乳糖(DHA)、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、氯化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘酚、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钾、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

贮存条件
1.本品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。 2.请尽量在开封后四周内食用完。

曾用名:百跃谱恩
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯西街西北段
电话:029-86823388 邮编:710089
销售中心电话:029-86268180
咨询热线:400-999-7100
网址:www.baiyuepuen.com
产地:陕西 西安
保质期:24个月
产品类型及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区



百跃谱恩官方微信

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2076
蛋白质	g	0.55	11.5
脂肪	g	1.20	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚麻酸	mg	15	320
碳水化合物	g	2.7	55.10
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.69	35.0
维生素B ₁	μg	24	500
维生素B ₂	μg	39	800
维生素B ₆	μg	14.5	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	4.8	100
泛酸	μg	135	2800
维生素C	mg	4.8	100.0
生物素	μg	0.72	15.0
胆碱	mg	7.2	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	16.9	350
镁	mg	1.5	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
钙	μg	2.41	50.0
锰	mg	15	320
碘	μg	10	210
氯	μg	4.8	100
硒	mg	15	315
磷	μg	0.87	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.4	30.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.00
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.5	115
低聚半乳糖	mg	19	400
低聚果糖	mg	96	2000
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	5.0
叶黄素	μg	2.9	60.0
乳铁蛋白	mg	1.4	30.0



国食注字YP20170606

谱恩

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)



净含量:800克



特别提示

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 每次请只准备一次的奶量,并及时给婴儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾以防婴儿呛奶或其他不适。
- 哺乳期用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

冲调方法

为了婴儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。



1. 将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟,然后盖好直至使用时;
2. 将饮用水煮沸5分钟后,晾至45°C-55°C;
3. 参照喂哺用量建议表,取所需冲调水量加入奶瓶或奶杯中;
4. 用专用量匙将正确奶粉的份量加入奶瓶或奶杯中,量取奶粉时请勿刻意压平;
5. 盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂哺。

喂哺用量建议表——每一平匙奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水						
婴儿月龄	0-2周	2周-1月	1-2月	2-3月	3-4月	4-6月
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平匙)	2	3	4	5	6	7
每日喂哺次数(次)	8	6-7	6	6	5-6	5



6 931708 014539

标签 5

● 配料表

生绵羊乳、脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、乳糖、全脂绵羊乳粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、氢化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-酮酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氯化钾;矿物质:氯化钾、磷酸三钙、柠檬酸钠、碳酸钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

● 贮存条件

1.本品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免阳光直射,请勿置于冰箱内保存。
2.请尽量在开封后四小时内食用完。

曾用名:百跃谱恩
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西北段
电话:029-86823388 邮编:710089
销售中心电话:029-86268180
咨询热线:400-999-7100
网址:www.baiyuepuen.com
产地:陕西 西安
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区



百跃谱恩官方微信

● 营养成分表		
项目	单位	每100g 每100kcal
能量	kJ	100 2043
蛋白质	g	0.61 12.5
脂肪	g	1.15 23.5
亚油酸	g	0.09 1.80
α-亚油酸	mg	15 300
碳水化合物	g	2.7 55.20
维生素		
维生素A	μg RE	23 460
维生素D	μg	0.59 12.0
维生素E	mg α-TE	0.24 5.00
维生素K ₁	μg	1.71 35.0
维生素B ₁	μg	25 600
维生素B ₂	μg	34 700
维生素B ₆	μg	17.1 350
维生素B ₁₂	μg	0.059 1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	147 3000
叶酸	μg	3.9 80.0
泛酸	μg	122 2500
维生素C	mg	4.9 100.0
生物素	μg	0.59 12.0
胆碱	mg	6.4 130
矿物质		
钠	mg	6 120
钾	mg	23 460
钙	μg	14.7 300
镁	mg	1.7 35.0
铁	mg	0.31 6.30
锌	mg	0.15 3.00
锰	μg	2.45 50.0
钙	mg	21 425
磷	mg	12 240
碘	μg	3.9 80.0
氯	mg	14 280
硒	μg	0.64 13.0
可选择成分		
肌醇	mg	1.7 35.0
牛磺酸	mg	1.5 30.0
左旋肉碱	mg	0.4 9.00
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9 80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6 115
低聚半乳糖	mg	39 800
低聚果糖	mg	98 2000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20 4.0
叶黄素	μg	9.8 200
乳铁蛋白	mg	1.5 30.0



国食注字YP20170607

谱恩

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)



2
净含量:800克



● 特别提示

- 6-12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾以防较大婴儿吃奶或其他不适。
- 哺乳期用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度可能引起不适。

● 冲调方法

为了较大婴儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。



- 1.将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟,然后盖好直至使用时;
- 2.将饮用水煮沸5分钟后,晾至45°C-55°C;
- 3.参照哺喂用量建议表,取所需冲调水量加入奶瓶或奶杯中;
- 4.用专用量匙将正确的奶粉份量加入至奶瓶或奶杯中,量取奶粉时请刻意压平;
- 5.盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂奶。

● 喂哺用量建议表

每一平匙奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

较大婴儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
6-9月	7	210	4~5
9-12月	8	240	3~4



6 931708 014546

标签 6

配料表

生绵羊乳、脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、乳糖、全脂绵羊乳粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、氯化胆碱、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、dl-α-脂酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺;矿物质:氯化钾、碳酸钾、柠檬酸钠、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

贮存条件

1、本品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免阳光直射,请勿置于冰箱内保存。
2、请尽量在开封后四周内食用完。

曾用名:百跃谱恩
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电话:029-86823388 邮编:710089
销售中心电话:029-86268180
咨询热线:400-999-7100
网址:www.baiyuepuen.com
产地:陕西 西安
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状幼/L配方食品
产品标准代号:GB 10767-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区



百跃谱恩官方微信

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2006
蛋白质	g	0.70	14.0
脂肪	g	1.12	22.5
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	53.70
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K ₁	μg	1.65	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	37	750
维生素B ₆	μg	19.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	155	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	140	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
铜	μg	15.5	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	12	250
碘	μg	2.2	45.0
氯	mg	14	280
可溶性成分			
酒	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.49	50.0
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.00
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚果糖	mg	40	800
低聚半乳糖	mg	100	2000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6
叶黄素	μg	10.2	205
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0



国食注字YP20170608

谱恩

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)



3
净含量:800克



特别提示

- 母乳是幼儿最好的食物,请全力支持母乳喂养。
- 每次请只准备一次的奶量,并及时给幼儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多照顾以防幼儿呛奶或其他不适。
- 哺乳用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的比例可能引起不适。

冲调方法 为了幼儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。



- 1.将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶嘴盖清洗干净,使用前沸水煮沸5分钟,然后盖好直至使用时;
- 2.将饮用水煮沸5分钟后,降至45°C-55°C;
- 3.参照哺喂用量建议表,取所需冲调水量加入奶瓶或奶杯中;
- 4.用专用量匙将正确的奶粉份量加入至奶瓶或奶杯中,量取奶粉时请勿刻意压平;
- 5.盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶瓶在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可哺喂。

哺喂用量建议表 每一平匙奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

幼儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日哺喂次数(次)
12-24月	8	240	3
24-36月	8	240	2



6 931708 014553

标签 7

配料表

生绵羊乳、脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、全脂绵羊乳粉、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、氯化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-脂酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、维生素K₁、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、硫酸钙、硫酸镁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

贮存条件

1. 本品应存放于阴凉干燥处, 开封后请密封存放, 避免强光直射, 请勿置于冰箱内保存。
2. 请尽量在开封后四周内食用完。

曾用名: 百跃谱恩
生产商: 西安百跃羊乳集团有限公司
地址: 陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电话: 029-86823388 邮编: 710089
销售中心电话: 029-86268180
咨询热线: 400-999-7100
网址: www.baiyuepuen.com
产地: 陕西 西安
保质期: 24个月
产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号: GB 10765-2021
食品生产许可证编号: SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号: 见罐底喷码区



百跃 请留意官方微信

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2076
蛋白质	g	0.55	11.5
脂肪	g	1.20	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚麻酸	mg	15	320
碳水化合物	g	2.7	55.10
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.69	35.0
维生素B ₁	μg	24	500
维生素B ₂	μg	39	800
维生素B ₆	μg	14.5	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	4.8	100
泛酸	μg	135	2800
维生素C	mg	4.8	100.0
生物素	μg	0.72	15.0
胆碱	mg	7.2	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	16.9	350
镁	mg	1.5	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.41	50.0
钙	mg	15	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.8	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.4	30.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.00
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.5	115
低聚果糖	mg	19	400
低聚乳糖	mg	96	2000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	5.0
叶黄素	μg	2.9	60.0
乳铁蛋白	mg	1.4	30.0



国食注字YP20170606

谱恩

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)



1
净含量: 700克



特别提示

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 每次请只准备一次的奶量, 并及时给婴儿喂奶, 不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾以防婴儿呛奶或其他不适。
- 哺乳期用量建议表是根据平均的需要量而定, 请遵照表中建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度, 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

冲调方法 —— 为了婴儿健康请小心遵照标示冲调, 冲调前请洗手。



1. 将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净, 使用前沸水煮5分钟, 然后盖好直至使用时;
2. 将饮用水煮沸5分钟后, 降至45°C-55°C;
3. 参照喂哺用量建议表, 取所需冲调水量加入奶瓶或奶杯中;
4. 用专用量匙将正确奶粉的份量加入至奶瓶或奶杯中, 量取奶粉时请勿刻意压平;
5. 盖紧奶瓶, 然后摇匀, 如果用奶杯冲调, 可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧, 确定已达到宝宝可以饮用的温度), 方可喂哺。

喂哺用量建议表 —— 每一平匙奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水						
婴儿月龄	0-2周	2周-1月	1-2月	2-3月	3-4月	4-6月
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平匙)	2	3	4	5	6	7
每日喂哺次数(次)	8	6-7	6	6	5-6	5



6 931708 015307

标签 8

● 配料表

生绵羊乳、脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、乳糖、全脂绵羊乳粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、氢化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-脂酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、胆酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘酚、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氯化钾;矿物质:氯化钾、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

● 贮存条件

1.本品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免阳光直射,请勿置于冰箱内保存。
2.请尽量在开封后四小时内食用完。

曾用名:百跃谱恩
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西北段
电话:029-86823388 邮编:710089
销售中心电话:029-86268180
咨询热线:400-999-7100
网址:www.baiyuepuen.com
产地:陕西 西安
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区



百跃谱恩官方微言

● 营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2043
蛋白质	g	0.61	12.5
脂肪	g	1.15	23.5
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚油酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	55.20
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.71	35.0
维生素B ₁	μg	25	600
维生素B ₂	μg	34	700
维生素B ₆	μg	17.1	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	122	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
铜	μg	14.7	300
铁	mg	1.7	35.0
锌	mg	0.31	6.30
锰	μg	0.15	3.00
钙	mg	2.45	50.0
磷	mg	21	425
碘	μg	12	240
氯	mg	3.9	80.0
硒	μg	14	280
锶	μg	0.64	13.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.00
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	39	800
低聚果糖	mg	98	2000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	9.8	200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0



国食注字YP20170607

谱恩

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)



2
净含量:700克



● 特别提示

- 6-12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾以防较大婴儿呛奶或其他不适。
- 哺乳期间建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度可能引起不适。

● 冲调方法 —— 为了较大婴儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。



1. 将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟,然后盖好直至使用时;
2. 将饮用水煮沸5分钟后,降至45°C-55°C;
3. 参照哺育用量建议表,取所需冲调水量加入奶瓶或奶杯中;
4. 用专用量匙将正确的奶粉份量加入至奶瓶或奶杯中,量取奶粉时请勿刻意压平;
5. 盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂奶。

● 哺育用量建议表 —— 每一平匙奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

较大婴儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂奶次数(次)
6-9月	7	210	4~5
9-12月	8	240	3~4



6 931708 015314

标签 9

●● 配料表

生绵羊乳、脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、乳糖、全脂绵羊乳粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、氯化胆碱、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、dl-α-脂酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺;矿物质:氯化钾、碳酸钾、柠檬酸钠、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

●● 贮存条件

- 1、本品应存放于阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免阳光直射，请勿置于冰箱内保存。
- 2、请尽量在开封后四周内食用完。

曾用名:百跃谱恩
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电话:029-86223388 邮编:710089
销售中心电话:029-86268180
咨询热线:400-999-7100
网址:www.baiyuepuen.com
产地:陕西 西安
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状幼/乳配方食品
产品标准代号:GB 10767-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区



图识:请留意官方微信

●● 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2006
蛋白质	g	0.70	14.0
脂肪	g	1.12	22.5
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	53.70
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K ₁	μg	1.65	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	37	750
维生素B ₆	μg	19.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	155	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	140	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
钙	mg	15.5	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
铜	mg	22	440
磷	mg	12	250
碘	μg	2.2	45.0
氯	mg	14	280
可选择成分			
酒	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.49	50.0
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.00
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚半乳糖	mg	40	800
低聚果糖	mg	100	2000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6
叶黄素	μg	10.2	205
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0



国食字YP20170608

谱恩

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)



净含量:700克



●● 特别提示

- 母乳是幼儿最好的食物,请全力支持母乳喂养。
- 每次请只准备一次的奶量,并及时给幼儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾以防幼儿呛奶或其他不适。
- 哺乳用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

●● 冲调方法 为了幼儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。



- 1.将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟,然后盖好直至使用时;
- 2.将饮用水煮沸5分钟后,降至45°C-55°C;
- 3.参照哺乳用量建议表,取所需冲调水量加入奶瓶或奶杯中;
- 4.用专用量匙将正确的奶粉份量加入到奶瓶或奶杯中,量取奶粉时请勿刻意压平;
- 5.盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂奶。

●● 哺乳用量建议表 每一平匙奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

幼儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂奶次数(次)
12-24月	8	240	3
24-36月	8	240	2



6 931708 015321

标签 10

配料表

生绵羊乳、脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、全脂绵羊乳粉、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、氯化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸镁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

贮存条件

1.本品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免阳光直射,请勿置于冰箱内保存。
2.请尽量在开封后四周内食用完。

曾用名:百跃谱恩
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电话:029-86823388 邮编:710089
销售中心电话:029-86268180
咨询热线:400-999-7100
网址:www.baiyuepuen.com
产地:陕西 西安
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区



百跃-谱恩官方微店

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2076
蛋白质	g	0.55	11.5
脂肪	g	1.20	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚麻酸	mg	15	320
碳水化合物	g	2.7	55.10
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.69	35.0
维生素B ₁	μg	24	500
维生素B ₂	μg	39	800
维生素B ₆	μg	14.5	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	4.8	100
泛酸	μg	135	2800
维生素C	mg	4.8	100.0
生物素	μg	0.72	15.0
胆碱	mg	7.2	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
钙	μg	16.9	350
镁	mg	1.5	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.41	50.0
铜	mg	15	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.8	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.4	30.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.00
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.5	115
低聚半乳糖	mg	19	400
低聚果糖	mg	96	2000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	5.0
叶黄素	μg	2.9	60.0
乳铁蛋白	mg	1.4	30.0



国食注字YP20170606

谱恩

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄, 1段)



1
净含量:400克



特别提示

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 每次请只准备一次的奶量,并及时给婴儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾以防婴儿呛奶或其他不适。
- 哺乳期用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

冲调方法

为了婴儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。



- 1.将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟,然后盖好直至使用时;
- 2.将饮用水煮沸5分钟后,晾至45°C-55°C;
- 3.参照喂哺用量建议表,取所需冲调水量加入奶瓶或奶杯中;
- 4.用专用量匙将正确奶粉的份量加入至奶瓶或奶杯中,量取奶粉时请勿刻意压平;
- 5.盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂哺。

喂哺用量建议表——每一平匙奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水						
婴儿月龄	0~2周	2周~1月	1~2月	2~3月	3~4月	4~6月
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平匙)	2	3	4	5	6	7
每日喂哺次数(次)	8	6~7	6	6	5~6	5



6 931706 014643

标签 11

● 配料表

生绵羊乳、脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、乳糖、全脂绵羊乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、氢化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-酮酸生育醇、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘酚、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氯化钾;矿物质:氯化钾、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

● 贮存条件

1.本品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。
2.请尽量在开封后四周内食用完。

曾用名:百跃谱恩
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电话:029-86823388 邮编:710089
销售中心电话:029-86268180
咨询热线:400-999-7100
网址:www.baiyuepuen.com
产地:陕西 西安
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区



百跃谱恩官方微信

● 营养成分表			
项目	单位	每100g	每100g
能量	kJ	100	2043
蛋白质	g	0.61	12.5
脂肪	g	1.15	23.5
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚油酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	55.20
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.71	35.0
维生素B ₁	μg	25	600
维生素B ₂	μg	34	700
维生素B ₆	μg	17.1	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	122	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
钙	μg	14.7	300
镁	mg	1.7	35.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
锰	μg	2.45	50.0
铜	mg	21	425
磷	mg	12	240
氯	μg	3.9	80.0
硒	mg	14	280
碘	μg	0.64	13.0
可溶性成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.00
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	39	800
低聚果糖	mg	98	2000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	9.8	200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0



国食注字YP20170607

谱恩

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)



2
净含量:400克



● 特别提示

- 6-12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾以防较大婴儿呛奶或其他不适。
- 哺乳期用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度可能引起不适。

● 冲调方法

为了较大婴儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。



- 1.将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟,然后盖好直至使用时;
- 2.将饮用水煮沸5分钟后,降至45°C-55°C;
- 3.参照哺育用量建议表,取所需冲调水量加入奶瓶或奶杯中;
- 4.用专用量匙将正确的奶粉份量加入至奶瓶或奶杯中,量取奶粉时请勿刻意压平;
- 5.盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂奶。

● 哺育用量建议表

每一平匙奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

较大婴儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂奶次数(次)
6-9月	7	210	4~5
9-12月	8	240	3~4



6 931708 014850

配料表
生绵羊乳、脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、乳糖、全脂绵羊乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、氯化胆碱、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺;矿物质:氯化钾、碳酸钙、柠檬酸钠、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

贮存条件
1. 本品应存放于阴凉干燥处, 开封后请密封存放, 避免强光直射, 请勿置于冰箱内保存。 2. 请尽量在开封后四周内食用完。

曾用名:百臻谱恩
生产商:西安百臻羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电话:029-86823388 邮编:710089
销售中心电话:029-86268180
咨询热线:400-999-7100
网址:www.baiyepu.com
产地:陕西 西安
保质期:24个月
产品类型及属性:乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号:GB 10767-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区



百臻-请留意方微蓝

● 营养成分表			
项目	单位	每100g	每100g
能量	kJ	100	2006
蛋白质	g	0.70	14.0
脂肪	g	1.12	22.5
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	53.70
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K ₁	μg	1.65	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	37	750
维生素B ₆	μg	19.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	155	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	140	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
铜	μg	15.5	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	12	250
碘	μg	2.2	45.0
氯	mg	14	280
可选择成分			
碘	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	mg	2.49	50.0
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.00
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚半乳糖	mg	40	800
低聚果糖	mg	100	2000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6
叶黄素	μg	10.2	205
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0



国食注字YP20170608

谱恩

幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)



3
净含量:400克



特别提示

- 母乳是幼儿最好的食物, 请全力支持母乳喂养。
- 每次请只准备一次的奶量, 并及时给幼儿喂奶, 不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾以防幼儿呛奶或其他不适。
- 哺乳用量建议表是根据平均的需要量而定, 请遵照表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度, 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

冲调方法

——为了幼儿健康请小心遵照标示冲调, 冲调前请洗手。



1. 将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净, 使用前沸水煮沸5分钟, 然后盖好直至使用时;
2. 将饮用水煮沸5分钟后, 降至45°C-55°C;
3. 参照哺乳用量建议表, 取所需冲调水量加入奶瓶或奶杯中;
4. 用专用量匙将正确的粉量加入奶瓶或奶杯中, 量取粉时请勿刻意压平;
5. 盖紧奶瓶, 然后摇匀, 如果用奶杯冲调, 可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶瓶在手腕内侧, 确定已达到宝宝可以饮用的温度), 方可喂哺。

喂哺用量建议表

——每一平匙奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

幼儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
12-24月	8	240	3
24-36月	8	240	2



6 931708 014867

标签 13

● 配料表

生绵羊乳、脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、全脂绵羊乳粉、低聚果糖、低聚半乳糖(DHA)、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、氯化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、硫酸钙、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

● 贮存条件

- 1.本品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免阳光直射,请勿置于冰箱内保存。
- 2.请尽量在开封后四个月内食用完。

曾用名:百跃谱恩
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电话:029-86823388 邮编:710089
销售中心电话:029-86268180
咨询热线:400-999-7100
网址:www.baiyuepuen.com
产地:陕西 西安
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区



百跃谱恩官方微信

● 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2076
蛋白质	g	0.55	11.5
脂肪	g	1.20	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚麻酸	mg	15	320
碳水化合物	g	2.7	55.10
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.69	35.0
维生素B ₁	μg	24	500
维生素B ₂	μg	39	800
维生素B ₆	μg	14.5	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	4.8	100
泛酸	μg	135	2800
维生素C	mg	4.8	100.0
生物素	μg	0.72	15.0
胆碱	mg	7.2	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
钙	μg	16.9	350
镁	mg	1.5	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.41	50.0
铜	mg	15	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.8	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.4	30.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.00
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.5	115
低聚半乳糖	mg	19	400
低聚果糖	mg	96	2000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	5.0
叶黄素	μg	2.9	60.0
乳铁蛋白	mg	1.4	30.0



国食注字YP20170606

谱恩

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)



1
净含量:300克



● 特别提示

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 每次请只准备一次的奶量,并及时给婴儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾以防婴儿呛奶或其他不适。
- 哺乳期用量建议表是根据平均的需要量而定,请参照表中建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

● 冲调方法 —— 为了婴儿健康请小心遵照标示冲调, 冲调前请洗手。



1. 将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟,然后盖好直至使用时;
2. 将饮用水煮沸5分钟后,降至45°C-55°C;
3. 参照喂哺用量建议表,取所需冲调水量加入奶瓶或奶杯中;
4. 用专用量匙将正确奶粉的份量加入到奶瓶或奶杯中,量取奶粉时请勿刻意压平;
5. 盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂哺。

● 喂哺用量建议表 —— 每一平匙奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

婴儿月龄	0~2周	2周~1月	1~2月	2~3月	3~4月	4~6月
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平匙)	2	3	4	5	6	7
每日喂哺次数(次)	8	6~7	6	6	5~6	5



6 931708 015277

● 配料表

生绵羊乳、脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、乳糖、全脂绵羊乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、氢化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-酮酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘酚、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氯化钾;矿物质:氯化钾、磷酸三钙、柠檬酸钠、碳酸钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

● 贮存条件

1.本品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。
2.请尽量在开封后四小时内食用完。

曾用名:百跃谱恩
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电话:029-86823388 邮编:710089
销售中心电话:029-86268180
咨询热线:400-999-7100
网址:www.baiyuepuen.com
产地:陕西 西安
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿/配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区



百跃谱恩官方微信

● 营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2043
蛋白质	g	0.61	12.5
脂肪	g	1.15	23.5
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚油酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	55.20
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.71	35.0
维生素B ₁	μg	25	600
维生素B ₂	μg	34	700
维生素B ₆	μg	17.1	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	122	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
铜	μg	14.7	300
铁	mg	1.7	35.0
锌	mg	0.31	6.30
钙	mg	0.15	3.00
镁	μg	2.45	50.0
钙	mg	21	425
磷	mg	12	240
碘	μg	3.9	80.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.64	13.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.00
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	39	800
低聚果糖	mg	98	2000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	9.8	200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0



国食注字YP20170607

谱恩

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)



2
净含量:300克



● 特别提示

- 6-12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾以防较大婴儿呛奶或其他不适。
- 哺乳期用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度可能引起不适。

● 冲调方法

为了较大婴儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。



- 1.将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟,然后盖好直至使用时;
- 2.将饮用水煮沸5分钟后,降至45°C-55°C;
- 3.参照哺育用量建议表,取所需冲调水量加入奶瓶或奶杯中;
- 4.用专用量匙将正确的奶粉份量加入至奶瓶或奶杯中,量取奶粉时请勿刻意压平;
- 5.盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂奶。

● 哺育用量建议表

每一平匙奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

较大婴儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水(毫升)	每日喂奶次数(次)
6-9月	7	210	4~5
9-12月	8	240	3~4



6 931708 015284

标签 15

●● 配料表

生绵羊乳、脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、乳糖、全脂绵羊乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、氯化胆碱、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺;矿物质:氯化钾、碳酸钙、柠檬酸钠、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

●● 贮存条件

1. 本品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。
2. 请尽量在开封后四周内食用完。

曾用名:百跃谱恩
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电话:029-86823388 邮编:710089
销售中心电话:029-86268180
咨询热线:400-999-7100
网址:www.baiyuepuen.com
产地:陕西 西安
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号:GB 10767-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区



百跃谱恩官方微信

●● 营养成分表

项目	单位	每100g	每100g
能量	kJ	100	2006
蛋白质	g	0.70	14.0
脂肪	g	1.12	22.5
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚油酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	53.70
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K ₁	μg	1.65	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	37	750
维生素B ₆	μg	19.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	155	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	140	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
铜	μg	15.5	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	12	250
碘	μg	2.2	45.0
氯	mg	14	280
可选择成分			
硒	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.49	50.0
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.00
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚半乳糖	mg	40	800
低聚果糖	mg	100	2000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6
叶黄素	μg	10.2	205
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0



国食注字YP20170608

谱恩

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)



3
净含量:300克



●● 特别提示

- 母乳是幼儿最好的食物,请全力支持母乳喂养。
- 每次请只准备一次的奶量,并及时给幼儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾以防幼儿呛奶或其他不适。
- 哺乳用量建议表是根据平均的需要量而定,请参照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

●● 冲调方法 —— 为了幼儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。



1. 将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,使用前沸水煮沸5分钟,然后盖好直至使用时;
2. 将饮用水煮沸5分钟后,降至45°C-55°C;
3. 参照哺喂用量建议表,取所需冲调水量加入奶瓶或奶杯中;
4. 用专用量匙将正确的奶粉份量加入到奶瓶或奶杯中,量取奶粉时请勿刻意压平;
5. 盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂哺。

●● 喂哺用量建议表 —— 每一平匙奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

幼儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
12-24月	8	240	3
24-36月	8	240	2



6 931708 015291

标签 16

配料表

生绵羊乳、脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、全脂绵羊乳粉、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钾、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

贮存条件

- 1、本品应存放于阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内保存。
- 2、请尽量在开封后四周内食用完。

曾用名:百跃谱恩

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司

地址:陕西省西安市阎良区武屯西街西环路北段

电话:029-86823388 邮编:710089

销售中心电话:029-86268180

咨询热线:400-999-7100

网址:www.baiyuepuen.com

产地:陕西 西安

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品

产品标准代号:GB 10765-2021

食品生产许可证编号:SC12961011400840

生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区



百跃谱恩官方微信

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2076
蛋白质	g	0.55	11.5
脂肪	g	1.20	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚麻酸	mg	15	320
碳水化合物	g	2.7	55.10
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.69	35.0
维生素B ₁	μg	24	500
维生素B ₂	μg	39	800
维生素B ₆	μg	14.5	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
叶酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	4.8	100
泛酸	μg	135	2800
维生素C	mg	4.8	100.0
生物素	μg	0.72	15.0
胆碱	mg	7.2	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	16.9	350
镁	mg	1.5	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.41	50.0
钙	mg	15	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.8	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.4	30.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.00
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	5.9	80.0
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.5	115
低聚半乳糖	mg	19	400
低聚果糖	mg	96	2000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	5.0
叶黄素	μg	2.9	60.0
乳铁蛋白	mg	1.4	30.0



国食注字YP20170606

谱恩

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)



净含量:75克

特别提示



- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 每次请只准备一次的奶量,并及时给婴儿喂奶。不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾以防婴儿呛奶或其他不适。
- 哺乳期用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度可能引起不适。

冲调方法



1. 将奶瓶或奶嘴、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟,然后盖好直至使用时;
2. 将饮用水煮沸5分钟后,晾至45°C-55°C;
3. 参照喂哺用量建议表,取所需冲调水量加入奶瓶或奶杯中;
4. 用专用量匙将正确奶粉的份量加入到奶瓶或奶杯中,量取奶粉时请勿刻意压平;
5. 盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂哺。

喂哺用量建议表

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

婴儿月龄	0~2周	2周~1月	1~2月	2~3月	3~4月	4~6月
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平匙)	2	3	4	5	6	7
每日喂哺次数(次)	8	6~7	6	6	5~6	5



6 931708 015215

配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-脂酸生育醇、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2059
蛋白质	g	0.56	11.5
脂肪	g	1.21	25.0
碳水化合物	g	0.09	1.90
D-亚油酸	mg	16	320
碳水化合物	g	2.6	53.20
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₂	μg	1.70	35.0
维生素B ₁	μg	24	500
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	14.6	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
叶酸(副叶酸)	μg	146	3000
叶醇	μg	4.9	100
泛酸	μg	136	2800
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.73	15.0
胆碱	mg	7.3	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	17.0	350
镁	mg	1.6	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.43	50.0
钙	mg	16	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.9	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
脂肪酸组成			
胆固醇	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	19	400
低聚果糖	mg	126	2600
果糖葡萄糖	mg	63	1300
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	5.0
叶黄素	μg	2.9	60.0
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩蓓护

1段

净含量:858g

国食注字 YP20230156

喂养用量建议表:

· 喂养用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲泡。
· 未经专业人士建议,请勿改变冲泡浓度。
· 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度可能引起不适。

婴儿月龄	每日喂奶次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
0~2周	8	60	2
2周~1月	6~7	90	3
1~2月	6	120	4
2~3月	6	150	5
3~4月	5~6	180	6
4~6月	5	210	7

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水
· 每次请只准备一次的奶量,并及时给婴儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
· 喂奶时应多加照顾,以防婴儿呛奶或其他不适。

产地:陕西 西安
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电话:029-86823388
邮编:710089
销售中心电话:029-88612023
客服中心电话:400-8353-933
网站:www.ybmilkgoat.com
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区

冲泡方法:

为了婴儿健康请小心遵照标示冲泡,冲泡前请洗手。

1

将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;

2

将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40°C~50°C(为保持奶粉中益生菌的活性);

3

冷却完成后,参照喂养用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;

4

用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);

5

盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲泡,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达宝宝可饮用温度),方可喂奶。

配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-脂酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示:6-12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

质量认证:

百跃羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

1. 本产品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。

2. 请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2029
蛋白质	g	0.64	13.0
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
D-泛酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	54.80
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	5.00
维生素K ₁	μg	1.72	35.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	34	700
维生素B ₆	μg	17.2	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	123	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
铜	μg	14.8	300
铁	mg	1.7	35.0
锰	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	μg	2.46	50.0
磷	mg	21	425
碘	mg	12	240
硒	μg	4.9	100
氯	mg	14	280
硫	μg	0.64	13.0
可溶性成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	115
低聚半乳糖	mg	15	300
低聚果糖	mg	79	1600
葡萄糖	mg	64	1300
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	9.9	200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩蓓护

2段

净含量:858g

国食注字 YP20230157

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)

喂哺用量建议表:

·喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

·未经专业人士建议,请勿改变冲调浓度。

·未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度可能引起不适。

较大婴儿月龄	每日喂哺次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
6-9月	4-5	210	7
9-12月	3-4	240	8

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

·每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

·喂奶时应多加照顾,以防较大婴儿呛奶或其他不适。

冲调方法:

为了较大婴儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。

将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;

将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40℃-50℃(为保持奶粉中益生菌的活性);

冷却完成后,参照喂哺用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;

用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);

盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲调,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达宝宝可饮用温度),方可喂哺。

产地:陕西 西安

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司

地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段

电话:029-86823388

邮编:710089

销售中心电话:029-88612023

客服中心电话:400-8353-933

网站:www.ybmilkgoat.com

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品

产品标准代号:GB 10766-2021

食品生产许可证编号:SC12961011400840

生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区

配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、葡萄糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示:本品适合12~36月龄幼儿食用。

质量认证:

百跃羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

1、本产品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。
2、请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1990
蛋白质	g	0.70	14.0
脂肪	g	1.13	22.5
碳水化合物	g	0.09	1.80
D-亚油酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.6	51.90
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K ₁	μg	1.66	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	38	750
维生素B ₆	μg	20.1	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	156	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	141	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
铜	μg	15.6	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.32	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	13	250
碘	μg	2.3	45.0
氯	mg	14	280
维生素			
维生素A	μg	0.65	13.0
维生素D	μg	6.5	130
维生素E	μg	2.51	50.0
维生素K ₁	μg	1.8	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳五烯酸(EPA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚半乳糖	mg	50	1000
低聚果糖	mg	101	2000
葡萄糖	mg	80	1600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6
叶黄素	μg	10.1	200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩蓓护

3段

净含量:858g

国食注字 YP20230158



幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)

喂养用量建议表:

· 喂养用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。
· 未经专业人士建议,请勿改变冲调浓度。
· 未经煮沸消毒的水、奶液或不恰当的浓度可能引起不适。

幼儿月龄	每日喂奶次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
12~24月	3	240	8
24~36月	2	240	8

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水
· 每次请只准备一次的奶量,并及时给幼儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

冲调方法:

为了幼儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。



1 将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;



2 将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40°C-50°C(为保持奶粉中益生菌的活性);



3 冷却完成后,参照喂养用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;



4 用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);



5 盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲调,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达宝宝可饮用温度),方可喂哺。

产地:陕西 西安
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电话:029-86823388
邮编:710089
销售中心电话:029-88612023
客服中心电话:400-8353-933
网站:www.ybmilkgoat.com
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号:GB 10767-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区



配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-脂酸生育醇、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示:对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

质量认证:

百跃羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

1、本产品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。
2、请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2059
蛋白质	g	0.56	11.5
脂肪	g	1.21	25.0
碳水化合物	g	0.09	1.90
D-亚油酸	mg	16	320
碳水化合物	g	2.6	53.20
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.70	35.0
维生素B ₁	μg	24	500
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	14.6	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
叶酸(副叶酸)	μg	146	3000
叶醇	μg	4.9	100
泛酸	μg	136	2800
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.73	15.0
胆碱	mg	7.3	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	17.0	350
镁	mg	1.6	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.43	50.0
钙	mg	16	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.9	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
脂肪酸组成			
胆固醇	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	19	400
低聚果糖	mg	126	2600
果糖葡萄糖	mg	63	1300
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	5.0
叶黄素	μg	2.9	60.0
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩蓓护

1段

净含量:800g

国食注字 YP20230156

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

喂养用量建议表:

· 喂养用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲泡。
· 未经专业人士建议,请勿改变冲泡浓度。
· 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度可能引起不适。

婴儿月龄	每日喂奶次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
0-2周	8	60	2
2周-1月	6-7	90	3
1-2月	6	120	4
2-3月	6	150	5
3-4月	5-6	180	6
4-6月	5	210	7

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水
· 每次请只准备一次的奶量,并及时给婴儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
· 喂奶时应多加照顾,以防婴儿呛奶或其他不适。

产地:陕西 西安
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电话:029-86823388
邮编:710089
销售中心电话:029-88612023
客服中心电话:400-8353-933
网站:www.ybmilkgoat.com
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区

冲泡方法:

为了婴儿健康请小心遵照标示冲泡,冲泡前请洗手。

将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;

将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40°C-50°C(为保持奶粉中益生菌的活性);

冷却完成后,参照喂养用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;

用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);

盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲泡,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达宝宝可饮用温度),方可喂奶。

配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-脂酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示:

6-12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

质量认证:

百跃羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

1. 本产品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。
2. 请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2029
蛋白质	g	0.64	13.0
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
D-亚油酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	54.80
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	5.00
维生素K ₁	μg	1.72	35.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	34	700
维生素B ₆	μg	17.2	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	123	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
钙	mg	14.8	300
镁	mg	1.7	35.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
锰	μg	2.46	50.0
铜	μg	21	425
磷	mg	12	240
碘	μg	4.9	100
氯	mg	14	280
硒	μg	0.64	13.0
可选营养成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	115
低聚半乳糖	mg	15	300
低聚果糖	mg	79	1600
葡萄糖	mg	64	1300
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	9.9	200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩蓓护

2段

净含量:800g

国食注字 YP20230157

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)

恩蓓护

较大婴儿配方羊奶粉

较大婴儿月龄

每日喂哺次数(次)

温开水量(毫升)

奶粉量(平匙)

6-9月	4-5	210	7
9-12月	3-4	240	8

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

·每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

·喂奶时应多加照顾,以防较大婴儿呛奶或其他不适。

产地:陕西 西安

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司

地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段

电话:029-86823388

邮编:710089

销售中心电话:029-88612023

客服中心电话:400-8353-933

网站: www.ybmilkgoat.com

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品

产品标准代号:GB 10766-2021

食品生产许可证编号:SC12961011400840

生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区

冲调方法:

为了较大婴儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。

1

将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;

2

将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40℃-50℃(为保持奶粉中益生菌的活性);

3

冷却完成后,参照喂哺用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;

4

用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);

5

盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲调,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达宝宝可饮用温度),方可喂哺。

二维码

6 931708 014515

配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、聚葡萄糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示:本品适合12~36月龄幼儿食用。

质量认证:

百跃羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

1、本产品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。

2、请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	KJ	100	1990
蛋白质	g	0.70	14.0
脂肪	g	1.13	22.5
碳水化合物	g	0.09	1.80
D-亚油酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.6	51.90
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K ₁	μg	1.66	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	38	750
维生素B ₆	μg	20.1	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	156	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	141	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
铜	μg	15.6	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.32	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	13	250
碘	μg	2.3	45.0
硒	μg	14	280
脂类物质			
胆固醇	mg	0.65	13.0
脂肪	mg	6.5	130
脂肪	mg	2.51	50.0
肌醇	mg	1.8	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚半乳糖	mg	50	1000
低聚果糖	mg	101	2000
聚葡萄糖	mg	80	1600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6
叶黄素	μg	10.1	200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩蓓护

3段

净含量:800g

国食注字 YP20230158

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)

喂养用量建议表:

· 喂养用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

· 未经专业人士建议,请勿改变冲调浓度。

· 未经煮沸消毒的水、奶液或不恰当的浓度可能引起不适。

幼儿月龄	每日喂奶次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
12~24月	3	240	8
24~36月	2	240	8

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

· 每次请只准备一次的奶量,并及时给幼儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

冲调方法:

为了幼儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。

- 将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;
- 将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40℃~50℃(为保持奶粉中益生菌的活性);
- 冷却完成后,参照喂养用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;
- 用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);
- 盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲调,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达宝宝可饮用温度),方可喂哺。

产地:陕西 西安

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司

地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段

电话:029-86823388

邮编:710089

销售中心电话:029-88612023

客服热线:400-8353-933

网站:www.ybmilkgoat.com

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品

产品标准代号:GB 10767-2021

食品生产许可证编号:SC12961011400840

生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区

6 931708 014522

配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-脂酸生育醇、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

质量认证:

百跃羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

1、本产品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。
2、请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2059
蛋白质	g	0.56	11.5
脂肪	g	1.21	25.0
碳水化合物	g	0.09	1.90
D-亚油酸	mg	16	320
碳水化合物	g	2.6	53.20
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₂	μg	1.70	35.0
维生素B ₁	μg	24	500
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	14.6	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸(尼克酸)	μg	146	3000
叶酸	μg	4.9	100
泛酸	μg	136	2800
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.73	15.0
胆碱	mg	7.3	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	17.0	350
镁	mg	1.6	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.43	50.0
钙	mg	16	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.9	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
脂肪酸组成			
胆固醇	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	19	400
低聚果糖	mg	126	2600
果糖葡萄糖	mg	63	1300
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	5.0
叶黄素	μg	2.9	60.0
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩蓓护

1段

净含量:700g

国食注字 YP20230156

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

喂养用量建议表:

· 喂养用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲泡。
· 未经专业人士建议,请勿改变冲泡浓度。
· 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度可能引起不适。

婴儿月龄	每日喂奶次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
0-2周	8	60	2
2周-1月	6-7	90	3
1-2月	6	120	4
2-3月	6	150	5
3-4月	5-6	180	6
4-6月	5	210	7

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水
· 每次请只准备一次的奶量,并及时给婴儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
· 喂奶时应多加照顾,以防婴儿呛奶或其他不适。

产地:陕西 西安

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司

地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段

电话:029-86823388

邮编:710089

销售中心电话:029-88612623

客服中心电话:400-8353-933

网站:www.ybmilkgoat.com

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品

产品标准代号:GB 10765-2021

食品生产许可证编号:SC12961011400840

生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区

冲泡方法:

为了婴儿健康请小心遵照标示冲泡,冲泡前请洗手。

1

将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;

2

将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40°C-50°C(为保持奶粉中益生菌的活性);

3

冷却完成后,参照喂养用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;

4

用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);

5

盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲泡,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达宝宝可饮用温度),方可喂奶。

6931708015024

配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-脂酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示:

6-12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

质量认证:

百跃羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

1. 本产品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。
2. 请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2029
蛋白质	g	0.64	13.0
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
D-亚油酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	54.80
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	5.00
维生素K ₁	μg	1.72	35.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	34	700
维生素B ₆	μg	17.2	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	123	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
钙	mg	14.8	300
镁	mg	1.7	35.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
锰	μg	2.46	50.0
铜	μg	21	425
磷	mg	12	240
碘	μg	4.9	100
氯	mg	14	280
硒	μg	0.64	13.0
可选营养成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	115
低聚半乳糖	mg	15	300
低聚果糖	mg	79	1600
葡萄糖	mg	64	1300
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	9.9	200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩蓓护

2段

净含量:700g

国食注字 YP20230157

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)

恩蓓护

较大婴儿配方羊奶粉

较大婴儿月龄

每日喂奶次数(次)

温开水量(毫升)

奶粉量(平匙)

6-9月	4-5	210	7
9-12月	3-4	240	8

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

·每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

·喂奶时应多加照顾,以防较大婴儿呛奶或其他不适。

产地:陕西 西安

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司

地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段

电话:029-86823388

邮编:710089

销售中心电话:029-88612023

客服中心电话:400-8353-933

网站:www.ybmilkgoat.com

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品

产品标准代号:GB 10766-2021

食品生产许可证编号:SC12961011400840

生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区

冲泡方法:

为了较大婴儿健康请小心遵照标示冲泡,冲泡前请洗手。

1

将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;

2

将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40℃-50℃(为保持奶粉中益生菌的活性);

3

冷却完成后,参照喂哺用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;

4

用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);

5

盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲泡,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达宝宝可饮用温度),方可喂哺。

二维码

6931708015031

配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、聚葡萄糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示:本品适合12~36月龄幼儿食用。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1990
蛋白质	g	0.70	14.0
脂肪	g	1.13	22.5
碳水化合物	g	0.09	1.80
D-亚油酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.6	51.90
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K ₁	μg	1.66	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	38	750
维生素B ₆	μg	20.1	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	156	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	141	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
铜	μg	15.6	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.32	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	13	250
碘	μg	2.3	45.0
硒	μg	14	280
其他营养成分			
维生素	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
肌醇	mg	2.51	50.0
肌醇	mg	1.8	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚半乳糖	mg	50	1000
低聚果糖	mg	101	2000
聚葡萄糖	mg	80	1600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6
叶黄素	μg	10.1	200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩蓓护

3段

净含量:700g

国食注字 YP20230158

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄, 3段)

喂养用量建议表:

· 喂养用量建议表是根据平均的需要量而定, 请遵照表中所建议的比例用量冲调。

· 未经专业人士建议, 请勿改变冲调浓度。

· 未经煮沸消毒的水、奶液或不恰当的浓度可能引起不适。

幼儿月龄	每日喂哺次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
12~24月	3	240	8
24~36月	2	240	8

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

· 每次请只准备一次的奶量, 并及时给幼儿喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。

产地: 陕西 西安

生产商: 西安百跃羊乳集团有限公司

地址: 陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段

电话: 029-86823388

邮编: 710089

销售中心电话: 029-88612023

客服中心电话: 400-8353-933

网站: www.ybmilkgoat.com

保质期: 24个月

产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品

产品标准代号: GB 10767-2021

食品生产许可证编号: SC12961011400840

生产日期、保质期至、批号: 见罐底喷码区

冲调方法:

为了幼儿健康请小心遵照标示冲调, 冲调前请洗手。

- 将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净, 沸水煮5分钟消毒, 然后盖好直至使用时;
- 将饮用水煮沸5分钟, 然后冷却至40°C~50°C (为保持奶粉中益生菌的活性);
- 冷却完成后, 参照喂养用量建议表, 将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;
- 用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中 (量取奶粉时请勿刻意压平);
- 盖紧奶瓶, 然后摇匀, 如果用杯冲调, 可用搅拌法搅匀, 待奶温适中 (将奶液滴于手腕内侧, 确定已达宝宝可饮用温度), 方可喂哺。

配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺;矿物质:碳酸钾、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示:

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

质量认证:

百跃羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

1、本产品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。
2、请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2059
蛋白质	g	0.56	11.5
脂肪	g	1.21	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚麻酸	mg	16	320
碳水化合物	g	2.6	53.20
维生素			
维生素A	RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.70	35.0
维生素B ₁	μg	24	500
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	14.6	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	146	3000
叶酸	μg	4.9	100
泛酸	μg	136	2800
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.73	15.0
胆碱	mg	7.3	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
钙	μg	17.0	350
镁	mg	1.6	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.43	50.0
铜	mg	16	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.9	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
可溶性成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	19	400
低聚果糖	mg	126	2600
果糖葡萄糖	mg	63	1300
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	5.0
叶黄素	μg	2.9	60.0
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩蓓护

1段

净含量:300g

国食注字 YP20230156

每罐重量

300g

净含量

300g

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

喂养用量建议表:

· 喂养用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。
· 未经专业人士建议,请勿改变冲调浓度。
· 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度可能引起不适。

婴儿月龄	每日喂奶次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
0-2周	8	60	2
2周-1月	6-7	90	3
1-2月	6	120	4
2-3月	6	150	5
3-4月	5-6	180	6
4-6月	5	210	7

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水
· 每次请只准备一次的奶量,并及时给婴儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
· 喂奶时应多加照顾,以防婴儿呛奶或其他不适。

产地:陕西 西安

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司

地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段

电话:029-86823388

邮编:710089

销售中心电话:029-88612023

客服中心电话:400-8353-933

网站:www.ybmilkgoat.com

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品

产品标准代号:GB 10765-2021

食品生产许可证编号:SC12961011400840

生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区

冲泡方法:

为了婴儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。

1

将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;

2

将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40°C-50°C(为保持奶粉中益生菌的活性);

3

冷却完成后,参照喂养用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;

4

用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);

5

盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲调,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达宝宝可饮用温度),方可喂奶。

QR Code

Barcode

配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯)、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-脂酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钾、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示:

6-12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

质量认证:

百跃羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证,危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

1.本产品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。
2.请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2029
蛋白质	g	0.64	13.0
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	54.80
维生素			
维生素A	μgRE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mgα-TE	0.25	5.00
维生素K ₁	μg	1.72	35.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	34	700
维生素B ₆	μg	17.2	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	123	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
铜	μg	14.8	300
镁	mg	1.7	35.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
锰	μg	2.46	50.0
钙	mg	21	425
磷	mg	12	240
氯	μg	4.9	100
硒	mg	14	280
碘	μg	0.64	13.0
膳食纤维			
肌醇	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	115
低聚半乳糖	mg	15	300
低聚果糖	mg	79	1600
葡萄糖	mg	64	1300
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	9.9	200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩蓓护

2段

净含量:300g

国食注字 YP20230157

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)

恩蓓护

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)

喂养用量建议表:

· 喂养用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。
· 未经专业人士建议,请勿改变冲调浓度。
· 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度可能引起不适。

较大婴儿月龄	每日喂奶次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
6-9月	4-5	210	7
9-12月	3-4	240	8

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水
· 每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
· 喂奶时应多加照顾,以防较大婴儿呛奶或其他不适。

产地:陕西 西安

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司

地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段

电话:029-86823388

邮编:710089

销售中心电话:029-88612023

客服中心电话:400-8353-933

网站:www.ybmilkgoat.com

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品

产品标准代号:GB 10766-2021

食品生产许可证编号:SC12961011400840

生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区

冲调方法:

为了较大婴儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。

1

将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;

2

将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40°C-50°C(为保持奶粉中益生菌的活性);

3

冷却完成后,参照喂养用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;

4

用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);

5

盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲调,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达到宝宝可饮用温度),方可喂奶。

6931708015062

6931708015062

配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、葡萄糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钾、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示:

本品适合12~36月龄幼儿食用。

质量认证:

百跃羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

1、本产品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。
2、请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1990
蛋白质	g	0.70	14.0
脂肪	g	1.13	22.5
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.6	51.90
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K ₁	μg	1.66	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	38	750
维生素B ₆	μg	20.1	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	156	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	141	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
铜	μg	15.6	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.32	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	13	250
氯	μg	2.3	45.0
锰	μg	14	280
膳食纤维			
糖	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.51	50.0
肌醇	mg	1.8	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚半乳糖	mg	50	1000
低聚果糖	mg	101	2000
葡萄糖	mg	80	1600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6
叶黄素	μg	10.1	200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩蓓护

3段

净含量:300g

国食注字 YP20230158

恩蓓护

3段

净含量:300g

国食注字 YP20230158

恩蓓护

3段

净含量:300g

国食注字 YP20230158

喂养用量建议表:

· 喂养用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲泡。
· 未经专业人士建议,请勿改变冲泡浓度。
· 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度可能引起不适。

幼儿月龄	每日喂哺次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
12~24月	3	240	8
24~36月	2	240	8

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水
· 每次请只准备一次的奶量,并及时给幼儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

冲泡方法:

为了幼儿健康请小心遵照标示冲泡,冲泡前请洗手。

1

将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;

2

将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40°C~50°C(为保持奶粉中益生菌的活性);

3

冷却完成后,参照喂哺用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;

4

用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);

5

盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲泡,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达到宝宝可饮用温度),方可喂哺。

产地:陕西 西安

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司

地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段

电话:029-86823388

邮编:710089

销售中心电话:029-88612023

客服中心电话:400-8353-933

网站:WWW.YBMILKGOAT.COM

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品

产品标准代号:GB 10767-2021

食品生产许可证编号:SC12961011400840

生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区

QR Code

Barcode

配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺;矿物质:碳酸钾、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示:对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2059
蛋白质	g	0.56	11.5
脂肪	g	1.21	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚麻酸	g	16	320
碳水化合物	g	2.6	53.20
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.70	35.0
维生素B ₁	μg	24	500
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	14.6	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	146	3000
叶酸	μg	4.9	100
泛酸	μg	136	2800
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.73	15.0
胆碱	mg	7.3	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	17.0	350
镁	mg	1.6	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.43	50.0
钙	mg	16	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.9	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	19	400
低聚果糖	mg	126	2600
聚葡萄糖	mg	63	1300
1,2-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	5.0
叶黄素	μg	2.9	60.0
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

质量认证:

百联羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

1、本产品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。

2、请尽量在开封后4周内食用完。

恩蓓护



1 段

净含量:100g

国食注字 YP20230156

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

喂养用量建议表:

· 喂养用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

· 未经专业人士建议,请勿改变冲调浓度。

· 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

婴儿月龄	每日喂奶次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
0~2周	8	60	2
2周~1月	6-7	90	3
1~2月	6	120	4
2~3月	6	150	5
3~4月	5-6	180	6
4~6月	5	210	7

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

· 每次请只准备一次的奶量,并及时给婴儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。

· 喂奶时应多加照顾,以防婴儿呛奶或其他不适。

产 地:陕西 西安
生产商:西安百联羊乳集团有限公司
地 址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电 话:029-86823388
邮 编:710089
销售中心电话:029-88612023
客服中心电话:400-8353-933
网 站:www.ybmlkgoat.com
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区

冲调方法:

为了婴儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。



将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;



将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40°C~50°C(为保持奶粉中益生菌的活性);



冷却完成后,参照喂养用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;



用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);



盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲调,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达到宝宝可饮用温度),方可喂哺。



配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示:6~12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

质量认证:

百联羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

1、本产品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。

2、请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2029
蛋白质	g	0.64	13.0
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	54.80
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	5.00
维生素K ₁	μg	1.72	35.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	34	700
维生素B ₆	μg	17.2	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	123	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
铜	μg	14.8	300
镁	mg	1.7	35.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
锰	μg	2.46	50.0
钙	mg	21	425
磷	mg	12	240
碘	μg	4.9	100
氯	mg	14	280
硒	μg	0.64	13.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	115
低聚半乳糖	mg	15	300
低聚果糖	mg	79	1600
聚葡萄糖	mg	64	1300
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	9.9	200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩倍护

2段

净含量:100g

国食注字 YP20230157

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)

喂哺用量建议表:

·喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

·未经专业人士建议,请勿改变冲调浓度。

·未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

较大婴儿月龄	每日喂哺次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
6~9月	4-5	210	7
9~12月	3-4	240	8

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

·每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

·喂奶时应多加照顾,以防较大婴儿呛奶或其他不适。

产地:陕西西安
生产商:西安百联羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电话:029-86823388
邮编:710089
销售中心电话:029-88612023
客服电话:400-8353-933
网站:www.bybmilkgoat.com
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区

冲调方法:

为了较大婴儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。

将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;

将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40°C~50°C(为保持奶粉中益生菌的活性);

冷却完成后,参照喂哺用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;

用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);

盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲调,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达到宝宝可饮用温度),方可喂哺。

6 931708 015093

配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、聚葡萄糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示:本品适合12~36月龄幼儿食用。

质量认证:

百跃羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

1、本产品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。

2、请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1990
蛋白质	g	0.70	14.0
脂肪	g	1.13	22.5
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.6	51.90
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K ₁	μg	1.66	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	38	750
维生素B ₆	μg	20.1	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	156	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	141	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
铜	μg	15.6	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.32	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	13	250
碘	μg	2.3	45.0
氯	mg	14	280
可选择成分			
硒	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.51	50.0
肌醇	mg	1.8	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚半乳糖	mg	50	1000
低聚果糖	mg	101	2000
聚葡萄糖	mg	80	1600
1,2-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6
叶黄素	μg	10.1	200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩倍护

3段

净含量:100g

国食注字 YP20230158

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)

喂养用量建议表:

· 喂养用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

· 未经专业人士建议,请勿改变冲调浓度。

· 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

幼儿月龄	每日喂哺次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
12~24月	3	240	8
24~36月	2	240	8

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

· 每次请只准备一次的奶量,并及时给幼儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

冲调方法:

为了幼儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。

将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;

将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40°C~50°C(为保持奶粉中益生菌的活性);

冷却完成后,参照喂养用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;

用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);

盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲调,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达到宝宝可饮用温度),方可喂哺。

6 931708 015109

产地:陕西 西安
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电话:029-86823388
邮编:710089
销售中心电话:029-88612023
客服中心电话:400-8353-933
网站:www.ybmlkgoat.com
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号:GB 10767-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区

配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺;矿物质:碳酸钾、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示:对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

质量认证:

百联羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

- 1、本产品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。
- 2、请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2059
蛋白质	g	0.56	11.5
脂肪	g	1.21	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚麻酸	g	16	320
碳水化合物	g	2.6	53.20
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.70	35.0
维生素B ₁	μg	24	500
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	14.6	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	146	3000
叶酸	μg	4.9	100
泛酸	μg	136	2800
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.73	15.0
胆碱	mg	7.3	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	17.0	350
镁	mg	1.6	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.43	50.0
钙	mg	16	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.9	100
溴	μg	15	315
氯	μg	0.87	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	19	400
低聚果糖	mg	126	2600
聚葡萄糖	mg	63	1300
1,2-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	5.0
叶黄素	μg	2.9	60.0
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩蓓护



1段

净含量:75g

国食注字 YP20230156

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

喂哺用量建议表:

- 喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。
- 未经专业人士建议,请勿改变冲调浓度。
- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

婴儿月龄	每日喂哺次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
0~2周	8	60	2
2周~1月	6-7	90	3
1~2月	6	120	4
2~3月	6	150	5
3~4月	5-6	180	6
4~6月	5	210	7

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

- 每次请只准备一次的奶量,并及时给婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾,以防婴儿呛奶或其他不适。

产地:陕西 西安

生产商:西安百联羊乳集团有限公司

地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段

电话:029-86823388

邮编:710089

销售中心电话:029-88612023

客服中心电话:400-8353-933

网站:www.ybmilkgoat.com

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品

产品标准代号:GB 10765-2021

食品生产许可证编号:SC12961011400840

生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区

冲调方法:

为了婴儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。

将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;

将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40°C~50°C(为保持奶粉中益生菌的活性);

冷却完成后,参照喂哺用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;

用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);

盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲调,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达到宝宝可饮用温度),方可喂哺。



配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钾、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示:6~12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

质量认证:

百联羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

1、本产品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。

2、请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2029
蛋白质	g	0.64	13.0
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	54.80
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	5.00
维生素K ₁	μg	1.72	35.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	34	700
维生素B ₆	μg	17.2	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	123	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
铜	μg	14.8	300
镁	mg	1.7	35.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
锰	μg	2.46	50.0
钙	mg	21	425
磷	mg	12	240
碘	μg	4.9	100
氯	mg	14	280
硒	μg	0.64	13.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	115
低聚半乳糖	mg	15	300
低聚果糖	mg	79	1600
聚葡萄糖	mg	64	1300
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	9.9	200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩倍护



2段

净含量:75g

国食注字 YP20230157

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)

喂哺用量建议表:

·喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

·未经专业人士建议,请勿改变冲调浓度。

·未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

较大婴儿月龄	每日喂哺次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
6~9月	4-5	210	7
9~12月	3-4	240	8

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

·每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

·喂奶时应多加照顾,以防较大婴儿呛奶或其他不适。

产地:陕西西安

生产商:西安百联羊乳集团有限公司

地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段

电话:029-86823388

邮编:710089

销售中心电话:029-88612023

客服中心电话:400-8353-933

网站:www.bybmilkgoat.com

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品

产品标准代号:GB 10766-2021

食品生产许可证编号:SC12961011400840

生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区

冲调方法:

为了较大婴儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。



将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;



将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40°C~50°C(为保持奶粉中益生菌的活性);



冷却完成后,参照喂哺用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;



用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);



盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲调,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达到宝宝可饮用温度),方可喂哺。



配料表:

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、聚葡萄糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、叶黄素、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

特别提示:本品适合12~36月龄幼儿食用。

质量认证:

百跃羊乳集团已通过ISO9001质量管理体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。

贮存说明:

1、本产品应存放于阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内保存。

2、请尽量在开封后4周内食用完。

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1990
蛋白质	g	0.70	14.0
脂肪	g	1.13	22.5
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.6	51.90
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K ₁	μg	1.66	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	38	750
维生素B ₆	μg	20.1	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	156	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	141	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
铜	μg	15.6	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.32	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	13	250
氯	mg	2.3	45.0
碘	μg	14	280
可选择成分			
硒	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.51	50.0
肌醇	mg	1.8	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚半乳糖	mg	50	1000
低聚果糖	mg	101	2000
聚葡萄糖	mg	80	1600
1,2-油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6
叶黄素	μg	10.1	200
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

恩倍护

3段

净含量:75g

国食注字 YP20230158

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)

喂哺用量建议表:

·喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

·未经专业人士建议,请勿改变冲调浓度。

·未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

幼儿月龄	每日喂哺次数(次)	温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
12~24月	3	240	8
24~36月	2	240	8

每一平匙配方羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水

·每次请只准备一次的奶量,并及时给幼儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

冲调方法:

为了幼儿健康请小心遵照标示冲调,冲调前请洗手。

将奶瓶或奶杯、奶嘴及奶瓶盖清洗干净,沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;

将饮用水煮沸5分钟,然后冷却至40°C~50°C(为保持奶粉中益生菌的活性);

冷却完成后,参照喂哺用量建议表,将正确水量倒入奶瓶或奶杯中;

用专用量匙将正确量的奶粉加入奶瓶或奶杯中(量取奶粉时请勿刻意压平);

盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用杯冲调,可用搅拌法搅匀,待奶温适中(将奶液滴于手腕内侧,确定已达到宝宝可饮用温度),方可喂哺。

6 931708 015130

产地:陕西 西安
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
电话:029-86823388
邮编:710089
销售中心电话:029-88612023
客服中心电话:400-8353-933
网站:www.ybmlkgoat.com
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号:GB 10767-2021
食品生产许可证编号:SC12961011400840
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区



跃小羊

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)



1

段

净含量:900克



对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲泡方法

1

2

3

4

5

6

① 冲泡前请洗手；

② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮沸5分钟消毒，然后盖好直至使用时；

③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40℃-50℃；

④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；

⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压平；

⑥ 盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用奶杯冲调，可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度)，方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

婴儿月龄	0-2周	2周-1月	1-2月	2-3月	3-4月	4-6月
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平匙)	2	3	4	5	6	7
每日喂哺次数(次)	8	6-7	6	6	5-6	5

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

· 每次请只准备一次的奶量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
· 喂奶时应多照顾以防婴儿呛奶或其他不适。

全国服务热线
NATIONAL SERVICE HOTLINE

400-029-6612



扫码关注

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.58	12.0
脂肪	g	1.21	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚麻酸	mg	15	320
碳水化合物	g	2.6	53.50
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.69	35.0
维生素B ₁	μg	29	600
维生素B ₂	μg	48	1000
维生素B ₆	μg	14.5	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	4.8	100
泛酸	μg	135	2800
维生素C	mg	4.8	1000
生物素	μg	0.73	15.0
胆碱	mg	7.3	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	16.9	350
镁	mg	1.5	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.42	50.0
钙	mg	15	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.8	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	60.0
牛磺酸	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	44	900
低聚果糖	mg	126	2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾；维生素：L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺；矿物质：碳酸钾、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商：西安百跃羊乳集团有限公司
地址：陕西省西安市阎良区武屯街西环路中段
食品生产许可证编号：SC12961011400840
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
生产日期、保质期、批号：见罐底喷码区
保质期：24个月
电话：029-86823388
销售中心电话：029-68959277
客服中心电话：400-029-6612
网址：www.yuexiaoyang.com



6 931708 014836



6-12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

冲调方法



① 冲调前请洗手；
② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40℃-50℃；
④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；
⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压实；
⑥ 盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用奶杯冲调，可用搅拌法搅匀。待奶温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

较大婴儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
6-9月	7	210	4-5
9-12月	8	240	3-4

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

· 每次请只准备一次的奶量，并及时给较大婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
· 喂奶时应多加照顾，以防较大婴儿吃奶或其他不适。



全国服务热线
NATIONAL SERVICE HOTLINE

400-029-6612



扫码关注



百肽®

跃小羊
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)

国食注字YP20230154



2段

净含量: 900克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2028
蛋白质	g	0.76	15.5
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.6	52.20
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	5.00
维生素K ₁	μg	1.73	35.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	17.3	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	123	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
铜	μg	14.8	300
镁	mg	1.7	35.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
锰	μg	2.47	50.0
钙	mg	21	425
磷	mg	12	240
碘	μg	4.9	100
氯	mg	14	280
硒	μg	0.64	13.0
可选择成分			
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	115
低聚半乳糖	mg	35	700
低聚果糖	mg	128	2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾、维生素L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺、矿物质：碳酸钾、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商：西安百跃羊乳集团有限公司
地址：陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号：SC12961011400840
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10766-2021
生产日期、保质期至、批号：见罐底喷码区
保质期：24个月
电话：029-86823388
销售中心电话：029-68959277
客服中心电话：400-029-6612
网址：www.yuexiaoyang.com



6 931708 014812



冲调方法



喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。
未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度可能引起不适。

幼儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
12-24月	8	240	3
24-36月	8	240	2

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

·每次请只准备一次的奶量，并及时给幼儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。

全国服务热线
NATIONAL SERVICE HOTLINE

400-029-6612



扫码关注



跃小羊

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)



3段

净含量:900克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2003
蛋白质	g	0.77	15.5
脂肪	g	1.15	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.5	50.30
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K ₁	μg	1.65	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	50	1000
维生素B ₆	μg	20.0	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	155	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	140	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
铜	μg	15.5	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	12	250
碘	μg	2.2	45.0
氯	mg	14	280
可选择成分			
硒	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.50	50.0
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚果糖	mg	60	1200
低聚半乳糖	mg	150	3000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、氯化胆碱、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾、维生素-L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺、矿物质：碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产 商：西安百跃羊乳集团有限公司
地 址：陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号：SC12961011400840
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号：GB 10767-2021
生产日期、保质期至、批号：见罐底喷码区
保 质 期：24个月
电 话：029-86823388
销售中心电话：029-68959277
客服中心电话：400-029-6612
网 址：www.yuexiaoyang.com



6 931708 014829



对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，
在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲调方法



① 冲调前请洗手；
② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮沸5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40℃-50℃；
④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；
⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压平；
⑥ 盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用奶杯冲调，可用搅拌法搅匀。待奶温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。
未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

婴儿月龄	0-2周	2周-1月	1-2月	2-3月	3-4月	4-6月
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平匙)	2	3	4	5	6	7
每日喂哺次数(次)	8	6-7	6	6	5-6	5

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

· 每次请只准备一次的奶量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
· 喂奶时应多照顾以防婴儿呛奶或其他不适。

全国服务热线

400-029-6612



扫码关注

跃小羊

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)



国食注字YP20230153

1段

净含量:800克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.58	12.0
脂肪	g	1.21	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚麻酸	mg	15	320
碳水化合物	g	2.6	53.50
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.69	35.0
维生素B ₁	μg	29	600
维生素B ₂	μg	48	1000
维生素B ₆	μg	14.5	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	4.8	100
泛酸	μg	135	2800
维生素C	mg	4.8	100.0
生物素	μg	0.73	15.0
胆碱	mg	7.3	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	16.9	350
镁	mg	1.5	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.42	50.0
钙	mg	15	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.8	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	60.0
牛磺酸	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	44	900
低聚果糖	mg	126	2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾；维生素：L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺；矿物质：碳酸钾、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商：西安百跃羊乳集团有限公司
地址：陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号：SC12961011400840
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
生产日期、保质期至、批号：见罐底喷码区
保质期：24个月
电话：029-86823388
销售中心电话：029-68959277
客服中心电话：400-029-6612
网址：www.yuexiaoyang.com



6 931708 011736



6-12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

冲调方法

1 冲调前请洗手；

2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；

3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40°C-50°C；

4 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；

5 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压实；

6 盖紧奶瓶，然后摇晃，如果用奶杯冲调，可用搅拌法搅匀。待奶温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

较大婴儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
6-9月	7	210	4-5
9-12月	8	240	3-4

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

· 每次请只准备一次的奶量，并及时给较大婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
· 喂奶时应多加照顾，以防较大婴儿呛奶或其他不适。

全国服务热线
NATIONAL SERVICE HOTLINE

400-029-6612



扫码关注

跃小羊
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)

国食注字YP20230154



2段

净含量:800克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2028
蛋白质	g	0.76	15.5
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.6	52.20
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	5.00
维生素K ₁	μg	1.73	35.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	17.3	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	123	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
铜	μg	14.8	300
镁	mg	1.7	35.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
锰	μg	2.47	50.0
钙	mg	21	425
磷	mg	12	240
碘	μg	4.9	100
氯	mg	14	280
硒	μg	0.64	13.0
可选择成分			
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	115
低聚半乳糖	mg	35	700
低聚果糖	mg	128	2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾、维生素L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺、矿物质：碳酸钾、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商：西安百跃羊乳集团有限公司
地址：陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号：SC12961011400840
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10766-2021
生产日期、保质期至、批号：见罐底喷码区
保质期：24个月
电话：029-86823388
销售中心电话：029-68959277
客服中心电话：400-029-6612
网址：www.yuexiaoyang.com



冲调方法



① 冲调前请洗手；

② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮沸5分钟消毒，然后盖好直至使用时；

③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40℃~50℃；

④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；

⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压实；

⑥ 盖紧奶瓶，然后摇匀；如果用奶杯冲调，可用搅拌法搅匀。待奶温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

幼儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
12~24月	8	240	3
24~36月	8	240	2

每一平匙羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

·每次请只准备一次的奶量，并及时给幼儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。

全国服务热线

400-029-6612



扫码关注



跃小羊

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)



3段

净含量:800克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2003
蛋白质	g	0.77	15.5
脂肪	g	1.15	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.5	50.30
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K ₁	μg	1.65	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	50	1000
维生素B ₆	μg	20.0	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	155	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	140	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
铜	μg	15.5	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	12	250
碘	μg	2.2	45.0
氯	mg	14	280
可选择成分			
硒	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.50	50.0
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚果糖	mg	60	1200
低聚半乳糖	mg	150	3000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、氯化胆碱、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾；维生素：L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺；矿物质：碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产 商：西安百跃羊乳集团有限公司
地 址：陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号：SC12961011400840
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号：GB 10767-2021
生产日期、保质期至、批号：见罐底喷码区
保 质 期：24个月
电 话：029-86823388
销售中心电话：029-68959277
客服中心电话：400-029-6612
网 址：www.yuexiaoyang.com



6 931708 011750



对于0-6月龄的婴儿最理想食品是母乳，
在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲调方法



① 冲调前请洗手；
② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮沸5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40℃-50℃；
④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；
⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压平；
⑥ 盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用奶杯冲调，可用搅拌法搅匀。待奶温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。
未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

婴儿月龄	0-2周	2周-1月	1-2月	2-3月	3-4月	4-6月
温升水量（毫升）	60	90	120	150	180	210
奶粉量（平匙）	2	3	4	5	6	7
每日喂哺次数（次）	8	6-7	6	6	5-6	5

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内存食用完。

温馨提示

- 每次请只准备一次的奶量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾以防婴儿呛奶或其他不适。



400-029-6612



扫码关注



跃小羊

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

国食注字YP20230153



1 段

净含量:400克

营养成分表		
项目	单位	每100kJ 每100g
能量	kJ	100 2067
蛋白质	g	0.58 12.0
脂肪	g	1.21 25.0
亚油酸	g	0.09 1.90
α-亚麻酸	mg	15 320
碳水化合物	g	2.6 53.50
维生素		
维生素A	μg RE	20 420
维生素D	μg	0.58 12.0
维生素E	mg α-TE	0.24 5.00
维生素K	μg	1.69 35.0
维生素B ₁	μg	29 600
维生素B ₂	μg	48 1000
维生素B ₆	μg	14.5 300
维生素B ₁₂	μg	0.058 1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	145 3000
叶酸	μg	4.8 100
泛酸	μg	135 2800
维生素C	mg	4.8 100.0
生物素	μg	0.73 15.0
胆碱	mg	7.3 150
矿物质		
钠	mg	8 160
钾	mg	18 370
铜	μg	16.9 350
镁	mg	1.5 32.0
铁	mg	0.19 4.00
锌	mg	0.17 3.50
锰	μg	2.42 50.0
钙	mg	15 320
磷	mg	10 210
碘	μg	4.8 100
氯	mg	15 315
硒	μg	0.87 18.0
可选择成分		
胆碱	mg	2.9 60.0
牛磺酸	mg	1.7 35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9 80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6 115
低聚半乳糖	mg	44 900
低聚果糖	mg	126 2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22 4.5

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾；维生素：L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘酚、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氯化钠、硫酸镁、硫酸钙、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸钾、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。	

产品信息	
生产商：西安百跃羊乳集团有限公司	
地址：陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段	
食品生产许可证编号：SC12961011400840	
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品	
产品标准代号：GB 10765-2021	
生产日期、保质期至、批号：见罐底喷码区	
保质期：24个月	
电话：029-86823388	
销售中心电话：029-68959277	
客服中心电话：400-029-6612	
网址：www.yuexiaoyang.com	



6 931708 014775





6-12月龄较大婴儿食用本产品时，
须配合添加辅食。

冲调方法



喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。
未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

较大婴儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
6-9月	7	210	4-5
9-12月	8	240	3-4

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

- 每次请只准备一次的奶量，并及时给较大婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾，以防较大婴儿呛奶或其他不适。



400-029-6612



扫码关注

跃小羊

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)

国食注字YP20230154



2

段

净含量:400克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2028
蛋白质	g	0.76	15.5
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.6	52.20
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	5.00
维生素K	μg	17.3	350
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	17.3	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	123	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
铜	μg	14.8	300
镁	mg	1.7	35.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
锰	μg	2.47	50.0
钙	mg	21	425
磷	mg	12	240
氯	μg	4.9	100
硒	μg	14	280
碘	μg	0.64	13.0
可选择成分			
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	115
低聚半乳糖	mg	35	700
低聚果糖	mg	128	2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾；维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺；矿物质:碳酸钾、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。	

产品信息	
生产	商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:	陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号:	SC12961011400840
产品类别及属性:	乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:	GB 10766-2021
生产日期、保质期至、批号:	见罐底喷码区
保质期:	24个月
电话:	029-86823388
销售中心电话:	029-68959277
客服中心电话:	400-029-6612
网址:	www.yuexiaoyang.com



6 931708 014782



冲调方法



- ① 冲调前请洗手；
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
- ③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40℃-50℃；
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；
- ⑤ 用专用匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压实；
- ⑥ 盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用奶瓶冲调，可用搅拌法搅匀。待奶滴温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。
未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的比例可能引起不适。

幼儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
12~24月	8	240	3
24~36月	8	240	2

每100毫升奶液 $\approx$ 13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处, 开封后请密封存放, 避免强光直射, 请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

·每次请只准备一次的奶量,并及时给幼儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。



400-029-6612



· 扫码关注 ·



跃小羊

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)



国食注字YP20230155



净含量:400克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	1000	2003
蛋白质	g	0.77	15.5
脂肪	g	1.15	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α -亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.5	50.30
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	22	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.22	4.50
维生素B ₁	μg	1.65	33.0
维生素B ₂	μg	30	600
维生素B ₆	μg	50	1000
维生素B ₁₂	μg	20.0	400
维生素B ₉	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	155	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	140	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
铜	μg	15.5	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	12	250
碘	μg	2.2	45.0
氯	mg	14	280
可选择成分			
谷	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.50	50.0
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚乳糖	mg	60	1200
低聚果糖	mg	150	3000
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、氯化胆碱、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾;维生素: L-抗坏血酸钠、 α -L-维生素生育醇、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酸、D-泛酸钙、植物甲萘醌、维生素D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质: 碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产 商:西安百致羊乳集团有限公司
地 址:陕西省西安市阎良区武屯街
西北路中段
食品生产许可证编号:SC12961011400840
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号:GB 10767-2012
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保 质 期:24个月
电 话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-021-6612
网 址:www.yuxiaoyang.cn



6 931708 014799



对于0-6月龄的婴儿最理想食品是母乳，
在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲调方法



① 冲调前请洗手；
② 将奶嘴、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮沸5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40℃-50℃；
④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；
⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压平；
⑥ 盖紧奶瓶，然后摇晃，如果用奶杯冲调，可用搅拌法搅匀。待奶温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。
未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

婴儿月龄	0-2周	2周-1月	1-2月	2-3月	3-4月	4-6月
温升水量（毫升）	60	90	120	150	180	210
奶粉量（平匙）	2	3	4	5	6	7
每日喂哺次数（次）	8	6-7	6	6	5-6	5

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内存食用完。

温馨提示

· 每次请只准备一次的奶量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
· 喂奶时应多加照顾以防婴儿呛奶或其他不适。

全国服务热线
NATIONAL SERVICE HOTLINE

400-029-6612



扫码关注



跃小羊
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

国食注字YP202030153

1 段

净含量:300克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.58	12.0
脂肪	g	1.21	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚麻酸	mg	15	320
碳水化合物	g	2.6	53.50
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K	μg	1.69	35.0
维生素B ₁	μg	29	600
维生素B ₂	μg	48	1000
维生素B ₆	μg	14.5	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸（烟酰胺）	μg	145	3000
叶酸	μg	4.8	100
泛酸	μg	135	2800
维生素C	mg	4.8	100.0
生物素	μg	0.73	15.0
胆碱	mg	7.3	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	16.9	350
镁	mg	1.5	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.42	50.0
钙	mg	15	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.8	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
可选择成分			
胆碱	mg	2.9	60.0
牛磺酸	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸（DHA）	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸（AA/ARA）	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	44	900
低聚果糖	mg	126	2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸（AA）、二十二碳六烯酸（DHA）、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾；维生素：L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘酚、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氯化钠；矿物质：碳酸钙、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商：西安百跃羊乳集团有限公司
地址：陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号：SC12961011400840
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
生产日期、保质期至、批号：见罐底喷码区
保质期：24个月
电话：029-86823388
销售中心电话：029-68959277
客服中心电话：400-029-6612
网址：www.yuexiaoyang.com



6 931708 015413

标签 45



6-12月龄较大婴儿食用本产品时，
须配合添加辅食。

冲调方法



① 冲调前请洗手；
② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮沸5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40℃-50℃；
④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；
⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压实；
⑥ 盖紧奶瓶，然后摇匀；如果用奶杯冲调，可用搅拌法搅匀。待奶温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。
未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

较大婴儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
6-9月	7	210	4-5
9-12月	8	240	3-4

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

· 每次请只准备一次的奶量，并及时给较大婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
· 喂奶时应多加照顾，以防较大婴儿呛奶或其他不适。



扫码关注



全国服务热线
NATIONAL SERVICE HOTLINE

400-029-6612



百跃®

跃小羊

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)

国食注字Y20230154





2段

净含量:300克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2028
蛋白质	g	0.76	15.5
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.6	52.20
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	5.00
维生素K	μg	17.3	350
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	17.3	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	123	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
铜	μg	14.8	300
镁	mg	1.7	35.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	μg	0.15	3.00
锰	μg	2.47	50.0
钙	mg	21	425
磷	mg	12	240
氯	μg	4.9	100
硒	μg	14	280
碘	μg	0.64	13.0
可选择成分			
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	115
低聚半乳糖	mg	35	700
低聚果糖	mg	128	2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾；维生素：L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺；矿物质：碳酸钾、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商：西安百跃羊乳集团有限公司
地址：陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号：SC12961011400840
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10766-2021
生产日期、保质期至、批号：见罐底喷码区
保质期：24个月
电话：029-86823388
销售中心电话：029-68959277
客服中心电话：400-029-6612
网址：www.yuexiaoyang.com



6 931708 015420



冲调方法



- ① 冲调前请洗手；
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
- ③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40℃-50℃；
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；
- ⑤ 用专用匙将正确的奶粉分量加入奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压实；
- ⑥ 盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用奶瓶冲调，可用搅拌法搅匀。待奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度，方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。
未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

幼儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
12~24月	8	240	3
24~36月	8	240	2

每100毫升奶液 $\approx$ 13.5克奶粉+90毫升水

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

·每次请只准备一次的奶量,并及时给幼儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。



400-029-6612



· 扫码关注 ·



跃小羊

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)



国食注字YP20230155



净含量:300克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	1000	2003
蛋白质	g	0.77	15.5
脂肪	g	1.15	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α -亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.5	50.30
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	22	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.22	4.50
维生素B ₁	μg	1.65	33.0
维生素B ₂	μg	30	600
维生素B ₆	μg	50	1000
维生素B ₁₂	μg	20.0	400
维生素B ₉	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	155	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	140	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
铜	μg	15.5	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	12	250
碘	μg	2.2	45.0
氯	mg	14	280
可选择成分			
谷	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.50	50.0
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚乳糖	mg	60	1200
低聚果糖	mg	150	3000
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、氯化胆碱、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾;维生素: L-抗坏血酸钠、 α -L-维生素生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、维生素D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质: 碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产 商:西安百致羊乳集团有限公司
地 址:陕西省西安市阎良区武屯街
西北路中段
食品生产许可证编号:SC12961011400840
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号:GB 10767-2012
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保 质 期:24个月
电 话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-021-6612
网 址:www.yuxiaoyang.cn



6 931708 015437



- ① 冲调前请洗手；
② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40℃~50℃；
④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；
⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压平；
⑥ 盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用奶杯冲调，可用搅拌法搅匀。待奶温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表						
婴儿月龄	0~2周	2周~1月	1~2月	2~3月	3~4月	4~6月
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平匙)	2	3	4	5	6	7
每日喂哺次数(次)	8	6~7	6	6	5~6	5

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法
本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内存食用完。

温馨提示
·每次请只准备一次的奶量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
·喂奶时应多加照顾以防婴儿呛奶或其他不适。

全国服务热线
NATIONAL SERVICE HOTLINE
400-029-6612



扫码关注



净含量:100克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.58	12.0
脂肪	g	1.21	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚麻酸	mg	15	320
碳水化合物	g	2.6	53.50
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.69	35.0
维生素B ₁	μg	29	600
维生素B ₂	μg	48	1000
维生素B ₆	μg	14.5	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	4.8	100
泛酸	μg	135	2800
维生素C	mg	4.8	100.0
生物素	μg	0.73	15.0
胆碱	mg	7.3	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	16.9	350
镁	mg	1.5	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.42	50.0
钙	mg	15	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.8	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	60.0
牛磺酸	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	44	900
低聚果糖	mg	126	2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5

配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾；维生素：L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、硫酸硫胺素、氰钴胺；矿物质：碳酸钙、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息
生产商：西安百跃羊乳集团有限公司
地址：陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号：SC12961011400840
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
生产日期、保质期至、批号：见罐底喷码区
保质期：24个月
电话：029-86823388
销售中心电话：029-68959277
客服中心电话：400-029-6612
网 址：www.yuexiaoyang.com





冲调方法



- ① 冲调前请洗手；
② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40℃~50℃；
④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；
⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压平；
⑥ 盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用奶杯冲调，可用搅拌法搅匀。待奶温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。
未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

婴儿月龄	0~2周	2周~1月	1~2月	2~3月	3~4月	4~6月
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平匙)	2	3	4	5	6	7
每日喂哺次数(次)	8	6~7	6	6	5~6	5

每一平匙羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内存食用完。

温馨提示

- 每次请只准备一次的奶量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
· 喂奶时应多加照顾以防婴儿呛奶或其他不适。



400-029-6612



扫码关注



跃小羊
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

国食注字YP20230153



净含量:75克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.58	12.0
脂肪	g	1.21	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚麻酸	mg	15	320
碳水化合物	g	2.6	53.50
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.69	35.0
维生素B ₁	μg	29	600
维生素B ₂	μg	48	1000
维生素B ₆	μg	14.5	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	4.8	100
泛酸	μg	135	2800
维生素C	mg	4.8	100.0
生物素	μg	0.73	15.0
胆碱	mg	7.3	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	16.9	350
镁	mg	1.5	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.42	50.0
钙	mg	15	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.8	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	60.0
牛磺酸	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	44	900
低聚果糖	mg	126	2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾；维生素：L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、硫酸硫胺素、氰钴胺；矿物质：碳酸钙、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商：西安百跃羊乳集团有限公司
地址：陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号：SC12961011400840
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
生产日期、保质期至、批号：见罐底喷码区
保质期：24个月
电话：029-86823388
销售中心电话：029-68959277
客服中心电话：400-029-6612
网 址：www.yuexiaoyang.com



6 931708 015444



- ① 冲调前请洗手；
② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40℃~50℃；
④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；
⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压平；
⑥ 盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用奶杯冲调，可用搅拌法搅匀。待奶温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表			
喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。 未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。			
较大婴儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
6-9月	7	210	4-5
9-12月	8	240	3-4
每一平匙羊奶粉约为4.5克。			
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。			

贮藏方法
本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月內食用完。

温馨提示
·每次请只准备一次的奶量，并及时给较大婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
·喂奶时应多加照顾，以防较大婴儿呛奶或其他不适。

全国服务热线
NATIONAL SERVICE HOTLINE
400-029-6612



扫码关注

跃小羊 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄,2段)



净含量:75克

营养成分表		
项目	单位	每100kJ 每100g
能量	kJ	100 2028
蛋白质	g	0.76 15.5
脂肪	g	1.13 23.0
亚油酸	g	0.09 1.80
α-亚麻酸	mg	15 300
碳水化合物	g	2.6 52.20
维生素		
维生素A	μg RE	23 460
维生素D	μg	0.59 12.0
维生素E	mg α-TE	0.25 5.00
维生素K ₁	μg	1.73 35.0
维生素B ₁	μg	30 600
维生素B ₂	μg	49 1000
维生素B ₆	μg	17.3 350
维生素B ₁₂	μg	0.059 1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	148 3000
叶酸	μg	3.9 80.0
泛酸	μg	123 2500
维生素C	mg	4.9 100.0
生物素	μg	0.59 12.0
胆碱	mg	6.4 130
矿物质		
钠	mg	6 120
钾	mg	23 460
铜	μg	14.8 300
镁	mg	1.7 35.0
铁	mg	0.31 6.30
锌	mg	0.15 3.00
锰	μg	2.47 50.0
钙	mg	21 425
磷	mg	12 240
碘	μg	4.9 100
氯	mg	14 280
硒	μg	0.64 13.0
可选择成分		
肌醇	mg	3.0 60.0
牛磺酸	mg	1.5 30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9 80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7 115
低聚半乳糖	mg	35 700
低聚果糖	mg	128 2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20 4.0

配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾；维生素：L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺；矿物质：碳酸钙、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息
生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号:SC12961011400840
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保质期:24个月
电话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网 址:www.yuexiaoyang.com



6 931708 015529

标签 50



冲调方法



① 冲调前请洗手；

② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；

③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40℃~50℃；

④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；

⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压平；

⑥ 盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用奶杯冲调，可用搅拌法搅匀。待奶温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。
未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

幼儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
12-24月	8	240	3
24-36月	8	240	2

每一平匙羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内存食用完。

温馨提示

·每次请只准备一次的奶量，并及时给幼儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。

全国服务热线
NATIONAL SERVICE HOTLINE

400-029-6612



扫码关注



跃小羊

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)



国食注字YP 20230155



净含量:75克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2003
蛋白质	g	0.77	15.5
脂肪	g	1.15	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.5	50.30
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K ₁	μg	1.65	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	50	1000
维生素B ₆	μg	20.0	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	155	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	140	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
铜	μg	15.5	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	12	250
碘	μg	2.2	45.0
氯	mg	14	280
可选择成分			
硒	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.50	50.0
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚半乳糖	mg	60	1200
低聚果糖	mg	150	3000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(AA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、氯化胆碱、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾；维生素：L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺；矿物质：碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号:SC12961011400840
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号:GB 10767-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保质期:24个月
电 话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网 址:www.yuexiaoyang.com



6 931708 015536

标签 51 (盖贴):



谱恩系列:

900g、800g、700g、400g、
300g、75g 所有包装通用

标签 52 (盖贴):



恩蓓护系列:

858g、800g、700g、300g、
100g、75g 所有包装通用

标签 53 (盖贴):



跃小羊系列:

900g、800g、400g、300g、
100g、75g 所有包装通用