

标签 1

注:即食状态下,每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

食用量建议表

婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(kg)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(勺)	2	3	4	5	6	7
每天食用(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种 B1-07、鼠李糖乳酪杆菌 HN001、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K₁(植物甲萘醌)、维生素 B₁(盐酸硫胺素)、维生素 B₂(核黄素)、维生素 B₆(盐酸吡哆醇)、维生素 B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

企业信息
生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10765-2021
产品属性及类别: 乳基粉状婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

全国客服热线: 4008-168-698



清洁环境
爱护自然



食用方法



1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。



2.加入温开水:参照“食用量建议表”,将烧开放凉到40°C-50°C准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。



3.加入适量奶粉:参照“食用量建议表”,加入所需奶粉数量。



4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。

贮存条件

开罐前

- ①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。
- ②请在保质期内食用完该产品。

开罐后

- ①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。
- ②建议在一个月内将本产品食用完。

爱心提示

- ①冲调奶时注意使用温开水(40°C-50°C)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
 - ②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每勺奶粉净含量约为4.5克。
 - ③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
 - ④喂养剩余奶液请丢弃,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
 - ⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
- 特别提示:
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



国食注字 YP20170618

德瑞兰帝

净含量:138克

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段) 1段

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2105
蛋白质	g	0.56	11.70
脂肪	g	1.24	26.20
亚油酸	g	0.17	3.60
α-亚麻酸	mg	16	330
碳水化合物	g	2.6	53.8
维生素			
维生素A	μg RE	19	400
维生素D	μg	0.60	12.60
维生素E	mg α-TE	0.31	6.50
维生素K ₁	μg	1.80	37.80
维生素B ₁	μg	22	460
维生素B ₂	μg	31	646
维生素B ₆	μg	14.9	314.0
维生素B ₁₂	μg	0.095	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2900
叶酸	μg	3.8	80.0
泛酸	μg	152	3200
维生素C	mg	4.0	85.0
生物素	μg	0.67	14.00
胆碱	mg	6.0	127.0
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	23	482
铜	μg	18.0	378.0
镁	mg	2.0	42.0
铁	mg	0.21	4.40
锌	mg	0.20	4.20
锰	μg	2.85	60.00
钙	mg	16	340
磷	mg	11	222
碘	μg	4.5	95.0
氯	mg	18	376
硒	μg	0.90	19.00
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	41.0
左旋肉碱	mg	0.6	13.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.3	153.0
低聚半乳糖	g	0.11	2.40
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.0
叶黄素	μg	3.8	80.0

注:即食状态下,每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

食用量建议表

婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平勺)	2	3	4	5	6	7
每天食用(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种 B1-07、鼠李糖乳酪杆菌 HN001、维生素 A(醋酸视黄醇)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K₁(植物甲萘醌)、维生素 B₁(盐酸硫胺素)、维生素 B₂(核黄素)、维生素 B₆(盐酸吡哆醇)、维生素 B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10765-2021
产品属性及类别: 乳基粉状婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

全国客服热线: 4008-168-698



食用方法



1. 洗净消毒: 用瓶刷洗奶瓶, 仔细检查颈部和螺纹处, 确定洗净后, 将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。



2. 加入温开水: 参照“食用量建议表”, 将烧开放凉到40℃-50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。



3. 加入适量奶粉: 参照“食用量建议表”, 加入所需奶粉数量。



4. 摇动均匀: 盖好奶瓶, 将奶瓶轻轻摇动, 使奶粉溶解均匀, 把奶液滴到手腕, 确定温度适宜即可喂哺。

贮存条件

开罐前	① 请常温保存, 避免长期处于高温下, 如开罐前发现封口破裂, 请勿再食用。 ② 请在保质期内食用完该产品。
开罐后	① 请将盖子盖紧, 并放置阴凉、干燥处, 切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ② 建议在一个月内在保质期内食用完。

爱心提示

① 冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调, 冲调好的奶液应及时食用。
② 冲调奶时, 请使用本产品配套专用量勺, 每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③ 喂养时应抱着宝宝, 疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④ 喂养剩余奶液请弃掉, 勿留于下次喂养, 每次喂养请重新冲调。
⑤ 切忌将奶粉长时间暴露在空气中, 应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
特别提示:
对于0-6月龄的婴儿, 最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



国食注字 YP20170618

德瑞兰帝

净含量: 300克

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄, 1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2105
蛋白质	g	0.56	11.70
脂肪	g	1.24	26.20
亚油酸	g	0.17	3.60
α-亚麻酸	mg	16	330
碳水化合物	g	2.6	53.8
维生素			
维生素A	μg RE	19	400
维生素D	μg	0.60	12.60
维生素E	mg α-TE	0.31	6.50
维生素K ₁	μg	1.80	37.80
维生素B ₁	μg	22	460
维生素B ₂	μg	31	646
维生素B ₆	μg	14.9	314.0
维生素B ₁₂	μg	0.095	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2900
叶酸	μg	3.8	80.0
泛酸	μg	152	3200
维生素C	mg	4.0	85.0
生物素	μg	0.67	14.00
胆碱	mg	6.0	127.0
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	23	482
铜	μg	18.0	378.0
镁	mg	2.0	42.0
铁	mg	0.21	4.40
锌	mg	0.20	4.20
锰	μg	2.85	60.00
钙	mg	16	340
磷	mg	11	222
碘	μg	4.5	95.0
氯	mg	18	376
硒	μg	0.90	19.00
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	41.0
左旋肉碱	mg	0.6	13.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.3	153.0
低聚半乳糖	g	0.11	2.40
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.0
叶黄素	μg	3.8	80.0

注: 即食状态下, 每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

食用量建议表

婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平勺)	2	3	4	5	6	7
每天食用(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种 B1-07、鼠李糖乳酪杆菌 HN001、维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K₁(植物甲萘醌)、维生素 B₁(盐酸硫胺素)、维生素 B₂(核黄素)、维生素 B₆(盐酸吡哆醇)、维生素 B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10765-2021
产品属性及类别: 乳基粉状婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

全国客服热线: 4008-168-698



食用方法



1. 洗净消毒: 用瓶刷洗奶瓶, 仔细检查颈部和螺纹处, 确定洗净后, 将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。



2. 加入温开水: 参照“食用量建议表”, 将烧开放凉到40℃-50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。



3. 加入适量奶粉: 参照“食用量建议表”, 加入所需奶粉数量。



4. 摇动均匀: 盖好奶瓶, 将奶瓶轻轻摇动, 使奶粉溶解均匀, 把奶液滴到手腕, 确定温度适宜即可喂哺。

贮存条件

开罐前

- ① 请常温保存, 避免长期处于高温下, 如开罐前发现封口破裂, 请勿再食用。
- ② 请在保质期内食用完该产品。

开罐后

- ① 请将盖子盖紧, 并放置阴凉、干燥处, 切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。
- ② 建议在一个月内将本产品食用完。

爱心提示

- ① 冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调, 冲调好的奶液应及时食用。
 - ② 冲调奶时, 请使用本产品配套专用量勺, 每平勺奶粉净含量约为4.5克。
 - ③ 喂养时应抱着宝宝, 疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
 - ④ 喂养剩余奶液请弃掉, 勿留于下次喂养, 每次喂养请重新冲调。
 - ⑤ 切忌将奶粉长时间暴露在空气中, 应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
- 特别提示:
对于0-6月龄的婴儿, 最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



国食注字 YP20170618

德瑞兰帝

净含量: 400克

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段) 1段

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2105
蛋白质	g	0.56	11.70
脂肪	g	1.24	26.20
亚油酸	g	0.17	3.60
α-亚麻酸	mg	16	330
碳水化合物	g	2.6	53.8
维生素			
维生素A	μg RE	19	400
维生素D	μg	0.60	12.60
维生素E	mg α-TE	0.31	6.50
维生素K ₁	μg	1.80	37.80
维生素B ₁	μg	22	460
维生素B ₂	μg	31	646
维生素B ₆	μg	14.9	314.0
维生素B ₁₂	μg	0.095	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2900
叶酸	μg	3.8	80.0
泛酸	μg	152	3200
维生素C	mg	4.0	85.0
生物素	μg	0.67	14.00
胆碱	mg	6.0	127.0
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	23	482
铜	μg	18.0	378.0
镁	mg	2.0	42.0
铁	mg	0.21	4.40
锌	mg	0.20	4.20
锰	μg	2.85	60.00
钙	mg	16	340
磷	mg	11	222
碘	μg	4.5	95.0
氯	mg	18	376
硒	μg	0.90	19.00
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	41.0
左旋肉碱	mg	0.6	13.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.3	153.0
低聚半乳糖	g	0.11	2.40
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.0
叶黄素	μg	3.8	80.0

注: 即食状态下, 每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

食用量建议表

婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平均)	2	3	4	5	6	7
每天食用(次)	7-8	7	5-6	5-6	4-5	4-5

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、鼠李糖乳酪杆菌HN001、维生素[维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10765-2021
产品属性及类别: 乳基粉状婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

全国客服热线:4008-168-698

清洁环境
爱护自然

6 920486 000339

食用方法

1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶瓶放在沸水中煮5分钟彻底消毒。

2.加入温开水:参照“食用量建议表”,将烧开放凉到40℃-50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

3.加入适量奶粉:参照“食用量建议表”,加入所需奶粉数量。

4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。

贮存条件

开罐前

① 请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。

② 请在保质期内食用完该产品。

开罐后

① 请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。

② 建议在一个月内将本产品食用完。

爱心提示

① 冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。

② 冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每勺奶粉净含量约为4.5克。

③ 喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④ 喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。

⑤ 切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示:
对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

美羚
MEILING

德瑞兰帝

净含量:800克

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

1段

国食注字 YP20170618

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2105
蛋白质	g	0.56	11.70
脂肪	g	1.24	26.20
亚油酸	g	0.17	3.60
α-亚麻酸	mg	16	330
碳水化合物	g	2.6	53.8
维生素			
维生素A	μg RE	19	400
维生素D	μg	0.60	12.60
维生素E	mg α-TE	0.31	6.50
维生素K ₁	μg	1.80	37.80
维生素B ₁	μg	22	460
维生素B ₂	μg	31	646
维生素B ₆	μg	14.9	314.0
维生素B ₁₂	μg	0.095	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2900
叶酸	μg	3.8	80.0
泛酸	μg	152	3200
维生素C	mg	4.0	85.0
生物素	μg	0.67	14.00
胆碱	mg	6.0	127.0
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	23	482
铜	μg	18.0	378.0
镁	mg	2.0	42.0
铁	mg	0.21	4.40
锌	mg	0.20	4.20
锰	μg	2.85	60.00
钙	mg	16	340
磷	mg	11	222
碘	μg	4.5	95.0
氯	mg	18	376
硒	μg	0.90	19.00
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	41.0
左旋肉碱	mg	0.6	13.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.3	153.0
低聚半乳糖	g	0.11	2.40
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.0
叶黄素	μg	3.8	80.0

注:即食状态下,每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

食用量建议表

婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平均)	2	3	4	5	6	7
每天食用(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、鼠李糖乳酪杆菌HN001、维生素[维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10765-2021
产品属性及类别: 乳基粉状婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

全国客服热线:4008-168-698

1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶瓶放在沸水中煮5分钟彻底消毒。

2.加入温开水:参照“食用量建议表”,将烧开放凉到40℃-50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

3.加入适量奶粉:参照“食用量建议表”,加入所需奶粉数量。

4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。

1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶瓶放在沸水中煮5分钟彻底消毒。

2.加入温开水:参照“食用量建议表”,将烧开放凉到40℃-50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

3.加入适量奶粉:参照“食用量建议表”,加入所需奶粉数量。

4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。

美羚 MEILING

德瑞兰帝

净含量:850克

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)

1段

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2105
蛋白质	g	0.56	11.70
脂肪	g	1.24	26.20
亚油酸	g	0.17	3.60
α-亚麻酸	mg	16	330
碳水化合物	g	2.6	53.8
维生素			
维生素A	μg RE	19	400
维生素D	μg	0.60	12.60
维生素E	mg α-TE	0.31	6.50
维生素K ₁	μg	1.80	37.80
维生素B ₁	μg	22	460
维生素B ₂	μg	31	646
维生素B ₆	μg	14.9	314.0
维生素B ₁₂	μg	0.095	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2900
叶酸	μg	3.8	80.0
泛酸	μg	152	3200
维生素C	mg	4.0	85.0
生物素	μg	0.67	14.00
胆碱	mg	6.0	127.0
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	23	482
铜	μg	18.0	378.0
镁	mg	2.0	42.0
铁	mg	0.21	4.40
锌	mg	0.20	4.20
锰	μg	2.85	60.00
钙	mg	16	340
磷	mg	11	222
碘	μg	4.5	95.0
氯	mg	18	376
硒	μg	0.90	19.00
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	41.0
左旋肉碱	mg	0.6	13.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.3	153.0
低聚半乳糖	g	0.11	2.40
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.0
叶黄素	μg	3.8	80.0

注:即食状态下,每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

食用量建议表		
较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平勺)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天食用(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种 Bi-07、鼠李糖乳酪杆菌 HN001、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K ₁ (植物甲萘醌)、维生素 B ₁ (盐酸硫胺素)、维生素 B ₂ (核黄素)、维生素 B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素 B ₁₂ (氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。	

企业信息
生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10766-2021
产品属性及类别: 乳基粉状较大婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月
全国客服热线: 4008-168-698



食用方法	
	1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶瓶放在沸水中煮5分钟彻底消毒。
	2.加入温开水:参照“食用量建议表”,将袋开放凉到40℃-50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。
	3.加入适量奶粉:参照“食用量建议表”,加入所需奶粉数量。
	4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。

贮存条件	
开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期内食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月将本产品食用完。

爱心提示	
①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。 ②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。 ③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。 ④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。 ⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。	
特别提示: 须配合添加辅助食品。	



德瑞兰帝

国食注字 YP20170619

净含量:100克
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段) 2段

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2053
蛋白质	g	0.63	13.00
脂肪	g	1.18	24.30
亚油酸	g	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	15	314
碳水化合物	g	2.6	53.3
维生素			
维生素A	μg RE	23	462
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.26	5.34
维生素K ₁	μg	1.70	35.00
维生素B ₁	μg	22	451
维生素B ₂	μg	28	575
维生素B ₆	μg	16.1	330.0
维生素B ₁₂	μg	0.113	2.320
烟酸(烟酰胺)	μg	146	3000
叶酸	μg	3.1	64.0
泛酸	μg	120	2464
维生素C	mg	3.2	65.7
生物素	μg	0.69	14.20
胆碱	mg	6.0	123.0
矿物质			
钠	mg	5	110
钾	mg	24	490
铜	μg	11.0	226.0
镁	mg	2.0	410
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.19	3.90
锰	μg	2.63	54.00
钙	mg	21	441
磷	mg	13	268
碘	μg	4.6	94.0
氯	mg	15	300
硒	μg	0.70	14.40
可选择成分			
肌醇	mg	17	34.9
左旋肉碱	mg	0.6	12.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.7	137.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.7
叶黄素	μg	8.8	180.0

注:即食状态下,每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。

食用量建议表		
较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平勺)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天食用(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种 B1-07、鼠李糖乳酪杆菌 HN001、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K ₁ (植物甲萘醌)、维生素 B ₁ (盐酸硫胺素)、维生素 B ₂ (核黄素)、维生素 B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素 B ₁₂ (氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。	

企业信息
生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10766-2021
产品属性及类别: 乳基粉状较大婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月
全国客服热线: 4008-168-698



食用方法	
	1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。
	2.加入温开水:参照“食用量建议表”,将烧开放凉到40℃-50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。
	3.加入适量奶粉:参照“食用量建议表”,加入所需奶粉数量。
	4.摇匀均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。

贮存条件	
开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期内食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月将本产品食用完。

爱心提示	
①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。 ②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。 ③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。 ④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。 ⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。	
特别提示: 须配合添加辅食。	



德瑞兰帝

国食字 YP20170619

净含量:138克
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段) **2段**

营养成分表			
项目	单位	每100kj	每100g
能量	kJ	100	2053
蛋白质	g	0.63	13.00
脂肪	g	1.18	24.30
亚油酸	g	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	15	314
碳水化合物	g	2.6	53.3
维生素			
维生素A	μg RE	23	462
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.26	5.34
维生素K ₁	μg	1.70	35.00
维生素B ₁	μg	22	451
维生素B ₂	μg	28	575
维生素B ₆	μg	16.1	330.0
维生素B ₁₂	μg	0.113	2.320
烟酸(烟酰胺)	μg	146	3000
叶酸	μg	3.1	64.0
泛酸	μg	120	2464
维生素C	mg	3.2	65.7
生物素	μg	0.69	14.20
胆碱	mg	6.0	123.0
矿物质			
钠	mg	5	110
钾	mg	24	490
铜	μg	11.0	226.0
镁	mg	2.0	410
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.19	3.90
锰	μg	2.63	54.00
钙	mg	21	441
磷	mg	13	268
碘	μg	4.6	94.0
氯	mg	15	300
硒	μg	0.70	14.40
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	34.9
左旋肉碱	mg	0.6	12.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.7	137.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.7
叶黄素	μg	8.8	180.0

注:即食状态下,每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。

较大婴儿月龄

6-8个月

8-12个月

奶粉量(平勺)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天食用(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、鼠李糖乳酪杆菌HN001、维生素[维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₃(盐酸吡哆醇)、维生素B₆(吡哆醇)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

食用方法

1. 洗净消毒: 用瓶刷洗奶瓶, 仔细检查颈部和螺纹处, 确定洗净后, 将奶瓶放在沸水中煮5分钟彻底消毒。

2. 加入温开水: 参照“食用量建议表”, 将烧开放凉到40°C-50°C准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

3. 加入适量奶粉: 参照“食用量建议表”, 加入所需奶粉数量。

4. 摇动均匀: 盖好奶瓶, 将奶瓶轻轻摇动, 使奶粉溶解均匀, 把奶液滴到手腕, 确定温度适宜时即可喂哺。

贮存条件

开罐前

① 请常温保存, 避免长期处于高温下, 如开罐前发现封口破损, 请勿再食用。
② 请在保质期内食用完该产品。

开罐后

① 请将盖子盖紧, 并放置阴凉、干燥处, 切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。
② 建议在一个月将本产品食用完。

爱心提示

① 冲调奶时注意使用温开水(40°C-50°C)并按照食用量建议表进行冲调, 冲调好的奶液应及时食用。

② 冲调奶时, 请使用本产品配套专用量勺, 每平勺奶粉净含量约为4.5克。

③ 喂养时应抱着宝宝, 疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④ 喂养剩余奶液请弃掉, 勿留于下次喂养, 每次喂养请重新冲调。

⑤ 切忌将奶粉长时间暴露在空气中, 应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示:

须配合添加辅助食品。

美羚®
MEILING

德瑞兰帝

净含量: 300克

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)

2段

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2053
蛋白质	g	0.63	13.00
脂肪	g	1.18	24.30
亚油酸	g	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	15	314
碳水化合物	g	2.6	53.3
维生素			
维生素A	μg RE	23	462
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.26	5.34
维生素K ₁	μg	1.70	35.00
维生素B ₁	μg	22	451
维生素B ₂	μg	28	575
维生素B ₆	μg	16.1	330.0
维生素B ₁₂	μg	0.113	2.320
烟酸(烟酰胺)	μg	146	3000
叶酸	μg	3.1	64.0
泛酸	μg	120	2464
维生素C	mg	3.2	65.7
生物素	μg	0.69	14.20
胆碱	mg	6.0	123.0
矿物质			
钠	mg	5	110
钾	mg	24	490
铜	μg	11.0	226.0
镁	mg	2.0	41.0
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.19	3.90
锰	μg	2.63	54.00
钙	mg	21	441
磷	mg	13	268
碘	μg	4.6	94.0
氯	mg	15	300
硒	μg	0.70	14.40
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	34.9
左旋肉碱	mg	0.6	12.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.7	137.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.7
叶黄素	μg	8.8	180.0

注: 即食状态下, 每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。

食用量建议表

较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平均)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天食用(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种B1-07、鼠李糖乳酪杆菌HN001、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

食用方法

1. 洗净消毒: 用瓶刷洗奶瓶, 仔细检查颈部和螺纹处, 确定洗净后, 将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。

2. 加入温开水: 参照“食用量建议表”, 将烧开放凉到40℃-50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

3. 加入适量奶粉: 参照“食用量建议表”, 加入所需奶粉数量。

4. 摇动均匀: 盖好奶瓶, 将奶瓶轻轻摇动, 使奶粉溶解均匀, 把奶液滴到手腕, 确定温度适宜时即可喂哺。

贮存条件

开罐前

① 请常温保存, 避免长期处于高温下, 如开罐前发现封口破损, 请勿再食用。

② 请在保质期内食用完该产品。

开罐后

① 请将盖子盖紧, 并放置阴凉干燥处, 切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。

② 建议在一个月内将本产品食用完。

爱心提示

① 冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调, 冲调好的奶液应及时食用。

② 冲调奶时, 请使用本产品配套专用量勺, 每平勺奶粉净含量约为4.5克。

③ 喂养时应抱着宝宝, 疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④ 喂养剩余奶液请弃掉, 勿留于下次喂养, 每次喂养请重新冲调。

⑤ 切忌将奶粉长时间暴露于空气中, 应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示:

须配合添加辅助食品。

美羚

MEILING

德瑞兰帝

净含量: 400克

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄, 2段)

2段

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2053
蛋白质	g	0.63	13.00
脂肪	g	1.18	24.30
亚油酸	g	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	15	314
碳水化合物	g	2.6	53.3
维生素			
维生素A	μg RE	23	462
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.26	5.34
维生素K ₁	μg	1.70	35.00
维生素B ₁	μg	22	451
维生素B ₂	μg	28	575
维生素B ₆	μg	16.1	330.0
维生素B ₁₂	μg	0.113	2.320
烟酸(烟酰胺)	μg	146	3000
叶酸	μg	3.1	64.0
泛酸	μg	120	2464
维生素C	mg	3.2	65.7
生物素	μg	0.69	14.20
胆碱	mg	6.0	123.0
矿物质			
钠	mg	5	110
钾	mg	24	490
铜	μg	11.0	226.0
镁	mg	2.0	41.0
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.19	3.90
锰	μg	2.63	54.00
钙	mg	21	441
磷	mg	13	268
碘	μg	4.6	94.0
氯	mg	15	300
硒	μg	0.70	14.40
可选择成分			
肌醇	mg	17	34.9
左旋肉碱	mg	0.6	12.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.7	137.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.7
叶黄素	μg	8.8	180.0

注: 即食状态下, 每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。

食用量建议表

较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平均)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天食用(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种BI-07、鼠李糖乳酪杆菌HN001、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10766-2021
产品属性及类别: 乳基粉状较大婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

全国客服热线:4008-168-698

清洁环境
爱护自然

6 920486 000346

食用方法

1. 洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶瓶放在沸水中煮5分钟彻底消毒。

2. 加入温开水:参照“食用量建议表”,将烧开放凉到40℃-50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

3. 加入适量奶粉:参照“食用量建议表”,加入所需奶粉数量。

4. 摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。

贮存条件

开罐前

① 请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。

② 请在保质期内食用完该产品。

开罐后

① 请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。

② 建议在一个月内将本产品食用完。

爱心提示

① 冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。

② 冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。

③ 喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④ 喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。

⑤ 切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示:

须配合添加辅助食品。

美羚
MEILING

德瑞兰帝

净含量:800克

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)

2段

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2053
蛋白质	g	0.63	13.00
脂肪	g	1.18	24.30
亚油酸	g	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	15	314
碳水化合物	g	2.6	53.3
维生素			
维生素A	μg RE	23	462
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.26	5.34
维生素K ₁	μg	1.70	35.00
维生素B ₁	μg	22	451
维生素B ₂	μg	28	575
维生素B ₆	μg	16.1	330.0
维生素B ₁₂	μg	0.113	2.320
烟酸(烟酰胺)	μg	146	3000
叶酸	μg	3.1	64.0
泛酸	μg	120	2464
维生素C	mg	3.2	65.7
生物素	μg	0.69	14.20
胆碱	mg	6.0	123.0
矿物质			
钠	mg	5	110
钾	mg	24	490
铜	μg	11.0	226.0
镁	mg	2.0	41.0
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.19	3.90
锰	μg	2.63	54.00
钙	mg	21	441
磷	mg	13	268
碘	μg	4.6	94.0
氯	mg	15	300
硒	μg	0.70	14.40
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	34.9
左旋肉碱	mg	0.6	12.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.7	137.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.7
叶黄素	μg	8.8	180.0

注:即食状态下,每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。

食用量建议表

较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平均)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天食用(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种BI-07、鼠李糖乳酪杆菌HN001、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10766-2021
产品属性及类别: 乳基粉状较大婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

食用方法

1. 洗净消毒: 用瓶刷洗奶瓶, 仔细检查颈部和螺纹处, 确定洗净后, 将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。

2. 加入温开水: 参照“食用量建议表”, 将烧开放凉到40℃-50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

3. 加入适量奶粉: 参照“食用量建议表”, 加入所需奶粉数量。

4. 摇动均匀: 盖好奶瓶, 将奶瓶轻轻摇动, 使奶粉溶解均匀, 把奶液滴到手腕, 确定温度适宜时即可喂哺。

贮存条件

开罐前

① 请常温保存, 避免长期处于高温下, 如开罐前发现封口破损, 请勿再食用。

② 请在保质期内食用完该产品。

开罐后

① 请将盖子盖紧, 并放置阴凉、干燥处, 切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。

② 建议在一个月内将本产品食用完。

爱心提示

① 冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调, 冲调好的奶液应及时食用。

② 冲调奶时, 请使用本产品配套专用量勺, 每平均奶粉净含量约为4.5克。

③ 喂养时应抱着宝宝, 疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④ 喂养剩余奶液请弃掉, 勿留于下次喂养, 每次喂养请重新冲调。

⑤ 切忌将奶粉长时间暴露在空气中, 应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示:

须配合添加辅助食品。

美羚®
MEILING

德瑞兰帝

净含量: 850克

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)

2段

国食注字 YP20170619

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2053
蛋白质	g	0.63	13.00
脂肪	g	1.18	24.30
亚油酸	g	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	15	314
碳水化合物	g	2.6	53.3
维生素			
维生素A	μg RE	23	462
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.26	5.34
维生素K	μg	1.70	35.00
维生素B ₁	μg	22	451
维生素B ₂	μg	28	575
维生素B ₆	μg	16.1	330.0
维生素B ₁₂	μg	0.113	2.320
烟酸(烟酰胺)	μg	146	3000
叶酸	μg	3.1	64.0
泛酸	μg	120	2464
维生素C	mg	3.2	65.7
生物素	μg	0.69	14.20
胆碱	mg	6.0	123.0
矿物质			
钠	mg	5	110
钾	mg	24	490
铜	μg	11.0	226.0
镁	mg	2.0	41.0
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.19	3.90
锰	μg	2.63	54.00
钙	μg	21	441
磷	mg	13	268
碘	μg	4.6	94.0
氟	mg	15	300
硒	μg	0.70	14.40
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	34.9
左旋肉碱	mg	0.6	12.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.7	137.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.7
叶黄素	μg	8.8	180.0

注: 即食状态下, 每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。

食用量建议表

幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平均)	8
温开水量(毫升)	240
每天食用(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、鼠李糖乳酪杆菌HN001、维生素A(维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10767-2021
产品属性及类别: 乳基粉状幼儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

全国客服热线: 4008-168-698

清洁环境
爱护自然

6 920486 001947

食用方法

1. 洗净消毒: 用瓶刷洗奶瓶, 仔细检查颈部和螺纹处, 确定洗净后, 将奶瓶放在沸水中煮5分钟彻底消毒。

2. 加入温开水: 参照“食用量建议表”, 将烧开放凉到40°C-50°C准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

3. 加入适量奶粉: 参照“食用量建议表”, 加入所需奶粉数量。

4. 摇动均匀: 盖好奶瓶, 将奶瓶轻轻摇动, 使奶粉溶解均匀, 把奶液滴到手腕, 确定温度适宜即可喂哺。

贮存条件

开罐前

①请常温保存, 避免长期处于高温下, 如开罐前发现封口破损, 请勿再食用。

②请在保质期内食用完该产品。

开罐后

①请将盖子盖紧, 并放置阴凉、干燥处, 切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。

②建议在一个月将本产品食用完。

爱心提示

①冲调奶时注意使用温开水(40°C-50°C)并参照食用量建议表进行冲调, 冲调好的奶液应及时食用。

②冲调奶时, 请使用本产品配套专用量勺, 每平勺奶粉净含量约为4.5克。

③喂养时应抱着宝宝, 疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④喂养剩余奶液请弃掉, 勿留于下次喂养, 每次喂养请重新冲调。

⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中, 应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

美羚®
MEILING

德瑞兰帝

净含量: 100克

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段) 3段

国食注字 YP20170620

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2022
蛋白质	g	0.73	14.80
脂肪	g	1.15	23.30
亚油酸	g	0.16	3.20
α-亚麻酸	mg	15	304
碳水化合物	g	2.6	51.8
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.62	12.60
维生素E	mg α-TE	0.30	6.00
维生素K ₁	μg	198	40.00
维生素B ₁	μg	23	462
维生素B ₂	μg	25	505
维生素B ₆	μg	16.2	328.0
维生素B ₁₂	μg	0.109	2.200
烟酸(烟酰胺)	μg	153	3100
叶酸	μg	3.1	63.0
泛酸	μg	128	2588
维生素C	mg	3.2	64.0
生物素	μg	0.69	14.00
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	29	577
铜	μg	13.9	2810
镁	mg	2.2	44.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	24	494
磷	mg	15	300
碘	μg	5.0	101.0
氯	mg	15	303
可选择成分			
硒	μg	0.73	14.80
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	2.70	54.50
肌醇	mg	2.0	40.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	84.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.9	139.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.9
叶黄素	μg	8.9	180.0

注: 即食状态下, 每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

食用量建议表

幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平勺)	8
温开水量(毫升)	240
每天食用(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、鼠李糖乳酪杆菌HN001、维生素A(维生素A)、维生素E(生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10767-2021
产品属性及类别: 乳基粉状幼儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

全国客服热线: 4008-168-698

清洁环境
爱护自然

6 920486 002333

食用方法

1. 洗净消毒: 用瓶刷洗奶瓶, 仔细检查颈部和螺纹处, 确定洗净后, 将奶瓶放在沸水中煮5分钟彻底消毒。

2. 加入温开水: 参照“食用量建议表”, 将烧开放凉到40°C-50°C准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

3. 加入适量奶粉: 参照“食用量建议表”, 加入所需奶粉数量。

4. 搅动均匀: 盖好奶瓶, 将奶瓶轻轻摇动, 使奶粉溶解均匀, 把奶液滴到手腕, 确定温度适宜时即可喂哺。

贮存条件

开罐前

① 请常温保存, 避免长期处于高温下, 如开罐前发现封口破损, 请勿再食用。

② 请在保质期内食用完该产品。

开罐后

① 请将盖子盖紧, 并放置阴凉、干燥处, 切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。

② 建议在一个月内将本产品食用完。

爱心提示

① 冲调奶时注意使用温开水(40°C-50°C)并按照食用量建议表进行冲调, 冲调好的奶液应及时食用。

② 冲调奶时, 请使用本产品配套专用量勺, 每平勺奶粉净含量约为4.5克。

③ 喂养时应抱着宝宝, 疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④ 喂养剩余奶液请弃掉, 勿留于下次喂养, 每次喂养请重新冲调。

⑤ 切忌将奶粉长时间暴露露在空气中, 应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

美羚®
MEILING

德瑞兰帝

净含量: 138克

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段) 3段

国食注字 YP20170620

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2022
蛋白质	g	0.73	14.80
脂肪	g	1.15	23.30
亚油酸	g	0.16	3.20
α-亚麻酸	mg	15	304
碳水化合物	g	2.6	51.8
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.62	12.60
维生素E	mg α-TE	0.30	6.00
维生素K ₁	μg	1.98	40.00
维生素B ₁	μg	23	462
维生素B ₂	μg	25	505
维生素B ₆	μg	16.2	328.0
维生素B ₁₂	μg	0.109	2.200
烟酸(烟酰胺)	μg	153	3100
叶酸	μg	3.1	63.0
泛酸	μg	128	2588
维生素C	mg	3.2	64.0
生物素	μg	0.69	14.00
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	29	577
铜	μg	13.9	2810
镁	mg	2.2	44.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	24	494
磷	mg	15	300
碘	μg	5.0	101.0
氯	mg	15	303
可选择成分			
硒	μg	0.73	14.80
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	2.70	54.50
肌醇	mg	2.0	40.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	84.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.9	139.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.9
叶黄素	μg	8.9	180.0

注: 即食状态下, 每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

食用量建议表

幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平勺)	8
温开水量(毫升)	240
每天食用(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种 BI-07、鼠李糖乳酪杆菌 HN001、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10767-2021
产品属性及类别: 乳基粉状幼儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月
全国客服热线: 4008-168-698

净油环境
爱护自然

6 920486 001978

食用方法

1. 洗净消毒: 用瓶刷洗奶瓶, 仔细检查颈部和螺纹处, 确定洗净后, 将奶瓶放在沸水中煮5分钟彻底消毒。

2. 加入温开水: 参照“食用量建议表”, 将烧开放凉到40℃-50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

3. 加入适量奶粉: 参照“食用量建议表”, 加入所需奶粉数量。

4. 摇动均匀: 盖好奶瓶, 将奶瓶轻轻摇动, 使奶粉溶解均匀, 把奶液滴到手上, 确定温度适宜时即可喂哺。

贮存条件

开罐前

① 请常温保存, 避免长期处于高温下, 如开罐前发现封口破损, 请勿再食用。
② 请在保质期内食用完该产品。

开罐后

① 请将盖子盖紧, 并放置阴凉、干燥处, 切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。
② 建议在一个月内将本产品食用完。

爱心提示

① 冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调, 冲调好的奶液应及时食用。
② 冲调奶时, 请使用本产品配套专用量勺, 每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③ 喂养时应抱着宝宝, 疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④ 喂养剩余奶液请弃掉, 勿留于下次喂养, 每次喂养请重新冲调。
⑤ 切忌将奶粉长时间暴露在空气中, 应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

美羚
MEILING

德瑞兰帝

净含量: 300克

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段) 3段

国食注字 YP20170620

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2022
蛋白质	g	0.73	14.80
脂肪	g	1.15	23.30
亚油酸	g	0.16	3.20
α-亚麻酸	mg	15	304
碳水化合物	g	2.6	51.8
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.62	12.60
维生素E	mg α-TE	0.30	6.00
维生素K ₁	μg	1.98	40.00
维生素B ₁	μg	23	462
维生素B ₂	μg	25	505
维生素B ₆	μg	16.2	328.0
维生素B ₁₂	μg	0.109	2.200
烟酸(烟酰胺)	μg	153	3100
叶酸	μg	3.1	63.0
泛酸	μg	128	2588
维生素C	mg	3.2	64.0
生物素	μg	0.69	14.00
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	29	577
铜	μg	13.9	2810
镁	mg	2.2	44.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	24	494
磷	mg	15	300
碘	μg	5.0	101.0
氯	mg	15	303
可选择成分			
硒	μg	0.73	14.80
胆碱	mg	6.0	1210
锰	μg	2.70	54.50
肌醇	mg	2.0	40.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	84.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.9	139.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.9
叶黄素	μg	8.9	180.0

注: 即食状态下, 每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

食用量建议表

幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平勺)	8
温开水量(毫升)	240
每天食用(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种 B1-07、鼠李糖乳酪杆菌 HN001、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10767-2021
产品属性及类别: 乳基粉状幼儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月
全国客服热线: 4008-168-698

食用方法

1

5min

1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。

2

40℃-50℃

2.加入温开水:参照“食用量建议表”,将袋开放凉到40℃-50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

3

羊奶粉

3.加入适量奶粉:参照“食用量建议表”,加入所需奶粉数量。

4

羊奶粉

4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。

贮存条件

开罐前

①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。
②请在保质期内食用完该产品。

开罐后

①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。
②建议在一个月内将本产品食用完。

爱心提示

①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿用于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

美羚
MEILING

德瑞兰帝

净含量:400克

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)3段

国食注字 YP20170620

羊奶粉

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2022
蛋白质	g	0.73	14.80
脂肪	g	1.15	23.30
亚油酸	g	0.16	3.20
α-亚麻酸	mg	15	304
碳水化合物	g	2.6	51.8
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.62	12.60
维生素E	mg α-TE	0.30	6.00
维生素K ₁	μg	1.98	40.00
维生素B ₁	μg	23	462
维生素B ₂	μg	25	505
维生素B ₆	μg	16.2	328.0
维生素B ₁₂	μg	0.109	2.200
烟酸(烟酰胺)	μg	153	3100
叶酸	μg	3.1	63.0
泛酸	μg	128	2588
维生素C	mg	3.2	64.0
生物素	μg	0.69	14.00
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	29	577
铜	μg	13.9	281.0
镁	mg	2.2	44.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	24	494
磷	mg	15	300
碘	μg	5.0	101.0
氯	mg	15	303
可选择成分			
硒	μg	0.73	14.80
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	2.70	54.50
肌醇	mg	2.0	40.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	84.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.9	139.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.9
叶黄素	μg	8.9	180.0

注:即食状态下,每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

食用量建议表

幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平均)	8
温开水量(毫升)	240
每天食用(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、鼠李糖乳酪杆菌HN001、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10767-2021
产品属性及类别: 乳基粉状幼儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

全国客服热线:4008-168-698

清洁环境
爱护自然

6 920486 000353

食用方法

1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶瓶放在沸水中煮5分钟彻底消毒。

2.加入温开水:参照“食用量建议表”,将烧开放凉到40℃-50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

3.加入适量奶粉:参照“食用量建议表”,加入所需奶粉数量。

4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。

贮存条件

开罐前

① 请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。

② 请在保质期内食用完该产品。

开罐后

① 请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。

② 建议在一个月内将本产品食用完。

爱心提示

① 冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。

② 冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每勺奶粉净含量约为4.5克。

③ 喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④ 喂养剩余奶液请丢弃,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。

⑤ 切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

美羚
MEILING

德瑞兰帝

净含量:800克

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)

国食注字 YP20170620

3段

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2022
蛋白质	g	0.73	14.80
脂肪	g	1.15	23.30
亚油酸	g	0.16	3.20
α-亚麻酸	mg	15	304
碳水化合物	g	2.6	51.8
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.62	12.60
维生素E	mg α-TE	0.30	6.00
维生素K ₁	μg	1.98	40.00
维生素B ₁	μg	23	462
维生素B ₂	μg	25	505
维生素B ₆	μg	16.2	328.0
维生素B ₁₂	μg	0.109	2.200
烟酸(烟酰胺)	μg	153	3100
叶酸	μg	3.1	63.0
泛酸	μg	128	2588
维生素C	mg	3.2	64.0
生物素	μg	0.69	14.00
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	29	577
铜	μg	13.9	281.0
镁	mg	2.2	44.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	24	494
磷	mg	15	300
碘	μg	5.0	101.0
氯	mg	15	303
可选择成分			
硒	μg	0.73	14.80
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	2.70	54.50
肌醇	mg	2.0	40.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	84.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.9	139.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.9
叶黄素	μg	8.9	180.0

注:即食状态下,每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

食用量建议表

幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平均)	8
温开水量(毫升)	240
每天食用(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、鼠李糖乳酪杆菌HN001、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10767-2021
产品属性及类别: 乳基粉状幼儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

食用方法

1

5min

2

40℃-50℃

3

羊奶粉

4

1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶瓶放在沸水中煮5分钟彻底消毒。

2.加入温开水:参照“食用量建议表”,将烧开放凉到40℃-50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

3.加入适量奶粉:参照“食用量建议表”,加入所需奶粉数量。

4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。

贮存条件

开罐前

① 请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。

② 请在保质期内食用完该产品。

开罐后

① 请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。

② 建议在一个月内将本产品食用完。

爱心提示

① 冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。

② 冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每勺奶粉净含量约为4.5克。

③ 喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④ 喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。

⑤ 切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

美羚

MEILING

德瑞兰帝

净含量:850克

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄, 3段)

3段

国食注字 YP20170620

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2022
蛋白质	g	0.73	14.80
脂肪	g	1.15	23.30
亚油酸	g	0.16	3.20
α-亚麻酸	mg	15	304
碳水化合物	g	2.6	51.8
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.62	12.60
维生素E	mg α-TE	0.30	6.00
维生素K ₁	μg	1.98	40.00
维生素B ₁	μg	23	462
维生素B ₂	μg	25	505
维生素B ₆	μg	16.2	328.0
维生素B ₁₂	μg	0.109	2.200
烟酸(烟酰胺)	μg	153	3100
叶酸	μg	3.1	63.0
泛酸	μg	128	2588
维生素C	mg	3.2	64.0
生物素	μg	0.69	14.00
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	29	577
铜	μg	13.9	281.0
镁	mg	2.2	44.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	24	494
磷	mg	15	300
碘	μg	5.0	101.0
氯	mg	15	303
可选择成分			
硒	μg	0.73	14.80
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	2.70	54.50
肌醇	mg	2.0	40.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	84.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.9	139.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.9
叶黄素	μg	8.9	180.0

注:即食状态下,每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

1



冲调奶粉前应用肥皂或清水将手彻底洗干净。

2



将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮沸5分钟。

3



将水煮沸5分钟,冷却至40°C-50°C左右,预备使用。

4



参照“食用量建议表”,将准确份量的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。

5



盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。

6



滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表						
婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平勺)	2	3	4	5	6	7
每天食用(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5
每天辅食(次)	-	-	-	-	-	1-2

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生乳乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素(维生素 A(醋酸视黄醇)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K(植物甲萘醌)、维生素 B(盐酸硫胺素)、维生素 B₂(核黄素)、维生素 B₆(盐酸吡哆醇)、维生素 B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱))、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

爱心提示及特别提示

爱心提示:

①冲调奶时注意使用温开水(40°C-50°C)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。

②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。

③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④喂养时若奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。

⑤切忌将奶液长时间暴露于空气中,应随手盖紧奶瓶或密封奶粉袋。

特别提示:

对于 0-6 月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

开罐前

①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。

②请在保质期内食用完该产品。

开罐后

①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。

②建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司

地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路 52 号

电话: 0913-8214088

网址: WWW.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859

产品标准代号: GB 10765-2021

产品属性及类别: 乳基粉状婴儿配方食品

产地: 陕西 渭南 富平

生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区

保质期: 24个月

全国客服热线:4008-168-698



6 920486 048195



国食注字 YP20230402

羚恩贝贝

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)



1 段

净含量:100克

营养成分表				
项目	单位	每100kJ	每100g	
能量	kJ	100	2077	
蛋白质	g	0.55	11.40	
脂肪	g	1.20	24.90	
亚油酸	g	0.22	4.50	
α-亚麻酸	mg	21	437	
碳水化合物	g	2.7	55.2	
维生素				
维生素A	μg RE	18	376	
维生素D	μg	0.63	13.00	
维生素E	mg α-TE	0.33	6.80	
维生素K ₁	μg	161	33.40	
维生素B ₁	μg	22	463	
维生素B ₂	μg	32	658	
维生素B ₆	μg	16.6	345.0	
维生素B ₁₂	μg	0.096	2.000	
烟酸(烟酰胺)	μg	140	2900	
叶酸	μg	3.9	80.0	
泛酸	μg	149	3100	
维生素C	mg	3.5	73.0	
生物素	μg	0.67	14.00	
胆碱	mg	6.1	127.0	
矿物质				
钠	mg	9	182	
钾	mg	23	469	
铜	μg	17.9	372.0	
镁	mg	19	40.0	
铁	mg	0.19	4.00	
锌	mg	0.22	4.50	
锰	μg	2.21	45.80	
钙	mg	16	330	
磷	mg	10	214	
碘	μg	4.5	94.0	
氯	mg	17	360	
硒	μg	0.91	19.00	
可选择成分				
肌醇	mg	2.0	410	
左旋肉碱	mg	0.7	15.0	
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.0	
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	145.0	
低聚半乳糖	g	0.12	2.50	
低聚果糖	g	0.02	0.40	
核苷酸	mg	0.96	20.00	

注:即食状态下,每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

1 冲调奶粉前使用肥皂或清水将手彻底洗干净。

2 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮5分钟。

3 饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右,预备使用。

4 参照“食用量建议表”,将准确份量的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。

5 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。

6 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平勺)	2	3	4	5	6	7
每天食用(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5
每天辅食(次)	-	-	-	-	-	1-2

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核黄素(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷二核苷酸、5'-鸟苷二核苷酸、5'-尿苷二核苷酸、5'-肌苷二核苷酸)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素(维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺(烟酸)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱))、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

爱心提示及特别提示

爱心提示:

① 冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。

② 冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。

③ 喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④ 喂养剩余奶液请丢弃,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。

⑤ 切忌将奶粉长时间暴露于空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示:

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时,可食用本产品。

清洁卫生 爱护自然

贮存条件

开罐前: ① 请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。
② 请在保质期内食用完该产品。

开罐后: ① 请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。
② 建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: WWW.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10765-2021
产品属性及类别: 乳基粉状婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

全国客服热线: 4008-168-698

6 920486 001909

国食注字 YP20230402

羚恩贝贝

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

1 段

净含量: 138克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2077
蛋白质	g	0.55	11.40
脂肪	g	1.20	24.90
亚油酸	g	0.22	4.50
α-亚麻酸	mg	21	437
碳水化合物	g	2.7	55.2
维生素			
维生素A	μg RE	18	376
维生素D	μg	0.63	13.00
维生素E	mg α-TE	0.33	6.80
维生素K ₁	μg	161	3340
维生素B ₁	μg	22	463
维生素B ₂	μg	32	658
维生素B ₆	μg	16.6	345.0
维生素B ₁₂	μg	0.096	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	140	2900
叶酸	μg	39	80.0
泛酸	μg	149	3100
维生素C	mg	3.5	73.0
生物素	μg	0.67	14.00
胆碱	mg	6.1	127.0
矿物质			
钠	mg	9	182
钾	mg	23	469
铜	μg	17.9	372.0
镁	mg	19	40.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.22	4.50
锰	μg	2.21	45.80
钙	mg	16	330
磷	mg	10	214
碘	μg	4.5	94.0
氯	mg	17	360
硒	μg	0.91	19.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	410
左旋肉碱	mg	0.7	15.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	145.0
低聚半乳糖	g	0.12	2.50
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	0.96	20.00

注:即食状态下,每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

食用方法

1 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。

2 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮沸5分钟。

3 饮用水煮沸5分钟冷却至40°C-50°C左右,预备使用。

4 参照“食用量建议表”,将准确份量的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。

5 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。

6 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表						
婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平勺)	2	3	4	5	6	7
每天食用(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5
每天辅食(次)	-	-	-	-	-	1-2

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸(发酵法)、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素[维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

爱心提示及特别提示

爱心提示:

- ①冲调奶时注意使用温开水(40°C-50°C)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
- ②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
- ③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
- ④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
- ⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示:

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

开罐前

- ①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。
- ②请在保质期内食用完该产品。

开罐后

- ①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。
- ②建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10765-2021
产品属性及类别: 乳基粉状婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

全国客服热线: 4008-168-698



国食注字 YP20230402

羚恩贝贝

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄, 1段)

1

段

净含量: 300克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2077
蛋白质	g	0.55	11.40
脂肪	g	1.20	24.90
亚油酸	g	0.22	4.50
α-亚麻酸	mg	21	437
碳水化合物	g	2.7	55.2
维生素			
维生素A	μg RE	18	376
维生素D	μg	0.63	13.00
维生素E	mg α-TE	0.33	6.80
维生素K ₁	μg	1.61	33.40
维生素B ₁	μg	22	463
维生素B ₂	μg	32	658
维生素B ₆	μg	16.6	345.0
维生素B ₁₂	μg	0.096	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	140	2900
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	149	3100
维生素C	mg	3.5	73.0
生物素	μg	0.67	14.00
胆碱	mg	6.1	127.0
矿物质			
钠	mg	9	182
钾	mg	23	469
铜	μg	17.9	372.0
镁	mg	19	40.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.22	4.50
锰	μg	2.21	45.80
钙	mg	16	330
磷	mg	10	214
碘	μg	4.5	94.0
氯	mg	17	360
硒	μg	0.91	19.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	410
左旋肉碱	mg	0.7	15.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	145.0
低聚半乳糖	g	0.12	2.50
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	0.96	20.00

注:即食状态下,每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

食用方法



冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。



将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮5分钟。



饮用水煮沸5分钟冷却至40°C-50°C左右,预备使用。



参照“食用量建议表”,将准确份量的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。



盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。



滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂奶。

食用量建议表

婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平勺)	2	3	4	5	6	7
每天食用(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5
每天辅食(次)	-	-	-	-	-	1-2

注以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸(发酵法)、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K(植物甲萘醌)、维生素 B(盐酸硫胺素)、维生素 B₂(核黄素)、维生素 B₆(盐酸吡哆醇)、维生素 B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

爱心提示及特别提示

爱心提示:
①冲调奶时注意使用温开水(40°C-50°C)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
特别提示:
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

开罐前:
①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。
②请在保质期内食用完该产品。
开罐后:
①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。
②建议在一个月内在将本产品食用完。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859

产品标准代号: GB 10765-2021

产品属性及类别: 乳基粉状婴儿配方食品

产地: 陕西 渭南 富平

生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区

保质期: 24个月

全国客服热线: 4008-168-698



国食注字 YP20230402

羚恩贝贝 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)



1 段
净含量: 400克

营养成分表


项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2077
蛋白质	g	0.55	11.40
脂肪	g	1.20	24.90
亚油酸	g	0.22	4.50
α-亚麻酸	mg	21	437
碳水化合物	g	2.7	55.2
维生素			
维生素A	μg RE	18	376
维生素D	μg	0.63	13.00
维生素E	mg α-TE	0.33	6.80
维生素K ₁	μg	161	33.40
维生素B ₁	μg	22	463
维生素B ₂	μg	32	658
维生素B ₆	μg	16.6	345.0
维生素B ₁₂	μg	0.096	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	140	2900
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	149	3100
维生素C	mg	3.5	73.0
生物素	μg	0.67	14.00
胆碱	mg	6.1	127.0
矿物质			
钠	mg	9	182
钾	mg	23	469
铜	μg	17.9	372.0
镁	mg	19	40.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.22	4.50
锰	μg	2.21	45.80
钙	mg	16	330
磷	mg	10	214
碘	μg	4.5	94.0
氯	mg	17	360
硒	μg	0.91	19.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	410
左旋肉碱	mg	0.7	15.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	145.0
低聚半乳糖	g	0.12	2.50
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	0.96	20.00

注:即食状态下,每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。



国食注字 YP20230402

食用方法



冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。将奶粉、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮沸5分钟。饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右,预备使用。参照“食用量建议表”,将准确份量的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可哺喂。

食用量建议表

婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温升水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平勺)	2	3	4	5	6	7
每天食用(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5
每天辅食(次)	-	-	-	-	-	1-2

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核苷酸(5'-核苷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素A(维生素A)、维生素D(维生素D)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₃(盐酸吡哆醇)、维生素B₅(泛酸)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

贮存条件

开罐前 ①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。
②请在保质期内食用完该产品。

开罐后 ①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。
②建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: WWW.CHINA-HXY.COM.CN

生产许可证编号: SC12961052800859

产品标准代号: GB 10765-2021

产品属性及类别: 乳基粉状婴儿配方食品

产地: 陕西 渭南 富平

生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区

保质期: 24个月

全国客服热线: 4008-168-698

爱心提示及特别提示

爱心提示:
①冲调奶粉时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶粉时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示:
对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



清洁环境
爱护自然



6 920486 000360



羚恩贝贝
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

1 段

净含量: 800克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2077
蛋白质	g	0.55	11.40
脂肪	g	1.20	24.90
亚油酸	g	0.22	4.50
α-亚麻酸	mg	21	437
碳水化合物	g	2.7	55.2
维生素			
维生素A	μg RE	18	376
维生素D	μg	0.63	13.00
维生素E	mg α-TE	0.33	6.80
维生素K ₁	μg	1.61	33.40
维生素B ₁	μg	22	463
维生素B ₂	μg	32	658
维生素B ₆	μg	16.6	345.0
维生素B ₁₂	μg	0.096	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	140	2900
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	149	3100
维生素C	mg	3.5	73.0
生物素	μg	0.67	14.00
胆碱	mg	6.1	127.0
矿物质			
钠	mg	9	182
钾	mg	23	469
铜	μg	17.9	372.0
镁	mg	1.9	40.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.22	4.50
锰	μg	2.21	45.80
钙	mg	16	330
磷	mg	10	214
碘	μg	4.5	94.0
氯	mg	17	360
硒	μg	0.91	19.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	41.0
左旋肉碱	mg	0.7	15.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	145.0
低聚半乳糖	g	0.12	2.50
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	0.96	20.00

注:即食状态下,每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗净。	将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮5分钟。	饮用开水煮5分钟冷却至40℃-50℃左右,预备使用。	参照“食用量建议表”,将准确量的水倒入奶瓶,使宝宝均匀加入奶粉。	盖紧奶瓶,摇晃至奶粉充分溶解。	滴一滴奶液在手背测试温度,稳定温度适宜时即可喂哺。
----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------	---------------------------

婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平勺)	2	3	4	5	6	7
每天食用(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5
每天辅食(次)	-	-	-	-	-	1-2

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜油、椰子油、花生油、大豆油)、低聚乳清蛋白、聚果糖、蔗糖、二十二烷六羧化合物(发酵法)、核苷(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-肌苷二磷酸)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌、亚精B-12、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D₃(胆钙化醇)、维生素E(d,l-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₃(盐酸烟酰胺)、维生素B₆(吡哆醇)、烟酸(烟酰胺)、叶酸(亚叶酸)、维生素B₁₂(L-α-甲钴胺)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、矿物质(柠檬酸钙、氯化钾、硫酸钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、硫酸钾、亚硒酸钠)、硫酸钾

开罐前	① 请常温储存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ② 请在保质期内食用完该产品。
开罐后	① 请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ② 建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息
 生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
 地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
 电话: 0913-8214088
 网址: WWW.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859

产品标准代号: GB 10765-2021

产品属性及类别: 乳基粉状婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平

产地: 陕西 渭南 富平
生产日期 批号 溯源信息: 见罐底部喷码区

保质期: 24个月

全国客服热线:4008-168-698

爱心提示:

- ①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶品应及时食用。
- ②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
- ③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
- ④喂养剩余奶液请丢弃,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
- ⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示:
对于 0~6 月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



清洁环境
爱护自然



6 920486 048133



A cute, fluffy white lamb with pink ears and hooves, smiling and standing on a blue background with a pink ribbon.

1 段
净含量: 850克

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2077
蛋白质	g	0.55	11.40
脂肪	g	1.20	24.90
亚油酸	g	0.22	4.50
α -亚麻酸	mg	21	437
碳水化合物	g	2.7	55.2
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	18	376
维生素D	μg	0.63	13.00
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.33	6.80
维生素K ₁	μg	1.61	33.40
维生素B ₁	μg	22	463
维生素B ₂	μg	32	658
维生素B ₆	μg	16.6	345.0
维生素B ₁₂	μg	0.096	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	140	2900
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	149	3100
维生素C	mg	3.5	73.0
生物素	μg	0.67	14.00
胆碱	mg	6.1	127.0
矿物质			
钠	mg	9	182
钾	mg	23	469
铜	μg	17.9	372.0
镁	mg	1.9	40.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.22	4.50
锰	μg	2.21	45.80
钙	mg	16	330
磷	mg	10	214
碘	μg	4.5	94.0
氯	mg	17	360
硒	μg	0.91	19.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	41.0
左旋肉碱	mg	0.7	15.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	145.0
低聚半乳糖	g	0.12	2.50
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	0.96	20.00

注:即食状态下,每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

标签 25



食用方法

1 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮沸5分钟。
3 饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右,预备使用。
4 参照“食用量建议表”,将准确份量的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。
5 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。
6 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平勺)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天喂哺(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸酯(发酵法)、核黄素(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷二钠、5'-鸟苷二钠、5'-尿苷二钠、5'-肌苷二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K(植物甲萘醌)、维生素 B(盐酸硫胺素)、维生素 B₂(核黄素)、维生素 B₆(盐酸吡哆醇)、维生素 B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质[硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、碳酸钾]。

爱心提示及特别提示

爱心提示:

- ① 冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
- ② 冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
- ③ 喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
- ④ 喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
- ⑤ 切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示:

须配合添加辅助食品。

贮存条件

- | | |
|-----|---|
| 开罐前 | ① 请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。
② 请在保质期内食用完该产品。 |
| 开罐后 | ① 请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。
② 建议在一个月内将本产品食用完。 |

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: WWW.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859

产品标准代号: GB 10766-2021

产品属性及类别: 乳基粉状较大婴儿配方食品

产地: 陕西 渭南 富平

生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区

保质期: 24个月

全国客服热线: 4008-168-698



国食注字 YP20230403

羚恩贝贝 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



2段
净含量: 100克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2036
蛋白质	g	0.64	13.00
脂肪	g	1.15	23.50
亚油酸	g	0.18	3.60
α-亚麻酸	mg	17	350
碳水化合物	g	2.7	54.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	459
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.28	5.70
维生素K ₁	μg	187	38.00
维生素B ₁	μg	20	407
维生素B ₂	μg	29	590
维生素B ₆	μg	16.2	330.0
维生素B ₁₂	μg	0.188	2.400
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3000
叶酸	μg	3.2	65.0
泛酸	μg	126	2565
维生素C	mg	3.1	63.0
生物素	μg	0.69	14.00
胆碱	mg	6.0	122.0
矿物质			
钠	mg	6	113
钾	mg	23	461
铜	μg	110	224.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	2.70	55.00
钙	mg	22	440
磷	mg	13	268
碘	μg	4.6	93.0
氯	mg	16	326
硒	μg	0.71	14.50
可选择成分			
肌醇	mg	18	37.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	143.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	1.03	21.00

注:即食状态下,每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。

1



冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。

2



将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮沸5分钟。

3



40℃-50℃
饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右,预备使用。

4



参照“食用量建议表”,将准确份量的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。

5



盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。

6



滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜即可哺喂。

食用量建议表		
较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平勺)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天喂哺(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、碳酸钾)。

爱心提示及特别提示

爱心提示:
①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
特别提示:
须配合添加辅助食品。

贮存条件

开罐前
①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。
②请在保质期内食用完该产品。

开罐后
①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。
②建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: WWW.china-hxry.com.cn
生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10766-2021
产品属性及类别: 乳基粉状较大婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

全国客服热线:4008-168-698



清洁生产
爱护自然



6 920486 048201



国食注字 YP20230403

羚恩贝贝

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)



2段

净含量: 138克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	KJ	100	2036
蛋白质	g	0.64	13.00
脂肪	g	1.15	23.50
亚油酸	g	0.18	3.60
α-亚麻酸	mg	17	350
碳水化合物	g	2.7	54.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	459
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.28	5.70
维生素K ₁	μg	187	38.00
维生素B ₁	μg	20	407
维生素B ₂	μg	29	590
维生素B ₆	μg	16.2	330.0
维生素B ₁₂	μg	0.118	2.400
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3000
叶酸	μg	3.2	65.0
泛酸	μg	126	2565
维生素C	mg	3.1	63.0
生物素	μg	0.69	14.00
胆碱	mg	6.0	122.0
矿物质			
钠	mg	6	113
钾	mg	23	461
铜	μg	110	224.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	2.70	55.00
钙	mg	22	440
磷	mg	13	268
碘	μg	4.6	93.0
氯	mg	16	326
硒	μg	0.71	14.50
可选择成分			
肌醇	mg	18	37.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	143.0
低聚乳糖	g	0.15	3.00
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	1.03	21.00

注:即食状态下,每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。

1



冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗净。

2



将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮5分钟。

3



40℃-50℃
饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右,预备使用。

4



参照“食用量建议表”,将准确份量的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。

5



盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。

6



滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时可喂奶。

食用方法

食用量建议表		
较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平勺)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天喂哺(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K(植物甲萘醌)、维生素 B(盐酸硫胺素)、维生素 B₂(核黄素)、维生素 B₆(盐酸吡哆醇)、维生素 B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

贮存条件

开罐前
①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。
②请在保质期内食用完该产品。

开罐后
①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。
②建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息
生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路 52 号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10766-2021
产品属性及类别: 乳基粉状较大婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

全国客服热线: 4008-168-698



国食注字 YP20230403

羚恩贝贝 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



2段
净含量: 300克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2036
蛋白质	g	0.64	13.00
脂肪	g	1.15	23.50
亚油酸	g	0.18	3.60
α-亚麻酸	mg	17	350
碳水化合物	g	2.7	54.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	459
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.28	5.70
维生素K ₁	μg	187	38.00
维生素B ₁	μg	20	407
维生素B ₂	μg	29	590
维生素B ₆	μg	16.2	330.0
维生素B ₁₂	μg	0.118	2.400
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3000
叶酸	μg	3.2	65.0
泛酸	μg	126	2565
维生素C	mg	3.1	63.0
生物素	μg	0.69	14.00
胆碱	mg	6.0	122.0
矿物质			
钠	mg	6	113
钾	mg	23	461
铜	μg	11.0	224.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	2.70	55.00
钙	mg	22	440
磷	mg	13	268
碘	μg	4.6	93.0
氯	mg	16	326
硒	μg	0.71	14.50
可选择成分			
肌醇	mg	18	37.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	143.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	1.03	21.00

注:即食状态下,每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。



食用量建议表		
较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平勺)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天喂哺(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸(发酵法)、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K(植物甲萘醌)、维生素 B ₁ (盐酸硫胺素)、维生素 B ₂ (核黄素)、维生素 B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素 B ₁₂ (氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

爱心提示及特别提示
爱心提示: ① 冲调奶时注意使用温开水(40°C-50°C)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。 ② 冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。 ③ 喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。 ④ 喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。 ⑤ 切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。 特别提示: 须配合添加辅助食品。

贮存条件
开罐前 ① 请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ② 请在保质期内食用完该产品。
开罐后 ① 请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ② 建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息
生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路 52 号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10766-2021
产品属性及类别: 乳基粉状较大婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

全国客服热线: 4008-168-698



国食注字 YP20230403

羚恩贝贝 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



2段
净含量: 400克


营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2036
蛋白质	g	0.64	13.00
脂肪	g	1.15	23.50
亚油酸	g	0.18	3.60
α-亚麻酸	mg	17	350
碳水化合物	g	2.7	54.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	459
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.28	5.70
维生素K ₁	μg	1.87	38.00
维生素B ₁	μg	20	407
维生素B ₂	μg	29	590
维生素B ₆	μg	16.2	330.0
维生素B ₁₂	μg	0.118	2.400
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3000
叶酸	μg	3.2	65.0
泛酸	μg	126	2565
维生素C	mg	3.1	63.0
生物素	μg	0.69	14.00
胆碱	mg	6.0	122.0
矿物质			
钠	mg	6	113
钾	mg	23	461
铜	μg	110	224.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	2.70	55.00
钙	mg	22	440
磷	mg	13	268
碘	μg	4.6	93.0
氯	mg	16	326
硒	μg	0.71	14.50
可选择成分			
肌醇	mg	18	37.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	143.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	1.03	21.00

注:即食状态下,每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。



国食注字 YP20230403

食用方法



1 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮5分钟。
3 饮用水煮沸5分钟冷却至40°C-50°C左右,预备使用。
4 参照“食用量建议表”,将准确份量的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉,分溶解。
5 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。
6 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平勺)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天喂哺(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸(DHA)、核黄素(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素E(维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(di-α-生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

贮存条件

- 开罐前 ① 请室温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。
② 请在保质期内食用完该产品。
- 开罐后 ① 请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。
② 建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10766-2021
产品属性及类别: 乳基粉状较大婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

全国客服热线: 4008-168-698



清洁环境
爱护自然



6 920486 000377



羚恩贝贝 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

2 段
净含量: 800克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2036
蛋白质	g	0.64	13.00
脂肪	g	1.15	23.50
亚油酸	g	0.18	3.60
α-亚麻酸	mg	17	350
碳水化合物	g	2.7	54.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	459
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.28	5.70
维生素K ₁	μg	1.87	38.00
维生素B ₁	μg	20	407
维生素B ₂	μg	29	590
维生素B ₆	μg	16.2	330.0
维生素B ₁₂	μg	0.118	2.400
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3000
叶酸	μg	3.2	65.0
泛酸	μg	126	2565
维生素C	mg	3.1	63.0
生物素	μg	0.69	14.00
胆碱	mg	6.0	122.0
矿物质			
钠	mg	6	113
钾	mg	23	461
铜	μg	11.0	224.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	2.70	55.00
钙	mg	22	440
磷	mg	13	268
碘	μg	4.6	93.0
氯	mg	16	326
硒	μg	0.71	14.50
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	37.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	143.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	1.03	21.00

注:即食状态下,每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。

食用方法



1 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。



2 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮5分钟。



3 饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右,预备使用。



4 参照“食用量建议表”,将准确份量的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。



5 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。



6 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表	
幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平勺)	8
温开水量(毫升)	240
每天喂哺(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核甘酸(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

爱心提示

① 冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。

② 冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。

③ 喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④ 喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。

⑤ 切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

贮存条件

开罐前

① 请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。
② 请在保质期内食用完该产品。

开罐后

① 请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。
② 建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: WWW.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10767-2021
产品属性及类别: 乳基粉状幼儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

全国客服热线:4008-168-698



请对环境友好
爱护自然



6 920486 001992



国食注字 YP20230404

羚恩贝贝

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄, 3段)



3段

净含量: 100克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2015
蛋白质	g	0.73	14.80
脂肪	g	1.14	23.00
亚油酸	g	0.15	3.00
α-亚麻酸	mg	15	303
碳水化合物	g	2.6	52.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	454
维生素D	μg	0.62	12.50
维生素E	mg α-TE	0.29	5.80
维生素K ₁	μg	2.00	40.30
维生素B ₁	μg	21	425
维生素B ₂	μg	24	484
维生素B ₆	μg	16.4	330.0
维生素B ₁₂	μg	0.119	2.400
烟酸(烟酰胺)	μg	159	3200
叶酸	μg	3.2	64.0
泛酸	μg	133	2680
维生素C	mg	31	62.0
生物素	μg	0.74	15.00
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	27	553
铜	μg	14.0	283.0
镁	mg	21	43.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	25	498
磷	mg	15	303
碘	μg	5.0	100.0
氯	mg	15	302
可选择成分			
硒	μg	0.72	14.50
胆碱	mg	6.0	1210
锰	μg	2.48	50.00
肌醇	mg	19	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	13.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	85.0
低聚半乳糖	g	0.16	3.20
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	1.09	22.00

注:即食状态下,每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

食用方法



1 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。



2 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮5分钟。



3 饮用水煮沸5分钟冷却至40°C-50°C左右,预备使用。



4 参阅“食用量建议表”,将准确份量的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。



5 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。



6 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平勺)	8
温开水量(毫升)	240
每天喂哺(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K(植物甲萘醌)、维生素 B₁(盐酸硫胺素)、维生素 B₂(核黄素)、维生素 B₆(盐酸吡哆醇)、维生素 B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

贮存条件

开罐前
① 请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。
② 请在保质期内食用完该产品。

开罐后
① 请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。
② 建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路 52 号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10767-2021
产品属性及类别: 乳基粉状幼儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

爱心提示

① 冲调奶时注意使用温开水(40°C-50°C)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
② 冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③ 喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④ 喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤ 切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

全国客服热线:4008-168-698



清洁环境
爱护自然



6 920486 002029



国食注字 YP20230404

羚恩贝贝

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄, 3段)



3段

净含量:300克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2015
蛋白质	g	0.73	14.80
脂肪	g	1.14	23.00
亚油酸	g	0.15	3.00
α-亚麻酸	mg	15	303
碳水化合物	g	2.6	52.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	454
维生素D	μg	0.62	12.50
维生素E	mg α-TE	0.29	5.80
维生素K ₁	μg	2.00	40.30
维生素B ₁	μg	21	425
维生素B ₂	μg	24	484
维生素B ₆	μg	16.4	330.0
维生素B ₁₂	μg	0.119	2.400
烟酸(烟酰胺)	μg	159	3200
叶酸	μg	3.2	64.0
泛酸	μg	133	2680
维生素C	mg	3.1	62.0
生物素	μg	0.74	15.00
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	27	553
铜	μg	14.0	283.0
镁	mg	2.1	43.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	25	498
磷	mg	15	303
碘	μg	5.0	100.0
氯	mg	15	302
可选择成分			
硒	μg	0.72	14.50
胆碱	mg	6.0	1210
锰	μg	2.48	50.00
肌醇	mg	19	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	13.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	85.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.9	140.0
低聚半乳糖	g	0.16	3.20
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	109	2200

注:即食状态下,每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

食用方法

1 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。

2 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮沸5分钟。

3 饮用水煮沸5分钟冷却至40°C-50°C左右,预备使用。

4 参照“食用量建议表”,将准确份量的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。

5 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。

6 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表	
幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平勺)	8
温开水量(毫升)	240
每天喂哺(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

爱心提示

① 冲调奶时注意使用温开水(40°C-50°C)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。

② 冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。

③ 喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④ 喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。

⑤ 切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

贮存条件

开罐前

① 请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。

② 请在保质期内食用完该产品。

开罐后

① 请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。

② 建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息

生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司

地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号

电话: 0913-8214088

网址: www.china-hxry.com.cn

生产许可证编号: SC12961052800859

产品标准代号: GB 10767-2021

产品属性及类别: 乳基粉状幼儿配方食品

产地: 陕西 渭南 富平

生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区

保质期: 24个月

全国客服热线: 4008-168-698



国食注字 YP20230404

羚恩贝贝

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄, 3段)

3段

净含量: 400克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	KJ	100	2015
蛋白质	g	0.73	14.80
脂肪	g	1.14	23.00
亚油酸	g	0.15	3.00
α-亚麻酸	mg	15	303
碳水化合物	g	2.6	52.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	454
维生素D	μg	0.62	12.50
维生素E	mg α-TE	0.29	5.80
维生素K ₁	μg	2.00	40.30
维生素B ₁	μg	21	425
维生素B ₂	μg	24	484
维生素B ₆	μg	16.4	330.0
维生素B ₁₂	μg	0.119	2.400
烟酸(烟酰胺)	μg	159	3200
叶酸	μg	3.2	64.0
泛酸	μg	133	2680
维生素C	mg	3.1	62.0
生物素	μg	0.74	15.00
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	27	553
铜	μg	14.0	283.0
镁	mg	2.1	43.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	25	498
磷	mg	15	303
碘	μg	5.0	100.0
氯	mg	15	302
可选择成分			
硒	μg	0.72	14.50
胆碱	mg	6.0	1210
锰	μg	2.48	50.00
肌醇	mg	19	380
左旋肉碱	mg	0.6	13.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	85.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.9	140.0
低聚半乳糖	g	0.16	3.20
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	1.09	22.00

注:即食状态下,每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

食用方法

1

冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。

2

将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮沸5分钟。

3

40℃-50℃
饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右,预备使用。

4

参照“食用量建议表”,将准确份量的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。

5

盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。

6

滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可哺喂。

食用量建议表

幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平勺)	8
温开水量(毫升)	240
每天喂哺(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表	
生牛乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、核黄素(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷二核苷、5'-鸟苷二核苷、5'-尿苷二核苷、5'-肌苷二核苷)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K ₁ (植物甲萘醌)、维生素B ₁ (盐酸硫胺素)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素B ₁₂ (氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。	

爱心提示

① 冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。

② 冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。

③ 喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④ 喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。

⑤ 切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

贮存条件	
开罐前	① 请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ② 请在保质期内食用完该产品。
开罐后	① 请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ② 建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息
生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: WWW.CHINA-HXRY.COM.CN

生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10767-2021
产品属性及类别: 乳基粉状幼儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息: 见罐底部喷码区
保质期: 24个月

全国客服热线: 4008-168-698

清洁环境
爱护自然

6 920486 048157

美羚®
MEILING

国食字 YP20230404

羚恩贝贝

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄, 3段)


3 段

净含量: 850克

营养成分表			
项目	单位	每 100kJ	每 100g
能量	KJ	100	2015
蛋白质	g	0.73	14.80
脂肪	g	1.14	23.00
亚油酸	g	0.15	3.00
α-亚麻酸	mg	15	303
碳水化合物	g	2.6	52.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	454
维生素D	μg	0.62	12.50
维生素E	mg α-TE	0.29	5.80
维生素K ₁	μg	2.00	40.30
维生素B ₁	μg	21	425
维生素B ₂	μg	24	484
维生素B ₆	μg	16.4	330.0
维生素B ₁₂	μg	0.119	2.400
烟酸(烟酰胺)	μg	159	3200
叶酸	μg	3.2	64.0
泛酸	μg	133	2680
维生素C	mg	3.1	62.0
生物素	μg	0.74	15.00
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	27	553
铜	μg	14.0	283.0
镁	mg	2.1	43.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	25	498
磷	mg	15	303
碘	μg	5.0	100.0
氯	mg	15	302
可选择成分			
硒	μg	0.72	14.50
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	2.48	50.00
肌醇	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	13.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	85.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.9	140.0
低聚乳糖	g	0.16	3.20
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	1.09	22.00

注:即食状态下,每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

标签 37



德瑞兰帝系列产品
100g、138g、300g、
400g、800g、850g
所有规格通用

标签 38



羚恩贝贝系列产品
100g、138g、300g、
400g、800g、850g
所有规格通用