

附件 2：陕西优利士乳业集团有限责任公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签1：

奶具消毒及食用方法

① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

② 将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

③ 调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

④ 依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

⑤ 再依推荐喂哺表的指示，加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

⑥ 摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示： 调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6 949008 404790

推荐喂哺表

| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 |
|------|----------|-------------|--------|
| | 温开水 (mL) | 乳粉 (g) (平匙) | |
| 0-1周 | 60 | 9 | 2 |
| 1-2周 | 90 | 13.5 | 3 |
| 2-4周 | 120 | 18 | 4 |
| 1-2月 | 150 | 22.5 | 5 |
| 2-4月 | 180 | 27 | 6 |
| 4-6月 | 210 | 31.5 | 7 |

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳

产品信息及资料查询
www.sxruyo.com

产品咨询热线
400-692-8998

优利士®

金瑞优®

1 段

净含量:100克 国食注字 YP20170648

婴儿配方羊乳粉 (0-6月龄,1段)

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|-------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2081 | 镁 | mg | 1.7 | 34.8 |
| 蛋白质 | g | 0.49 | 10.20 | 铁 | mg | 0.19 | 3.90 |
| 脂肪 | g | 1.18 | 24.50 | 锌 | mg | 0.19 | 3.90 |
| 亚油酸 | g | 0.15 | 3.16 | 锰 | μg | 2.78 | 57.94 |
| α-亚麻酸 | mg | 20 | 410 | 钙 | mg | 16 | 325 |
| 碳水化合物 | g | 2.8 | 57.82 | 磷 | mg | 11 | 226 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 4.5 | 93.6 |
| 维生素A | μg RE | 18 | 383 | 氯 | mg | 15 | 321 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.49 | 硒 | μg | 0.90 | 18.73 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.71 | 可选择成分 | | | |
| 维生素K ₁ | μg | 1.85 | 38.60 | 肌醇 | mg | 3.2 | 66.8 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 510 | 牛磺酸 | mg | 1.7 | 36.2 |
| 维生素B ₂ | μg | 39 | 815 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.8 |
| 维生素B ₆ | μg | 15.1 | 313.9 | 二十二碳六烯酸 (DHA) | mg | 4.5 | 93.6 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.131 | 2.725 | 二十碳四烯酸 (AA/ARA) | mg | 5.4 | 111.8 |
| 烟酸 (烟酰胺) | μg | 148 | 3090 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 4.3 | 90.5 | 低聚半乳糖 | g | 0.027 | 0.560 |
| 泛酸 | μg | 158 | 3296 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 4.0 | 83.7 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | μg | 0.71 | 14.82 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.26 | 5.33 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 124.9 | 叶黄素 | μg | 1.9 | 40.0 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钠 | mg | 9 | 182 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.0 | 62.3 |
| 钾 | mg | 21 | 442 | | | | |
| 铜 | μg | 17.9 | 372.0 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油 (1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂 (发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯 (维生素A)、胆钙化醇 (维生素D)、dl-α-醋酸生育酚 (维生素E)、植物甲萘醌 (维生素K₁)、L-抗坏血酸钠 (维生素C)、盐酸硫胺素 (维生素B₁)、核黄素 (维生素B₂)、盐酸吡哆醇 (维生素B₆)、氰钴胺 (维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙 (泛酸)、烟酰胺、D-生物素 (生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷。

标签2:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例。除非有专业人员建议，不当配制和使用不当可能引起健康危害！
对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

推荐喂哺表

| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 | |
|------|----------|------|--------|--------|
| | 温开水 (mL) | 乳粉 | | 乳粉 (次) |
| | | (g) | (平匙) | |
| 0-1周 | 60 | 9 | 2 | 8 |
| 1-2周 | 90 | 13.5 | 3 | 6 |
| 2-4周 | 120 | 18 | 4 | 5 |
| 1-2月 | 150 | 22.5 | 5 | 5 |
| 2-4月 | 180 | 27 | 6 | 5 |
| 4-6月 | 210 | 31.5 | 7 | 5 |

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
保质期：24个月
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
产地：陕西 咸阳
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状

产品信息及产品资料查询
www.sxruyo.com
产品咨询热线
400-692-8998

优利士

金瑞优

1

段

净含量:300克 国食注字 YP20170648

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|-------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2081 | 镁 | mg | 1.7 | 34.8 |
| 蛋白质 | g | 0.49 | 10.20 | 铁 | mg | 0.19 | 3.90 |
| 脂肪 | g | 1.18 | 24.50 | 锌 | mg | 0.19 | 3.90 |
| 亚油酸 | g | 0.15 | 3.16 | 锰 | μg | 2.78 | 57.94 |
| α-亚麻酸 | mg | 20 | 410 | 钙 | mg | 16 | 325 |
| 碳水化合物 | g | 2.8 | 57.82 | 磷 | mg | 11 | 226 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 4.5 | 93.6 |
| 维生素A | μg RE | 18 | 383 | 氯 | mg | 15 | 321 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.49 | 硒 | μg | 0.90 | 18.73 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.71 | 可选择成分 | | | |
| 维生素K ₁ | μg | 1.85 | 38.60 | 肌醇 | mg | 3.2 | 66.8 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 510 | 牛磺酸 | mg | 1.7 | 36.2 |
| 维生素B ₂ | μg | 39 | 815 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.8 |
| 维生素B ₆ | μg | 15.1 | 313.9 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 93.6 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.131 | 2.725 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.4 | 111.8 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 148 | 3090 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 4.3 | 90.5 | 低聚半乳糖 | g | 0.027 | 0.560 |
| 泛酸 | μg | 158 | 3296 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 4.0 | 83.7 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | μg | 0.71 | 14.82 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.26 | 5.33 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 124.9 | 叶黄素 | μg | 1.9 | 40.0 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钠 | mg | 9 | 182 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.0 | 62.3 |
| 钾 | mg | 21 | 442 | | | | |
| 铜 | μg | 17.9 | 372.0 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、脂酸视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、硬脂酸、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷酸。

标签3:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉，只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

推荐喂哺表

| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 | |
|------|----------|------|--------|--------|
| | 温开水 (mL) | 乳粉 | | 乳粉 (次) |
| | | (g) | (平匙) | |
| 0-1周 | 60 | 9 | 2 | 8 |
| 1-2周 | 90 | 13.5 | 3 | 6 |
| 2-4周 | 120 | 18 | 4 | 5 |
| 1-2月 | 150 | 22.5 | 5 | 5 |
| 2-4月 | 180 | 27 | 6 | 5 |
| 4-6月 | 210 | 31.5 | 7 | 5 |

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC1296104200829

产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳

产品信息及产品质量查询
www.sxruyo.com

产品咨询热线
400-692-8998



净含量: 350克 国食注字 YP20170648

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄, 1段)

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|-------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2081 | 镁 | mg | 1.7 | 34.8 |
| 蛋白质 | g | 0.49 | 10.20 | 铁 | mg | 0.19 | 3.90 |
| 脂肪 | g | 1.18 | 24.50 | 锌 | mg | 0.19 | 3.90 |
| 亚油酸 | g | 0.15 | 3.16 | 锰 | μg | 2.78 | 57.94 |
| α-亚麻酸 | mg | 20 | 410 | 钙 | mg | 16 | 325 |
| 碳水化合物 | g | 2.8 | 57.82 | 磷 | mg | 11 | 226 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 4.5 | 93.6 |
| 维生素A | μg RE | 18 | 383 | 氯 | mg | 15 | 321 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.49 | 硒 | μg | 0.90 | 18.73 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.71 | 可选择成分 | | | |
| 维生素K ₁ | μg | 1.85 | 38.60 | 肌醇 | mg | 3.2 | 66.8 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 510 | 牛磺酸 | mg | 1.7 | 36.2 |
| 维生素B ₂ | μg | 39 | 815 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.8 |
| 维生素B ₆ | μg | 15.1 | 313.9 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 93.6 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.131 | 2.725 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.4 | 111.8 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 148 | 3090 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 4.3 | 90.5 | 低聚半乳糖 | g | 0.027 | 0.560 |
| 泛酸 | μg | 158 | 3296 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 4.0 | 83.7 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | μg | 0.71 | 14.82 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.26 | 5.33 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 124.9 | 叶黄素 | μg | 1.9 | 40.0 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钠 | mg | 9 | 182 | 酸蛋白磷酸肽 | mg | 3.0 | 62.3 |
| 钾 | mg | 21 | 442 | | | | |
| 铜 | μg | 17.9 | 372.0 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氧化胆碱、植酸衍生物(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、硫酸硫酸素(维生素B₁₂)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、磷酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸钾、磷酸钾、亚磷酸钾、硫酸锰、氯化钾、磷酸。

标签4:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例。除非有专业人员建议，不当配制和使用不当可能引起健康危害！
对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

推荐喂哺表

| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 | |
|------|----------|--------|--------|---|
| | 乳粉 | | | |
| | 温开水 (mL) | 乳粉 (次) | | |
| 0-1周 | 60 | 9 | 2 | 8 |
| 1-2周 | 90 | 13.5 | 3 | 6 |
| 2-4周 | 120 | 18 | 4 | 5 |
| 1-2月 | 150 | 22.5 | 5 | 5 |
| 2-4月 | 180 | 27 | 6 | 5 |
| 4-6月 | 210 | 31.5 | 7 | 5 |

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳

产品信息及产品质量查询
www.sxruyo.com

产品咨询热线
400-692-8998

净含量:400克 国食注字 YP20170648

婴儿配方羊乳粉 (0-6月龄,1段)

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|-------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2081 | 镁 | mg | 1.7 | 34.8 |
| 蛋白质 | g | 0.49 | 10.20 | 铁 | mg | 0.19 | 3.90 |
| 脂肪 | g | 1.18 | 24.50 | 锌 | mg | 0.19 | 3.90 |
| 亚油酸 | g | 0.15 | 3.16 | 锰 | μg | 2.78 | 57.94 |
| α-亚麻酸 | mg | 20 | 410 | 钙 | mg | 16 | 325 |
| 碳水化合物 | g | 2.8 | 57.82 | 磷 | mg | 11 | 226 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 4.5 | 93.6 |
| 维生素A | μg RE | 18 | 383 | 氯 | mg | 15 | 321 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.49 | 硒 | μg | 0.90 | 18.73 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.71 | 可选择成分 | | | |
| 维生素K ₁ | μg | 1.85 | 38.60 | 肌醇 | mg | 3.2 | 66.8 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 510 | 牛磺酸 | mg | 1.7 | 36.2 |
| 维生素B ₂ | μg | 39 | 815 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.8 |
| 维生素B ₆ | μg | 15.1 | 313.9 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 93.6 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.131 | 2.725 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.4 | 111.8 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 148 | 3090 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 4.3 | 90.5 | 低聚半乳糖 | g | 0.027 | 0.560 |
| 泛酸 | μg | 158 | 3296 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 4.0 | 83.7 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | μg | 0.71 | 14.82 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.26 | 5.33 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 124.9 | 叶黄素 | μg | 1.9 | 40.0 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钠 | mg | 9 | 182 | 酸蛋白磷酸肽 | mg | 3.0 | 62.3 |
| 钾 | mg | 21 | 442 | | | | |
| 铜 | μg | 17.9 | 372.0 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油酯、核桃油、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酸蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Pb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、胆碱视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育醇(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸钾、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷酯。

标签5:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残留。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人士建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

推荐喂哺表

| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 | |
|------|----------|------|--------|---|
| | 温开水 (mL) | 乳粉 | 乳粉 (次) | |
| | | (g) | (平匙) | |
| 0-1周 | 60 | 9 | 2 | 8 |
| 1-2周 | 90 | 13.5 | 3 | 6 |
| 2-4周 | 120 | 18 | 4 | 5 |
| 1-2月 | 150 | 22.5 | 5 | 5 |
| 2-4月 | 180 | 27 | 6 | 5 |
| 4-6月 | 210 | 31.5 | 7 | 5 |

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状

产品标准代号：GB 10765-2021

保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司

产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

优利士®

金瑞优®

1

段

净含量:700克 国食注字 YP20170648

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2081 | 镁 | mg | 1.7 | 34.8 |
| 蛋白质 | g | 0.49 | 10.20 | 铁 | mg | 0.19 | 3.90 |
| 脂肪 | g | 1.18 | 24.50 | 锌 | mg | 0.19 | 3.90 |
| 亚油酸 | g | 0.15 | 3.16 | 锰 | μg | 2.78 | 57.94 |
| α-亚麻酸 | mg | 20 | 410 | 钙 | mg | 16 | 325 |
| 碳水化合物 | g | 2.8 | 57.82 | 磷 | mg | 11 | 226 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 4.5 | 93.6 |
| 维生素A | μg RE | 18 | 383 | 氟 | mg | 15 | 321 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.49 | 硒 | μg | 0.90 | 18.73 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.71 | 可选择成分 | | | |
| 维生素K ₁ | μg | 1.85 | 38.60 | 肌醇 | mg | 3.2 | 66.8 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 510 | 牛磺酸 | mg | 1.7 | 36.2 |
| 维生素B ₂ | μg | 39 | 815 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.8 |
| 维生素B ₆ | μg | 15.1 | 313.9 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 93.6 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.131 | 2.725 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.4 | 111.8 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 148 | 3090 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 4.3 | 90.5 | 低聚半乳糖 | g | 0.027 | 0.560 |
| 泛酸 | μg | 158 | 3296 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 4.0 | 83.7 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | μg | 0.71 | 14.82 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸 | g | 0.26 | 5.33 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 124.9 | 甘油三酯 | | | |
| 矿物质 | | | | 叶黄素 | μg | 1.9 | 40.0 |
| 钠 | mg | 9 | 182 | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钾 | mg | 21 | 442 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.0 | 62.3 |
| 铜 | μg | 17.9 | 372.0 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钾、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷酯。

产品信息及产品资料查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

标签6:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残留奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

推荐喂哺表

| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 | |
|------|----------|------|--------|--------|
| | 温开水 (mL) | 乳粉 | | 乳粉 (次) |
| | | (g) | (平匙) | |
| 0-1周 | 60 | 9 | 2 | 8 |
| 1-2周 | 90 | 13.5 | 3 | 6 |
| 2-4周 | 120 | 18 | 4 | 5 |
| 1-2月 | 150 | 22.5 | 5 | 5 |
| 2-4月 | 180 | 27 | 6 | 5 |
| 4-6月 | 210 | 31.5 | 7 | 5 |

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
保质期：24个月
制造商：陕西优利士乳业集团有限公司 产地：陕西 咸阳
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品信息及产品质量查询
www.sxruyo.com

产品咨询热线
400-692-8998

优利士®

金瑞优®

1

段

净含量:800克 国食注字 YP20170648

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|-------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2081 | 镁 | mg | 1.7 | 34.8 |
| 蛋白质 | g | 0.49 | 10.20 | 铁 | mg | 0.19 | 3.90 |
| 脂肪 | g | 1.18 | 24.50 | 锌 | mg | 0.19 | 3.90 |
| 亚油酸 | g | 0.15 | 3.16 | 锰 | μg | 2.78 | 57.94 |
| α-亚麻酸 | mg | 20 | 410 | 钙 | mg | 16 | 325 |
| 碳水化合物 | g | 2.8 | 57.82 | 磷 | mg | 11 | 226 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 4.5 | 93.6 |
| 维生素A | μg RE | 18 | 383 | 氟 | mg | 15 | 321 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.49 | 硒 | μg | 0.90 | 18.73 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.71 | 可选择成分 | | | |
| 维生素K ₁ | μg | 1.85 | 38.60 | 肌醇 | mg | 3.2 | 66.8 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 510 | 牛磺酸 | mg | 1.7 | 36.2 |
| 维生素B ₂ | μg | 39 | 815 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.8 |
| 维生素B ₆ | μg | 15.1 | 313.9 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 93.6 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.131 | 2.725 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.4 | 111.8 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 148 | 3090 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 4.3 | 90.5 | 低聚半乳糖 | g | 0.027 | 0.560 |
| 泛酸 | μg | 158 | 3296 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 4.0 | 83.7 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | μg | 0.71 | 14.82 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.26 | 5.33 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 124.9 | 叶黄素 | μg | 1.9 | 40.0 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钠 | mg | 9 | 182 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.0 | 62.3 |
| 钾 | mg | 21 | 442 | | | | |
| 铜 | μg | 17.9 | 372.0 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐半乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育醇(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、磷酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、碘酸钾。

6 949008 404332

标签7:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手,彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟,待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟,冷却至45°C左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示,先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表的指示,加入准确份量(平匙)的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示: 调奶时请使用罐内专用量匙,建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉,请勿随意改变冲调比例,除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害!

6~12月龄较大婴儿食用本产时,须配合添加辅助食品。

推荐喂哺表

| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 |
|-------|-------------|----------------|--------|
| | 温开水 (mL) | 乳粉 (g) (平匙) | |
| 6-12月 | 210 | 31.5 7 | 3-4 |

说明: 每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别: 较大婴儿配方食品
产品标准代号: GB 10766-2021
制造商: 陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址: 陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号: 见罐底
检验合格证号: 同生产批号
食品生产许可证编号: SC12961042400829
产品属性: 乳基粉状
保质期: 24个月
产地: 陕西 咸阳

产品信息及产品资料查询
www.sxruyo.com

产品咨询热线
400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

6949008403779

净含量:100克 国食注字 YP20170649
较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|-------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2078 | 镁 | mg | 1.9 | 40.0 |
| 蛋白质 | g | 0.58 | 12.10 | 铁 | mg | 0.30 | 6.23 |
| 脂肪 | g | 1.18 | 24.60 | 锌 | mg | 0.18 | 3.82 |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.74 | 锰 | μg | 3.02 | 62.80 |
| α-亚麻酸 | mg | 17 | 361 | 钙 | mg | 21 | 442 |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 55.52 | 磷 | mg | 14 | 292 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 4.5 | 93.5 |
| 维生素A | μg RE | 23 | 468 | 氯 | mg | 19 | 405 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.47 | 硒 | μg | 0.69 | 14.27 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.53 | 可选择成分 | | | |
| 维生素K ₁ | μg | 1.88 | 39.07 | 肌醇 | mg | 3.0 | 61.8 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 514 | 牛磺酸 | mg | 1.7 | 35.3 |
| 维生素B ₂ | μg | 35 | 718 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.5 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.8 | 308.0 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 93.5 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.125 | 2.602 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.5 | 114.1 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 148 | 3069 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.5 | 低聚半乳糖 | g | 0.027 | 0.560 |
| 泛酸 | μg | 157 | 3265 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 4.0 | 83.8 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | μg | 0.73 | 15.19 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.21 | 4.33 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 124.7 | 叶黄素 | μg | 7.8 | 162.0 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钠 | mg | 6 | 123 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.3 | 68.2 |
| 钾 | mg | 24 | 503 | | | | |
| 铜 | μg | 13.4 | 277.9 | | | | |

说明: 每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷酯。

标签8:

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。



| 推荐喂哺表 | | | | |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 | |
| | 温开水 (mL) | 乳粉 | | 乳粉 (次) |
| | | (g) | (平匙) | |
| 6-12月 | 210 | 31.5 | 7 | 3-4 |

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：较大婴儿配方食品 产品属性：乳基粉状

产品标准代号：GB 10766-2021 保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司 产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

产品信息及产品介绍

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998



净含量: 300克 国食注字 YP20170649

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄, 2段)

| 营养成分表 | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------|-------|----------------|----|--------|-------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2078 | 镁 | mg | 1.9 | 40.0 |
| 蛋白质 | g | 0.58 | 12.10 | 铁 | mg | 0.30 | 6.23 |
| 脂肪 | g | 1.18 | 24.60 | 锌 | mg | 0.18 | 3.82 |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.74 | 锰 | μg | 3.02 | 62.80 |
| α-亚麻酸 | mg | 17 | 361 | 钙 | mg | 21 | 442 |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 55.52 | 磷 | mg | 14 | 292 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 4.5 | 93.5 |
| 维生素A | μg RE | 23 | 468 | 氯 | mg | 19 | 405 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.47 | 硒 | μg | 0.69 | 14.27 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.53 | 可选择成分 | | | |
| 维生素K ₁ | μg | 1.88 | 39.07 | 肌醇 | mg | 3.0 | 61.8 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 514 | 牛磺酸 | mg | 1.7 | 35.3 |
| 维生素B ₂ | μg | 35 | 718 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.5 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.8 | 308.0 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 93.5 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.125 | 2.602 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.5 | 114.1 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 148 | 3069 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.5 | 低聚半乳糖 | g | 0.027 | 0.560 |
| 泛酸 | μg | 157 | 3265 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 4.0 | 83.8 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | μg | 0.73 | 15.19 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸 | | | |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 124.7 | 甘油三酯 | g | 0.21 | 4.33 |
| 矿物质 | | | | 叶黄素 | μg | 7.8 | 162.0 |
| 钠 | mg | 6 | 123 | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钾 | mg | 24 | 503 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.3 | 68.2 |
| 铜 | μg | 13.4 | 277.9 | | | | |
| 说明:每100mL奶液含乳粉13.5g。 | | | | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油酯、核桃油、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、胆酸钙(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-磷酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、磷酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。

标签9:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲泡乳粉，请勿随意改变冲泡比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

推荐喂哺表

| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 | |
|-------|----------|------|--------|--------|
| | 温开水 (mL) | 乳粉 | | 乳粉 (次) |
| | | (g) | (平匙) | |
| 6-12月 | 210 | 31.5 | 7 | 3-4 |

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：较大婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状

产品标准代号：GB 10766-2021

保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司

产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

产品信息及产品介绍

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

优利士®

金瑞优®



段

净含量:350克 国食注字 YP20170649

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|-------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2078 | 镁 | mg | 1.9 | 40.0 |
| 蛋白质 | g | 0.58 | 12.10 | 铁 | mg | 0.30 | 6.23 |
| 脂肪 | g | 1.18 | 24.60 | 锌 | mg | 0.18 | 3.82 |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.74 | 锰 | μg | 3.02 | 62.80 |
| α-亚麻酸 | mg | 17 | 361 | 钙 | mg | 21 | 442 |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 55.52 | 磷 | mg | 14 | 292 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 4.5 | 93.5 |
| 维生素A | μg RE | 23 | 468 | 氯 | mg | 19 | 405 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.47 | 硒 | μg | 0.69 | 14.27 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.53 | 可选择成分 | | | |
| 维生素K ₁ | μg | 1.88 | 39.07 | 肌醇 | mg | 3.0 | 61.8 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 514 | 牛磺酸 | mg | 1.7 | 35.3 |
| 维生素B ₂ | μg | 35 | 718 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.5 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.8 | 308.0 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 93.5 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.125 | 2.602 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.5 | 114.1 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 148 | 3069 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.5 | 低聚半乳糖 | g | 0.027 | 0.560 |
| 泛酸 | μg | 157 | 3265 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 4.0 | 83.8 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | μg | 0.73 | 15.19 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.21 | 4.33 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 124.7 | 叶黄素 | μg | 7.8 | 162.0 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钠 | mg | 6 | 123 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.3 | 68.2 |
| 钾 | mg | 24 | 503 | | | | |
| 铜 | μg | 13.4 | 277.9 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、胆酸视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D₃)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。

标签10:

奶具消毒及食用方法

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45°C左右。

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议，不当配制和使用不当可能引起健康危害！

6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。

推荐喂哺表

| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 | |
|-------|----------|------|--------|--------|
| | 温开水 (mL) | 乳粉 | | 乳粉 (次) |
| | | (g) | (平匙) | |
| 6-12月 | 210 | 31.5 | 7 | 3-4 |

说明：每平匙乳粉约4.5g

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类型：较大婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状

产品标准代号：GB 10766-2021

保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司 产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产日期

食品生产许可证编号：SC12961042400829

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

6 949008 404370

产品信息及产品质量查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-9998

净含量:400克 国食注字 YP20170649

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2078 | 铁 | mg | 1.9 | 40.00 |
| 蛋白质 | g | 0.58 | 12.10 | 镁 | mg | 0.30 | 6.23 |
| 脂肪 | g | 1.18 | 24.60 | 锌 | mg | 0.18 | 3.82 |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.74 | 锰 | μg | 3.02 | 62.80 |
| α-亚麻酸 | mg | 17 | 361 | 钙 | mg | 21 | 442 |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 55.52 | 磷 | mg | 14 | 292 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 4.5 | 93.5 |
| 维生素A | μgRE | 23 | 468 | 氯 | mg | 19 | 405 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.47 | 硒 | μg | 0.69 | 14.27 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.53 | 可适成分 | | | |
| 维生素K ₁ | μg | 1.88 | 39.07 | 肌醇 | mg | 3.0 | 61.8 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 514 | 牛磺酸 | mg | 1.7 | 35.3 |
| 维生素B ₂ | μg | 35 | 718 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.5 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.8 | 308.0 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 93.5 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.125 | 2.602 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.5 | 114.1 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 148 | 3069 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.5 | 低聚半乳糖 | g | 0.027 | 0.560 |
| 泛酸 | μg | 157 | 3265 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 4.0 | 83.8 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | μg | 0.73 | 15.19 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸 | | | |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 124.7 | 甘油三酯 | g | 0.21 | 4.33 |
| 矿物质 | | | | 叶黄素 | μg | 7.8 | 162.0 |
| 钠 | mg | 6 | 123 | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钾 | mg | 24 | 503 | 酸蛋白磷酸肽 | mg | 3.3 | 68.2 |
| 铜 | μg | 13.4 | 277.9 | | | | |

说明:每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯)、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油酯、核桃油、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、低聚半乳糖、低果聚糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种D-12、左旋肉碱、氧化亚铁、醋酸视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘酚(维生素K)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、硫酸锰(维生素B)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氟铝铵(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、磷酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸钴、氧化钾、磷酸。

标签11:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人士建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

推荐喂哺表

| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 | |
|-------|----------|--------|---------|--------|
| | 温开水 (mL) | 乳粉 (g) | 乳粉 (平匙) | 乳粉 (次) |
| 6-12月 | 210 | 31.5 | 7 | 3-4 |

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：较大婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状

产品标准代号：GB 10766-2021

保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司

产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

优利士®

金瑞优®



段

净含量: 700克 国食注字 YP20170649

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄, 2段)

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2078 | 镁 | mg | 1.9 | 40.0 |
| 蛋白质 | g | 0.58 | 12.10 | 铁 | mg | 0.30 | 6.23 |
| 脂肪 | g | 1.18 | 24.60 | 锌 | mg | 0.18 | 3.82 |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.74 | 锰 | μg | 3.02 | 62.80 |
| α-亚油酸 | mg | 17 | 361 | 钙 | mg | 21 | 442 |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 55.52 | 磷 | mg | 14 | 292 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 4.5 | 93.5 |
| 维生素A | μg RE | 23 | 468 | 氯 | mg | 19 | 405 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.47 | 硒 | μg | 0.69 | 14.27 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.53 | 可选择成分 | | | |
| 维生素K ₁ | μg | 1.88 | 39.07 | 肌醇 | mg | 3.0 | 61.8 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 514 | 牛磺酸 | mg | 1.7 | 35.3 |
| 维生素B ₂ | μg | 35 | 718 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.5 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.8 | 308.0 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 93.5 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.125 | 2.602 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.5 | 114.1 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 148 | 3069 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.5 | 低聚半乳糖 | g | 0.027 | 0.560 |
| 泛酸 | μg | 157 | 3265 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 4.0 | 83.8 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | μg | 0.73 | 15.19 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸 | g | 0.21 | 4.33 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 124.7 | 甘油三酯 | | | |
| 矿物质 | | | | 叶黄素 | μg | 7.8 | 162.0 |
| 钠 | mg | 6 | 123 | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钾 | mg | 24 | 503 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.3 | 68.2 |
| 铜 | μg | 13.4 | 277.9 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钾、磷酸三钙、磷酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸镁、氯化钾、磷脂。

标签12:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

推荐喂哺表

| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 | |
|-------|---------|------|--------|-----|
| | 温开水（mL） | 乳粉 | 乳粉（次） | |
| | | （g） | （平匙） | |
| 6-12月 | 210 | 31.5 | 7 | 3-4 |

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：较大婴儿配方食品

产品标准代号：GB 10766-2021

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状

保质期：24个月

产地：陕西 咸阳

产品信息及产品资料查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

优利士®

金瑞优®



段

净含量：800克 国食注字 YP20170649

较大婴儿配方羊乳粉

(6-12月龄,2段)

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2078 | 镁 | mg | 1.9 | 40.0 |
| 蛋白质 | g | 0.58 | 12.10 | 铁 | mg | 0.30 | 6.23 |
| 脂肪 | g | 1.18 | 24.60 | 锌 | mg | 0.18 | 3.82 |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.74 | 锰 | μg | 3.02 | 62.80 |
| α-亚麻酸 | mg | 17 | 361 | 钙 | mg | 21 | 442 |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 55.52 | 磷 | mg | 14 | 292 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 4.5 | 93.5 |
| 维生素A | μg RE | 23 | 468 | 氯 | mg | 19 | 405 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.47 | 硒 | μg | 0.69 | 14.27 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.53 | 可选择成分 | | | |
| 维生素K ₁ | μg | 1.88 | 39.07 | 肌醇 | mg | 3.0 | 61.8 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 514 | 牛磺酸 | mg | 1.7 | 35.3 |
| 维生素B ₂ | μg | 35 | 718 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.5 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.8 | 308.0 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 93.5 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.125 | 2.602 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.5 | 114.1 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 148 | 3069 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.5 | 低聚半乳糖 | g | 0.027 | 0.560 |
| 泛酸 | μg | 157 | 3265 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 4.0 | 83.8 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | μg | 0.73 | 15.19 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸 | | | |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 124.7 | 甘油三酯 | g | 0.21 | 4.33 |
| 矿物质 | | | | 叶黄素 | μg | 7.8 | 162.0 |
| 钠 | mg | 6 | 123 | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钾 | mg | 24 | 503 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.3 | 68.2 |
| 铜 | μg | 13.4 | 277.9 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油酯、核桃油、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育醇(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、葡萄糖胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、磷酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸镁、氯化钾、碘化钾。





6 949008 404349

标签13:

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表的指示，加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

产品信息及产品资料查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

推荐喂哺表

| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 |
|-------|-------------|----------------|--------|
| | 温开水 (mL) | 乳粉 (g) (平匙) | |
| 12个月起 | 210 | 31.5 | 7 |

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品
产品标准代号：GB 10767-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳

优利士®

金瑞优®



段

净含量:100克 国食注字 YP20170650
幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|-------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2053 | 铁 | mg | 0.30 | 6.16 |
| 蛋白质 | g | 0.74 | 15.20 | 锌 | mg | 0.16 | 3.21 |
| 脂肪 | g | 1.17 | 24.00 | 钙 | mg | 25 | 521 |
| 亚油酸 | g | 0.09 | 1.90 | 磷 | mg | 17 | 349 |
| α-亚麻酸 | mg | 12 | 246 | 碘 | μg | 2.5 | 51.5 |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 52.25 | 氯 | mg | 24 | 499 |
| 维生素 | | | | 可选择成分 | | | |
| 维生素A | μg RE | 23 | 462 | 硒 | μg | 0.75 | 15.32 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.32 | 胆碱 | mg | 6.0 | 123.6 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.26 | 5.27 | 锰 | μg | 3.31 | 68.05 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.93 | 39.63 | 肌醇 | mg | 3.1 | 63.3 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 518 | 牛磺酸 | mg | 1.8 | 37.9 |
| 维生素B ₂ | μg | 35 | 710 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.5 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.9 | 305.1 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 2.9 | 60.2 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.127 | 2.608 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 4.6 | 94.9 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 150 | 3086 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.7 | 低聚半乳糖 | g | 0.028 | 0.575 |
| 泛酸 | μg | 164 | 3376 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 3.9 | 80.0 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.62 |
| 生物素 | μg | 0.78 | 16.01 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.15 | 3.00 |
| 矿物质 | | | | 叶黄素 | μg | 7.9 | 162.0 |
| 钠 | mg | 7 | 151 | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钾 | mg | 29 | 595 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.9 | 80.5 |
| 铜 | μg | 13.8 | 282.4 | | | | |
| 镁 | mg | 1.9 | 39.0 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核桃油、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、磷脂。

生羊乳加工

标签14:

奶具消毒及食用方法

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45°C左右。

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉，只可用专用量匙。

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议，不当配制和使用不当可能引起健康危害！

推荐喂哺表

| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 | |
|-------|----------|----------|--------|---|
| | 温开水 (mL) | 乳粉 | 乳粉 (次) | |
| | | (E) (平匙) | | |
| 12个月起 | 210 | 31.5 | 7 | 3 |

说明：每平匙乳粉约4.5g

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品

产品属性：乳基粉状

产品标准代号：GB 10767-2021

保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业集团有限公司 产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产日期号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

产品信息及产品质量查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

优利士®

金瑞优®

3

段

净含量: 300克 国食注字 YP20170650

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄, 3段)

| 营养成分表 | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|-------------------|----|--------|-------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2053 | 铁 | mg | 0.30 | 6.16 |
| 蛋白质 | g | 0.74 | 15.20 | 锌 | mg | 0.16 | 3.21 |
| 脂肪 | g | 1.17 | 24.00 | 钙 | mg | 25 | 521 |
| 亚油酸 | g | 0.09 | 1.90 | 磷 | mg | 17 | 349 |
| α-亚麻酸 | mg | 12 | 246 | 碘 | μg | 2.5 | 51.5 |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 52.25 | 氯 | mg | 24 | 499 |
| 维生素 | | | | 可适成分 | | | |
| 维生素A | μg RE | 23 | 462 | 硒 | μg | 0.75 | 15.32 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.32 | 胆碱 | mg | 6.0 | 123.6 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.26 | 5.27 | 锰 | μg | 3.31 | 68.05 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.93 | 39.63 | 肌醇 | mg | 3.1 | 63.3 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 518 | 牛磺酸 | mg | 1.8 | 37.9 |
| 维生素B ₂ | μg | 35 | 710 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.5 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.9 | 305.1 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 2.9 | 60.2 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.127 | 2.608 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 4.6 | 94.9 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 150 | 3086 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.7 | 低聚半乳糖 | g | 0.028 | 0.575 |
| 泛酸 | μg | 164 | 3376 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 3.9 | 80.0 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.62 |
| 生物素 | μg | 0.78 | 16.01 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.15 | 3.00 |
| 矿物质 | | | | 叶黄素 | μg | 7.9 | 162.0 |
| 钠 | mg | 7 | 151 | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钾 | mg | 29 | 595 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.9 | 80.5 |
| 铜 | μg | 13.8 | 282.4 | | | | |
| 镁 | mg | 1.9 | 39.0 | | | | |

说明:每100mL奶含乳粉13.5g。

配料表

生牛乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、核桃油、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氧化亚铁、醋酸钙黄原(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-磷酸生育醇(维生素E)、植物甲萘酚(维生素K₁)、L-抗坏血酸钙(维生素C)、盐硫酸胺素(维生素B₆)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₁₂)、氰钴胺(维生素B₁)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸钾、硫酸钾、磷酸钾、亚硒酸盐、硫酸锰、碘酸钾、碘

标签15:

奶具消毒及食用方法

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

依照婴幼儿年龄及推荐哺喂表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

再依推荐哺喂表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐哺喂表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

推荐喂哺表

| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 | |
|-------|----------|------|--------|--------|
| | 温开水 (mL) | 乳粉 | | 乳粉 (次) |
| | | (g) | (平匙) | |
| 12个月起 | 210 | 31.5 | 7 | 3 |

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品

产品属性：乳基粉状

产品标准代号：GB 10767-2021

保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司 产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产日期

食品生产许可证编号：SC12961042400829

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

产品信息及产品质量查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-9998

6 949008 404844

优利士®

金瑞优®

3

段

净含量: 350克 国食注字 YP20170650

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄, 3段)

| 营养成分表 | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------|----|--------|-------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2053 | 铁 | mg | 0.30 | 6.16 |
| 蛋白质 | g | 0.74 | 15.20 | 锌 | mg | 0.16 | 3.21 |
| 脂肪 | g | 1.17 | 24.00 | 钙 | mg | 25 | 521 |
| 亚油酸 | g | 0.09 | 1.90 | 磷 | mg | 17 | 349 |
| α-亚麻酸 | mg | 12 | 246 | 碘 | μg | 2.5 | 51.5 |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 52.25 | 氯 | mg | 24 | 499 |
| 维生素 | | | | 可选择成分 | | | |
| 维生素A | μg RE | 23 | 462 | 硒 | μg | 0.75 | 15.32 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.32 | 胆碱 | mg | 6.0 | 123.6 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.26 | 5.27 | 锰 | μg | 3.31 | 68.05 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.93 | 39.63 | 肌醇 | mg | 3.1 | 63.3 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 518 | 牛磺酸 | mg | 1.8 | 37.9 |
| 维生素B ₂ | μg | 35 | 710 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.5 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.9 | 305.1 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 2.9 | 60.22 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.127 | 2.608 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 4.6 | 94.9 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 150 | 3086 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.7 | 低聚半乳糖 | g | 0.028 | 0.575 |
| 泛酸 | μg | 164 | 3376 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 3.9 | 80.0 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.62 |
| 生物素 | μg | 0.78 | 16.01 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸 | g | 0.15 | 3.00 |
| 矿物质 | | | | 甘油二酯 | | | |
| 钠 | mg | 7 | 151 | 叶黄素 | μg | 7.9 | 162.0 |
| 钾 | mg | 29 | 595 | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 铜 | μg | 13.8 | 282.4 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.9 | 80.5 |
| 镁 | mg | 1.9 | 39.0 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

标签16:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉，只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议，不当配制和使用不当可能引起健康危害！

推荐喂哺表

| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 | |
|-------|----------|----------------|--------|--|
| | 温开水 (mL) | 乳粉 (g) (平匙) | 乳粉 (次) | |
| 12个月起 | 210 | 31.5 7 | 3 | |

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品

产品属性：乳基粉状

产品标准代号：GB 10767-2021

保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司

产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

产品信息及产品资料查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

优利士®

金瑞优®

3

段

净含量: 400克 国食注字 YP20170650

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄, 3段)

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|-------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2053 | 铁 | mg | 0.30 | 6.16 |
| 蛋白质 | g | 0.74 | 15.20 | 锌 | mg | 0.16 | 3.21 |
| 脂肪 | g | 1.17 | 24.00 | 钙 | mg | 25 | 521 |
| 亚油酸 | g | 0.09 | 1.90 | 磷 | mg | 17 | 349 |
| α-亚麻酸 | mg | 12 | 246 | 碘 | μg | 2.5 | 51.5 |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 52.25 | 氯 | mg | 24 | 499 |
| 维生素 | | | | 可选择成分 | | | |
| 维生素A | μg RE | 23 | 462 | 硒 | μg | 0.75 | 15.32 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.32 | 胆碱 | mg | 6.0 | 123.6 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.26 | 5.27 | 锰 | μg | 3.31 | 68.05 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.93 | 39.63 | 肌醇 | mg | 3.1 | 63.3 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 518 | 牛磺酸 | mg | 1.8 | 37.9 |
| 维生素B ₂ | μg | 35 | 710 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.5 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.9 | 305.1 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 2.9 | 60.2 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.127 | 2.608 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 4.6 | 94.9 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 150 | 3086 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.7 | 低聚半乳糖 | g | 0.028 | 0.575 |
| 泛酸 | μg | 164 | 3376 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 3.9 | 80.0 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.62 |
| 生物素 | μg | 0.78 | 16.01 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.15 | 3.00 |
| 矿物质 | | | | 叶黄素 | μg | 7.9 | 162.0 |
| 钠 | mg | 7 | 151 | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钾 | mg | 29 | 595 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.9 | 80.5 |
| 铜 | μg | 13.8 | 282.4 | | | | |
| 镁 | mg | 1.9 | 39.0 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、核桃油、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、脂酰视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、磷脂。

生羊乳加工

标签17:

奶具消毒及使用方法

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准备份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

再依**推荐喂哺表**指示加入准备份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

振荡奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用喂哺内专用量匙，建议按照**推荐喂哺表**用量冲泡乳粉，请勿随意改变冲泡比例，除非有专业人士建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

推荐喂哺表

| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 | |
|-------|----------|------|--------|--------|
| | 温开水 (mL) | 乳粉 | | 乳粉 (次) |
| | | (g) | (平匙) | |
| 12个月起 | 210 | 31.5 | 7 | 3 |

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品

产品属性：乳基粉状

产品标准代号：GB 10767-2021

保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司

产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县锦汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品信息及产品资料查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

优利士®

金瑞优®

3

段

净含量: 700克 国食注字 YP20170650

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄, 3段)

| 营养成分表 | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|-----------------|----|--------|-------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2053 | 铁 | mg | 0.30 | 6.16 |
| 蛋白质 | g | 0.74 | 15.20 | 锌 | mg | 0.16 | 3.21 |
| 脂肪 | g | 1.17 | 24.00 | 钙 | mg | 25 | 521 |
| 亚油酸 | g | 0.09 | 1.90 | 磷 | mg | 17 | 349 |
| α-亚麻酸 | mg | 12 | 246 | 碘 | μg | 2.5 | 51.5 |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 52.25 | 氯 | mg | 24 | 499 |
| 维生素 | | | | 可选择成分 | | | |
| 维生素A | μg RE | 23 | 462 | 硒 | μg | 0.75 | 15.32 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.32 | 胆碱 | mg | 6.0 | 123.6 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.26 | 5.27 | 锰 | μg | 3.31 | 68.05 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.93 | 39.63 | 肌醇 | mg | 3.1 | 63.3 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 518 | 牛磺酸 | mg | 1.8 | 37.9 |
| 维生素B ₂ | μg | 35 | 710 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.5 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.9 | 305.1 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 2.9 | 60.2 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.127 | 2.608 | 二十二碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 4.6 | 94.9 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 150 | 3086 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.7 | 低聚半乳糖 | g | 0.028 | 0.575 |
| 泛酸 | μg | 164 | 3376 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 3.9 | 80.0 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.62 |
| 生物素 | μg | 0.78 | 16.01 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸 | g | 0.15 | 3.00 |
| 矿物质 | | | | 甘油三酯 | | | |
| 钠 | mg | 7 | 151 | 叶黄素 | μg | 7.9 | 162.0 |
| 钾 | mg | 29 | 595 | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 铜 | μg | 13.8 | 282.4 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.9 | 80.5 |
| 镁 | mg | 1.9 | 39.0 | | | | |

说明:每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生乳乳、脱盐生乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸)甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(反发酵)、核桃油、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物源性枝杆葛乳,亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、胆碱视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-磷酸生育醇(维生素E)、植物甲萘酚(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、碘酒。

生乳乳加工

标签18:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

推荐喂哺表

| 月龄 | 每次喂哺份量 | | 每日喂哺次数 | |
|-------|----------|------|--------|---|
| | 温开水 (mL) | 乳粉 | 乳粉 (次) | |
| | | (g) | (平匙) | |
| 12个月起 | 210 | 31.5 | 7 | 3 |

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品

产品标准代号：GB 10767-2021

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状

保质期：24个月

产地：陕西 咸阳

优利士®

金瑞优®



段

净含量: 800克 国食注字 YP20170650

幼儿配方羊乳粉

(12-36月龄, 3段)

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|-------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2053 | 铁 | mg | 0.30 | 6.16 |
| 蛋白质 | g | 0.74 | 15.20 | 锌 | mg | 0.16 | 3.21 |
| 脂肪 | g | 1.17 | 24.00 | 钙 | mg | 25 | 521 |
| 亚油酸 | g | 0.09 | 1.90 | 磷 | mg | 17 | 349 |
| α-亚油酸 | mg | 12 | 246 | 碘 | μg | 2.5 | 51.5 |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 52.25 | 氟 | mg | 24 | 499 |
| 维生素 | | | | 可选择成分 | | | |
| 维生素A | μg RE | 23 | 462 | 硒 | μg | 0.75 | 15.32 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.32 | 胆碱 | mg | 6.0 | 123.6 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.26 | 5.27 | 锰 | μg | 3.31 | 68.05 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.93 | 39.63 | 肌醇 | mg | 3.1 | 63.3 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 518 | 牛磺酸 | mg | 1.8 | 37.9 |
| 维生素B ₂ | μg | 35 | 710 | 左旋肉碱 | mg | 1.5 | 31.5 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.9 | 305.1 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 2.9 | 60.2 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.127 | 2.608 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 4.6 | 94.9 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 150 | 3086 | 膳食纤维 | | | |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.7 | 低聚半乳糖 | g | 0.028 | 0.575 |
| 泛酸 | μg | 164 | 3376 | 低聚果糖 | g | 0.007 | 0.149 |
| 维生素C | mg | 3.9 | 80.0 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.62 |
| 生物素 | μg | 0.78 | 16.01 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.15 | 3.00 |
| 矿物质 | | | | 叶黄素 | μg | 7.9 | 162.0 |
| 钠 | mg | 7 | 151 | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钾 | mg | 29 | 595 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.9 | 80.5 |
| 铜 | μg | 13.8 | 282.4 | | | | |
| 镁 | mg | 1.9 | 39.0 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、核桃油、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、胆碱视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、磷酸。生羊乳加工。

产品信息及资料查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

标签19:

| 营养成分表 | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------|-----------------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 每100kJ 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2096 | 钾 | mg 21 445 |
| 蛋白质 | g | 0.50 | 10.40 | 铜 | μg 17.9 374.7 |
| 脂肪 | g | 1.21 | 25.40 | 镁 | mg 1.7 36.3 |
| 亚油酸 | g | 0.16 | 3.37 | 铁 | mg 0.19 3.95 |
| α-亚麻酸 | mg | 18 | 386 | 锌 | mg 0.18 3.74 |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 56.4 | 锰 | μg 2.6 54.1 |
| 维生素 | | | | 钙 | mg 16 330 |
| 维生素A | μg RE | 18 | 374 | 磷 | mg 11 228 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.58 | 碘 | μg 4.5 94.3 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.25 | 5.14 | 氯 | mg 15 322 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.81 | 37.97 | 硒 | μg 0.90 18.86 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 523 | 可选择成分 | |
| 维生素B ₂ | μg | 39 | 807 | 肌醇 | mg 3.3 68.2 |
| 维生素B ₆ | μg | 15.0 | 314.6 | 牛磺酸 | mg 1.8 37.0 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.131 | 2.743 | 左旋肉碱 | mg 1.3 26.3 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 150 | 3138 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg 4.5 94.3 |
| 叶酸 | μg | 4.3 | 90.4 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg 5.2 109.5 |
| 泛酸 | μg | 161 | 3369 | 膳食纤维 | |
| 维生素C | mg | 4.2 | 87.3 | 低聚半乳糖 | g 0.08 1.68 |
| 生物素 | μg | 0.71 | 14.79 | 低聚果糖 | g 0.04 0.93 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.8 | 核苷酸 | mg 0.6 12.0 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg 1.2 25.0 |
| 钠 | mg | 9 | 183 | 酪蛋白磷酸肽 | mg 2.9 61.7 |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 9:00-18:00 AM08:30 PM05:30



6 949008 406671



净含量:100克 国食注字 YP 20230162

1段
婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、酯化视黄醇、胆钙化醇、*dl-α*-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸亚铁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | | 每天喂哺次数 |
|-------|--------|------|---------|--------|
| | 量匙数量 | 乳粉克数 | 温开水(ml) | |
| 0-1周 | 2 | 9 | 60 | 8 |
| 1-2周 | 3 | 13.5 | 90 | 6 |
| 2-4周 | 4 | 18 | 120 | 5 |
| 1-2个月 | 5 | 22.5 | 150 | 5 |
| 2-4个月 | 6 | 27 | 180 | 5 |
| 4-6个月 | 7 | 31.5 | 210 | 5 |

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确量乳粉。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签20:

| 营养成分表 | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------|-------|--|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | |
| 能量 | kJ | 100 | 2096 | |
| 蛋白质 | g | 0.50 | 10.40 | |
| 脂肪 | g | 1.21 | 25.40 | |
| 亚油酸 | g | 0.16 | 3.37 | |
| α -亚麻酸 | mg | 18 | 386 | |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 56.4 | |
| 维生素 | | | | |
| 维生素A | $\mu\text{g RE}$ | 18 | 374 | |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.58 | |
| 维生素E | $\text{mg } \alpha\text{-TE}$ | 0.25 | 5.14 | |
| 维生素K ₁ | μg | 1.81 | 37.97 | |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 523 | |
| 维生素B ₂ | μg | 39 | 807 | |
| 维生素B ₆ | μg | 15.0 | 314.6 | |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.131 | 2.743 | |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 150 | 3138 | |
| 泛酸 | μg | 4.3 | 90.4 | |
| 叶酸 | μg | 161 | 3369 | |
| 维生素C | mg | 4.2 | 87.3 | |
| 生物素 | μg | 0.71 | 14.79 | |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.8 | |
| 矿物质 | | | | |
| 钾 | mg | 9 | 183 | |
| | | | | |
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | |
| 钾 | mg | 21 | 445 | |
| 铜 | μg | 17.9 | 374.7 | |
| 镁 | mg | 1.7 | 36.3 | |
| 铁 | mg | 0.19 | 3.95 | |
| 锰 | mg | 0.18 | 3.74 | |
| 锰 | μg | 2.6 | 54.1 | |
| 钙 | mg | 16 | 330 | |
| 磷 | mg | 11 | 228 | |
| 碘 | μg | 4.5 | 94.3 | |
| 氯 | mg | 15 | 322 | |
| 硒 | μg | 0.90 | 18.86 | |
| 可选择成分 | | | | |
| 肌醇 | mg | 3.3 | 68.2 | |
| 牛磺酸 | mg | 1.8 | 37.0 | |
| 左旋肉碱 | mg | 1.3 | 26.3 | |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 94.3 | |
| 二十碳五烯酸(ARA) | mg | 5.2 | 109.5 | |
| 膳食纤维 | | | | |
| 低聚乳糖 | g | 0.08 | 1.68 | |
| 低聚果糖 | g | 0.04 | 0.93 | |
| 核苷酸 | mg | 0.6 | 12.0 | |
| 乳铁蛋白 | mg | 1.2 | 25.0 | |
| 酪蛋白磷酸肽 | mg | 2.9 | 61.7 | |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

儲藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者:陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址:陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站:www.ylshi.com
电话:029-35330333
产地:陕西·咸阳
产品类别:婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
产品标准代号:GB10765-2021
食品生产许可证编号:SC12961042400829
保质期:24个月
生产日期及批号:见罐底
检验合格证号:同生产日期批号

400 895 8028
工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



净含量:300克 国食注字 YP20230162

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

配料表

生羊毛、脱盐羊毛清粉、食用植物油和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、桃核油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄醇、胆钙化醇、*dl*- α -醋酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫酸素、核黄素、盐酸吡哆醇、氟铝胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸二钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | | 每天喂 次数 |
|-------|----------|----------|-------------|-----------|
| | 量匙 数量 | 乳粉 克数 | 温开水 (ml) | |
| 0-1周 | 2 | 9 | 60 | 8 |
| 1-2周 | 3 | 13.5 | 90 | 6 |
| 2-4周 | 4 | 18 | 120 | 5 |
| 1-2个月 | 5 | 22.5 | 150 | 5 |
| 2-4个月 | 6 | 27 | 180 | 5 |
| 4-6个月 | 7 | 31.5 | 210 | 5 |

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害：切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前,请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯(奶瓶)中。



5. 用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示: 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品

标签21:

| 营养成分表 | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------|----|--------|-------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2096 | 钾 | mg | 21 | 445 |
| 蛋白质 | g | 0.50 | 10.40 | 铜 | μg | 17.9 | 374.7 |
| 脂肪 | g | 1.21 | 25.40 | 镁 | mg | 1.7 | 36.3 |
| 亚油酸 | g | 0.16 | 3.37 | 铁 | mg | 0.19 | 3.95 |
| α-亚麻酸 | mg | 18 | 386 | 锌 | mg | 0.18 | 3.74 |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 56.4 | 锰 | μg | 2.6 | 54.1 |
| 维生素 | | | | 钙 | mg | 16 | 330 |
| 维生素A | μg RE | 18 | 374 | 磷 | mg | 11 | 228 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.58 | 碘 | μg | 4.5 | 94.3 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.25 | 5.14 | 氯 | mg | 15 | 322 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.81 | 37.97 | 硒 | μg | 0.90 | 18.86 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 523 | 可选择成分 | | | |
| 维生素B ₂ | μg | 39 | 807 | 肌醇 | mg | 3.3 | 68.2 |
| 维生素B ₆ | μg | 15.0 | 314.6 | 牛磺酸 | mg | 1.8 | 37.0 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.131 | 2.743 | 左旋肉碱 | mg | 1.3 | 26.3 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 150 | 3138 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 94.3 |
| 叶酸 | μg | 4.3 | 90.4 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.2 | 109.5 |
| 泛酸 | μg | 161 | 3369 | 膳食纤维 | | | |
| 维生素C | mg | 4.2 | 87.3 | 低聚半乳糖 | g | 0.08 | 1.68 |
| 生物素 | μg | 0.71 | 14.79 | 低聚果糖 | g | 0.04 | 0.93 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.8 | 核苷酸 | mg | 0.6 | 12.0 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg | 1.2 | 25.0 |
| 钠 | mg | 9 | 183 | 酸蛋白磷酸肽 | mg | 2.9 | 61.7 |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业有限公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



6 949008 406640




优能佳®



1段

净含量:400克 国食注字 YP20230162

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、脂酸视黄酯、胆钙化醇、*dl*-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bifidobacterium bifidum B-12、磷。

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | | 每天喂哺次数 |
|-------|--------|------|---------|--------|
| | 量匙数量 | 乳粉克数 | 温开水(ml) | |
| 0-1周 | 2 | 9 | 60 | 8 |
| 1-2周 | 3 | 13.5 | 90 | 6 |
| 2-4周 | 4 | 18 | 120 | 5 |
| 1-2个月 | 5 | 22.5 | 150 | 5 |
| 2-4个月 | 6 | 27 | 180 | 5 |
| 4-6个月 | 7 | 31.5 | 210 | 5 |

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签22:

| 营养成分表 | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|--------------|-----------------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 每100kJ 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2096 | 钾 | mg 21 445 |
| 蛋白质 | g | 0.50 | 10.40 | 铜 | μg 17.9 374.7 |
| 脂肪 | g | 1.21 | 25.40 | 镁 | mg 1.7 36.3 |
| 亚油酸 | g | 0.16 | 3.37 | 铁 | mg 0.19 3.95 |
| α-亚麻酸 | mg | 18 | 386 | 锌 | mg 0.18 3.74 |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 56.4 | 锰 | μg 2.6 54.1 |
| 维生素 | | | | 钙 | mg 16 330 |
| 维生素A | μg RE | 18 | 374 | 磷 | mg 11 228 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.58 | 碘 | μg 4.5 94.3 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.25 | 5.14 | 氯 | mg 15 322 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.81 | 37.97 | 硒 | μg 0.90 18.86 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 523 | 可选择成分 | |
| 维生素B ₂ | μg | 39 | 807 | 肌醇 | mg 3.3 68.2 |
| 维生素B ₆ | μg | 15.0 | 314.6 | 牛磺酸 | mg 1.8 37.0 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.131 | 2.743 | 左旋肉碱 | mg 1.3 26.3 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 150 | 3138 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg 4.5 94.3 |
| 叶酸 | μg | 4.3 | 90.4 | 二十碳四烯酸(ARA) | mg 5.2 109.5 |
| 泛酸 | μg | 161 | 3369 | 膳食纤维 | |
| 维生素C | mg | 4.2 | 87.3 | 低聚半乳糖 | g 0.08 1.68 |
| 生物素 | μg | 0.71 | 14.79 | 低聚果糖 | g 0.04 0.93 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.8 | 核苷酸 | mg 0.6 12.0 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg 1.2 25.0 |
| 钠 | mg | 9 | 183 | 酪蛋白磷酸肽 | mg 2.9 61.7 |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内存食用完。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylshi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 星期一至五 AM08:30 PM05:30



6 949008 404769



净含量:600克 国食注字 YP 20230162

1段
婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

| 配料表 | | 喂哺用量建议表 | | | |
|--|--------------------|----------|-------------|------------|--|
| 月龄 | 每次乳粉用量 量匙 数量 | 乳粉 克数 | 温开水 (ml) | 每天喂哺 次数 | |
| | | | | | |
| 0-1周 | 2 | 9 | 60 | 8 | |
| 1-2周 | 3 | 13.5 | 90 | 6 | |
| 2-4周 | 4 | 18 | 120 | 5 | |
| 1-2个月 | 5 | 22.5 | 150 | 5 | |
| 2-4个月 | 6 | 27 | 180 | 5 | |
| 4-6个月 | 7 | 31.5 | 210 | 5 | |
| 注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。 | | | | | |
| 喂哺及注意事项 | | | | | |
| 请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。 | | | | | |

奶具消毒及调奶方法

1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。

2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。

3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。

4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。

5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。

6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签23:

| 营养成分表 | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------|-----------------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 每100kJ 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2096 | 钾 | mg 21 445 |
| 蛋白质 | g | 0.50 | 10.40 | 铜 | μg 17.9 374.7 |
| 脂肪 | g | 1.21 | 25.40 | 镁 | mg 1.7 36.3 |
| 亚油酸 | g | 0.16 | 3.37 | 铁 | mg 0.19 3.95 |
| α-亚麻酸 | mg | 18 | 386 | 锌 | mg 0.18 3.74 |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 56.4 | 锰 | μg 2.6 54.1 |
| 维生素 | | | | 钙 | mg 16 330 |
| 维生素A | μg RE | 18 | 374 | 磷 | mg 11 228 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.58 | 碘 | μg 4.5 94.3 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.25 | 5.14 | 氯 | mg 15 322 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.81 | 37.97 | 硒 | μg 0.90 18.86 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 523 | 可选择成分 | |
| 维生素B ₂ | μg | 39 | 807 | 肌醇 | mg 3.3 68.2 |
| 维生素B ₆ | μg | 15.0 | 314.6 | 牛磺酸 | mg 1.8 37.0 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.131 | 2.743 | 左旋肉碱 | mg 1.3 26.3 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 150 | 3138 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg 4.5 94.3 |
| 叶酸 | μg | 4.3 | 90.4 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg 5.2 109.5 |
| 泛酸 | μg | 161 | 3369 | 膳食纤维 | |
| 维生素C | mg | 4.2 | 87.3 | 低聚半乳糖 | g 0.08 1.68 |
| 生物素 | μg | 0.71 | 14.79 | 低聚果糖 | g 0.04 0.93 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.8 | 核苷酸 | mg 0.6 12.0 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg 1.2 25.0 |
| 钠 | mg | 9 | 183 | 酪蛋白磷酸肽 | mg 2.9 61.7 |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 周二-周五 AM08:30 PM05:30



优利士®

优能佳®



1段

净含量:700克 国食注字 YP 20230162

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | | 每天喂哺次数 |
|-------|--------|------|---------|--------|
| | 量匙数量 | 乳粉克数 | 温开水(ml) | |
| 0-1周 | 2 | 9 | 60 | 8 |
| 1-2周 | 3 | 13.5 | 90 | 6 |
| 2-4周 | 4 | 18 | 120 | 5 |
| 1-2个月 | 5 | 22.5 | 150 | 5 |
| 2-4个月 | 6 | 27 | 180 | 5 |
| 4-6个月 | 7 | 31.5 | 210 | 5 |

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签24:

| 营养成分表 | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------|-----------------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 每100kJ 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2096 | 钾 | mg 21 445 |
| 蛋白质 | g | 0.50 | 10.40 | 铜 | µg 17.9 374.7 |
| 脂肪 | g | 1.21 | 25.40 | 镁 | mg 1.7 36.3 |
| 亚油酸 | g | 0.16 | 3.37 | 铁 | mg 0.19 3.95 |
| α-亚麻酸 | mg | 18 | 386 | 锌 | mg 0.18 3.74 |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 56.4 | 锰 | µg 2.6 54.1 |
| 维生素 | | | | 钙 | mg 16 330 |
| 维生素A | µg RE | 18 | 374 | 磷 | mg 11 228 |
| 维生素D | µg | 0.60 | 12.58 | 碘 | µg 4.5 94.3 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.25 | 5.14 | 氯 | mg 15 322 |
| 维生素K ₁ | µg | 1.81 | 37.97 | 硒 | µg 0.90 18.86 |
| 维生素B ₁ | µg | 25 | 523 | 可选择成分 | |
| 维生素B ₂ | µg | 39 | 807 | 肌醇 | mg 3.3 68.2 |
| 维生素B ₆ | µg | 15.0 | 314.6 | 牛磺酸 | mg 1.8 37.0 |
| 维生素B ₁₂ | µg | 0.131 | 2.743 | 左旋肉碱 | mg 1.3 26.3 |
| 烟酸(烟酰胺) | µg | 150 | 3138 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg 4.5 94.3 |
| 叶酸 | µg | 4.3 | 90.4 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg 5.2 109.5 |
| 泛酸 | µg | 161 | 3369 | 膳食纤维 | |
| 维生素C | mg | 4.2 | 87.3 | 低聚半乳糖 | g 0.08 1.68 |
| 生物素 | µg | 0.71 | 14.79 | 低聚果糖 | g 0.04 0.93 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.8 | 核苷酸 | mg 0.6 12.0 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg 1.2 25.0 |
| 钠 | mg | 9 | 183 | 酪蛋白磷酸肽 | mg 2.9 61.7 |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 上午08:30 AM08:30 PM05:30



6 949008 406619



净含量:800克 国食注字 YP 20230162

1段
婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | | 每天喂哺次数 |
|-------|--------|------|---------|--------|
| | 量匙数量 | 乳粉克数 | 温开水(ml) | |
| 0-1周 | 2 | 9 | 60 | 8 |
| 1-2周 | 3 | 13.5 | 90 | 6 |
| 2-4周 | 4 | 18 | 120 | 5 |
| 1-2个月 | 5 | 22.5 | 150 | 5 |
| 2-4个月 | 6 | 27 | 180 | 5 |
| 4-6个月 | 7 | 31.5 | 210 | 5 |

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签25:

| 营养成分表 | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------|-----------------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 每100kJ 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2083 | 钾 | mg 25 516 |
| 蛋白质 | g | 0.60 | 12.40 | 铜 | μg 14.3 298.7 |
| 脂肪 | g | 1.20 | 25.00 | 镁 | mg 2.1 44.0 |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.80 | 铁 | mg 0.30 6.25 |
| α-亚麻酸 | mg | 16 | 327 | 锌 | mg 0.20 4.07 |
| 碳水化合物 | g | 2.6 | 54.5 | 锰 | μg 2.90 60.31 |
| 维生素 | | | | 钙 | mg 22 448 |
| 维生素A | μg RE | 23 | 469 | 磷 | mg 15 303 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.50 | 碘 | μg 4.5 93.7 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.24 | 4.93 | 氯 | mg 20 425 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.85 | 38.51 | 硒 | μg 0.66 13.73 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 527 | 可选择成分 | |
| 维生素B ₂ | μg | 32 | 668 | 肌醇 | mg 2.9 60.2 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.7 | 306.6 | 牛磺酸 | mg 1.7 34.8 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.123 | 2.555 | 左旋肉碱 | mg 1.2 24.8 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 149 | 3101 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg 4.5 93.7 |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.5 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg 5.4 112.3 |
| 泛酸 | μg | 158 | 3290 | 膳食纤维 | |
| 维生素C | mg | 4.2 | 87.4 | 低聚半乳糖 | g 0.08 1.68 |
| 生物素 | μg | 0.73 | 15.11 | 低聚果糖 | g 0.04 0.93 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.0 | 核苷酸 | mg 0.6 12.0 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg 1.2 25.0 |
| 钠 | mg | 6 | 127 | 酪蛋白磷酸肽 | mg 3.4 71.3 |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 上午9:00-下午5:00 AM08:30 PM05:30



6 949008 406688



优利士®

优能佳®



2段

净含量:100克 国食注字 YP 20230163

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bifidobacterium bifidum Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | | 每天喂哺次数 |
|--------|--------|------|---------|--------|
| | 量匙数量 | 乳粉克数 | 温开水(ml) | |
| 6-12个月 | 7 | 31.5 | 210 | 3-4 |

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。

标签26:

| 营养成分表 | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|--------------|----|--------|-------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2083 | 钾 | mg | 25 | 516 |
| 蛋白质 | g | 0.60 | 12.40 | 铜 | μg | 14.3 | 298.7 |
| 脂肪 | g | 1.20 | 25.00 | 镁 | mg | 2.1 | 44.0 |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.80 | 铁 | mg | 0.30 | 6.25 |
| α-亚麻酸 | mg | 16 | 327 | 锌 | mg | 0.20 | 4.07 |
| 碳水化合物 | g | 2.6 | 54.5 | 锰 | μg | 2.90 | 60.31 |
| 维生素 | | | | 钙 | mg | 22 | 448 |
| 维生素A | μg RE | 23 | 469 | 磷 | mg | 15 | 303 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.50 | 碘 | μg | 4.5 | 93.7 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.24 | 4.93 | 氯 | mg | 20 | 425 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.85 | 38.51 | 硒 | μg | 0.66 | 13.73 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 527 | 可选择成分 | | | |
| 维生素B ₂ | μg | 32 | 668 | 肌醇 | mg | 2.9 | 60.2 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.7 | 306.6 | 牛磺酸 | mg | 1.7 | 34.8 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.123 | 2.555 | 左旋肉碱 | mg | 1.2 | 24.8 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 149 | 3101 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 93.7 |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.5 | 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 5.4 | 112.3 |
| 泛酸 | μg | 158 | 3290 | 膳食纤维 | | | |
| 维生素C | mg | 4.2 | 87.4 | 低聚半乳糖 | g | 0.08 | 1.68 |
| 生物素 | μg | 0.73 | 15.11 | 低聚果糖 | g | 0.04 | 0.93 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.0 | 核苷酸 | mg | 0.6 | 12.0 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg | 1.2 | 25.0 |
| 钠 | mg | 6 | 127 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.4 | 71.3 |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



6 949008 407425



净含量:300克 国食注字 YP20230163

2段

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种 Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | | 每天喂哺次数 |
|--------|--------|------|---------|--------|
| | 量匙数量 | 乳粉克数 | 温开水(ml) | |
| 6-12个月 | 7 | 31.5 | 210 | 3-4 |

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好剩余的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

标签27:

| 营养成分表 | | | |
|--------------------|------------------|--------|-------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2083 |
| 蛋白质 | g | 0.60 | 12.40 |
| 脂肪 | g | 1.20 | 25.00 |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.80 |
| α -亚麻酸 | mg | 16 | 327 |
| 碳水化合物 | g | 2.6 | 54.5 |
| 维生素 | | | |
| 维生素A | $\mu\text{g RE}$ | 23 | 469 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.50 |
| 维生素E | mg α -TE | 0.24 | 4.93 |
| 维生素K ₁ | mg | 1.85 | 38.51 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 527 |
| 维生素B ₂ | μg | 32 | 668 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.7 | 306.6 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.123 | 2.555 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 149 | 3101 |
| 泛酸 | μg | 3.5 | 72.5 |
| 叶酸 | μg | 158 | 3290 |
| 维生素C | mg | 4.2 | 87.4 |
| 生物素 | mg | 0.73 | 15.11 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.0 |
| 矿物质 | | | |
| 钠 | mg | 6 | 127 |

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|----------------|---------------|--------|-------|
| 钾 | mg | 25 | 516 |
| 铜 | μg | 14.3 | 298.7 |
| 镁 | mg | 2.1 | 44.0 |
| 铁 | mg | 0.30 | 6.25 |
| 锌 | mg | 0.20 | 4.07 |
| 锰 | μg | 2.90 | 60.31 |
| 钙 | mg | 22 | 448 |
| 磷 | mg | 15 | 303 |
| 碘 | μg | 4.5 | 93.7 |
| 氯 | mg | 20 | 425 |
| 硒 | μg | 0.66 | 13.73 |
| 可选择成分 | | | |
| 肌醇 | mg | 2.9 | 60.2 |
| 牛磺酸 | mg | 1.7 | 34.8 |
| 左旋肉碱 | mg | 1.2 | 24.8 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 93.7 |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.4 | 112.3 |
| 膳食纤维 | | | |
| 低聚半乳糖 | g | 0.08 | 1.68 |
| 低聚果糖 | g | 0.04 | 0.93 |
| 核苷酸 | mg | 0.6 | 12.0 |
| 乳铁蛋白 | mg | 1.2 | 25.0 |
| 聚蛋白磷酸肽 | mg | 3.4 | 71.1 |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者:陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址:陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站:www.ylshi.com
电话:029-35330333
产地:陕西·咸阳
产品类别:较大婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
产品标准代号:GB10766-2021
食品生产许可证编号:SC12961042400829
保质期:24个月
生产日期及批号:见罐底
检验合格证号:同生产日期号

 **400 895 8028**
工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



净含量:400克 国食注字 YP20230163

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄, 2段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄醇、胆钙化醇、*dl*- α -醋酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氟铝胶、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸二钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种 Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | | 每天喂 次数 |
|--------|----------|----------|-------------|-----------|
| | 量匙 数量 | 乳粉 克数 | 温开水 (ml) | |
| 6-12个月 | 7 | 31.5 | 210 | 3-4 |

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前,请洗净、擦干双手。



2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5. 用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

标签28:

| 营养成分表 | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|--------------|-----------------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 每100kJ 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2083 | 钾 | mg 25 516 |
| 蛋白质 | g | 0.60 | 12.40 | 铜 | μg 14.3 298.7 |
| 脂肪 | g | 1.20 | 25.00 | 镁 | mg 2.1 44.0 |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.80 | 铁 | mg 0.30 6.25 |
| α-亚麻酸 | mg | 16 | 327 | 锌 | mg 0.20 4.07 |
| 碳水化合物 | g | 2.6 | 54.5 | 锰 | μg 2.90 60.31 |
| 维生素 | | | | 钙 | mg 22 448 |
| 维生素A | μg RE | 23 | 469 | 磷 | mg 15 303 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.50 | 碘 | μg 4.5 93.7 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.24 | 4.93 | 氯 | mg 20 425 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.85 | 38.51 | 硒 | μg 0.66 13.73 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 527 | 可选择成分 | |
| 维生素B ₂ | μg | 32 | 668 | 肌醇 | mg 2.9 60.2 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.7 | 306.6 | 牛磺酸 | mg 1.7 34.8 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.123 | 2.555 | 左旋肉碱 | mg 1.2 24.8 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 149 | 3101 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg 4.5 93.7 |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.5 | 二十碳四烯酸(ARA) | mg 5.4 112.3 |
| 泛酸 | μg | 158 | 3290 | 膳食纤维 | |
| 维生素C | mg | 4.2 | 87.4 | 低聚半乳糖 | g 0.08 1.68 |
| 生物素 | μg | 0.73 | 15.11 | 低聚果糖 | g 0.04 0.93 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.0 | 核苷酸 | mg 0.6 12.0 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg 1.2 25.0 |
| 钠 | mg | 6 | 127 | 酪蛋白磷酸肽 | mg 3.4 71.3 |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylshi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 9:00-18:00 AM08:30 PM05:30



6 949008 404776








净含量:600克 国食注字 YP 20230163

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-维生素生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'胞苷酸二钠、5'鸟苷酸二钠、5'肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | | 每天喂哺次数 |
|--------|--------|------|---------|--------|
| | 量匙数量 | 乳粉克数 | 温开水(ml) | |
| 6-12个月 | 7 | 31.5 | 210 | 3-4 |

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

标签29:

| 营养成分表 | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------|-----------------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 每100kJ 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2083 | 钾 | mg 25 516 |
| 蛋白质 | g | 0.60 | 12.40 | 铜 | μg 14.3 298.7 |
| 脂肪 | g | 1.20 | 25.00 | 镁 | mg 2.1 44.0 |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.80 | 铁 | mg 0.30 6.25 |
| α-亚麻酸 | mg | 16 | 327 | 锌 | mg 0.20 4.07 |
| 碳水化合物 | g | 2.6 | 54.5 | 锰 | μg 2.90 60.31 |
| 维生素 | | | | 钙 | mg 22 448 |
| 维生素A | μg RE | 23 | 469 | 磷 | mg 15 303 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.50 | 碘 | μg 4.5 93.7 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.24 | 4.93 | 氯 | mg 20 425 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.85 | 38.51 | 硒 | μg 0.66 13.73 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 527 | 可选择成分 | |
| 维生素B ₂ | μg | 32 | 668 | 肌醇 | mg 2.9 60.2 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.7 | 306.6 | 牛磺酸 | mg 1.7 34.8 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.123 | 2.555 | 左旋肉碱 | mg 1.2 24.8 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 149 | 3101 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg 4.5 93.7 |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.5 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg 5.4 112.3 |
| 泛酸 | μg | 158 | 3290 | 膳食纤维 | |
| 维生素C | mg | 4.2 | 87.4 | 低聚半乳糖 | g 0.08 1.68 |
| 生物素 | μg | 0.73 | 15.11 | 低聚果糖 | g 0.04 0.93 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.0 | 核苷酸 | mg 0.6 12.0 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg 1.2 25.0 |
| 钠 | mg | 6 | 127 | 酪蛋白磷酸肽 | mg 3.4 71.3 |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10766-2011
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间：AM08:30 PM05:30



6 949008 408231



优利士®

优能佳®



2段

净含量:700克 国食注字 YP20230163

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | | 每天喂哺次数 |
|--------|--------|------|---------|--------|
| | 量匙数量 | 乳粉克数 | 温开水(ml) | |
| 6-12个月 | 7 | 31.5 | 210 | 3-4 |

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

标签30:

| 营养成分表 | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------|----|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 |
| 能量 | kJ | 100 | 2083 | 钾 | mg |
| 蛋白质 | g | 0.60 | 12.40 | 铜 | μg |
| 脂肪 | g | 1.20 | 25.00 | 镁 | mg |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.80 | 铁 | mg |
| α-亚麻酸 | mg | 16 | 327 | 锌 | mg |
| 碳水化合物 | g | 2.6 | 54.5 | 锰 | μg |
| 维生素 | | | | 钙 | mg |
| 维生素A | μg RE | 23 | 469 | 磷 | mg |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.50 | 碘 | μg |
| 维生素E | mg α-TE | 0.24 | 4.93 | 氯 | mg |
| 维生素K ₁ | μg | 1.85 | 38.51 | 硒 | μg |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 527 | 可选择成分 | |
| 维生素B ₂ | μg | 32 | 668 | 肌醇 | mg |
| 维生素B ₆ | μg | 14.7 | 306.6 | 牛磺酸 | mg |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.123 | 2.555 | 左旋肉碱 | mg |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 149 | 3101 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.5 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg |
| 泛酸 | μg | 158 | 3290 | 膳食纤维 | |
| 维生素C | mg | 4.2 | 87.4 | 低聚半乳糖 | g |
| 生物素 | μg | 0.73 | 15.11 | 低聚果糖 | g |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.0 | 核苷酸 | mg |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg |
| 钠 | mg | 6 | 127 | 酪蛋白磷酸肽 | mg |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 上午 08:30 下午 05:30



6 949008 406626



净含量:800克 国食注字 YP 20230163

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

| 配料表 | | 喂哺用量建议表 | | | |
|---|--------|----------|----------|-------------|------------|
| 生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油 (葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大 豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚 果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十 二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸 油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸 生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄 素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟 酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L- 抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸 三钙、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸 镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化 钾、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二 钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'- 尿苷酸二钠）、动物双歧杆菌乳亚种 Bif-07、 动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、磷脂。 | 月龄 | 每次乳粉用量 | | | 每天喂哺 次数 |
| | | 量匙 数量 | 乳粉 克数 | 温开水 (ml) | |
| | | | | | |
| | 6-12个月 | 7 | 31.5 | 210 | 3-4 |
| 注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑 30毫升温开水为标准稀释法。 | | | | | |
| 喂哺及注意事项 | | | | | |
| 请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业 资质人员建议。不当配制和使用不当可能 引起健康危害！切记不要将冲调好喂哺的 奶液留到下次食用。请在保质期内食用。 | | | | | |

奶具消毒及调奶方法

1.在调配乳粉之前，
请洗净、擦干双手。

4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至
45°C左右，将正确量煮开过的
温水(45°C左右)倒入消毒后的奶
杯/奶瓶中。

2.清洗奶瓶/奶瓶、
奶嘴、瓶盖。

5.用优能佳专用量勺，参照喂哺
表加入正确份量乳粉。

3.把奶杯/奶瓶放在
沸水中至少煮5分钟。

6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，
冷却到适合宝宝饮用的温度，可
以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

标签31:

| 营养成分表 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------|----|--------|-------|--|--|--|--|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | | | | |
| 能量 | kJ | 100 | 2067 | 铜 | μg | 14.6 | 302.7 | | | | |
| 蛋白质 | g | 0.73 | 15.00 | 镁 | mg | 2.0 | 41.0 | | | | |
| 脂肪 | g | 1.20 | 24.80 | 铁 | mg | 0.30 | 6.20 | | | | |
| 亚油酸 | g | 0.10 | 2.08 | 锌 | mg | 0.15 | 3.20 | | | | |
| α-亚麻酸 | mg | 12 | 250 | 钙 | mg | 25 | 517 | | | | |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 51.4 | 磷 | mg | 17 | 343 | | | | |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 2.8 | 56.9 | | | | |
| 维生素A | μg RE | 22 | 465 | 氟 | mg | 24 | 492 | | | | |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.40 | 可选择成分 | | | | | | | |
| 维生素E | mg α-TE | 0.23 | 4.70 | 硒 | μg | 0.71 | 14.72 | | | | |
| 维生素K ₁ | μg | 1.88 | 38.96 | 胆碱 | mg | 6.0 | 124.0 | | | | |
| 维生素B ₁ | μg | 26 | 531 | 锰 | μg | 3.09 | 63.88 | | | | |
| 维生素B ₂ | μg | 33 | 684 | 肌醇 | mg | 3.1 | 63.1 | | | | |
| 维生素B ₆ | μg | 14.8 | 305.1 | 牛磺酸 | mg | 1.8 | 37.7 | | | | |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.126 | 2.595 | 左旋肉碱 | mg | 1.2 | 25.4 | | | | |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 151 | 3124 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 2.2 | 45.6 | | | | |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.7 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 3.3 | 68.8 | | | | |
| 泛酸 | μg | 165 | 3413 | 膳食纤维 | | | | | | | |
| 维生素C | mg | 4.1 | 83.9 | 低聚半乳糖 | g | 0.08 | 1.68 | | | | |
| 生物素 | μg | 0.77 | 15.88 | 低聚果糖 | g | 0.04 | 0.93 | | | | |
| 矿物质 | | | | 核苷酸 | mg | 0.6 | 12.0 | | | | |
| 钠 | mg | 7 | 137 | 乳铁蛋白 | mg | 1.1 | 23.5 | | | | |
| 钾 | mg | 28 | 582 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.9 | 81.6 | | | | |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月內食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：幼儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 08:00-18:00 AM08:30 PM05:30



6 949008 406695



净含量:100克 国食注字 YP20230164

3段
幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

| 配料表 | | 喂哺用量建议表 | | | |
|--|---------|---------|---------|-----|--------|
| 生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂）、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、硫酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠）、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。 | 月龄 | 每次乳粉用量 | | | 每天喂哺次数 |
| | 量匙数量 | 乳粉克数 | 温开水（ml） | | |
| | 12-36个月 | 7 | 31.5 | 210 | 3 |
| 注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。 | | | | | |
| 喂哺及注意事项 | | | | | |
| 请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。 | | | | | |
| 生羊乳加工 | | | | | |

| 奶具消毒及调奶方法 | | | |
|-----------|----------------------|--|---|
| | 1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。 | | 4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。 |
| | 2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。 | | 5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。 |
| | 3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。 | | 6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。 |

标签32:

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|--------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2067 | 铜 | μg | 14.6 | 302.7 |
| 蛋白质 | g | 0.73 | 15.00 | 镁 | mg | 2.0 | 41.0 |
| 脂肪 | g | 1.20 | 24.80 | 铁 | mg | 0.30 | 6.20 |
| 亚油酸 | g | 0.10 | 2.08 | 锌 | mg | 0.15 | 3.20 |
| α-亚油酸 | mg | 12 | 250 | 钙 | mg | 25 | 517 |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 51.4 | 磷 | mg | 17 | 343 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 2.8 | 56.9 |
| 维生素A | μg RE | 22 | 465 | 氯 | mg | 24 | 492 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.40 | 可选择成分 | | | |
| 维生素E | mg α-TE | 0.23 | 4.70 | 硒 | μg | 0.71 | 14.72 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.88 | 38.96 | 胆碱 | mg | 6.0 | 124.0 |
| 维生素B ₁ | μg | 26 | 531 | 锰 | μg | 3.09 | 63.88 |
| 维生素B ₂ | μg | 33 | 684 | 肌醇 | mg | 3.1 | 63.1 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.8 | 305.1 | 牛磺酸 | mg | 1.8 | 37.7 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.126 | 2.595 | 左旋肉碱 | mg | 1.2 | 25.4 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 151 | 3124 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 2.2 | 45.6 |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.7 | 二十甾四烯酸(ARA) | mg | 3.3 | 68.8 |
| 泛酸 | μg | 165 | 3413 | 膳食纤维 | | | |
| 维生素C | mg | 4.1 | 83.9 | 低聚半乳糖 | g | 0.08 | 1.68 |
| 生物素 | μg | 0.77 | 15.88 | 低聚果糖 | g | 0.04 | 0.93 |
| 矿物质 | | | | 核苷酸 | mg | 0.6 | 12.0 |
| 钠 | mg | 7 | 137 | 乳铁蛋白 | mg | 1.1 | 23.5 |
| 钾 | mg | 28 | 582 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.9 | 81.6 |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

儲藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完后，请及时紧盖罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者:陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址:陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站:www.ylshi.com
电话:029-35330333
产地:陕西·咸阳
产品类型:幼儿配方食品
产品属性:乳基粉状
产品标准代号:GB10767-2021
食品生产许可证编号:SC12961042400829
保质期:24个月
生产日期及批号:见罐底
检验合格证号:同生产日期号

 **400 895 8028**
工作时间 周一-周五 AM08:30 PM05:30



净含量:300克 国食注字 YP20230164

3段

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核棕油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄醇、胆钙化醇、*d*- α -醋酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

生羊乳加工

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | | 每天喂哺次数 |
|---------|--------|------|---------|--------|
| | 量匙数量 | 乳粉克数 | 温开水(ml) | |
| 12-36个月 | 7 | 31.5 | 210 | 3 |

注：一优能片平兑本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配调或使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲泡好喂哺的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法

1. 在调配乳粉前，请洗净、擦干双手。

2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。

3. 把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。

4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量量开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。

5. 用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。

6. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

标签33:

| 营养成分表 | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------|----|--------|-------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2067 | 铜 | μg | 14.6 | 302.7 |
| 蛋白质 | g | 0.73 | 15.00 | 镁 | mg | 2.0 | 41.0 |
| 脂肪 | g | 1.20 | 24.80 | 铁 | mg | 0.30 | 6.20 |
| 亚油酸 | g | 0.10 | 2.08 | 锌 | mg | 0.15 | 3.20 |
| α-亚麻酸 | mg | 12 | 250 | 钙 | mg | 25 | 517 |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 51.4 | 磷 | mg | 17 | 343 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 2.8 | 56.9 |
| 维生素A | μg RE | 22 | 465 | 氯 | mg | 24 | 492 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.40 | 可选择成分 | | | |
| 维生素E | mg α-TE | 0.23 | 4.70 | 硒 | μg | 0.71 | 14.72 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.88 | 38.96 | 胆碱 | mg | 6.0 | 124.0 |
| 维生素B ₁ | μg | 26 | 531 | 锰 | μg | 3.09 | 63.88 |
| 维生素B ₂ | μg | 33 | 684 | 肌醇 | mg | 3.1 | 63.1 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.8 | 305.1 | 牛磺酸 | mg | 1.8 | 37.7 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.126 | 2.595 | 左旋肉碱 | mg | 1.2 | 25.4 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 151 | 3124 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 2.2 | 45.6 |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.7 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 3.3 | 68.8 |
| 泛酸 | μg | 165 | 3413 | 膳食纤维 | | | |
| 维生素C | mg | 4.1 | 83.9 | 低聚半乳糖 | g | 0.08 | 1.68 |
| 生物素 | μg | 0.77 | 15.88 | 低聚果糖 | g | 0.04 | 0.93 |
| 矿物质 | | | | 核苷酸 | mg | 0.6 | 12.0 |
| 钠 | mg | 7 | 137 | 乳铁蛋白 | mg | 1.1 | 23.5 |
| 钾 | mg | 28 | 582 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.9 | 81.6 |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业有限公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：幼儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 9:00-18:00 AM08:30 PM05:30



6 949008 406664



净含量:400克 国食注字 YP20230164

3段

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、*dl-α*-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、碳酸钙、碳酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

生羊乳加工

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | | 每天喂哺次数 |
|---------|--------|------|---------|--------|
| | 量匙数量 | 乳粉克数 | 温开水(ml) | |
| 12-36个月 | 7 | 31.5 | 210 | 3 |

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

标签34：

| 营养成分表 | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|--------------|----|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 |
| 能量 | kJ | 100 | 2067 | 铜 | μg |
| 蛋白质 | g | 0.73 | 15.00 | 镁 | mg |
| 脂肪 | g | 1.20 | 24.80 | 铁 | mg |
| 亚油酸 | g | 0.10 | 2.08 | 锌 | mg |
| α-亚麻酸 | mg | 12 | 250 | 钙 | mg |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 51.4 | 磷 | mg |
| 维生素 | | | | 碘 | μg |
| 维生素A | μg RE | 22 | 465 | 氯 | mg |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.40 | 可选择成分 | |
| 维生素E | mg α-TE | 0.23 | 4.70 | 硒 | μg |
| 维生素K ₁ | μg | 1.88 | 38.96 | 胆碱 | mg |
| 维生素B ₁ | μg | 26 | 531 | 锰 | μg |
| 维生素B ₂ | μg | 33 | 684 | 肌醇 | mg |
| 维生素B ₆ | μg | 14.8 | 305.1 | 牛磺酸 | mg |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.126 | 2.595 | 左旋肉碱 | mg |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 151 | 3124 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.7 | 二十碳四烯酸(ARA) | mg |
| 泛酸 | μg | 165 | 3413 | 膳食纤维 | |
| 维生素C | mg | 4.1 | 83.9 | 低聚半乳糖 | g |
| 生物素 | μg | 0.77 | 15.88 | 低聚果糖 | g |
| 矿物质 | | | | 核苷酸 | mg |
| 钠 | mg | 7 | 137 | 乳铁蛋白 | mg |
| 钾 | mg | 28 | 582 | 酪蛋白磷酸肽 | mg |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：幼儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



6 949008 404783



净含量:600克 国食注字 YP 20230164

3段
幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

| 配料表 | | 喂哺用量建议表 | | | |
|--|---------|---------|---------|--------|---|
| 月龄 | 每次乳粉用量 | | | 每天喂哺次数 | |
| | 量匙数量 | 乳粉克数 | 温开水(ml) | | |
| | 12-36个月 | 7 | 31.5 | 210 | 3 |
| 注：一优能佳平乳本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。 | | | | | |
| 喂哺及注意事项 | | | | | |
| 请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。 | | | | | |
| 生羊乳加工 | | | | | |

| 奶具消毒及调奶方法 | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------------|---|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。 | 2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。 | 3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。 | 4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。 | 5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。 | 6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。 |

标签35:

| 营养成分表 | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------|----|--------|-------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2067 | 铜 | μg | 14.6 | 302.7 |
| 蛋白质 | g | 0.73 | 15.00 | 镁 | mg | 2.0 | 41.0 |
| 脂肪 | g | 1.20 | 24.80 | 铁 | mg | 0.30 | 6.20 |
| 亚油酸 | g | 0.10 | 2.08 | 锌 | mg | 0.15 | 3.20 |
| α-亚麻酸 | mg | 12 | 250 | 钙 | mg | 25 | 517 |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 51.4 | 磷 | mg | 17 | 343 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 2.8 | 56.9 |
| 维生素A | μg RE | 22 | 465 | 氯 | mg | 24 | 492 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.40 | 可选择成分 | | | |
| 维生素E | mg α-TE | 0.23 | 4.70 | 硒 | μg | 0.71 | 14.72 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.88 | 38.96 | 胆碱 | mg | 6.0 | 124.0 |
| 维生素B ₁ | μg | 26 | 531 | 锰 | μg | 3.09 | 63.88 |
| 维生素B ₂ | μg | 33 | 684 | 肌醇 | mg | 3.1 | 63.1 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.8 | 305.1 | 牛磺酸 | mg | 1.8 | 37.7 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.126 | 2.595 | 左旋肉碱 | mg | 1.2 | 25.4 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 151 | 3124 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 2.2 | 45.6 |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.7 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 3.3 | 68.8 |
| 泛酸 | μg | 165 | 3413 | 膳食纤维 | | | |
| 维生素C | mg | 4.1 | 83.9 | 低聚半乳糖 | g | 0.08 | 1.68 |
| 生物素 | μg | 0.77 | 15.88 | 低聚果糖 | g | 0.04 | 0.93 |
| 矿物质 | | | | 核苷酸 | mg | 0.6 | 12.0 |
| 钠 | mg | 7 | 137 | 乳铁蛋白 | mg | 1.1 | 23.5 |
| 钾 | mg | 28 | 582 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.9 | 81.6 |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：幼儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产日期

400 895 8028
工作时间 上午9:00-下午5:00 AM08:30 PM05:30



6 949008 408248








净含量:700克 国食注字 YP 20230164

3段

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

| 配料表 | | 喂哺用量建议表 | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|----------|-----|--------|---|
| 生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂）、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、 <i>dlt</i> -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠）、动物双歧杆菌乳亚种 Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、磷脂。 | 月龄 | | 每次乳粉用量 | | 每天喂哺次数 | |
| | 量匙数量 | 乳粉克数 | 温开水 (ml) | | | |
| | 12-36个月 | 7 | 31.5 | 210 | | 3 |
| | 注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。 | | | | | |
| | 喂哺及注意事项 | | | | | |
| 请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。 | | | | | | |
| 生羊乳加工 | | | | | | |



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

标签36:

| 营养成分表 | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------|-----------------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 每100kJ 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2067 | 铜 | μg 14.6 302.7 |
| 蛋白质 | g | 0.73 | 15.00 | 镁 | mg 2.0 41.0 |
| 脂肪 | g | 1.20 | 24.80 | 铁 | mg 0.30 6.20 |
| 亚油酸 | g | 0.10 | 2.08 | 锌 | mg 0.15 3.20 |
| α-亚麻酸 | mg | 12 | 250 | 钙 | mg 25 517 |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 51.4 | 磷 | mg 17 343 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg 2.8 56.9 |
| 维生素A | μg RE | 22 | 465 | 氯 | mg 24 492 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.40 | 可选择成分 | |
| 维生素E | mg α-TE | 0.23 | 4.70 | 硒 | μg 0.71 14.72 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.88 | 38.96 | 胆碱 | mg 6.0 124.0 |
| 维生素B ₁ | μg | 26 | 531 | 锰 | μg 3.09 63.88 |
| 维生素B ₂ | μg | 33 | 684 | 肌醇 | mg 3.1 63.1 |
| 维生素B ₆ | μg | 14.8 | 305.1 | 牛磺酸 | mg 1.8 37.7 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.126 | 2.595 | 左旋肉碱 | mg 1.2 25.4 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 151 | 3124 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg 2.2 45.6 |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.7 | 二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg 3.3 68.8 |
| 泛酸 | μg | 165 | 3413 | 膳食纤维 | |
| 维生素C | mg | 4.1 | 83.9 | 低聚半乳糖 | g 0.08 1.68 |
| 生物素 | μg | 0.77 | 15.88 | 低聚果糖 | g 0.04 0.93 |
| 矿物质 | | | | 核苷酸 | mg 0.6 12.0 |
| 钠 | mg | 7 | 137 | 乳铁蛋白 | mg 1.1 23.5 |
| 钾 | mg | 28 | 582 | 酪蛋白磷酸肽 | mg 3.9 81.6 |

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：幼儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10767-2011
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 895 8028
工作时间 9:00-18:00 AM08:30 PM05:30



6 949008 406633



优利士®

优能佳®



3段

净含量:800克 国食注字 YP20230164

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、*dl*-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'胞苷酸二钠、5'鸟苷酸二钠、5'肌苷酸二钠、5'尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

生羊乳加工

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | | 每天喂哺次数 |
|---------|--------|------|---------|--------|
| | 量匙数量 | 乳粉克数 | 温开水(ml) | |
| 12-36个月 | 7 | 31.5 | 210 | 3 |

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

标签37:

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2109 | 钾 | mg | 21 | 448 |
| 蛋白质 | g | 0.49 | 10.27 | 铜 | µg | 17.9 | 377.0 |
| 脂肪 | g | 1.22 | 25.82 | 镁 | mg | 1.6 | 34.7 |
| 亚油酸 | g | 0.16 | 3.46 | 铁 | mg | 0.19 | 4.02 |
| α-亚麻酸 | mg | 20 | 425 | 锌 | mg | 0.18 | 3.73 |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 56.58 | 锰 | µg | 2.49 | 52.43 |
| 维生素 | | | | 钙 | mg | 16 | 330 |
| 维生素A | µg RE | 17 | 367 | 磷 | mg | 10 | 215 |
| 维生素D | µg | 0.60 | 12.65 | 碘 | µg | 4.5 | 94.9 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.79 | 氯 | mg | 15 | 324 |
| 维生素K ₁ | µg | 1.71 | 36.12 | 硒 | µg | 0.90 | 18.98 |
| 维生素B ₁ | µg | 25 | 524 | 可选择成分 | | | |
| 维生素B ₂ | µg | 35 | 734 | 肌醇 | mg | 3.0 | 62.8 |
| 维生素B ₆ | µg | 13.5 | 283.7 | 牛磺酸 | mg | 1.6 | 34.2 |
| 维生素B ₁₂ | µg | 0.124 | 2.620 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 94.9 |
| 烟酸(烟酰胺) | µg | 144 | 3031 | 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 5.2 | 109.6 |
| 叶酸 | µg | 4.3 | 90.5 | 膳食纤维 | | | |
| 泛酸 | µg | 171 | 3615 | 低聚半乳糖 | g | 0.03 | 0.56 |
| 维生素C | mg | 4.3 | 91.3 | 聚葡萄糖 | g | 0.07 | 1.57 |
| 生物素 | µg | 0.69 | 14.51 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.2 | 3.8 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 126.5 | 乳铁蛋白 | mg | 1.5 | 32.6 |
| 矿物质 | | | | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 2.9 | 60.2 |
| 钠 | mg | 9 | 185 | 说明: 每100mL奶液含乳粉13.5g | | | |

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、酪蛋白磷酸肽、酪蛋白磷酸肽(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-脂酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种BI-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

优利士®

贝博儿®



1段

净含量:100克 国食注字YP20230165

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

喂哺用量建议表

| 婴儿月龄 | 每次乳粉用量 | | 每24小时喂哺次数 |
|------|----------|-----|-----------|
| | 温开水量(毫升) | 平匙数 | |
| 0-1周 | 60 | 2 | 8 |
| 1-2周 | 90 | 3 | 6 |
| 2-4周 | 120 | 4 | 5 |
| 1-2月 | 150 | 5 | 5 |
| 2-4月 | 180 | 6 | 5 |
| 4-6月 | 210 | 7 | 5 |

说明: 每平匙净含量约4.5克

温馨提示: 调奶时请使用罐内专用量匙, 建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉, 请勿随意改变冲调比例, 除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害!

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

奶具消毒及食用方法

①



调奶之前请洗手, 彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

②



依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示, 将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③



取下固定在罐盖上的量匙, 量取奶粉, 依照喂哺表的指示, 加入准确份量的奶粉。

④



盖紧瓶盖, 并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧, 并在一个月内用完。



品牌官方网址

www.beiboer.cn

产品咨询热线

400-029-8003

6 949008 404516

标签38:

| 营养成分表 | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|---------------------|-----------------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 每100kJ 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2109 | 钾 | mg 21 448 |
| 蛋白质 | g | 0.49 | 10.27 | 铜 | µg 17.9 377.0 |
| 脂肪 | g | 1.22 | 25.82 | 镁 | mg 1.6 34.7 |
| 亚油酸 | g | 0.16 | 3.46 | 铁 | mg 0.19 4.02 |
| α-亚麻酸 | mg | 20 | 425 | 锌 | mg 0.18 3.73 |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 56.58 | 锰 | µg 2.49 52.43 |
| 维生素 | | | | 钙 | mg 16 330 |
| 维生素A | µg RE | 17 | 367 | 磷 | mg 10 215 |
| 维生素D | µg | 0.60 | 12.65 | 碘 | µg 4.5 94.9 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.79 | 氯 | mg 15 324 |
| 维生素K ₁ | µg | 1.71 | 36.12 | 硒 | µg 0.90 18.98 |
| 维生素B ₁ | µg | 25 | 524 | 可选择成分 | |
| 维生素B ₂ | µg | 35 | 734 | 肌醇 | mg 3.0 62.8 |
| 维生素B ₆ | µg | 13.5 | 283.7 | 牛磺酸 | mg 1.6 34.2 |
| 维生素B ₁₂ | µg | 0.124 | 2.620 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg 4.5 94.9 |
| 烟酸(烟酰胺) | µg | 144 | 3031 | 二十碳四烯酸(ARA) | mg 5.2 109.6 |
| 叶酸 | µg | 4.3 | 90.5 | 膳食纤维 | |
| 泛酸 | µg | 171 | 3615 | 低聚半乳糖 | g 0.03 0.56 |
| 维生素C | mg | 4.3 | 91.3 | 聚葡萄糖 | g 0.07 1.57 |
| 生物素 | µg | 0.69 | 14.51 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g 0.2 3.8 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 126.5 | 乳铁蛋白 | mg 1.5 32.6 |
| 矿物质 | | | | 酪蛋白磷酸肽 | mg 2.9 60.2 |
| 钠 | mg | 9 | 185 | 说明：每100mL奶液含乳粉13.5g | |

| 配料表 | |
|--|--|
| 生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、脂肪酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-脂酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。 | |



净含量:200克 国食注字 YP20230165

1 段

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

| 喂哺用量建议表 | | |
|--|----------|-----|
| 婴儿月龄 | 每次乳粉用量 | |
| | 温开水量(毫升) | 平匙数 |
| 0-1周 | 60 | 2 |
| 1-2周 | 90 | 3 |
| 2-4周 | 120 | 4 |
| 1-2月 | 150 | 5 |
| 2-4月 | 180 | 6 |
| 4-6月 | 210 | 7 |
| 说明：每平匙净含量约4.5克 | | |
| 温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！ 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。 | | |

产品类别：婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

| 奶具消毒及食用方法 | |
|-----------|---|
| ① | 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。 |
| ② | 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。 |
| ③ | 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。 |
| ④ | 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。 |

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内存完。



标签39:

| 营养成分表 | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|---------------------|-----------------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 每100kJ 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2109 | 钾 | mg 21 448 |
| 蛋白质 | g | 0.49 | 10.27 | 铜 | µg 17.9 377.0 |
| 脂肪 | g | 1.22 | 25.82 | 镁 | mg 1.6 34.7 |
| 亚油酸 | g | 0.16 | 3.46 | 铁 | mg 0.19 4.02 |
| α-亚麻酸 | mg | 20 | 425 | 锌 | mg 0.18 3.73 |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 56.58 | 锰 | µg 2.49 52.43 |
| 维生素 | | | | 钙 | mg 16 330 |
| 维生素A | µg RE | 17 | 367 | 磷 | mg 10 215 |
| 维生素D | µg | 0.60 | 12.65 | 碘 | µg 4.5 94.9 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.79 | 氯 | mg 15 324 |
| 维生素K ₁ | µg | 1.71 | 36.12 | 硒 | µg 0.90 18.98 |
| 维生素B ₁ | µg | 25 | 524 | 可选择成分 | |
| 维生素B ₂ | µg | 35 | 734 | 肌醇 | mg 3.0 62.8 |
| 维生素B ₆ | µg | 13.5 | 283.7 | 牛磺酸 | mg 1.6 34.2 |
| 维生素B ₁₂ | µg | 0.124 | 2.620 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg 4.5 94.9 |
| 烟酸(烟酰胺) | µg | 144 | 3031 | 二十碳四烯酸(ARA) | mg 5.2 109.6 |
| 叶酸 | µg | 4.3 | 90.5 | 膳食纤维 | |
| 泛酸 | µg | 171 | 3615 | 低聚半乳糖 | g 0.03 0.56 |
| 维生素C | mg | 4.3 | 91.3 | 聚葡萄糖 | g 0.07 1.57 |
| 生物素 | µg | 0.69 | 14.51 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g 0.2 3.8 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 126.5 | 乳铁蛋白 | mg 1.5 32.6 |
| 矿物质 | | | | 酪蛋白磷酸肽 | mg 2.9 60.2 |
| 钠 | mg | 9 | 185 | 说明：每100mL奶液含乳粉13.5g | |

| 配料表 | |
|--|--|
| 生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油(DHA)、花生四烯酸油(ARA)、酪蛋白磷酸肽、酪蛋白磷酸肽(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。 | |



净含量:300克 国食注字YP20230165

1段

婴儿配方羊乳粉

(0-6月龄,1段)

| 喂哺用量建议表 | | |
|--|----------|-----|
| 婴儿月龄 | 每次乳粉用量 | |
| | 温开水量(毫升) | 平匙数 |
| 0-1周 | 60 | 2 |
| 1-2周 | 90 | 3 |
| 2-4周 | 120 | 4 |
| 1-2月 | 150 | 5 |
| 2-4月 | 180 | 6 |
| 4-6月 | 210 | 7 |
| 说明：每平匙净含量约4.5克 | | |
| 温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！ 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。 | | |

产品类别：婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

品牌官方网址
www.beiboer.cn
产品咨询热线
400-029-8003

| 奶具消毒及食用方法 | |
|-----------|---|
| ① | 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。 |
| ② | 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。 |
| ③ | 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。 |
| ④ | 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。 |

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内存用。



标签40:

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|-------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2109 | 钾 | mg | 21 | 448 |
| 蛋白质 | g | 0.49 | 10.27 | 铜 | µg | 17.9 | 377.0 |
| 脂肪 | g | 1.22 | 25.82 | 镁 | mg | 1.6 | 34.7 |
| 亚油酸 | g | 0.16 | 3.46 | 铁 | mg | 0.19 | 4.02 |
| α-亚麻酸 | mg | 20 | 425 | 锌 | mg | 0.18 | 3.73 |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 56.58 | 锰 | µg | 2.49 | 52.43 |
| 维生素 | | | | 钙 | mg | 16 | 330 |
| 维生素A | µg RE | 17 | 367 | 磷 | mg | 10 | 215 |
| 维生素D | µg | 0.60 | 12.65 | 碘 | µg | 4.5 | 94.9 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.79 | 氯 | mg | 15 | 324 |
| 维生素K ₁ | µg | 1.71 | 36.12 | 硒 | µg | 0.90 | 18.98 |
| 维生素B ₁ | µg | 25 | 524 | 可选择成分 | | | |
| 维生素B ₂ | µg | 35 | 734 | 肌醇 | mg | 3.0 | 62.8 |
| 维生素B ₆ | µg | 13.5 | 283.7 | 牛磺酸 | mg | 1.6 | 34.2 |
| 维生素B ₁₂ | µg | 0.124 | 2.620 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 94.9 |
| 烟酸(烟酰胺) | µg | 144 | 3031 | 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 5.2 | 109.6 |
| 叶酸 | µg | 4.3 | 90.5 | 膳食纤维 | | | |
| 泛酸 | µg | 171 | 3615 | 低聚半乳糖 | g | 0.03 | 0.56 |
| 维生素C | mg | 4.3 | 91.3 | 聚葡萄糖 | g | 0.07 | 1.57 |
| 生物素 | µg | 0.69 | 14.51 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.2 | 3.8 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 126.5 | 乳铁蛋白 | mg | 1.5 | 32.6 |
| 矿物质 | | | | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 2.9 | 60.2 |
| 钠 | mg | 9 | 185 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、酪蛋白磷酸肽、脂酰视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-磷酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

优利士®

贝博儿®

1段

净含量:400克 国食注字 YP20230165

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

喂哺用量建议表

| 婴儿月龄 | 每次乳粉用量 | | 每24小时喂哺次数 |
|------|----------|-----|-----------|
| | 温开水量(毫升) | 平匙数 | |
| 0-1周 | 60 | 2 | 8 |
| 1-2周 | 90 | 3 | 6 |
| 2-4周 | 120 | 4 | 5 |
| 1-2月 | 150 | 5 | 5 |
| 2-4月 | 180 | 6 | 5 |
| 4-6月 | 210 | 7 | 5 |

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

产品类别：婴儿配方食品

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

销售热线：029-81776389

产品属性：乳基粉状

保质期：24个月

产地：陕西 咸阳

产品标准代号：GB 10765-2021

食品生产许可证编号：SC12961042400829

奶具消毒及食用方法

① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③ 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④ 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

品牌官方网址
www.beibaoer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

6 1949008 1404486

标签41:

| 配料表 |
|---|
| 生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D ₃)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。 |

产品类别：婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



| 营养成分表 | | | |
|---------------------|---------|--------|-------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2109 |
| 蛋白质 | g | 0.49 | 10.27 |
| 脂肪 | g | 1.22 | 25.82 |
| 亚油酸 | g | 0.16 | 3.46 |
| α-亚麻酸 | mg | 20 | 425 |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 56.58 |
| 维生素 | | | |
| 维生素A | μg RE | 17 | 367 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.65 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.79 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.71 | 36.12 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 524 |
| 维生素B ₂ | μg | 35 | 734 |
| 维生素B ₆ | μg | 13.5 | 283.7 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.124 | 2.620 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 144 | 3031 |
| 叶酸 | μg | 4.3 | 90.5 |
| 泛酸 | μg | 171 | 3615 |
| 维生素C | mg | 4.3 | 91.3 |
| 生物素 | μg | 0.69 | 14.51 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 126.5 |
| 矿物质 | | | |
| 钠 | mg | 9 | 185 |
| 钾 | mg | 21 | 448 |
| 铜 | μg | 17.9 | 377.0 |
| 镁 | mg | 1.6 | 34.7 |
| 铁 | mg | 0.19 | 4.02 |
| 锌 | mg | 0.18 | 3.73 |
| 锰 | μg | 2.49 | 52.43 |
| 钙 | mg | 16 | 330 |
| 磷 | mg | 10 | 215 |
| 碘 | μg | 4.5 | 94.9 |
| 氯 | mg | 15 | 324 |
| 硒 | μg | 0.90 | 18.98 |
| 可选择成分 | | | |
| 肌醇 | mg | 3.0 | 62.8 |
| 牛磺酸 | mg | 1.6 | 34.2 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 94.9 |
| 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 5.2 | 109.6 |
| 膳食纤维 | | | |
| 低聚半乳糖 | g | 0.03 | 0.56 |
| 聚葡萄糖 | g | 0.07 | 1.57 |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.2 | 3.8 |
| 乳铁蛋白 | mg | 1.5 | 32.6 |
| 酪蛋白磷酸肽 | mg | 2.9 | 60.2 |
| 说明：每100mL奶液含乳粉13.5g | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®

1段

净含量:700克 国食注字YP20230165

婴儿配方羊乳粉

(0-6月龄,1段)

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

①

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

②

依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③

取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④

盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

| 婴儿月龄 | 每次乳粉用量 | | 每24小时喂哺次数 |
|------|----------|-----|-----------|
| | 温开水量(毫升) | 平匙数 | |
| 0-1周 | 60 | 2 | 8 |
| 1-2周 | 90 | 3 | 6 |
| 2-4周 | 120 | 4 | 5 |
| 1-2月 | 150 | 5 | 5 |
| 2-4月 | 180 | 6 | 5 |
| 4-6月 | 210 | 7 | 5 |

说明：每平匙净含量约4.5克。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签42:

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D₃)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷酸。

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2109 |
| 蛋白质 | g | 0.49 | 10.27 |
| 脂肪 | g | 1.22 | 25.82 |
| 亚油酸 | g | 0.16 | 3.46 |
| α-亚麻酸 | mg | 20 | 425 |
| 碳水化合物 | g | 2.7 | 56.58 |
| 维生素 | | | |
| 维生素A | μg RE | 17 | 367 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.65 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.79 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.71 | 36.12 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 524 |
| 维生素B ₂ | μg | 35 | 734 |
| 维生素B ₆ | μg | 13.5 | 283.7 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.124 | 2.620 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 144 | 3031 |
| 叶酸 | μg | 4.3 | 90.5 |
| 泛酸 | μg | 171 | 3615 |
| 维生素C | mg | 4.3 | 91.3 |
| 生物素 | μg | 0.69 | 14.51 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 126.5 |
| 矿物质 | | | |
| 钠 | mg | 9 | 185 |
| 钾 | mg | 21 | 448 |
| 铜 | μg | 17.9 | 377.0 |
| 镁 | mg | 1.6 | 34.7 |
| 铁 | mg | 0.19 | 4.02 |
| 锌 | mg | 0.18 | 3.73 |
| 锰 | μg | 2.49 | 52.43 |
| 钙 | mg | 16 | 330 |
| 磷 | mg | 10 | 215 |
| 碘 | μg | 4.5 | 94.9 |
| 氯 | mg | 15 | 324 |
| 硒 | μg | 0.90 | 18.98 |
| 可选择成分 | | | |
| 肌醇 | mg | 3.0 | 62.8 |
| 牛磺酸 | mg | 1.6 | 34.2 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 94.9 |
| 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 5.2 | 109.6 |
| 膳食纤维 | | | |
| 低聚半乳糖 | g | 0.03 | 0.56 |
| 聚葡萄糖 | g | 0.07 | 1.57 |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.2 | 3.8 |
| 乳铁蛋白 | mg | 1.5 | 32.6 |
| 酪蛋白磷酸肽 | mg | 2.9 | 60.2 |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

产品类别：婴儿配方食品

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

销售热线：029-81776389

产品属性：乳基粉状

保质期：24个月

产地：陕西 咸阳

产品标准代号：GB 10765-2021

食品生产许可证编号：SC12961042400829

6 949008 404424

优利士®

贝博儿®

1段

净含量:800克 国食注字 YP20230165

婴儿配方羊乳粉

(0-6月龄,1段)

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

①

调奶之前请洗手,彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

②

依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示,将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③

取下固定在罐盖上的量匙,量取奶粉,依照喂哺表的指示,加入准确份量的奶粉。

④

盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧,并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

| 婴儿月龄 | 每次乳粉用量 | | 每24小时喂哺次数 |
|------|----------|-----|-----------|
| | 温开水量(毫升) | 平匙数 | |
| 0-1周 | 60 | 2 | 8 |
| 1-2周 | 90 | 3 | 6 |
| 2-4周 | 120 | 4 | 5 |
| 1-2月 | 150 | 5 | 5 |
| 2-4月 | 180 | 6 | 5 |
| 4-6月 | 210 | 7 | 5 |

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙,建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉,请勿随意改变冲调比例,除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害!

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签43:

| 营养成分表 | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|---------------------|-----------------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 每100kJ 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2093 | 钾 | mg 23 488 |
| 蛋白质 | g | 0.58 | 12.10 | 铜 | µg 14.1 294.8 |
| 脂肪 | g | 1.21 | 25.30 | 镁 | mg 2.0 41.5 |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.81 | 铁 | mg 0.30 6.28 |
| α-亚麻酸 | mg | 16 | 340 | 锌 | mg 0.18 3.67 |
| 碳水化合物 | g | 2.6 | 54.97 | 锰 | µg 2.74 57.27 |
| 维生素 | | | | 钙 | mg 21 445 |
| 维生素A | µg RE | 23 | 471 | 磷 | mg 13 280 |
| 维生素D | µg | 0.60 | 12.56 | 碘 | µg 4.5 94.2 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.56 | 氯 | mg 20 421 |
| 维生素K ₁ | µg | 1.75 | 36.60 | 硒 | µg 0.66 13.77 |
| 维生素B ₁ | µg | 25 | 528 | 可选择成分 | |
| 维生素B ₂ | µg | 30 | 627 | 肌醇 | mg 2.7 57.0 |
| 维生素B ₆ | µg | 13.8 | 287.8 | 牛磺酸 | mg 1.6 33.0 |
| 维生素B ₁₂ | µg | 0.117 | 2.458 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg 4.5 94.2 |
| 烟酸(烟酰胺) | µg | 144 | 3005 | 二十碳四烯酸(ARA) | mg 5.4 112.1 |
| 叶酸 | µg | 3.5 | 72.5 | 膳食纤维 | |
| 泛酸 | µg | 170 | 3566 | 低聚半乳糖 | g 0.03 0.56 |
| 维生素C | mg | 4.4 | 91.4 | 聚葡萄糖 | g 0.08 1.57 |
| 生物素 | µg | 0.71 | 14.89 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g 0.1 2.6 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.6 | 乳铁蛋白 | mg 1.6 32.6 |
| 矿物质 | | | | 酪蛋白磷酸肽 | mg 3.3 69.5 |
| 钠 | mg | 6 | 123 | 说明：每100mL奶液含乳粉13.5g | |

| 配料表 | |
|--|--|
| 生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三钙、磷酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。 | |



净含量:100克 国食注字 YP20230166

2段

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

| 喂哺用量建议表 | | | |
|--|--------------|-----|---------------|
| 月龄 | 每次乳粉用量 | | 每24小时 喂哺次数 |
| | 温开水量 (毫升) | 平匙数 | |
| 6-12个月 | 210 | 7 | 3-4 |
| 说明：每平匙净含量约4.5克 | | | |
| 温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！ 6-12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。 | | | |

产品类别：较大婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

品牌官方网址
www.beiboer.cn
产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

①

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

②

依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③

取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④

盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

6 949008 404523

标签44:

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|----------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2093 | 钾 | mg | 23 | 488 |
| 蛋白质 | g | 0.58 | 12.10 | 铜 | µg | 14.1 | 294.8 |
| 脂肪 | g | 1.21 | 25.30 | 镁 | mg | 2.0 | 41.5 |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.81 | 铁 | mg | 0.30 | 6.28 |
| α-亚麻酸 | mg | 16 | 340 | 锌 | mg | 0.18 | 3.67 |
| 碳水化合物 | g | 2.6 | 54.97 | 锰 | µg | 2.74 | 57.27 |
| 维生素 | | | | 钙 | mg | 21 | 445 |
| 维生素A | µg RE | 23 | 471 | 磷 | mg | 13 | 280 |
| 维生素D | µg | 0.60 | 12.56 | 碘 | µg | 4.5 | 94.2 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.56 | 氯 | mg | 20 | 421 |
| 维生素K ₁ | µg | 1.75 | 36.60 | 硒 | µg | 0.66 | 13.77 |
| 维生素B ₁ | µg | 25 | 528 | 可选择成分 | | | |
| 维生素B ₂ | µg | 30 | 627 | 肌醇 | mg | 2.7 | 57.0 |
| 维生素B ₆ | µg | 13.8 | 287.8 | 牛磺酸 | mg | 1.6 | 33.0 |
| 维生素B ₁₂ | µg | 0.117 | 2.458 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 94.2 |
| 烟酸(烟酰胺) | µg | 144 | 3005 | 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 5.4 | 112.1 |
| 叶酸 | µg | 3.5 | 72.5 | 膳食纤维 | | | |
| 泛酸 | µg | 170 | 3566 | 低聚半乳糖 | g | 0.03 | 0.56 |
| 维生素C | mg | 4.4 | 91.4 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | µg | 0.71 | 14.89 | 1,3-二油酰-2-棕榈酰甘油三酯 | g | 0.1 | 2.6 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.6 | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 矿物质 | | | | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.3 | 69.5 |
| 钠 | mg | 6 | 123 | 说明: 每100mL奶液含乳粉13.5g | | | |

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酰-2-棕榈酰甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、酪蛋白磷酸肽、酪蛋白磷酸肽(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

优利士®

贝博儿®

2段

净含量:200克 国食注字 YP20230166

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | 每24小时喂哺次数 |
|--------|----------|-----|-----------|
| | 温开水量(毫升) | 平匙数 | |
| 6-12个月 | 210 | 7 | 3-4 |

说明: 每平匙净含量约4.5克

温馨提示: 调奶时请使用罐内专用量匙, 建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉, 请勿随意改变冲调比例, 除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害!

6-12月龄较大婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

产品类别: 较大婴儿配方食品

生产日期及批号: 见罐底

检验合格证号: 同生产批号

生产者: 陕西优利士乳业有限公司

地址: 陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

销售热线: 029-81776389

产品属性: 乳基粉状

保质期: 24个月

产地: 陕西 咸阳

产品标准代号: GB 10766-2021

食品生产许可证编号: SC12961042400829

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

1 调奶之前请洗手, 彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

2 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示, 将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

3 取下固定在罐盖上的量匙, 量取奶粉, 依照喂哺表的指示, 加入准确份量的奶粉。

4 盖紧瓶盖, 并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧, 并在一个月内存用。

标签45:

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|---------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2093 | 钾 | mg | 23 | 488 |
| 蛋白质 | g | 0.58 | 12.10 | 铜 | µg | 14.1 | 294.8 |
| 脂肪 | g | 1.21 | 25.30 | 镁 | mg | 2.0 | 41.5 |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.81 | 铁 | mg | 0.30 | 6.28 |
| α-亚麻酸 | mg | 16 | 340 | 锌 | mg | 0.18 | 3.67 |
| 碳水化合物 | g | 2.6 | 54.97 | 锰 | µg | 2.74 | 57.27 |
| 维生素 | | | | 钙 | mg | 21 | 445 |
| 维生素A | µg RE | 23 | 471 | 磷 | mg | 13 | 280 |
| 维生素D | µg | 0.60 | 12.56 | 碘 | µg | 4.5 | 94.2 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.56 | 氯 | mg | 20 | 421 |
| 维生素K ₁ | µg | 1.75 | 36.60 | 硒 | µg | 0.66 | 13.77 |
| 维生素B ₁ | µg | 25 | 528 | 可选择成分 | | | |
| 维生素B ₂ | µg | 30 | 627 | 肌醇 | mg | 2.7 | 57.0 |
| 维生素B ₆ | µg | 13.8 | 287.8 | 牛磺酸 | mg | 1.6 | 33.0 |
| 维生素B ₁₂ | µg | 0.117 | 2.458 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 94.2 |
| 烟酸(烟酰胺) | µg | 144 | 3005 | 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 5.4 | 112.1 |
| 叶酸 | µg | 3.5 | 72.5 | 膳食纤维 | | | |
| 泛酸 | µg | 170 | 3566 | 低聚半乳糖 | g | 0.03 | 0.56 |
| 维生素C | mg | 4.4 | 91.4 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | µg | 0.71 | 14.89 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.1 | 2.6 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.6 | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 矿物质 | | | | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.3 | 69.5 |
| 钠 | mg | 6 | 123 | 说明：每100mL奶液含乳粉13.5g | | | |

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、胆碱、维生素A、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-脂酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三钙、碳酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

优利士®

贝博儿®



2段

净含量:300克 国食注字YP20230166

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | 每24小时 喂哺次数 |
|--------|--------------|-----|---------------|
| | 温开水量 (毫升) | 平匙数 | |
| 6-12个月 | 210 | 7 | 3-4 |

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
6-12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

奶具消毒及食用方法

①



调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

②



依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③



取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④



盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内存用。



品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

6 949008 408484



标签46:

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|-------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2093 | 钾 | mg | 23 | 488 |
| 蛋白质 | g | 0.58 | 12.10 | 铜 | µg | 14.1 | 294.8 |
| 脂肪 | g | 1.21 | 25.30 | 镁 | mg | 2.0 | 41.5 |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.81 | 铁 | mg | 0.30 | 6.28 |
| α-亚麻酸 | mg | 16 | 340 | 锌 | mg | 0.18 | 3.67 |
| 碳水化合物 | g | 2.6 | 54.97 | 锰 | µg | 2.74 | 57.27 |
| 维生素 | | | | 钙 | mg | 21 | 445 |
| 维生素A | µg RE | 23 | 471 | 磷 | mg | 13 | 280 |
| 维生素D | µg | 0.60 | 12.56 | 碘 | µg | 4.5 | 94.2 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.56 | 氯 | mg | 20 | 421 |
| 维生素K ₁ | µg | 1.75 | 36.60 | 硒 | µg | 0.66 | 13.77 |
| 维生素B ₁ | µg | 25 | 528 | 可选择成分 | | | |
| 维生素B ₂ | µg | 30 | 627 | 肌醇 | mg | 2.7 | 57.0 |
| 维生素B ₆ | µg | 13.8 | 287.8 | 牛磺酸 | mg | 1.6 | 33.0 |
| 维生素B ₁₂ | µg | 0.117 | 2.458 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 94.2 |
| 烟酸(烟酰胺) | µg | 144 | 3005 | 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 5.4 | 112.1 |
| 叶酸 | µg | 3.5 | 72.5 | 膳食纤维 | | | |
| 泛酸 | µg | 170 | 3566 | 低聚半乳糖 | g | 0.03 | 0.56 |
| 维生素C | mg | 4.4 | 91.4 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | µg | 0.71 | 14.89 | 1,3-二油酸-2-萜烯酸甘油三酯 | g | 0.1 | 2.6 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.6 | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 矿物质 | | | | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.3 | 69.5 |
| 钠 | mg | 6 | 123 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-萜烯生育酚(维生素E)、植物甲萘酚(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氟钴胺(维生素B₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

优利士®

贝博儿®

2段

净含量:400克 国食注字 YP20230166

较大婴儿配方羊乳粉(6-12月龄,2段)

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | 每24小时喂哺次数 |
|--------|----------|-----|-----------|
| | 温开水量(毫升) | 平匙数 | |
| 6-12个月 | 210 | 7 | 3-4 |

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

6-12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

奶具消毒及食用方法

① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残留。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③ 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④ 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

6 949008 404493

产品类别：较大婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

标签47:

配料表

生乳牛、脱脂羊乳清粉、乳糖、食用植物油和(1,3-二甘油酯)-棕榈酸甘油二酯、葵花籽油、椰子油、大豆油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓糖干澄清白粉、十二碳六烯酸甘油酯(DHA)、花生四烯酸甘油酯(ARA)、酸酐白磷酸盐、醋酸钙黄曲霉(维生素A)、胆钙三醇(维生素D₃)、dl-α-酮酸生育酚(维生素E)、植物甲素酮(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、β-胡萝卜素(维生素A)、肌醇、烟酰胺(维生素B₃)、吡哆醇(维生素B₆)、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三甲氧磷、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锰、硫酸铝、硫酸锌、碘酸钾、硫酸镁、硫酸钡、硫酸镍、硫酸钴、硫酸镍、硫酸银、硫酸镉、硫酸铊、硫酸铋、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Hn019、磷脂。

产品类别：较大婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县昌汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|-------------------------------|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2093 |
| 蛋白质 | g | 0.58 | 12.10 |
| 脂肪 | g | 1.21 | 25.30 |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.81 |
| α -亚麻酸 | mg | 16 | 340 |
| 碳水化合物 | g | 2.6 | 54.97 |
| 维生素 | | | |
| 维生素A | $\mu\text{g RE}$ | 23 | 471 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.56 |
| 维生素E | $\text{mg } \alpha\text{-TE}$ | 0.27 | 5.6 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.75 | 35.60 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 528 |
| 维生素B ₂ | μg | 30 | 627 |
| 维生素B ₆ | μg | 13.8 | 287.8 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.117 | 2.458 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 144 | 3005 |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.5 |
| 泛酸 | μg | 170 | 3566 |
| 维生素C | mg | 4.4 | 91.4 |
| 生物素 | μg | 0.71 | 14.9 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.6 |
| 矿物质 | | | |
| 钠 | mg | 6 | 123 |
| 钾 | mg | 23 | 488 |
| 钙 | μg | 14.1 | 294.8 |
| 镁 | mg | 2.0 | 41.5 |
| 铁 | mg | 0.30 | 62.8 |
| 锌 | mg | 0.18 | 3.67 |
| 锰 | μg | 2.74 | 57.27 |
| 铜 | μg | 21 | 445 |
| 磷 | mg | 13 | 280 |
| 碘 | μg | 4.5 | 94.2 |
| 氯 | μg | 20 | 421 |
| 硒 | μg | 0.66 | 13.77 |
| 可选择成分 | | | |
| 肌醇 | mg | 2.7 | 57.0 |
| 牛磺酸 | mg | 1.6 | 33.0 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 94.2 |
| 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 5.4 | 112.1 |
| 膳食纤维 | | | |
| 低聚半乳糖 | g | 0.03 | 0.56 |
| 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 1,3-二油酰-2-甘油酰甘油三酯 | g | 1.3 | 26.9 |
| 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.3 | 69.5 |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®



净含量:700克 国食注字 YP20230166

2段

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)



品牌官方网址
www.beiboer.cn



产品咨询热线
400-029-8003



奶具消毒及食用方法



调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。



依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示,将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。



取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。



盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | 每24小时 喂哺次数 |
|--------|--------------|-----|---------------|
| | 温开水量 (毫升) | 平匙数 | |
| 6-12个月 | 210 | 7 | 3-4 |

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示: 调奶时请使用罐内专用量匙, 建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉, 请勿随意改变冲调比例, 除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害!

6~12月龄较大婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

标签48:

| 配料表 |
|--|
| 生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、酪蛋白磷酸肽、酪酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三钙、碳酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。 |

产品类别：较大婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



| 营养成分表 | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2093 |
| 蛋白质 | g | 0.58 | 12.10 |
| 脂肪 | g | 1.21 | 25.30 |
| 亚油酸 | g | 0.13 | 2.81 |
| α-亚麻酸 | mg | 16 | 340 |
| 碳水化合物 | g | 2.6 | 54.97 |
| 维生素 | | | |
| 维生素A | μg RE | 23 | 471 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.56 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.27 | 5.56 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.75 | 36.60 |
| 维生素B ₁ | μg | 25 | 528 |
| 维生素B ₂ | μg | 30 | 627 |
| 维生素B ₆ | μg | 13.8 | 287.8 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.117 | 2.458 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 144 | 3005 |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.5 |
| 泛酸 | μg | 170 | 3566 |
| 维生素C | mg | 4.4 | 91.4 |
| 生物素 | μg | 0.71 | 14.89 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 125.6 |
| 矿物质 | | | |
| 钠 | mg | 6 | 123 |
| 钾 | mg | 23 | 488 |
| 铜 | μg | 14.1 | 294.8 |
| 镁 | mg | 2.0 | 41.5 |
| 铁 | mg | 0.30 | 6.28 |
| 锌 | mg | 0.18 | 3.67 |
| 锰 | μg | 2.74 | 57.27 |
| 钙 | mg | 21 | 445 |
| 磷 | mg | 13 | 280 |
| 碘 | μg | 4.5 | 94.2 |
| 氯 | mg | 20 | 421 |
| 硒 | μg | 0.66 | 13.77 |
| 可选择成分 | | | |
| 肌醇 | mg | 2.7 | 57.0 |
| 牛磺酸 | mg | 1.6 | 33.0 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 94.2 |
| 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 5.4 | 112.1 |
| 膳食纤维 | | | |
| 低聚半乳糖 | g | 0.03 | 0.56 |
| 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.1 | 2.6 |
| 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.3 | 69.5 |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®

2段

净含量:800克 国食注字 YP20230166

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

1. 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残留。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
2. 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
3. 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。
4. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | 每24小时喂哺次数 |
|--------|----------|-----|-----------|
| | 温开水量(毫升) | 平匙数 | |
| 6-12个月 | 210 | 7 | 3-4 |

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
6-12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

标签49:

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|-------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2067 | 铜 | μg | 14.4 | 298.6 |
| 蛋白质 | g | 0.72 | 14.80 | 镁 | mg | 1.9 | 38.3 |
| 脂肪 | g | 1.19 | 24.60 | 铁 | mg | 0.30 | 6.20 |
| 亚油酸 | g | 0.11 | 2.25 | 锌 | mg | 0.15 | 3.04 |
| α-亚麻酸 | mg | 12 | 248 | 钙 | mg | 24 | 503 |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 52.27 | 磷 | mg | 17 | 354 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 2.7 | 55.7 |
| 维生素A | μg RE | 23 | 466 | 氯 | mg | 23 | 484 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.40 | 可选择成分 | | | |
| 维生素E | mg α-TE | 0.26 | 5.36 | 硒 | μg | 0.71 | 14.74 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.79 | 37.01 | 胆碱 | mg | 6.0 | 124.0 |
| 维生素B ₁ | μg | 26 | 531 | 锰 | μg | 2.91 | 60.25 |
| 维生素B ₂ | μg | 32 | 659 | 肌醇 | mg | 2.9 | 60.9 |
| 维生素B ₆ | μg | 13.8 | 284.3 | 牛磺酸 | mg | 1.8 | 36.4 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.122 | 2.519 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 1.5 | 30.8 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 147 | 3033 | 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 2.6 | 53.4 |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.7 | 膳食纤维 | | | |
| 泛酸 | μg | 180 | 3723 | 低聚半乳糖 | g | 0.03 | 0.56 |
| 维生素C | mg | 3.9 | 81.5 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | μg | 0.76 | 15.68 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.1 | 2.4 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钠 | mg | 7 | 143 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.9 | 79.6 |
| 钾 | mg | 27 | 560 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D₃)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

生羊乳加工

优利士®

贝博儿®



3段

净含量:100克 国食注字 YP20230167

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | 每24小时喂哺次数 |
|---------|----------|-----|-----------|
| | 温开水量(毫升) | 平匙数 | |
| 12-36个月 | 210 | 7 | 3 |

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

奶具消毒及食用方法



① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。



② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。



③ 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。



④ 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。



品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

产品类别：幼儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



6 949008 404530

标签50:

| 营养成分表 | | | | | | |
|---|---------|--------|-------|---------------------|----|--------------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2067 | 铜 | μg | 14.4 298.6 |
| 蛋白质 | g | 0.72 | 14.80 | 镁 | mg | 1.9 38.3 |
| 脂肪 | g | 1.19 | 24.60 | 铁 | mg | 0.30 6.20 |
| 亚油酸 | g | 0.11 | 2.25 | 锌 | mg | 0.15 3.04 |
| α-亚麻酸 | mg | 12 | 248 | 钙 | mg | 24 503 |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 52.27 | 磷 | mg | 17 354 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 2.7 55.7 |
| 维生素A | μg RE | 23 | 466 | 氯 | mg | 23 484 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.40 | 可选择成分 | | |
| 维生素E | mg α-TE | 0.26 | 5.36 | 硒 | μg | 0.71 14.74 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.79 | 37.01 | 胆碱 | mg | 6.0 124.0 |
| 维生素B ₁ | μg | 26 | 531 | 锰 | μg | 2.91 60.25 |
| 维生素B ₂ | μg | 32 | 659 | 肌醇 | mg | 2.9 60.9 |
| 维生素B ₆ | μg | 13.8 | 284.3 | 牛磺酸 | mg | 1.8 36.4 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.122 | 2.519 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 1.5 30.8 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 147 | 3033 | 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 2.6 53.4 |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.7 | 膳食纤维 | | |
| 泛酸 | μg | 180 | 3723 | 低聚半乳糖 | g | 0.03 0.56 |
| 维生素C | mg | 3.9 | 81.5 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 1.57 |
| 生物素 | μg | 0.76 | 15.68 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.1 2.4 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 32.6 |
| 钠 | mg | 7 | 143 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.9 79.6 |
| 钾 | mg | 27 | 560 | 说明：每100mL奶液含乳粉13.5g | | |
| 配料表 | | | | | | |
| 生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘酚(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、碳酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。 | | | | | | |
| 生羊乳加工 | | | | | | |

优利士®

贝博儿®



3段

净含量:200克 国食注字 YP20230167

幼儿配方羊乳粉

(12-36月龄,3段)

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | 每24小时 喂哺次数 |
|---------|--------------|-----|---------------|
| | 温开水量 (毫升) | 平匙数 | |
| 12-36个月 | 210 | 7 | 3 |

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

奶具消毒及食用方法

①



调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

②



依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③



取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④



盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

6 1949008 404417

标签51:

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|-------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2067 | 铜 | μg | 14.4 | 298.6 |
| 蛋白质 | g | 0.72 | 14.80 | 镁 | mg | 1.9 | 38.3 |
| 脂肪 | g | 1.19 | 24.60 | 铁 | mg | 0.30 | 6.20 |
| 亚油酸 | g | 0.11 | 2.25 | 锌 | mg | 0.15 | 3.04 |
| α-亚麻酸 | mg | 12 | 248 | 钙 | mg | 24 | 503 |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 52.27 | 磷 | mg | 17 | 354 |
| 维生素 | | | | 碘 | μg | 2.7 | 55.7 |
| 维生素A | μg RE | 23 | 466 | 氯 | mg | 23 | 484 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.40 | 可选择成分 | | | |
| 维生素E | mg α-TE | 0.26 | 5.36 | 硒 | μg | 0.71 | 14.74 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.79 | 37.01 | 胆碱 | mg | 6.0 | 124.0 |
| 维生素B ₁ | μg | 26 | 531 | 锰 | μg | 2.91 | 60.25 |
| 维生素B ₂ | μg | 32 | 659 | 肌醇 | mg | 2.9 | 60.9 |
| 维生素B ₆ | μg | 13.8 | 284.3 | 牛磺酸 | mg | 1.8 | 36.4 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.122 | 2.519 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 1.5 | 30.8 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 147 | 3033 | 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 2.6 | 53.4 |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.7 | 膳食纤维 | | | |
| 泛酸 | μg | 180 | 3723 | 低聚半乳糖 | g | 0.03 | 0.56 |
| 维生素C | mg | 3.9 | 81.5 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | μg | 0.76 | 15.68 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.1 | 2.4 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钠 | mg | 7 | 143 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.9 | 79.6 |
| 钾 | mg | 27 | 560 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、酪蛋白磷酸肽、酪蛋白磷酸肽(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-磷酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

生羊乳加工

优利士®

贝博儿®



3段

净含量:300克 国食注字 YP20230167

幼儿配方羊乳粉

(12-36月龄,3段)

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | 每24小时 喂哺次数 |
|---------|--------------|-----|---------------|
| | 温开水量 (毫升) | 平匙数 | |
| 12-36个月 | 210 | 7 | 3 |

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

奶具消毒及食用方法

①



调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

②



依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③



取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④



盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内存完。



品牌官方网址

www.beiboer.cn

产品咨询热线

400-029-8003

6 1949008 1408491

标签52:

营养成分表

| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|-------------------|----|--------|-------|
| 能量 | kJ | 100 | 2067 | 铜 | µg | 14.4 | 298.6 |
| 蛋白质 | g | 0.72 | 14.80 | 镁 | mg | 1.9 | 38.3 |
| 脂肪 | g | 1.19 | 24.60 | 铁 | mg | 0.30 | 6.20 |
| 亚油酸 | g | 0.11 | 2.25 | 锌 | mg | 0.15 | 3.04 |
| α-亚麻酸 | mg | 12 | 248 | 钙 | mg | 24 | 503 |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 52.27 | 磷 | mg | 17 | 354 |
| 维生素 | | | | 碘 | µg | 2.7 | 55.7 |
| 维生素A | µg RE | 23 | 466 | 氯 | mg | 23 | 484 |
| 维生素D | µg | 0.60 | 12.40 | 可选择成分 | | | |
| 维生素E | mg α-TE | 0.26 | 5.36 | 硒 | µg | 0.71 | 14.74 |
| 维生素K ₁ | µg | 1.79 | 37.01 | 胆碱 | mg | 6.0 | 124.0 |
| 维生素B ₁ | µg | 26 | 531 | 锰 | µg | 2.91 | 60.25 |
| 维生素B ₂ | µg | 32 | 659 | 肌醇 | mg | 2.9 | 60.9 |
| 维生素B ₆ | µg | 13.8 | 284.3 | 牛磺酸 | mg | 1.8 | 36.4 |
| 维生素B ₁₂ | µg | 0.122 | 2.519 | 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 1.5 | 30.8 |
| 烟酸(烟酰胺) | µg | 147 | 3033 | 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 2.6 | 53.4 |
| 叶酸 | µg | 3.5 | 72.7 | 膳食纤维 | | | |
| 泛酸 | µg | 180 | 3723 | 低聚半乳糖 | g | 0.03 | 0.56 |
| 维生素C | mg | 3.9 | 81.5 | 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 生物素 | µg | 0.76 | 15.68 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.1 | 2.4 |
| 矿物质 | | | | 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 钠 | mg | 7 | 143 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.9 | 79.6 |
| 钾 | mg | 27 | 560 | | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、酪蛋白磷酸肽、脂酰视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-磷酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

生羊乳加工

优利士®

贝博儿®



3段

净含量:400克 国食注字 YP20230167

幼儿配方羊乳粉

(12-36月龄,3段)

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | 每24小时 喂哺次数 |
|---------|--------------|-----|---------------|
| | 温开水量 (毫升) | 平匙数 | |
| 12-36个月 | 210 | 7 | 3 |

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

奶具消毒及食用方法



① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。



② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。



③ 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。



④ 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

产品类别：幼儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003



6 1949008 404509

标签53:

| 配料表 |
|--|
| 生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸油(ARA)、酪蛋白磷酸肽、维生素A、维生素E、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HNO19、磷脂。 |

生羊乳加工

产品类别：幼儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



| 营养成分表 | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2067 |
| 蛋白质 | g | 0.72 | 14.80 |
| 脂肪 | g | 1.19 | 24.60 |
| 亚油酸 | g | 0.11 | 2.25 |
| α-亚麻酸 | mg | 12 | 248 |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 52.27 |
| 维生素 | | | |
| 维生素A | μg RE | 23 | 466 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.40 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.26 | 5.36 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.79 | 37.01 |
| 维生素B ₁ | μg | 26 | 531 |
| 维生素B ₂ | μg | 32 | 659 |
| 维生素B ₆ | μg | 13.8 | 284.3 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.122 | 2.519 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 147 | 3033 |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.7 |
| 泛酸 | μg | 180 | 3723 |
| 维生素C | mg | 3.9 | 81.5 |
| 生物素 | μg | 0.76 | 15.68 |
| 矿物质 | | | |
| 钠 | mg | 7 | 143 |
| 钾 | mg | 27 | 560 |
| 铜 | μg | 14.4 | 298.6 |
| 镁 | mg | 1.9 | 38.3 |
| 铁 | mg | 0.30 | 6.20 |
| 锌 | mg | 0.15 | 3.04 |
| 钙 | mg | 24 | 503 |
| 磷 | mg | 17 | 354 |
| 碘 | μg | 2.7 | 55.7 |
| 氯 | mg | 23 | 484 |
| 可选择成分 | | | |
| 硒 | μg | 0.71 | 14.74 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 124.0 |
| 锰 | μg | 2.91 | 60.25 |
| 肌醇 | mg | 2.9 | 60.9 |
| 牛磺酸 | mg | 1.8 | 36.4 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 1.5 | 30.8 |
| 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 2.6 | 53.4 |
| 膳食纤维 | | | |
| 低聚半乳糖 | g | 0.03 | 0.56 |
| 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.1 | 2.4 |
| 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.9 | 79.6 |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g



净含量：700克 国食注字 YP20230167

3段
幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)



| 奶具消毒及食用方法 | |
|-----------|---|
| ① | 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残留。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。 |
| ② | 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。 |
| ③ | 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。 |
| ④ | 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。 |

| 贮存条件 | | | |
|---|----------|-----|-----------|
| 置阴凉、干燥处贮存。食用后将罐盖盖紧，并在一个月内用完。 | | | |
| 喂哺用量建议表 | | | |
| 月龄 | 每次乳粉用量 | | 每24小时喂哺次数 |
| | 温开水量(毫升) | 平匙数 | |
| 12-36个月 | 210 | 7 | 3 |
| 说明：每平匙净含量约4.5克 | | | |
| 温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！ | | | |

标签54:

| 配料表 |
|--|
| 生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、酪酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育醇(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。 |

生羊乳加工

产品类别：幼儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



| 营养成分表 | | | |
|---------------------|---------|--------|-------|
| 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
| 能量 | kJ | 100 | 2067 |
| 蛋白质 | g | 0.72 | 14.80 |
| 脂肪 | g | 1.19 | 24.60 |
| 亚油酸 | g | 0.11 | 2.25 |
| α-亚麻酸 | mg | 12 | 248 |
| 碳水化合物 | g | 2.5 | 52.27 |
| 维生素 | | | |
| 维生素A | μg RE | 23 | 466 |
| 维生素D | μg | 0.60 | 12.40 |
| 维生素E | mg α-TE | 0.26 | 5.36 |
| 维生素K ₁ | μg | 1.79 | 37.01 |
| 维生素B ₁ | μg | 26 | 531 |
| 维生素B ₂ | μg | 32 | 659 |
| 维生素B ₆ | μg | 13.8 | 284.3 |
| 维生素B ₁₂ | μg | 0.122 | 2.519 |
| 烟酸(烟酰胺) | μg | 147 | 3033 |
| 叶酸 | μg | 3.5 | 72.7 |
| 泛酸 | μg | 180 | 3723 |
| 维生素C | mg | 3.9 | 81.5 |
| 生物素 | μg | 0.76 | 15.68 |
| 矿物质 | | | |
| 钠 | mg | 7 | 143 |
| 钾 | mg | 27 | 560 |
| 铜 | μg | 14.4 | 298.6 |
| 镁 | mg | 1.9 | 38.3 |
| 铁 | mg | 0.30 | 6.20 |
| 锌 | mg α-TE | 0.15 | 3.04 |
| 钙 | mg | 24 | 503 |
| 磷 | mg | 17 | 354 |
| 氯 | μg | 2.7 | 55.7 |
| 氯 | mg | 23 | 484 |
| 可选择成分 | | | |
| 硒 | μg | 0.71 | 14.74 |
| 胆碱 | mg | 6.0 | 124.0 |
| 锰 | μg | 2.91 | 60.25 |
| 肌醇 | mg | 2.9 | 60.9 |
| 牛磺酸 | mg | 1.8 | 36.4 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 1.5 | 30.8 |
| 二十碳四烯酸(ARA) | mg | 2.6 | 53.4 |
| 膳食纤维 | | | |
| 低聚半乳糖 | g | 0.03 | 0.56 |
| 聚葡萄糖 | g | 0.08 | 1.57 |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g | 0.1 | 2.4 |
| 乳铁蛋白 | mg | 1.6 | 32.6 |
| 酪蛋白磷酸肽 | mg | 3.9 | 79.6 |
| 说明：每100mL奶液含乳粉13.5g | | | |

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g



贝博儿®

3段

净含量：800克 国食注字 YP20230167

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)



品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003



奶具消毒及食用方法

1. 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
2. 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
3. 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。
4. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

| 月龄 | 每次乳粉用量 | | 每24小时喂哺次数 |
|---------|----------|-----|-----------|
| | 温开水量(毫升) | 平匙数 | |
| 12-36个月 | 210 | 7 | 3 |

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

标签55:



标签56:



标签57:

