



附件2: 陕西美力源乳业集团有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签1: 10021270



冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净并擦干手,将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒,用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮沸5分钟,冷却至50-55℃。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉,请勿压紧专用量勺里的奶粉,每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶,摇晃至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐,必须将奶液冷藏并在24小时内食用完,将喂剩下的奶液弃掉。

生产者: 陕西美力源乳业集团有限公司
地址: 陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别: 婴儿配方食品
产品属性及状态: 乳基粉状
生产许可证编号: SC12961043100837
产品标准代码: GB 10765-2021
保质期: 24个月
产地: 陕西·咸阳
邮编: 712200
生产日期及产品批号见罐底

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (mL)	奶粉用量 (平均)
0-2周	8-10	30-90	1-3
2周-1月龄	6-7	90-120	3-4
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5-6	120-180	4-6
4-6月龄	5	180-210	6-7

注意: 每平均约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示:

请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证



6 955801 1119892



爱赋

国食注字 YP20250046



婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

1

净含量: 108克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2040
蛋白质	g	0.57	11.56
脂肪	g	1.21	24.64
亚油酸	g	0.15	3.153
α-亚麻酸	mg	15.93	325.00
碳水化合物	g	2.6	52.6
维生素			
维生素A	μg RE	18	358
维生素D	μg	0.583	11.9
维生素E	mg α-TE	0.20	4.01
维生素K ₁	μg	2.93	59.71
维生素B ₁	μg	25	518
维生素B ₂	μg	52	1051
维生素B ₆	μg	16.9	344.1
维生素B ₁₂	μg	0.083	1.686
烟酸(烟酰胺)	μg	163	3318
叶酸	μg	4.7	95
泛酸	μg	128	2613
维生素C	mg	3.8	76.6
生物素	μg	1.00	20.36
胆碱	mg	5.6	113.3
矿物质			
钠	mg	7.65	156
钾	mg	21	425
铜	μg	15.2	310.4
镁	mg	1.9	38.7
铁	mg	0.17	3.54
锌	mg	0.16	3.332
锰	μg	2.43	49.59
钙	mg	19	380
磷	mg	13	272
碘	μg	5.6	113.3
氯	mg	18	365
硒	μg	0.78	15.97
可选择成分			
肌醇	mg	4.2	85.7
牛磺酸	mg	1.5	30
左旋肉碱	mg	2.1	42.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	98.33
低聚半乳糖	mg	152.99	3121
低聚果糖	mg	40.25	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0295	0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT)	g	0.0088	0.180
1,3-二油酸 2-	mg	220.59	4500
棕榈酸甘油三酯	μg	3.97	80.92
核昔酸	mg	1.15	23.45

注: 即食状态下,每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素;
维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱;
矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

温馨提示:

1. 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2. 喂奶时应抱着宝宝,如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线: 400-600-8670

官方网站: www.sxmlyr.com





标签 2:



冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手,将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒,用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟,冷却至50-55°C。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉,请勿压紧专用量勺里的奶粉,每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐,必须将奶液冷藏并在24小时内食用完,将喂剩下的奶液弃掉。

生产者: 陕西美力源乳业有限公司
地址: 陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别: 婴儿配方食品
产品属性及状态: 乳基粉状
生产许可证编号: SC12961043100837
产品标准代码: GB 10765-2021
保质期: 24个月
产地: 陕西·咸阳
邮编: 712200
生产日期及产品批号见罐底

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (mL)	奶粉用量 (平均)
0-2周	8-10	30-90	1-3
2周-1月龄	6-7	90-120	3-4
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5-6	120-180	4-6
4-6月龄	5	180-210	6-7

注意: 每平均约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示:

请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

本企业已通过质量管理体系(符合ISO9001)体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证



爱赋



婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

国食注字 YP20250046

1段
净含量: 300克

营养成分表

项目	单位	每100 kJ	每100g
能量	kJ	100	2040
蛋白质	g	0.57	11.56
脂肪	g	1.21	24.64
亚油酸	g	0.15	3.153
α -亚麻酸	mg	15.93	325.00
碳水化合物	g	2.6	52.6
维生素			
维生素A	μ g RE	18	358
维生素D	μ g	0.583	11.9
维生素E	mg α -TE	0.20	4.01
维生素K ₁	μ g	2.93	59.71
维生素B ₁	μ g	25	518
维生素B ₂	μ g	52	1051
维生素B ₆	μ g	16.9	344.1
维生素B ₁₂	μ g	0.083	1.686
烟酸(烟酰胺)	μ g	163	3318
叶酸	μ g	4.7	95
泛酸	μ g	128	2613
维生素C	mg	3.8	76.6
生物素	μ g	1.00	20.36
胆碱	mg	5.6	113.3
矿物质			
钠	mg	7.65	156
钾	mg	21	425
铜	μ g	15.2	310.4
镁	mg	1.9	38.7
铁	mg	0.17	3.54
锌	mg	0.16	3.332
锰	μ g	2.43	49.59
钙	mg	19	380
磷	mg	13	272
碘	μ g	5.6	113.3
氯	mg	18	365
硒	μ g	0.78	15.97
可选择成分			
肌醇	mg	4.2	85.7
牛磺酸	mg	1.5	30
左旋肉碱	mg	2.1	42.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	98.33
低聚半乳糖	mg	152.99	3121
低聚果糖	mg	40.25	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0295	0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT)	g	0.0088	0.180
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	220.59	4500
叶黄素	μ g	3.97	80.92
核甘酸	mg	1.15	23.45

注: 即食状态下, 每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核甘酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素;
维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl- α -醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱;
矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠。

温馨提示:

1. 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2. 喂奶时应抱着宝宝, 如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用方法不当可能会影响健康。

服务热线: 400-600-8670

官方网站: www.sxmlyry.com





标签 3:



爱赋

国食注字 YP20250046



冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手,将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒,用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟,冷却至50-55°C。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉,请勿压紧专用量勺里的奶粉,每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐,必须将奶液冷藏并在24小时内食用完,将喂剩下的奶液弃掉。

生产者: 陕西美力源乳业有限公司
地址: 陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别: 婴儿配方食品
产品属性及状态: 乳基粉状
生产许可证编号: SC12961043100837
产品标准代码: GB 10765-2021
保质期: 24个月
产地: 陕西·咸阳
邮编: 712200
生产日期及产品批号见罐底

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (mL)	奶粉用量 (平均)
0-2周	8-10	30-90	1-3
2周-1月龄	6-7	90-120	3-4
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5-6	120-180	4-6
4-6月龄	5	180-210	6-7

注意: 每平均约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示:

请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按要求的奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证



婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)

1 段
净含量: 700克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2040
蛋白质	g	0.57	11.56
脂肪	g	1.21	24.64
亚油酸	g	0.15	3.153
α-亚麻酸	mg	15.93	325.00
碳水化合物	g	2.6	52.6
维生素			
维生素A	μg RE	18	358
维生素D	μg	0.583	11.9
维生素E	mg α-TE	0.20	4.01
维生素K ₁	μg	2.93	59.71
维生素B ₁	μg	25	518
维生素B ₂	μg	52	1051
维生素B ₆	μg	16.9	344.1
维生素B ₁₂	μg	0.083	1.686
烟酸(烟酰胺)	μg	163	3318
叶酸	μg	4.7	95
泛酸	μg	128	2613
维生素C	mg	3.8	76.6
生物素	μg	1.00	20.36
胆碱	mg	5.6	113.3
矿物质			
钠	mg	7.65	156
钾	mg	21	425
铜	μg	15.2	310.4
镁	mg	1.9	38.7
铁	mg	0.17	3.54
锌	mg	0.16	3.332
锰	μg	2.43	49.59
钙	mg	19	380
磷	mg	13	272
碘	μg	5.6	113.3
氯	mg	18	365
硒	μg	0.78	15.97
可选择成分			
肌醇	mg	4.2	85.7
牛磺酸	mg	1.5	30
左旋肉碱	mg	2.1	42.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	98.33
低聚半乳糖	mg	152.99	3121
低聚果糖	mg	40.25	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0295	0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT)	g	0.0088	0.180
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	mg	220.59	4500
叶黄素	μg	3.97	80.92
核苷酸	mg	1.15	23.45

注: 即食状态下, 每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素;
维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱;
矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

温馨提示:

1. 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2. 喂奶时应抱着宝宝, 如有呛咳可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670

网站 www.sxmlyry.com





标签 4:



爱赋

国食注字 YP20250046



冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手,将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒,用沸水煮 5 分钟。
2. 饮用水沸水煮 5 分钟,冷却至 50-55℃。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉,请勿压紧专用量勺里的奶粉,每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶,摇晃至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐,必须将奶液冷藏并在 24 小时内食用完,将剩余的奶液弃掉。

生产者: 陕西美力源乳业有限公司
地址: 陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别: 婴儿配方食品
产品属性及状态: 乳基粉状
生产许可证编号: SC12961043100837
产品标准代码: GB 10765-2021
保质期: 24个月
产地: 陕西 咸阳
邮编: 712200
生产日期及产品批号见罐底

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (mL)	奶粉用量 (平均)
0-2周	8-10	30-90	1-3
2周-1月龄	6-7	90-120	3-4
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5-6	120-180	4-6
4-6月龄	5	180-210	6-7

注意: 每平均约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示:

请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按要求的对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

本企业已通过质量管理(符合 ISO9001)体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证



婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)

1 段
净含量: 800克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2040
蛋白质	g	0.57	11.56
脂肪	g	1.21	24.64
亚油酸	g	0.15	3.153
α-亚麻酸	mg	15.93	325.00
碳水化合物	g	2.6	52.6
维生素A	μg RE	18	358
维生素D	μg	0.583	11.9
维生素E	mg α-TE	0.20	4.01
维生素K	μg	2.93	59.71
维生素B ₁	μg	25	518
维生素B ₂	μg	52	1051
维生素B ₆	μg	16.9	344.1
维生素B ₁₂	μg	0.083	1.686
烟酸(烟酰胺)	μg	163	3318
叶酸	μg	4.7	95
泛酸	μg	128	2613
维生素C	mg	3.8	76.6
生物素	μg	1.00	20.36
胆碱	mg	5.6	113.3
矿物质			
钠	mg	7.65	156
钾	mg	21	425
铜	μg	15.2	310.4
铁	mg	1.9	38.7
镁	mg	0.17	3.54
锌	μg	0.16	3.332
锰	μg	2.43	49.59
钙	mg	19	380
磷	mg	13	272
碘	μg	5.6	113.3
氯	mg	18	365
硒	μg	0.78	15.97
可选择成分			
肌醇	mg	4.2	85.7
牛磺酸	mg	1.5	30
左旋肉碱	mg	2.1	42.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	98.33
低聚半乳糖	mg	152.99	3121
低聚果糖	mg	40.25	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0295	0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT)	g	0.0088	0.180
1,3-二油酸 2-			
棕榈酸甘油三酯	mg	220.59	4500
叶黄素	μg	3.97	80.92
核黄素	mg	1.15	23.45

注: 即食状态下, 每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核黄素(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素;
维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱;
矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠。

温馨提示:

1. 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2. 喂奶时应抱着宝宝, 如有疑虑可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670

官方网站 www.sxmlyry.com





标签 5:



本品含脂肪、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1,3-二油酸-2-酰基甘油三酯、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)和益生元。除含膳食纤维外，不含其他膳食纤维。

冲泡方法



1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手、将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。



2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。



3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。



4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。



5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。



6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂哺剩下的奶液弃掉。



7. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂哺剩下的奶液弃掉。



8. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂哺剩下的奶液弃掉。



9. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂哺剩下的奶液弃掉。



10. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂哺剩下的奶液弃掉。



11. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂哺剩下的奶液弃掉。



12. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂哺剩下的奶液弃掉。



13. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂哺剩下的奶液弃掉。



14. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂哺剩下的奶液弃掉。



15. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂哺剩下的奶液弃掉。



16. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂哺剩下的奶液弃掉。

喂哺用量建议表

较大婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量(mL)	奶粉用量(平均)
6-9月龄	4-5	180-240	6-8
9-12月龄	4	180-210	6-7

注意：每平均约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：

请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员人员的指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

本企业已通过质量管理体系(符合ISO9001)体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证。



爱赋

国食注字：YP20250047



较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄，2段) 2段 净含量：108克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2084
蛋白质	g	0.58	12.06
脂肪	g	1.29	26.84
亚油酸	g	0.18	3.758
α-亚麻酸	mg	19.47	405.68
碳水化合物	g	2.4	49.9
维生素A	μg RE	22	453
维生素D	μg	0.571	11.9
维生素E	mg α-TE	0.20	4.21
维生素K	μg	2.97	61.80
维生素B ₁	μg	25	515
维生素B ₂	μg	48	995
维生素B ₆	μg	16.3	339.1
维生素B ₁₂	μg	0.078	1.630
烟酸(烟酰胺)	μg	160	3326
叶酸	μg	4.3	89
泛酸	μg	126	2622
维生素C	mg	3.7	76.6
生物素	μg	1.01	21.08
胆碱	mg	5.2	109.2
矿物质			
钠	mg	6.29	131
钾	mg	19	406
铜	μg	14.9	310.2
镁	mg	1.9	38.7
铁	mg	0.27	5.62
锌	mg	0.15	3.091
锰	μg	3.14	65.48
钙	mg	21	444
磷	mg	14	287
碘	μg	5.4	112.8
硒	μg	15	321
硝	μg	0.72	14.91
可选择成分			
肌醇	mg	4.0	82.7
牛磺酸	mg	1.5	31
左旋肉碱	mg	2.0	40.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.7	98.33
低聚半乳糖	mg	149.76	3121
低聚果糖	mg	39.40	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0289	0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT)	g	0.0086	0.180
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	167.71	3495
叶黄素	μg	9.71	202.30
核苷酸	mg	1.11	23.20

注：即食状态下，每100mL奶液中含有该产品13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素；维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；矿物质：磷酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

温馨提示：

1. 食用本品时须配合添加辅助食品。
2. 喂奶时应适量给宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670
官方网站 www.sxmlyry.com



标签 6:



本品含乳品、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1,3-二油酸-2-硬脂酰甘油三酯、核苷酸，膳食纤维有助于维持正常的肠道功能，膳食纤维是低聚糖物质。

冲泡方法

1. 冲泡奶粉前应将奶瓶洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶嘴盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿用家用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇晃至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲泡多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喝剩下的奶液弃掉。

生产者：陕西美力源乳业有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性及状态：乳基粉状
生产许可证编号：SC12961043100837
产品标准代码：GB 10766-2021
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
邮编：712200
生产日期及产品批号见罐底

喂哺用量建议表

较大婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (mL)	奶粉用量 (平均)
6-9月龄	4-5	180-240	6-8
9-12月龄	4	180-210	6-7

注意：每平均约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖，开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：

请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲泡方式可能会给您的宝宝带来不适。

本企业已通过质量管理体系(符合ISO9001)体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证



6 953 801 119939



爱赋



国食注字 YP20250047

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄, 2段)

净含量: 300克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2084
蛋白质	g	0.58	12.06
脂肪	g	1.29	26.84
亚油酸	g	0.18	3.758
α-亚麻酸	mg	19.47	405.68
碳水化合物	g	2.4	49.9
维生素			
维生素A	μg RE	22	453
维生素D	μg	0.571	11.9
维生素E	mg α-TE	0.20	4.21
维生素K	μg	2.97	61.80
维生素B ₁	μg	25	515
维生素B ₂	μg	48	995
维生素B ₆	μg	16.3	339.1
维生素B ₁₂	μg	0.078	1.630
烟酸(烟酰胺)	μg	160	3326
叶酸	μg	4.3	89
泛酸	μg	126	2622
维生素C	mg	3.7	76.6
生物素	μg	1.01	21.08
胆碱	mg	5.2	109.2
矿物质			
钠	mg	6.29	131
钾	mg	19	406
钙	mg	14.9	310.2
镁	mg	1.9	38.7
铁	mg	0.27	5.62
锌	mg	0.15	3.091
锰	μg	3.14	65.48
铜	μg	21	444
碘	μg	14	287
硒	μg	5.4	112.8
氯	mg	15	321
磷	mg	0.72	14.91
可选择成分			
肌醇	mg	4.0	82.7
牛磺酸	mg	1.5	31
左旋肉碱	mg	2.0	40.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.7	98.33
低聚半乳糖	mg	149.76	3121
低聚果糖	mg	39.40	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0289	0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT)	g	0.0086	0.180
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	167.71	3495
叶黄素	μg	9.71	202.30
核黄素	mg	1.11	23.20

注：即食状态下，每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素；维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

温馨提示：

1. 食用本品时须配合添加辅助食品。
2. 喂奶时注意宝宝姿势，如有不适可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670

官方网站 www.sxmlyr.com





标签 7:



冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇晃至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。

生产者：陕西美力源乳业有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性及状态：乳基粉状
生产许可证编号：SC12961043100837
产品标准代码：GB 10766-2021
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
邮编：712200
生产日期及产品批号见罐底

喂哺用量建议表

较大婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (mL)	奶粉用量 (平勺)
6-9月龄	4-5	180-240	6-8
9-12月龄	4	180-210	6-7

注意：每平勺约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：

请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求的对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证



爱赋

国食注字 YP20250047

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

净含量: 700克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2084
蛋白质	g	0.58	12.06
脂肪	g	1.29	26.84
亚油酸	g	0.18	3.758
α-亚麻酸	mg	19.47	405.68
碳水化合物	g	2.4	49.9
维生素			
维生素A	μg RE	22	453
维生素D	μg	0.571	11.9
维生素E	mg α-TE	0.20	4.21
维生素K ₁	μg	2.97	61.80
维生素B ₁	μg	25	515
维生素B ₂	μg	48	995
维生素B ₆	μg	16.3	339.1
维生素B ₁₂	μg	0.078	1.630
烟酸(烟酰胺)	μg	160	3326
叶酸	μg	4.3	89
泛酸	μg	126	2622
维生素C	mg	3.7	76.6
生物素	μg	1.01	21.08
胆碱	mg	5.2	109.2
矿物质			
钠	mg	6.29	131
钾	mg	19	406
铜	μg	14.9	310.2
镁	mg	1.9	38.7
铁	mg	0.27	5.62
锌	mg	0.15	3.091
锰	μg	3.14	65.48
钙	mg	21	444
磷	mg	14	287
碘	μg	5.4	112.8
氯	mg	15	321
硒	μg	0.72	14.91
可选择成分			
肌醇	mg	4.0	82.7
牛磺酸	mg	1.5	31
左旋肉碱	mg	2.0	40.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.7	98.33
低聚半乳糖	mg	149.76	3121
低聚果糖	mg	39.40	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0289	0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT)	g	0.0086	0.180
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	mg	167.71	3495
叶黄素	μg	9.71	202.30
核黄素	mg	1.11	23.20

注：即食状态下，每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核黄素(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素；
维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

温馨提示：


1. 食用本品时须配合添加辅助食品。
2. 喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670
网站 www.sxmlyr.com





标签 8:



本品含乳糖、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。膳食纤维是低聚糖物质。

冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55°C。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用勺加入奶粉，请勿压紧专用勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 将一满勺在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喝剩下的奶液丢弃。

生产者：陕西美力源乳业有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
产品类型：较大婴儿配方食品
产品属性及状态：乳基粉状
生产许可证编号：SC12961043100837
产品标准代码：GB 10766-2021
保质期：24个月
产地：陕西咸阳
邮编：712200
生产日期及产品批号见罐底

喂哺用量建议表

较大婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (mL)	奶粉用量 (平均)
6-9月龄	4-5	180-240	6-8
9-12月龄	4	180-210	6-7

注意：每平均约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：

请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证



6 955801 118956



爱赋

国食注字 YP20250047

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)

2段
净含量: 800克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2084
蛋白质	g	0.58	12.06
脂肪	g	1.29	26.84
亚油酸	g	0.18	3.758
α-亚麻酸	mg	19.47	405.68
碳水化合物	g	2.4	49.9
维生素			
维生素A	μg RE	22	453
维生素D	μg	0.571	11.9
维生素E	mg α-TE	0.20	4.21
维生素K	μg	2.97	61.80
维生素B ₁	μg	25	515
维生素B ₂	μg	48	995
维生素B ₆	μg	16.3	339.1
维生素B ₁₂	μg	0.078	1.630
烟酸(烟酰胺)	μg	160	3326
叶酸	μg	4.3	89
泛酸	μg	126	2622
维生素C	mg	3.7	76.6
生物素	μg	10.1	21.08
胆碱	mg	5.2	109.2
矿物质			
钠	mg	6.29	131
钾	mg	19	406
铜	μg	14.9	310.2
镁	mg	1.9	38.7
铁	mg	0.27	5.62
锌	mg	0.15	3.091
锰	μg	3.14	65.48
钙	mg	21	444
磷	mg	14	287
碘	μg	5.4	112.8
氯	mg	15	321
硒	μg	0.72	14.91
可选择成分			
肌醇	mg	4.0	82.7
牛磺酸	mg	1.5	31
左旋肉碱	mg	2.0	40.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.7	98.33
低聚半乳糖	mg	149.76	3121
低聚果糖	mg	39.40	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0289	0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT)	g	0.0086	0.180
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	167.71	3495
叶黄素	μg	9.71	202.30
核苷酸	mg	1.11	23.20

注：即食状态下，每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素；
维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

温馨提示：

1. 食用本品时请配合添加辅食。
2. 喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670

官方网站 www.sxmylry.com





标签 9:



冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55°C。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将剩下的奶液弃掉。

生产者：陕西美力源乳业有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别：幼儿配方食品
产品属性及状态：乳基粉状
生产许可证编号：SC12961043100837
产品标准代号：GB 10767-2021
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
邮编：712200
生产日期及产品批号见罐底

喂哺用量建议表

幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (mL)	奶粉用量 (平均)
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注意：每平均约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：

请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证



爱赋

国食注字 YP20250048

幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

3段

净含量：108克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1977
蛋白质	g	0.72	14.28
脂肪	g	1.09	21.48
亚油酸	g	0.15	2.902
α-亚麻酸	mg	13.77	272.31
碳水化合物	g	2.7	53.04
维生素			
维生素A	μg RE	24	468
维生素D	μg	0.602	11.9
维生素E	mg α-TE	0.19	3.69
维生素K ₁	μg	2.92	57.75
维生素B ₁	μg	26	523
维生素B ₂	μg	53	1057
维生素B ₆	μg	17.4	344.2
维生素B ₁₂	μg	0.084	1.652
烟酸(烟酰胺)	μg	174	3435
叶酸	μg	4.6	90
泛酸	μg	139	2739
维生素C	mg	3.9	76.6
生物素	μg	1.16	22.91
矿物质			
钠	mg	7.64	151
钾	mg	23	450
铜	μg	16.0	315.5
镁	mg	2.0	39.9
铁	mg	0.27	5.34
锌	mg	0.14	2.731
钙	mg	23	450
磷	mg	16	307
碘	μg	5.3	105.5
氯	mg	21	419
可选择成分			
硒	μg	0.67	13.17
胆碱	mg	5.7	112.0
锰	μg	3.48	68.89
肌醇	mg	4.5	88.6
牛磺酸	mg	1.8	35
左旋肉碱	mg	2.1	41.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	98.33
低聚半乳糖	mg	157.87	3121
低聚果糖	mg	41.53	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0305	0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT)	g	0.0091	0.180
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	155.29	3070
叶黄素	μg	10.23	202.30
核苷酸	mg	1.25	24.70

注：即食状态下，每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素；
维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

注：生羊乳加工

温馨提示：

1. 喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
2. 配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670

官方网站 www.sxmlyr.com





标签 10:



本品含钙、磷、钾、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1,3-二油酸-2-硬脂酰甘油三酯、核苷酸、膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。膳食纤维是低聚糖物质。

冲泡方法

1. 冲泡奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿用家用量勺量的奶粉，每瓶奶粉需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 将一滴奶在手背测试温度。如需要一次冲泡多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喝剩下的奶液弃掉。

生产者：陕西美力源乳业有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别：幼儿配方食品
产品属性及状态：乳基粉状
生产许可证编号：SC12961043100837
产品标准代码：GB 10767-2021
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
邮编：712200
生产日期及产品批号见罐底

喂哺用量建议表

幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (mL)	奶粉用量 (平均)
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注意：每平均约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：

请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲泡方式可能会给您的宝宝带来不适。

本企业已通过质量管理(符合ISO9001)体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证



爱赋



幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

3段
净含量: 300克

国食注字 YP20250048

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1977
蛋白质	g	0.72	14.28
脂肪	g	1.09	21.48
亚油酸	g	0.15	2.902
α-亚油酸	mg	13.77	272.31
碳水化合物	g	2.7	53.04
维生素			
维生素A	μg RE	24	468
维生素D	μg	0.602	11.9
维生素E	mg α-TE	0.19	3.69
维生素K ₁	μg	2.92	57.75
维生素B ₁	μg	26	523
维生素B ₂	μg	53	1057
维生素B ₆	μg	17.4	344.2
维生素B ₁₂	μg	0.084	1.652
烟酸(烟酰胺)	μg	174	3435
叶酸	μg	4.6	90
泛酸	μg	139	2739
维生素C	mg	3.9	76.6
生物素	μg	1.16	22.91
矿物质			
钠	mg	7.64	151
钾	mg	23	450
钙	mg	16.0	315.5
镁	mg	2.0	39.9
铁	mg	0.27	5.34
锌	mg	0.14	2.731
铜	mg	23	450
磷	mg	16	307
碘	μg	5.3	105.5
氯	mg	21	419
可选择成分			
硒	μg	0.67	13.17
胆碱	mg	5.7	112.0
锰	μg	3.48	68.89
肌醇	mg	4.5	88.6
牛磺酸	mg	1.8	35
左旋肉碱	mg	2.1	41.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	98.33
低聚半乳糖	mg	157.87	3121
低聚果糖	mg	41.53	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0305	0.602
乳糖-N-新四糖(LNNT)	g	0.0091	0.180
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	155.29	3070
叶黄素	μg	10.23	202.30
核黄素	mg	1.25	24.70

注：即食状态下，每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、乳糖-N-新四糖(LNNT)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素；
维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠。

注：生羊乳加工

温馨提示：

1. 喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
2. 配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670

官方网站 www.sxmyry.com





标签 11:



爱赋

国食注字 YP20250048



幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段) 3 段
净含量: 700克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1977
蛋白质	g	0.72	14.28
脂肪	g	1.09	21.48
亚油酸	g	0.15	2.902
α-亚麻酸	mg	13.77	272.31
碳水化合物	g	2.7	53.04
维生素			
维生素A	μg RE	24	468
维生素D	μg	0.602	11.9
维生素E	mg α-TE	0.19	3.69
维生素K ₁	μg	2.92	57.75
维生素B ₁	μg	26	523
维生素B ₂	μg	53	1057
维生素B ₆	μg	17.4	344.2
维生素B ₁₂	μg	0.084	1.652
烟酸(烟酰胺)	μg	17.4	343.5
叶酸	μg	4.6	90
泛酸	μg	139	2739
维生素C	mg	3.9	76.6
生物素	μg	1.16	22.91
矿物质			
钠	mg	7.64	151
钾	mg	23	450
铜	μg	16.0	315.5
镁	mg	2.0	39.9
铁	mg	0.27	5.34
锌	mg	0.14	2.731
钙	mg	23	450
磷	mg	16	307
氯	mg	5.3	105.5
硒	mg	21	419
可选择成分			
糖	μg	0.67	13.17
胆碱	μg	5.7	112.0
锰	μg	3.48	68.89
肌醇	mg	4.5	88.6
牛磺酸	mg	1.8	35
左旋肉碱	mg	2.1	41.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	98.33
低聚半乳糖	mg	157.87	3121
低聚果糖	mg	41.53	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0305	0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT)	g	0.0091	0.180
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	mg	155.29	3070
叶黄素	μg	10.23	202.30
核黄素	mg	1.25	24.70

注: 即食状态下, 每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核黄素(5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素; 维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱; 矿物质: 碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

注: 生羊乳加工

温馨提示:

1. 喂奶时应抱着宝宝, 如有疏忽可能导致宝宝窒息。
2. 配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670

网站 www.sxmlyry.com





标签 12:



本品含钙、磷、钾、钠、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1,3-二油酸-2-硬脂酰甘油三酯、核苷酸、膳食纤维有助于调节宝宝的肠道功能,膳食纤维是低聚糖物质。

冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净并擦干手,将奶瓶、奶嘴、奶嘴盖及器具清洗消毒,用沸水煮5分钟。
2. 饮用沸水煮5分钟,冷却至50-55℃。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉,请勿压紧专用量勺里的奶粉,每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶,摇晃至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐,必须将奶液冷藏并在24小时内食用完,将喂剩下的奶液弃掉。

生产者: 陕西美力源乳业有限公司
地址: 陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别: 幼儿配方食品
产品属性及状态: 乳基粉状
生产许可证编号: SC12961043100837
产品标准代码: GB 10767-2021
保质期: 24个月
产地: 陕西 咸阳
邮编: 712200
生产日期及产品批号见罐底

喂哺用量建议表

幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量(mL)	奶粉用量(平勺)
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注意: 每平勺约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用,未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示:

请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

本企业已通过质量管理体系符合ISO9001体系认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证、良好生产规范(GMP)认证



6 955801 118963



爱赋

国食注字 YP20250048

幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

净含量: 800克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1977
蛋白质	g	0.72	14.28
脂肪	g	1.09	21.48
亚油酸	g	0.15	2.902
α-亚麻酸	mg	13.77	272.31
碳水化合物	g	2.7	53.04
维生素A	μg RE	24	468
维生素D	μg	0.602	11.9
维生素E	mg α-TE	0.19	3.69
维生素K	μg	2.92	57.75
维生素B ₁	μg	26	523
维生素B ₂	μg	53	1057
维生素B ₆	μg	17.4	344.2
维生素B ₁₂	μg	0.084	1.652
烟酸(烟酰胺)	μg	174	3435
叶酸	μg	4.6	90
泛酸	μg	139	2739
维生素C	mg	3.9	76.6
生物素	μg	1.16	22.91
矿物质			
钠	mg	7.64	151
钾	mg	23	450
钙	mg	16.0	315.5
镁	mg	2.0	39.9
铁	mg	0.27	5.34
锌	mg	0.14	2.731
铜	mg	23	450
碘	mg	16	307
硒	μg	5.3	105.5
氯	mg	21	419
可选择成分			
磷	μg	0.67	13.17
胆碱	mg	5.7	112.0
锰	μg	3.48	68.89
肌醇	mg	4.5	88.6
牛磺酸	mg	1.8	35
左旋肉碱	mg	2.1	41.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	98.33
低聚半乳糖	mg	157.87	3121
低聚果糖	mg	41.53	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0305	0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT)	g	0.0091	0.180
1,3-二油酸-2-硬脂酰甘油三酯	mg	155.29	3070
叶黄素	μg	10.23	202.30
核黄素	mg	1.25	24.70

注: 即食状态下, 每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸-2-棕榈酰甘油三酯、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素;
维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱;
矿物质: 碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠。

注生羊乳加工

温馨提示:

1. 喂奶时应抱着宝宝, 如有疏忽可能导致宝宝窒息。
2. 配制不当或食用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670

官方网站 www.sxmlyry.com

