

附件 2：陕西优利士乳业集团有限责任公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签1：

奶具消毒及食用方法

1 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2 将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3 调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4 依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5 再依推荐喂哺表的指示，加入准确份量(条)的乳粉。

6 摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示： 调奶时建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6 949008 407852

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量			每日喂哺次数
	温开水 (mL)	乳粉 (g)	乳粉 (条)	
0-1周	60	9	1	8
1-2周	90	13.5	1.5	6
2-4周	120	18	2	5
1-2月	150	22.5	2.5	5
2-4月	180	27	3	5
4-6月	210	31.5	3.5	5

说明：每条乳粉约9克。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳

产品信息及产品资料查询
www.sxruyo.com

产品咨询热线
400-692-8998

优利士®

金瑞优®

1 段

净含量:45克(9克X5) 国食注字 YP20170648

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2081	镁	mg	1.7	34.8
蛋白质	g	0.49	10.20	铁	mg	0.19	3.90
脂肪	g	1.18	24.50	锌	mg	0.19	3.90
亚油酸	g	0.15	3.16	锰	μg	2.78	57.94
α-亚麻酸	mg	20	410	钙	mg	16	325
碳水化合物	g	2.8	57.82	磷	mg	11	226
维生素				碘	μg	4.5	93.6
维生素A	μg RE	18	383	氯	mg	15	321
维生素D	μg	0.60	12.49	硒	μg	0.90	18.73
维生素E	mg α-TE	0.27	5.71	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.85	38.60	肌醇	mg	3.2	66.8
维生素B ₁	μg	25	510	牛磺酸	mg	1.7	36.2
维生素B ₂	μg	39	815	左旋肉碱	mg	1.5	31.8
维生素B ₆	μg	15.1	313.9	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.6
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.725	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	111.8
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3090	膳食纤维			
叶酸	μg	4.3	90.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	158	3296	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.7	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.71	14.82	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.33
胆碱	mg	6.0	124.9	叶黄素	μg	1.9	40.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钠	mg	9	182	酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	62.3
钾	mg	21	442				
铜	μg	17.9	372.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。

标签2:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表的指示，加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数
	温开水 (mL)	乳粉 (g) (平匙)	
0-1周	60	9	2
1-2周	90	13.5	3
2-4周	120	18	4
1-2月	150	22.5	5
2-4月	180	27	6
4-6月	210	31.5	7

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品

产品标准代号：GB 10765-2021

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状

保质期：24个月

产地：陕西 咸阳

产品信息及产品召回

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

优利士®

金瑞优®

1

段

净含量:100克

国食注字 YP20170648

婴儿配方羊乳粉

(0-6月龄,1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2081	镁	mg	1.7	34.8
蛋白质	g	0.49	10.20	铁	mg	0.19	3.90
脂肪	g	1.18	24.50	锌	mg	0.19	3.90
亚油酸	g	0.15	3.16	锰	μg	2.78	57.94
α-亚麻酸	mg	20	410	钙	mg	16	325
碳水化合物	g	2.8	57.82	磷	mg	11	226
维生素				碘	μg	4.5	93.6
维生素A	μg RE	18	383	氯	mg	15	321
维生素D	μg	0.60	12.49	硒	μg	0.90	18.73
维生素E	mg α-TE	0.27	5.71	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.85	38.60	肌醇	mg	3.2	66.8
维生素B ₁	μg	25	510	牛磺酸	mg	1.7	36.2
维生素B ₂	μg	39	815	左旋肉碱	mg	1.5	31.8
维生素B ₆	μg	15.1	313.9	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.6
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.725	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	111.8
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3090	膳食纤维			
叶酸	μg	4.3	90.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	158	3296	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.7	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.71	14.82	1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.26	5.33
胆碱	mg	6.0	124.9	甘油三酯			
矿物质				叶黄素	μg	1.9	40.0
钠	mg	9	182	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	21	442	酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	62.3
铜	μg	17.9	372.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。

标签3:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表的指示加入准确份量(条)的乳粉。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数
	温开水 (mL)	乳粉 (g) (条)	
0-1周	60	9 1	8
1-2周	90	13.5 1.5	6
2-4周	120	18 2	5
1-2月	150	22.5 2.5	5
2-4月	180	27 3	5
4-6月	210	31.5 3.5	5

说明：每条乳粉约9g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
保质期：24个月
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
产地：陕西 咸阳
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品信息及产品资料查询
www.sxruyo.com
产品咨询热线
400-692-8998

优利士

金瑞优

1

段

净含量：270克(9克x30) 国食注字 YP20170648

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2081	镁	mg	1.7	34.8
蛋白质	g	0.49	10.20	铁	mg	0.19	3.90
脂肪	g	1.18	24.50	锌	mg	0.19	3.90
亚油酸	g	0.15	3.16	锰	μg	2.78	57.94
α-亚麻酸	mg	20	410	钙	mg	16	325
碳水化合物	g	2.8	57.82	磷	mg	11	226
维生素				碘	μg	4.5	93.6
维生素A	μg RE	18	383	氯	mg	15	321
维生素D	μg	0.60	12.49	硒	μg	0.90	18.73
维生素E	mg α-TE	0.27	5.71	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.85	38.60	肌醇	mg	3.2	66.8
维生素B ₁	μg	25	510	牛磺酸	mg	1.7	36.2
维生素B ₂	μg	39	815	左旋肉碱	mg	1.5	31.8
维生素B ₆	μg	15.1	313.9	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.6
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.725	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	111.8
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3090	膳食纤维			
叶酸	μg	4.3	90.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	158	3296	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.7	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.71	14.82	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.33
胆碱	mg	6.0	124.9	叶黄素	μg	1.9	40.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钠	mg	9	182	酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	62.3
钾	mg	21	442				
铜	μg	17.9	372.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油酯、核桃油、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷酸。

标签4:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人士建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数
	温开水 (mL)	乳粉 (g) (平匙)	
0-1周	60	9	2
1-2周	90	13.5	3
2-4周	120	18	4
1-2月	150	22.5	5
2-4月	180	27	6
4-6月	210	31.5	7

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件


本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳

产品信息及产品追溯码
www.sxruyo.com

产品咨询热线
400-692-8998



净含量: 300克 国食注字 YP20170648

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄, 1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2081	镁	mg	1.7	34.8
蛋白质	g	0.49	10.20	铁	mg	0.19	3.90
脂肪	g	1.18	24.50	钾	mg	0.19	3.90
亚油酸	g	0.15	3.16	锰	μg	2.78	57.94
α-亚麻酸	mg	20	410	钙	mg	16	325
碳水化合物	g	2.8	57.82	磷	mg	11	226
维生素				碘	μg	4.5	93.6
维生素A	μg RE	18	383	氯	mg	15	321
维生素D	μg	0.60	12.49	硒	μg	0.90	18.73
维生素E	mg α-TE	0.27	5.71	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.85	38.60	肌醇	mg	3.2	66.8
维生素B ₁	μg	25	510	牛磺酸	mg	1.7	36.2
维生素B ₂	μg	39	815	左旋肉碱	mg	1.5	31.8
维生素B ₆	μg	15.1	313.9	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.6
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.725	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	111.8
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3090	膳食纤维			
叶酸	μg	4.3	90.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	158	3296	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.7	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.71	14.82	1,3-二油酸-2-棕榈酸			
胆碱	mg	6.0	124.9	甘油三酯	g	0.26	5.33
矿物质				叶黄素	μg	1.9	40.0
钠	mg	9	182	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	21	442	酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	62.3
铜	μg	17.9	372.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、烟酰胺、维生素A、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育醇(维生素E)、植物甲萘酮(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷酸。

标签5:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	乳粉			
	温开水 (mL)	乳粉 (次)		
0-1周	60	9	2	8
1-2周	90	13.5	3	6
2-4周	120	18	4	5
1-2月	150	22.5	5	5
2-4月	180	27	6	5
4-6月	210	31.5	7	5

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品

产品标准代号：GB 10765-2021

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司

产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状

保质期：24个月

产品信息及产品资料查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

优利士®

金瑞优®

1

段

净含量：700克 国食注字 YP20170648

婴儿配方羊乳粉 (0-6月龄, 1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2081	镁	mg	1.7	34.8
蛋白质	g	0.49	10.20	铁	mg	0.19	3.90
脂肪	g	1.18	24.50	锌	mg	0.19	3.90
亚油酸	g	0.15	3.16	锰	μg	2.78	57.94
α-亚麻酸	mg	20	410	钙	mg	16	325
碳水化合物	g	2.8	57.82	磷	mg	11	226
维生素				碘	μg	4.5	93.6
维生素A	μg RE	18	383	氯	mg	15	321
维生素D	μg	0.60	12.49	硒	μg	0.90	18.73
维生素E	mg α-TE	0.27	5.71	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.85	38.60	肌醇	mg	3.2	66.8
维生素B ₁	μg	25	510	牛磺酸	mg	1.7	36.2
维生素B ₂	μg	39	815	左旋肉碱	mg	1.5	31.8
维生素B ₆	μg	15.1	313.9	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.6
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.725	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	111.8
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3090	膳食纤维			
叶酸	μg	4.3	90.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	158	3296	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.7	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.71	14.82	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.33
胆碱	mg	6.0	124.9	叶黄素	μg	1.9	40.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钠	mg	9	182	酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	62.3
钾	mg	21	442				
铜	μg	17.9	372.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油酯、核桃油、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、碘酸钾。

6 949008 408101

标签6:

1

调奶之前请洗手,彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟,待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟,冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示,先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表的指示,加入准确份量(条)的乳粉。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示:调奶时建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉,请勿随意改变冲调比例,除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害!

6~12月龄较大婴儿食用本产时,须配合添加辅助食品。

产品信息及产品资料查询
www.sxruyo.com

产品咨询热线
400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量			每日喂哺次数
	温开水 (mL)	乳粉 (g)	乳粉(条)	
6-12月	210	31.5	3.5	3-4

说明:每条乳粉约9克。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别:较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
制造商:陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址:陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号:见罐底
检验合格证号:同生产批号
食品生产许可证编号:SC12961042400829
产品属性:乳基粉状
保质期:24个月
产地:陕西 咸阳



净含量:45克(9克X5) 国食注字 YP20170649
较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2078	镁	mg	1.9	40.0
蛋白质	g	0.58	12.10	铁	mg	0.30	6.23
脂肪	g	1.18	24.60	锌	mg	0.18	3.82
亚油酸	g	0.13	2.74	锰	μg	3.02	62.80
α-亚麻酸	mg	17	361	钙	mg	21	442
碳水化合物	g	2.7	55.52	磷	mg	14	292
维生素				碘	μg	4.5	93.5
维生素A	μg RE	23	468	氯	mg	19	405
维生素D	μg	0.60	12.47	硒	μg	0.69	14.27
维生素E	mg α-TE	0.27	5.53	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.88	39.07	肌醇	mg	3.0	61.8
维生素B ₁	μg	25	514	牛磺酸	mg	1.7	35.3
维生素B ₂	μg	35	718	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μg	14.8	308.0	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.5
维生素B ₁₂	μg	0.125	2.602	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.5	114.1
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3069	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	157	3265	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.8	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.73	15.19	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.33
胆碱	mg	6.0	124.7	叶黄素	μg	7.8	162.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钠	mg	6	123	酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	68.2
钾	mg	24	503				
铜	μg	13.4	277.9				

说明:每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。

标签7:

奶具消毒及食用方法

1 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残留奶。

2 将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3 调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4 依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5 再依推荐喂哺表的指示加入准确份量(条)的乳粉。

6 摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数
	温开水 (mL)	乳粉 (g) (条)	
6-12月	210	31.5 (3条)	3-4

说明：每条乳粉约9g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：较大婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状

产品标准代号：GB 10766-2021

保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司

产地：陕西 咸阳

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

产品追溯及产品信息查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

优利士®

金瑞优®

段

净含量: 270克(9克x30)

国食注字 YP20170649

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄, 2段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2078	镁	mg	1.9	40.0
蛋白质	g	0.58	12.10	铁	mg	0.30	6.23
脂肪	g	1.18	24.60	锌	mg	0.18	3.82
亚油酸	g	0.13	2.74	锰	μg	3.02	62.80
α-亚麻酸	mg	17	361	钙	mg	21	442
碳水化合物	g	2.7	55.52	磷	mg	14	292
维生素				碘	μg	4.5	93.5
维生素A	μg RE	23	468	氯	mg	19	405
维生素D	μg	0.60	12.47	硒	μg	0.69	14.27
维生素E	mg α-TE	0.27	5.53	可选择成分			
维生素K	μg	1.88	39.07	肌醇	mg	3.0	61.8
维生素B ₁	μg	25	514	牛磺酸	mg	1.7	35.3
维生素B ₂	μg	35	718	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₃	μg	14.8	308.0	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.5
维生素B ₅	μg	0.125	2.602	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.5	114.1
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3069	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	157	3265	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.8	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.73	15.19	1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.21	4.33
胆碱	mg	6.0	124.7	甘油三酯			
矿物质				叶黄素	μg	7.8	162.0
钠	mg	6	123	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	24	503	酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	68.2
铜	μg	13.4	277.9				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、葡萄糖、花生四烯酸油酯、核桃油、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氧化胆碱、脂酰视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。

标签8:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45°C左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

6 9 4 9 0 0 8 4 0 7 9 9 9 1

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数
	温开水 (mL)	乳粉 (g) (平匙)	
6-12月	210	31.5 7	3-4

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：较大婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状

产品标准代号：GB 10766-2021

保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司

产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

产品信息及产品资料查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

优利士®

金瑞优®

段

净含量: 300克 国食注字 YP20170649

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄, 2段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2078	镁	mg	1.9	40.0
蛋白质	g	0.58	12.10	铁	mg	0.30	6.23
脂肪	g	1.18	24.60	锌	mg	0.18	3.82
亚油酸	g	0.13	2.74	锰	μg	3.02	62.80
α-亚麻酸	mg	17	361	钙	mg	21	442
碳水化合物	g	2.7	55.52	磷	mg	14	292
维生素				碘	μg	4.5	93.5
维生素A	μg RE	23	468	氯	mg	19	405
维生素D	μg	0.60	12.47	硒	μg	0.69	14.27
维生素E	mg α-TE	0.27	5.53	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.88	39.07	肌醇	mg	3.0	61.8
维生素B ₁	μg	25	514	牛磺酸	mg	1.7	35.3
维生素B ₂	μg	35	718	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μg	14.8	308.0	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.5
维生素B ₁₂	μg	0.125	2.602	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.5	114.1
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3069	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	157	3265	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.8	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.73	15.19	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.33
胆碱	mg	6.0	124.7	叶黄素	μg	7.8	162.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钠	mg	6	123	酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	68.2
钾	mg	24	503				
铜	μg	13.4	277.9				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油酯、核桃油、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、磷酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。

标签9:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人士建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水（mL）	乳粉 （g） （平匙）	乳粉（次）	
6-12月	210	31.5	7	3-4

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：较大婴儿配方食品

产品标准代号：GB 10766-2021

制造商：陕西优利士乳业有限公司

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状

保质期：24个月

产地：陕西 咸阳

产品信息及产品资料查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

优利士®

金瑞优®

段

净含量：700克 国食注字 YP20170649

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2078	镁	mg	1.9	40.0
蛋白质	g	0.58	12.10	铁	mg	0.30	6.23
脂肪	g	1.18	24.60	锌	mg	0.18	3.82
亚油酸	g	0.13	2.74	锰	μg	3.02	62.80
α-亚麻酸	mg	17	361	钙	mg	21	442
碳水化合物	g	2.7	55.52	磷	mg	14	292
维生素				碘	μg	4.5	93.5
维生素A	μg RE	23	468	氯	mg	19	405
维生素D	μg	0.60	12.47	硒	μg	0.69	14.27
维生素E	mg α-TE	0.27	5.53	可选择成分			
维生素K ₁	μg	1.88	39.07	肌醇	mg	3.0	61.8
维生素B ₁	μg	25	514	牛磺酸	mg	1.7	35.3
维生素B ₂	μg	35	718	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μg	14.8	308.0	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.5
维生素B ₁₂	μg	0.125	2.602	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.5	114.1
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3069	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	157	3265	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.8	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.73	15.19	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.33
胆碱	mg	6.0	124.7	叶黄素	μg	7.8	162.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钠	mg	6	123	酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	68.2
钾	mg	24	503				
铜	μg	13.4	277.9				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油酯、核桃油、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钾、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。

6 949008 407807

标签10:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手,彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟,待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟,冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示,先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表的指示,加入准确份量(条)的乳粉。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示:调奶时建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉,请勿随意改变冲调比例,除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害!

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量			每日喂哺次数
	温开水 (mL)	乳粉 (g)	乳粉(条)	
12个月起	210	31.5	3.5	3

说明:每条乳粉约9克。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别: 幼儿配方食品

产品标准代号: GB 10767-2021

制造商: 陕西优利士乳业集团有限责任公司

地址: 陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号: 见罐底

检验合格证号: 同生产批号

食品生产许可证编号: SC12961042400829

产品属性: 乳基粉状

保质期: 24个月

产地: 陕西 咸阳

6 949008 407876

产品信息及资料查询
www.sxruyo.com

产品咨询热线
400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸
甘油三酯

优利士®

金瑞优®

3

段

净含量:45克(9克X5) 国食注字 YP20170650
幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2053	铁	mg	0.30	6.16
蛋白质	g	0.74	15.20	锌	mg	0.16	3.21
脂肪	g	1.17	24.00	钙	mg	25	521
亚油酸	g	0.09	1.90	磷	mg	17	349
α-亚麻酸	mg	12	246	碘	μg	2.5	51.5
碳水化合物	g	2.5	52.25	氯	mg	24	499
维生素				可选择成分			
维生素A	μg RE	23	462	硒	μg	0.75	15.32
维生素D	μg	0.60	12.32	胆碱	mg	6.0	123.6
维生素E	mg α-TE	0.26	5.27	锰	μg	3.31	68.05
维生素K ₁	μg	1.93	39.63	肌醇	mg	3.1	63.3
维生素B ₁	μg	25	518	牛磺酸	mg	1.8	37.9
维生素B ₂	μg	35	710	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μg	14.9	305.1	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.9	60.2
维生素B ₁₂	μg	0.127	2.608	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.6	94.9
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3086	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.7	低聚半乳糖	g	0.028	0.575
泛酸	μg	164	3376	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	3.9	80.0	聚葡萄糖	g	0.08	1.62
生物素	μg	0.78	16.01	1,3-二油酸-2-棕榈酸 甘油三酯	g	0.15	3.00
矿物质				叶黄素	μg	7.9	162.0
钠	mg	7	151	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	29	595	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	80.5
铜	μg	13.8	282.4				
镁	mg	1.9	39.0				

说明:每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核桃油、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、磷脂。

生羊乳加工

标签11:

奶具消毒及食用方法

调奶之前先消毒，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45°C左右。

依照婴幼儿年龄及推荐哺喂表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

再依推荐哺喂表的指示加入准确份量(条)的乳粉。

摇匀奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时建议按照推荐哺喂表用量冲调乳粉，请勿随意更改冲调比例，除非有专业人士建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉		乳粉(次)
		(g)	(条)	
12个月起	210	31.5	3.5	3

说明：每条乳粉约9g

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内，开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品

产品属性：乳基粉状

产品标准代号：GB 10767-2021

保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司

产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县昌汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

含1,3-二油-2-棕榈酸甘油三酯

产品品质及产品质量检测

www.sxruyo.com

产品销售热线

400-692-8998

优利士®

金瑞优®

3

段

净含量: 270克(9克x30) 国食注字 YP20170650

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄, 3段)

营养成分表							
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2053	铁	mg	0.30	6.16
蛋白质	g	0.74	15.20	钾	mg	0.16	3.21
脂肪	g	1.17	24.00	钙	mg	25	521
亚油酸	g	0.09	1.90	磷	mg	17	349
α-亚麻酸	mg	12	246	氯	μg	2.5	51.5
碳水化合物	g	2.5	52.25	碘	mg	2.4	499
维生素				可选择成分			
维生素A	μg RE	23	462	硒	μg	0.75	15.32
维生素D	μg	0.60	12.32	胆碱	mg	6.0	123.6
维生素E	mg α-TE	0.26	5.27	锰	μg	3.31	68.05
维生素K ₁	μg	1.93	39.63	肌醇	mg	3.1	63.3
维生素B ₁	μg	25	518	牛磺酸	mg	1.8	37.9
维生素B ₂	μg	35	710	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μg	14.9	305.1	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.9	60.2
维生素B ₁₂	μg	0.127	2.608	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.6	94.9
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3086	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.7	低聚半乳糖	g	0.028	0.575
泛酸	μg	164	3376	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	3.9	80.0	葡萄糖	g	0.08	1.62
生物素	μg	0.78	16.01	1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.15	3.00
矿物质				甘油三酯			
钠	mg	7	151	叶黄素	μg	7.9	162.0
钾	mg	29	595	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
铜	μg	13.8	282.4	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	80.5
镁	mg	1.9	39.0				

说明：每100mL奶液含乳脂13.5g。

配料表	
生乳乳、脱盐半乳清粉、食用油脂滑剂油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、核桃油、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种D-12、L-左旋肉碱、氯化胆碱、胆碱肌氨酸(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮基生育醇(维生素E)、植物甲氧基(维生素K ₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫氨酸(维生素B ₆)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₃)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、碘酸钾。	

生乳乳加工

标签12:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残留奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉		乳粉 (次)
		(g)	(平匙)	
12个月起	210	31.5	7	3

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内；开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品
产品标准代号：GB 10767-2021
保质期：24个月
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
产地：陕西 咸阳
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

产品信息及产品介绍
www.sxruyo.com

产品咨询热线
400-692-8998

优利士

金瑞优

3

段

净含量：300克 国食注字 YP20170650

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2053	铁	mg	0.30	6.16
蛋白质	g	0.74	15.20	锌	mg	0.16	3.21
脂肪	g	1.17	24.00	钙	mg	25	521
亚油酸	g	0.09	1.90	磷	mg	17	349
α-亚油酸	mg	12	246	碘	μg	2.5	51.5
碳水化合物	g	2.5	52.25	氯	mg	24	499
维生素				可选择成分			
维生素A	μg RE	23	462	硒	μg	0.75	15.32
维生素D	μg	0.60	12.32	胆碱	mg	6.0	123.6
维生素E	mg α-TE	0.26	5.27	锰	μg	3.31	68.05
维生素K	μg	1.93	39.63	肌醇	mg	3.1	63.3
维生素B ₁	μg	25	518	牛磺酸	mg	1.8	37.9
维生素B ₂	μg	35	710	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μg	14.9	305.1	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.9	60.2
维生素B ₁₂	μg	0.127	2.608	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.6	94.9
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3086	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.7	低聚半乳糖	g	0.028	0.575
泛酸	μg	164	3376	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	3.9	80.0	聚葡萄糖	g	0.08	1.62
生物素	μg	0.78	16.01	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
矿物质				叶黄素	μg	7.9	162.0
钠	mg	7	151	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	29	595	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	80.5
铜	μg	13.8	282.4				
镁	mg	1.9	39.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油酯(发酵法)、核桃油、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、胆碱视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、碘化钾。

生羊乳加工

标签13:

奶具消毒及食用方法

1

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残留奶。

2

将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

3

调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

4

依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

5

再依推荐喂哺表指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

6

摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙。建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (mL)	乳粉 (g) (平匙)	乳粉 (次)	
12个月起	210	31.5	7	3

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品

产品属性：乳基粉状

产品标准代号：GB 10767-2021

保质期：24个月

制造商：陕西优利士乳业有限公司

产地：陕西 咸阳

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品信息及产品资料查询

www.sxruyo.com

产品咨询热线

400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

优利士®

金瑞优®



段

净含量: 700克 国食注字 YP20170650

幼儿配方羊乳粉

(12-36月龄, 3段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2053	铁	mg	0.30	6.16
蛋白质	g	0.74	15.20	锌	mg	0.16	3.21
脂肪	g	1.17	24.00	钙	mg	25	521
亚油酸	g	0.09	1.90	磷	mg	17	349
α-亚麻酸	mg	12	246	碘	μg	2.5	51.5
碳水化合物	g	2.5	52.25	氯	mg	24	499
维生素				可选择成分			
维生素A	μg RE	23	462	硒	μg	0.75	15.32
维生素D	μg	0.60	12.32	胆碱	mg	6.0	123.6
维生素E	mg α-TE	0.26	5.27	锰	μg	3.31	68.05
维生素K	μg	1.93	39.63	肌醇	mg	3.1	63.3
维生素B ₁	μg	25	518	牛磺酸	mg	1.8	37.9
维生素B ₂	μg	35	710	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B ₆	μg	14.9	305.1	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.9	60.2
维生素B ₁₂	μg	0.127	2.608	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.6	94.9
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3086	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.7	低聚半乳糖	g	0.028	0.575
泛酸	μg	164	3376	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	3.9	80.0	聚葡萄糖	g	0.08	1.62
生物素	μg	0.78	16.01	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
矿物质							
钠	mg	7	151	叶黄素	μg	7.9	162.0
钾	mg	29	595	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
铜	μg	13.8	282.4	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	80.5
镁	mg	1.9	39.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、核桃油、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、维生素A、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-酮酸生育醇(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、硫酸硫酸胺(维生素B₆)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₁₂)、氰钴胺(维生素B₁₂)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸亚铁、硫酸钾、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、磷脂。

生羊乳加工





6 949008 408118

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位
能量	kJ	100	2096	钾	mg
蛋白质	g	0.50	10.40	铜	μg
脂肪	g	1.21	25.40	镁	mg
亚油酸	g	0.16	3.37	铁	mg
α-亚麻酸	mg	18	386	锌	mg
碳水化合物	g	2.7	56.4	锰	μg
维生素				钙	mg
维生素A	μg RE	18	374	磷	mg
维生素D	μg	0.60	12.58	碘	μg
维生素E	mg α-TE	0.25	5.14	氯	mg
维生素K ₁	μg	1.81	37.97	硒	μg
维生素B ₁	μg	25	523	可选择成分	
维生素B ₂	μg	39	807	肌醇	mg
维生素B ₆	μg	15.0	314.6	牛磺酸	mg
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.743	左旋肉碱	mg
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3138	二十二碳六烯酸(DHA)	mg
叶酸	μg	4.3	90.4	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg
泛酸	μg	161	3369	膳食纤维	
维生素C	mg	4.2	87.3	低聚半乳糖	g
生物素	μg	0.71	14.79	低聚果糖	g
胆碱	mg	6.0	125.8	核苷酸	mg
矿物质				乳铁蛋白	mg
钠	mg	9	183	酪蛋白磷酸肽	mg

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

1. 本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
2. 每次食用完毕后，请及时盖紧瓶盖；
3. 开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 6060 780
工作时间 9:00-18:00 AM08:30 PM05:30

6 949008 408569

优能佳®

1段

净含量:100克 国食注字 YP20230162

婴儿配方羊乳粉

(0-6月龄, 1段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、酯酸视黄酯、胆钙化醇、D-α-酯酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
0-1周	2	9	60	8
1-2周	3	13.5	90	6
2-4周	4	18	120	5
1-2个月	5	22.5	150	5
2-4个月	6	27	180	5
4-6个月	7	31.5	210	5

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶瓶消毒及调奶方法

1. 在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶/奶嘴、奶嘴、瓶盖。
3. 把奶瓶/奶嘴放在沸水中至少煮5分钟。
4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶瓶/奶瓶中。
5. 用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。
6. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示: 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签15:

营养成分表							
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096	钾	mg	21	445
蛋白质	g	0.50	10.40	铜	μg	17.9	374.7
脂肪	g	1.21	25.40	镁	mg	1.7	36.3
亚油酸	g	0.16	3.37	铁	mg	0.19	3.95
α-亚麻酸	mg	18	386	锌	mg	0.18	3.74
碳水化合物	g	2.7	56.4	锰	μg	2.6	54.1
维生素				钙	mg	16	330
维生素A	μg RE	18	374	磷	mg	11	228
维生素D	μg	0.60	12.58	碘	μg	4.5	94.3
维生素E	mg α-TE	0.25	5.14	氯	mg	15	322
维生素K ₁	μg	1.81	37.97	硒	μg	0.90	18.86
维生素B ₁	μg	25	523	可选择成分			
维生素B ₂	μg	39	807	肌醇	mg	3.3	68.2
维生素B ₆	μg	15.0	314.6	牛磺酸	mg	1.8	37.0
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.743	左旋肉碱	mg	1.3	26.3
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3138	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.3
叶酸	μg	4.3	90.4	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.2	109.5
泛酸	μg	161	3369	膳食纤维			
维生素C	mg	4.2	87.3	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.71	14.79	低聚果糖	g	0.04	0.93
胆碱	mg	6.0	125.8	核苷酸	mg	0.6	12.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.2	25.0
钠	mg	9	183	酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	61.7

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

儲藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内冷藏;
- 2.每次食用完毕后,请及时盖紧罐盖;
- 3.开封后,请务必在一个月內食用完毕。

生产者:陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址:陕西省咸阳市杨木乡杨汉工业园区
官方网站:www.ylshi.com
电话:029-35330333
产地:陕西·咸阳
产品类别:婴儿配方食品
产品类型:乳基粉状
产品标准代号:GB10765-2021
食品生产许可证编号:SC12961042008029
保质期:24个月
生产日期及批号:见罐底
检验合格证书:同生产日期批号

 **400 6060 780**
工作时间 周一-周五 AM08:30 PM05:30



净含量:300克 国食注字 YP20230162

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄醇、胆钙化醇、*D*- α -生育生甾醇、植物甲萘酮、硫酸硫酸素、核黄素、盐酸吡哆醇、氟铝盐、*D*-生物素、烟酰胺、叶酸、*D*-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、*L*-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种B-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、菌类。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天 次数
	量匙 数量	乳粉 克数	温开水 (ml)	
0-1周	2	9	60	8
1-2周	3	13.5	90	6
2-4周	4	18	120	5
1-2个月	5	22.5	150	5
2-4个月	6	27	180	5
4-6个月	7	31.5	210	5

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前,请洗净、擦干双手。



2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5. 用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示: 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签16:

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096	钾	mg	21	445
蛋白质	g	0.50	10.40	铜	μg	17.9	374.7
脂肪	g	1.21	25.40	镁	mg	1.7	36.3
亚油酸	g	0.16	3.37	铁	mg	0.19	3.95
α-亚油酸	mg	18	386	钾	mg	0.18	3.74
碳水化合物	g	2.7	56.4	锰	μg	2.6	54.1
维生素				钙	mg	16	330
维生素A	μg RE	18	374	磷	mg	11	228
维生素D	μg	0.60	12.58	碘	μg	4.5	94.3
维生素E	mg α-TE	0.25	5.14	氯	mg	15	322
维生素K ₁	μg	1.81	37.97	硒	μg	0.90	18.86
维生素B ₁	μg	25	523	可选择成分			
维生素B ₂	μg	39	807	肌醇	mg	3.3	68.2
维生素B ₆	μg	15.0	314.6	牛磺酸	mg	1.8	37.0
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.743	左旋肉碱	mg	1.3	26.3
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3138	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.3
叶酸	μg	4.3	90.4	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.2	109.5
泛酸	μg	161	3369	膳食纤维			
维生素C	mg	4.2	87.3	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.71	14.79	低聚果糖	g	0.04	0.93
胆碱	mg	6.0	125.8	核苷酸	mg	0.6	12.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.2	25.0
钠	mg	9	183	酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	61.7

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

儲藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者:陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址:陕西省咸阳市杨汉工业园区
官方网站:www.ylshi.com
电话:029-35330333
产地:陕西·咸阳
产品类别:婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
产品标准代号:GB10765-2021
食品生产许可证编号:SC12961042008029
保质期:24个月
生产日期及批号:见罐底
检验合格证号:同生产日期批号

 **400 6060 780**
工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



净含量:400克 国食注字 YP20230162

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、桃核油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸盐、二二碳六烯油酸(发酵法)、维生素四烯油酸、醋酸视黄醇、胆钙化醇、*dl*-α-醋酸生育酚、植物甲萘酮、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、苊酞酸、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸二钙、碳酸氢钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸铜、硫酸铁、磷酸亚砷酸钙、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂 次数
	量匙 数量	乳粉 克数	温开水 (ml)	
0-1周	2	9	60	8
1-2周	3	13.5	90	6
2-4周	4	18	120	5
1-2个月	5	22.5	150	5
2-4个月	6	27	180	5
4-6个月	7	31.5	210	5

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前,请洗净、擦干双手。



2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯(奶瓶)中。



5. 用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示: 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签17:

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096	钾	mg	21	445
蛋白质	g	0.50	10.40	铜	μg	17.9	374.7
脂肪	g	1.21	25.40	镁	mg	1.7	36.3
亚油酸	g	0.16	3.37	铁	mg	0.19	3.95
α-亚麻酸	mg	18	386	锰	mg	0.18	3.74
碳水化合物	g	2.7	56.4	锌	μg	2.6	54.1
维生素				钙	mg	16	330
维生素A	μg RE	18	374	磷	mg	11	228
维生素D	μg	0.60	12.58	碘	μg	4.5	94.3
维生素E	mg α-TE	0.25	5.14	硒	μg	15	322
维生素K ₁	μg	1.81	37.97	铬	μg	0.90	18.86
维生素B ₁	μg	25	523	可选择成分			
维生素B ₂	μg	39	807	肌醇	mg	3.3	68.2
维生素B ₆	μg	15.0	314.6	牛磺酸	mg	1.8	37.0
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.743	左旋肉碱	mg	1.3	26.3
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3138	二氢六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.3
叶酸	μg	4.3	90.4	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.2	109.5
泛酸	μg	161	3369	膳食纤维			
维生素C	mg	4.2	87.3	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.71	14.79	低聚果糖	g	0.04	0.93
胆碱	mg	6.0	125.8	核苷酸	mg	0.6	12.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.2	25.0
钠	g	9	183	酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	61.7

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

儲藏方法

1. 本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
2. 每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
3. 开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者:陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址:陕西省咸阳市泾阳县泾干工业园区
官方网站:www.ylshi.com
电话:029-35330333
产地:陕西·咸阳
产品类别:婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
产品标准代号:GB 10765-2021
食品生产许可证编号:SC12961042400829
保质期:24个月
生产日期及批号:见罐底
检验合格标志:同生产日期

 **400 6060 780**
 工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



净含量:600克 国食注字 YP 20230162

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄醇、胆钙化醇、*d,l*-维生素生育酚、维生素甲萘酚、盐酸硫胺素、维生素C、盐酸吡哆醇、葡萄糖、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化钾、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷二酸、5'-鸟苷二酸、5'-肌苷二酸、5'-尿苷二酸)、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种Bif-12、磷脂

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水 (ml)	
0-1周	2	9	60	8
1-2周	3	13.5	90	6
2-4周	4	18	120	5
1-2个月	5	22.5	150	5
2-4个月	6	27	180	5
4-6个月	7	31.5	210	5

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)
30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，
请洗净、擦干双手。



2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示: 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品

标签18:

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096	钾	mg	21	445
蛋白质	g	0.50	10.40	铜	μg	17.9	374.7
脂肪	g	1.21	25.40	镁	mg	1.7	36.3
亚油酸	g	0.16	3.37	铁	mg	0.19	3.95
α-亚麻酸	mg	18	386	锰	mg	0.18	3.74
碳水化合物	g	2.7	56.4	锌	μg	2.6	54.1
维生素				钙	mg	16	330
维生素A	μg RE	18	374	磷	mg	11	228
维生素D	μg	0.60	12.58	碘	μg	4.5	94.3
维生素E	mg α-TE	0.25	5.14	硒	μg	15	322
维生素K ₁	μg	1.81	37.97	铬	μg	0.90	18.86
维生素B ₁	μg	25	523	可选择成分			
维生素B ₂	μg	39	807	肌醇	mg	3.3	68.2
维生素B ₆	μg	15.0	314.6	牛磺酸	mg	1.8	37.0
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.743	左旋肉碱	mg	1.3	26.3
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3138	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.3
叶酸	μg	4.3	90.4	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.2	109.5
泛酸	μg	161	3369	膳食纤维			
维生素C	mg	4.2	87.3	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.71	14.79	低聚果糖	g	0.04	0.93
胆碱	mg	6.0	125.8	核苷酸	mg	0.6	12.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.2	25.0
钠	g	9	183	酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	61.7

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

儲藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者:陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址:陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站:www.ylshi.com
电话:029-35330333
产地:陕西·咸阳
产品类别:婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
产品标准代号:GB 10765-2021
食品生产许可证编号:SC12961042400829
保质期:24个月
生产日期及批号:见罐底
检验合格证书:同生产批号

 **400 6060 780**
工作时间 周一-周五 AM08:30 PM05:30



净含量:700克 国食注字 YP20230162

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低果聚糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸盐、二十二碳六烯酸油酯(龙脑油)、花生四烯酸油酯、醋酸钠黄酯、胆钙化醇、*dl*-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、维生素、盐酸吡啶醇、钴盐、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种Bif-12、嗜盐

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
0-1周	2	9	60	8
1-2周	3	13.5	90	6
2-4周	4	18	120	5
1-2个月	5	22.5	150	5
2-4个月	6	27	180	5
4-6个月	7	31.5	210	5

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，
请洗净、擦干双手。



2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示: 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签19:

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096	钾	mg	21	445
蛋白质	g	0.50	10.40	铜	μg	17.9	374.7
脂肪	g	1.21	25.40	镁	mg	1.7	36.3
亚油酸	g	0.16	3.37	铁	mg	0.19	39.5
α-亚麻酸	mg	18	386	锌	mg	0.18	3.74
碳水化合物	g	2.7	56.4	钙	mg	2.6	54.1
维生素				锰	mg	16	330
维生素A	μg RE	18	374	磷	mg	11	228
维生素D	μg	0.60	12.58	碘	μg	4.5	94.3
维生素E	mg α-TE	0.25	5.14	氯	mg	15	322
维生素K ₁	μg	1.81	37.97	硒	μg	0.90	18.86
维生素B ₁	μg	2.5	523	可选择成分			
维生素B ₂	μg	39	807	肌醇	mg	3.3	68.2
维生素B ₆	μg	15.0	314.6	牛磺酸	mg	1.8	37.0
维生素B ₁₂	μg	0.131	2.743	左旋肉碱	mg	1.3	26.3
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3138	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.3
叶酸	μg	4.3	90.4	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.2	109.5
泛酸	mg	161	3369	膳食纤维			
维生素C	mg	4.2	87.3	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.71	14.79	低聚果糖	g	0.04	0.93
胆碱	mg	6.0	125.8	核苷酸	mg	0.6	12.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.2	25.0
钠	mg	9	183	酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	61.1

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

儲藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月內食用完。

生产者: 陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址: 陕西省咸阳市乾县杨洪工业园区
官方网站: www.ylshi.com
电话: 029-33303333
产地: 陕西·咸阳
产品类别: 婴儿配方食品
产品属性: 乳基粉状
产品标准代号: GB 10765-2021
食品生产许可证编号: SC129610420400829
保质期: 24个月
生产日期及批号: 见罐底
检验合格证号: 同生产批号

 **400 6060 780**
工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



净含量:800克 国食注字 YP20230162

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核糖、乳糖蛋白、酪蛋白磷酸盐、二羧六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄醇、胆钙化醇、*d*-α-维生素生育酚、植物甲萘酚、硫酸硫酸素、核酸素、盐酸吡哆醇、葡萄糖、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硫酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷二酸、5'-鸟苷二酸、5'-肌苷二酸、5'-尿苷二酸)、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种Bif-12、磷脂

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂 次数
	量此 数量	乳粉 克数	温开水 (ml)	
0-1周	2	9	60	8
1-2周	3	13.5	90	6
2-4周	4	18	120	5
1-2个月	5	22.5	150	5
2-4个月	6	27	180	5
4-6个月	7	31.5	210	5

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业
资质人员建议。不当配制和使用不当可能
引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的
奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，
请洗净、擦干双手。



2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签20:

营养成分表							
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2083	钾	mg	25	516
蛋白质	g	0.60	12.40	铜	μg	14.3	298.7
脂肪	g	1.20	25.00	镁	mg	2.1	44.0
亚油酸	g	0.13	2.80	铁	mg	0.30	6.25
α-亚麻酸	mg	16	327	锌	mg	0.20	4.07
碳水化合物	g	2.6	54.5	锰	μg	2.90	60.31
维生素A	μg RE	23	469	钙	mg	22	448
维生素D	μg	0.60	12.50	磷	mg	15	303
维生素E	mg α-TE	0.24	4.93	碘	μg	4.5	93.7
维生素K ₁	μg	1.85	38.51	硒	μg	20	425
维生素B ₁	μg	25	527	可选择成分			
维生素B ₂	μg	32	668	肌醇	mg	2.9	60.2
维生素B ₆	μg	14.7	306.6	牛磺酸	mg	1.7	34.8
维生素B ₁₂	μg	0.123	2.555	左旋肉碱	mg	1.2	24.8
烟酸(烟酰胺)	μg	149	3101	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.7
叶酸	μg	3.5	72.5	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	112.3
泛酸	μg	158	3290	膳食纤维			
维生素C	mg	4.2	87.4	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.73	15.11	低聚果糖	g	0.04	0.93
胆碱	mg	6.0	125.0	核苷酸	mg	0.6	12.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.2	25.0
钠	mg	6	127	酪蛋白磷酸肽	mg	3.4	71.3

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

儲藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者: 陕西优利士乳业集团有限责任公司
 地址: 陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
 官方网站: www.ylishi.com
 电话: 029-35330333
 产地: 陕西·咸阳
 产品类别: 较大婴儿配方食品
 产品属性: 乳基粉状
 产品标准代号: GB 10766-2021
 食品生产许可证编号: SC129610420400829
 保质期: 24个月
 生产日期及批号: 见罐底
 检验合格证号: 同生产批号

 **400 6060 780**
工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



净含量:100克 国食注字 YP 20230163

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄, 2段)

配料表		喂哺用量建议表			
月龄	每次乳粉用量				每天喂哺次数
		量匙 数量	乳粉 克数	温开水 (ml)	
6-12个月		7	31.5	210	3-4

奶具消毒及调奶方法



温馨提示：对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

标签21:

营养成分表							
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2083	钾	mg	25	516
蛋白质	g	0.60	12.40	铜	μg	14.3	298.
脂肪	g	1.20	25.00	镁	mg	2.1	44.0
亚油酸	g	0.13	2.80	铁	mg	0.30	6.25
α-亚麻酸	mg	16	327	锌	mg	0.20	4.07
碳水化合物	g	2.6	54.5	锰	μg	2.90	60.31
维生素				钙	mg	22	448
维生素A	μg RE	23	469	磷	mg	15	303
维生素D	μg	0.60	12.50	碘	μg	4.5	93.7
维生素E	mg α-TE	0.24	4.93	氯	mg	20	425
维生素K ₁	μg	1.85	38.51	硒	μg	0.66	13.73
维生素B ₁	μg	25	527	可选择成分			
维生素B ₂	μg	32	668	肌醇	mg	2.9	60.2
维生素B ₆	μg	14.7	306.6	牛磺酸	mg	1.7	34.8
维生素B ₁₂	μg	0.123	2.555	左旋肉碱	mg	1.2	24.8
烟酸(烟酰胺)	μg	149	3101	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.7
叶酸	μg	3.5	72.5	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	112.3
泛酸	μg	158	3290	膳食纤维			
维生素C	mg	4.2	87.4	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.73	15.11	低聚果糖	g	0.04	0.93
胆碱	mg	6.0	125.0	核苷酸	mg	0.6	12.0
矿物质				乳珠蛋白	mg	1.2	25.0
钠	mg	6	127	酸蛋白磷酸盐	mg	3.4	71.3

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

儲藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内冷藏;
- 2.每次食用完毕后,请及时盖紧罐盖;
- 3.开封后,请务必在一个月內食用完毕。

生产者:陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址:陕西省咸阳市杨林县杨汉工业园区
官方网站:www.ylishi.com
电话:029-35330333
产地:陕西·咸阳
产品类型:较大婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
产品标准代号:GB10766-2021
食品生产许可证编号:SC12961042400829
保质期:24个月
生产日期及批号:见罐底
检验合格证号:同生产日期批号

 400 6060 780
工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



净含量:300克 国食注字 YP20230163

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄, 2段)

配料表

喂哺用量建议表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、生鱼四烯酸油脂、醋酸视黄醇、胆钙化醇、*dl-α*-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氟钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种 Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、磷脂。

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
6-12个月	7	31.5	210	3-4

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喂哺的奶液留到下次食用，请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法

1. 在配制乳粉之前，请洗净、擦干双手。

2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。

3. 把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。

4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。

5. 用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。

6. 用匙搅拌均匀或盖紧好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅食食用。

标签22:

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2083	钾	mg	25	516
蛋白质	g	0.60	12.40	铜	µg	14.3	298.7
脂肪	g	1.20	25.00	镁	mg	2.1	44.0
亚油酸	g	0.13	2.80	铁	mg	0.30	6.25
α-亚麻酸	mg	16	327	锌	mg	0.20	4.07
碳水化合物	g	2.6	54.5	锰	µg	2.90	60.31
维生素				钙	mg	22	448
维生素A	µg RE	23	469	磷	mg	15	303
维生素D	µg	0.60	12.50	碘	µg	4.5	93.7
维生素E	mg α-TE	0.24	4.93	氯	mg	20	425
维生素K ₁	µg	1.85	38.51	硒	µg	0.66	13.73
维生素B ₁	µg	25	527	可选择成分			
维生素B ₂	µg	32	668	肌醇	mg	2.9	60.2
维生素B ₆	µg	14.7	306.6	牛磺酸	mg	1.7	34.8
维生素B ₁₂	µg	0.123	2.555	左旋肉碱	mg	1.2	24.8
烟酸(烟酰胺)	µg	149	3101	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.7
泛酸	µg	3.5	72.5	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	112.3
叶酸	µg	158	3290	膳食纤维			
维生素C	mg	4.2	87.4	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	µg	0.73	15.11	低聚果糖	g	0.04	0.93
胆碱	mg	6.0	125.0	核苷酸	mg	0.6	12.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.2	25.0
钠	mg	6	127	酪蛋白磷酸肽	mg	3.4	71.3

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

儲藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内冷藏;
- 2.每次食用完毕后,请及时盖紧罐盖;
- 3.开封后,请务必在一个月內食用完毕。

生产者:陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址:陕西省咸阳市杨木县杨汉工业园区
官方网站:www.ylshi.com
电话:029-35330333
产地:陕西·咸阳
产品类别:较大婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
产品标准代号:GB10766-2021
食品生产许可证编号:SC12961042008029
保质期:24个月
生产日期及批号:见罐底
检验合格证书:同生产日期批号

 400 6060 780
工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



净含量:400克 国食注字 YP20230163

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄, 2段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄醇、胆钙化醇、*d*- α -磷酸生育酚、植物甲萘酚、硫酸硫酸素、核黄素、硫酸吡哆醇、氟铝盐、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸铁、硫酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸[5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠]、动物双歧杆菌乳亚种 Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂 次数
	量匙 数量	乳粉 克数	温开水 (ml)	
6-12个月	7	31.5	210	3-4

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前,请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯(奶瓶)中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示: 对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

标签23:

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2083	钾	mg	25	516
蛋白质	g	0.60	12.40	铜	μg	14.3	298.7
脂肪	g	1.20	25.00	铁	mg	2.1	44.0
亚油酸	g	0.13	2.80	镁	mg	0.30	62.5
α-亚麻酸	mg	16	327	锌	mg	0.20	4.07
碳水化合物	g	2.6	54.5	钙	μg	2.90	60.31
维生素				锰	mg	22	448
维生素A	μg RE	23	469	磷	mg	15	303
维生素D	μg	0.60	12.50	碘	μg	4.5	93.7
维生素E	mg α-TE	0.24	4.93	氯	mg	20	425
维生素K ₁	μg	1.85	38.51	硒	μg	0.66	13.73
维生素B ₁	μg	25	527	可选择成分			
维生素B ₂	μg	32	668	肌醇	mg	2.9	60.2
维生素B ₆	μg	14.7	306.6	牛磺酸	mg	1.7	34.8
维生素B ₁₂	0.123	2.555	左旋肉碱	mg	1.2	24.8	
烟酸(烟酰胺)	μg	149	3101	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.7
叶酸	μg	3.5	72.5	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	112.3
泛酸	μg	158	3290	膳食纤维			
维生素C	mg	4.2	87.1	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.73	15.11	低聚果糖	g	0.04	0.93
胆碱	mg	6.0	125.0	核苷酸	mg	0.6	12.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.2	25.0
钠	mg	6	127	酪蛋白磷酸肽	mg	3.4	71.3

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

儲藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月內食用完。

生产者: 陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址: 陕西省咸阳市杨林县杨洪工业园区
官方网站: www.ylshi.com
电话: 029-35303033
产地: 陕西·咸阳
产品类别: 较大婴儿配方食品
产品属性: 乳基粉状
产品标准代号: GB 10766-2021
食品生产许可证编号: SC12961042400829
保质期: 24个月
生产日期及批号: 见罐底
检验合格证号: 同生产日期

 **400 6060 780**
 工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



净含量:600克 国食注字 YP20230163

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄, 2段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低果糖浆、核糖、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸盐、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄醇、胆钙化醇、*dl*- α -胡萝卜素、植物甲萘酮、盐酸硫胺素、核黄素、维生素B₁₂、葡萄糖、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种B4-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂 次数
	量匙 数量	乳粉 克数	温开水 (ml)	
6-12个月	7	31.5	210	3-4

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)
30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业
资质人员建议。不当配制和使用不当可能
引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的
奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，
请洗净、擦干双手。



2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示: 对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品

标签24:

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2083	钾	mg	25	516
蛋白质	g	0.60	12.40	铜	μg	14.3	298.7
脂肪	g	1.20	25.00	铁	mg	2.1	44.0
亚油酸	g	0.13	2.80	镁	mg	0.30	6.25
α-亚麻酸	mg	16	327	锌	mg	0.20	4.07
碳水化合物	g	2.6	54.5	锰	μg	2.90	60.31
维生素				钙	mg	22	448
维生素A	μg RE	23	469	磷	mg	15	303
维生素D	μg	0.60	12.50	碘	μg	4.5	93.7
维生素E	mg α-TE	0.24	4.93	氯	mg	20	425
维生素K ₁	μg	1.85	38.51	硒	μg	0.66	13.73
维生素B ₁	μg	25	527	可选择成分			
维生素B ₂	μg	32	668	肌醇	mg	2.9	60.2
维生素B ₆	μg	14.7	306.6	牛磺酸	mg	1.7	34.8
维生素B ₁₂	μg	0.123	2.555	左旋肉碱	mg	1.2	24.8
烟酸(烟酰胺)	μg	149	3101	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.7
叶酸	μg	3.5	72.5	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	112.3
泛酸	μg	158	3290	膳食纤维			
维生素C	mg	4.2	87.1	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.73	15.11	低聚果糖	g	0.04	0.93
胆碱	mg	6.0	125.0	核苷酸	mg	0.6	12.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.2	25.0
钠	mg	6	127	酪蛋白磷酸肽	mg	3.4	71.3

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

儲藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者: 陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址: 陕西省咸阳市乾县杨洪工业园区
官方网站: www.ylishi.com
电话: 029-35330333
产地: 陕西·咸阳
产品类别: 较大婴儿配方食品
产品属性: 乳基粉状
产品标准代号: GB 10766-2021
食品生产许可证编号: SC12961042400829
保质期: 24个月
生产日期及批号: 见罐底
检验合格证号: 同生产日期

 **400 6060 780**
工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂）、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、桉树油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、醋酸视黄醇、胆钙化醇、*dl*- α -磷酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫霉素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸铜、硫酸锰、磷酸亚、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠）、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水 (ml)	
6-12个月	7	31.5	210	3-4

注：1-优能恒平惠本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康问题！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，
请洗净、擦干双手。



2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

标签25:

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2083	钾	mg	25	516
蛋白质	g	0.60	12.40	铜	μg	14.3	298.7
脂肪	g	1.20	25.00	铁	mg	2.1	44.0
亚油酸	g	0.13	2.80	镁	mg	0.30	62.5
α-亚麻酸	mg	16	327	锌	mg	0.20	4.07
碳水化合物	g	2.6	54.5	钙	μg	2.90	60.31
维生素				锰	mg	22	448
维生素A	μg RE	23	469	磷	mg	15	303
维生素D	μg	0.60	12.50	碘	μg	4.5	93.7
维生素E	mg α-TE	0.24	4.93	氯	mg	20	425
维生素K ₁	μg	1.85	38.51	硒	μg	0.66	13.73
维生素B ₁	μg	25	527	可选择成分			
维生素B ₂	μg	32	668	肌醇	mg	2.9	60.2
维生素B ₆	μg	14.7	306.6	牛磺酸	mg	1.7	34.8
维生素B ₁₂	μg	0.123	2.555	左旋肉碱	mg	1.2	24.8
烟酸(烟酰胺)	μg	149	3101	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.7
叶酸	μg	3.5	72.5	二十碳五烯酸(EA/ARA)	mg	5.4	112.3
泛酸	μg	158	3290	膳食纤维			
维生素C	mg	4.2	87.4	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.73	15.11	低聚果糖	g	0.04	0.93
胆碱	mg	6.0	125.0	核苷酸	mg	0.6	12.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.2	25.0
钠	mg	6	127	酪蛋白磷酸肽	mg	3.4	71.3

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

儲藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者: 陕西优利士乳业集团有限责任公司
 地址: 陕西省咸阳市杨陵区杨干工业园区
 官方网站: www.ylishi.com
 电话: 029-35303033
 产地: 陕西·咸阳
 产品类别: 较大婴儿配方食品
 产品属性: 乳基粉状
 产品标准代号: GB 10766-2021
 食品生产许可证编号: SC12961042000829
 保质期: 24个月
 生产日期及批号: 见罐底
 检验合格标志: 同生产批号

 **400 6060 780**
工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、*dlt*-醋酸生育醇、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、磷酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
6-12个月	7	31.5	210	3-4

注：1-优能佳平乳配产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法

1.在调乳粉之前，
请洗净、擦干双手。

2.清洗奶瓶/奶瓶、
奶嘴、瓶盖。

3.把奶瓶/奶瓶放在
沸水中至少煮5分钟。

4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至
45℃左右，将正确量量开过的温
水(45℃左右)倒入消毒后的奶
杯/奶瓶中。

5.用优能佳专用量勺，参照喂哺
表加入正确份量乳粉。

6.用底搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，
冷却到适合宝宝饮用的温度，可
以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

标签26:

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位
能量	kJ	100	2067	铜	μg
蛋白质	g	0.73	15.00	镁	mg
脂肪	g	1.20	24.80	铁	mg
亚油酸	g	0.10	2.08	锌	mg
α-亚麻酸	mg	12	250	钙	mg
碳水化合物	g	2.5	51.4	磷	mg
维生素				碘	μg
维生素A	μg RE	22	465	氯	mg
维生素D	μg	0.60	12.40	可选择成分	
维生素E	mg α-TE	0.23	4.70	硒	μg
维生素K ₁	μg	1.88	38.96	胆碱	mg
维生素B ₁	μg	26	531	锰	μg
维生素B ₂	μg	33	684	肌醇	mg
维生素B ₆	μg	14.8	305.1	牛磺酸	mg
维生素B ₁₂	μg	0.126	2.595	左旋肉碱	mg
烟酸(烟酰胺)	μg	151	3124	二十二碳六烯酸(DHA)	mg
叶酸	μg	3.5	72.7	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg
泛酸	μg	165	3413	膳食纤维	
维生素C	mg	4.1	83.9	低聚半乳糖	g
生物素	μg	0.77	15.88	低聚果糖	g
矿物质				核苷酸	mg
钠	mg	7	137	乳铁蛋白	mg
钾	mg	28	582	酪蛋白磷酸肽	mg

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：幼儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 6060 780
工作时间 8:00-18:00 AM08:30 PM05:30



6 949008 406695



优利士®

优能佳®



3段

净含量:100克 国食注字 YP 20230164

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘酮、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

生羊乳加工

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
12-36个月	7	31.5	210	3

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

标签27:

营养成分表							
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067	铜	μg	14.6	302.7
蛋白质	g	0.73	15.00	镁	mg	2.0	41.0
脂肪	g	1.20	24.80	铁	mg	0.30	6.20
亚油酸	g	0.10	2.08	锌	mg	0.15	3.20
α-亚麻酸	mg	12	250	钙	mg	25	517
碳水化合物	g	2.5	51.4	磷	mg	17	343
维生素				碘	μg	2.8	56.9
维生素A	μg RE	22	465	氯	mg	24	492
维生素D	μg	0.60	12.40	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.23	4.70	硒	μg	0.71	14.72
维生素K ₁	μg	1.88	38.96	胆碱	mg	6.0	124.0
维生素B ₁	μg	26	531	锰	μg	3.09	63.88
维生素B ₂	μg	33	684	肌醇	mg	3.1	63.1
维生素B ₆	μg	14.8	305.1	牛磺酸	mg	1.8	37.7
维生素B ₁₂	μg	0.126	2.595	左旋肉碱	mg	1.2	25.4
烟酸(烟酰胺)	μg	151	3124	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.2	45.6
叶酸	μg	3.5	72.7	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.3	68.8
泛酸	μg	165	3413	膳食纤维			
维生素C	mg	4.1	83.9	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.77	15.88	低聚果糖	g	0.04	0.93
矿物质				核苷酸	mg	0.6	12.0
钠	mg	7	137	乳铁蛋白	mg	1.1	23.5
钾	mg	28	582	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	81.6

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者:陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址:陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站:www.ylshi.com
电话:029-35330333
产地:陕西·咸阳
产品类别:幼儿配方食品
产品属性:乳基粉状
产品标准代号:GB10767-2021
食品生产许可证编号:SC12961042400829
保质期:24个月
生产日期及批号:见罐底
检验合格证号:同生产批号

400 6060 780
工作时间 周二至周五 AM08:30 PM05:30



6 949008 407432



优利士®

优能佳®

3段

净含量:300克 国食注字 YP 20230164

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-胞苷二钠、5'-鸟苷二钠、5'-肌苷二钠、5'-尿苷二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

生羊乳加工

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
12-36个月	7	31.5	210	3

注：一优能佳平乳本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好剩余的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法

1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。

2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。

3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。

4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。

5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。

6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

标签28:

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067	铜	μg	14.6	302.7
蛋白质	g	0.73	15.00	镁	mg	2.0	41.0
脂肪	g	1.20	24.80	铁	mg	0.30	6.20
亚油酸	g	0.10	2.08	锌	mg	0.15	3.20
α-亚麻酸	mg	12	250	钙	mg	25	517
碳水化合物	g	2.5	51.4	磷	mg	17	343
维生素				碘	μg	2.8	56.9
维生素A	μg RE	22	465	氯	mg	24	492
维生素D	μg	0.60	12.40	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.23	4.70	硒	μg	0.71	14.72
维生素K ₁	μg	1.88	38.96	烟碱	mg	6.0	124.0
维生素B ₁	μg	26	531	锰	μg	3.09	63.88
维生素B ₂	μg	33	684	肌醇	mg	3.1	63.1
维生素B ₆	μg	14.8	305.1	牛磺酸	mg	1.8	37.7
维生素B ₁₂	μg	0.126	2.595	左旋肉碱	mg	1.2	25.4
烟酸(烟酰胺)	μg	151	3124	二十二碳六烯酸(DHA)	μg	2.2	45.6
泛酸	μg	3.5	72.7	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.3	68.8
叶酸	μg	165	3413	膳食纤维			
维生素C	mg	4.1	83.9	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.77	15.88	低聚果糖	g	0.04	0.93
矿物质				核苷酸	mg	0.6	12.0
钠	mg	7	137	乳铁蛋白	mg	1.1	23.5
钾	mg	28	582	酸蛋白磷酸肽	mg	3.9	81.6

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

儲藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内冷藏;
- 2.每次食用完毕后,请及时盖紧罐盖;
- 3.开封后,请务必在一个月內食用完。

生产者:陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址:陕西省咸阳市杨陵区汉工业园区
官方网站:www.ylishi.com
电话:029-35330333
产地:陕西·咸阳
产品类别:幼儿配方食品
产品属性:乳基粉状
产品标准代号:GB10767-2021
食品生产许可证编号:SC12961042000829
保质期:24个月
生产日期及批号:见罐底
检验合格证号:同生产日期批号

 **400 6060 780**
 工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



净含量:400克 国食注字 YP20230164

3段

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄醇、胆钙化素、*d*- α -醋酸生育酚、植物甲萘酮、硫酸酪氨酸、核黄素、盐酸吡哆醇、氟铝肽、D-生物素、烟酰胺、叶黄素、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠)、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种Bif-12、磷脂。

生羊乳加工

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂 次数
	量匙 数量	乳粉 克数	温开水 (ml)	
12-36个月	7	31.5	210	3

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前,请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

标签29:

营养成分表							
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067	铜	μg	14.6	302.7
蛋白质	g	0.73	15.00	镁	mg	2.0	41.0
脂肪	g	1.20	24.80	铁	mg	0.30	6.20
亚油酸	g	0.10	2.08	锌	mg	0.15	3.20
α-亚麻酸	mg	12	250	钙	mg	25	517
碳水化合物	g	2.5	51.4	磷	mg	17	343
维生素				碘	μg	2.8	56.9
维生素A	μg RE	22	465	氯	mg	24	492
维生素D	μg	0.60	12.40	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.23	4.70	硒	μg	0.71	14.72
维生素K ₁	μg	1.88	38.96	胆碱	mg	6.0	124.0
维生素B ₁	μg	26	531	锰	μg	3.09	63.88
维生素B ₂	μg	33	684	肌醇	mg	3.1	63.1
维生素B ₆	μg	14.8	305.1	牛磺酸	mg	1.8	37.7
维生素B ₁₂	μg	0.126	2.595	左旋肉碱	mg	1.2	25.4
烟酸(烟酰胺)	μg	151	3124	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.2	45.6
叶酸	μg	3.5	72.7	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.3	68.8
泛酸	μg	165	3413	膳食纤维			
维生素C	mg	4.1	83.9	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.77	15.88	低聚果糖	g	0.04	0.93
矿物质				核苷酸	mg	0.6	12.0
钠	mg	7	137	乳铁蛋白	mg	1.1	23.5
钾	mg	28	582	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	81.6

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylishi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：幼儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 6060 780
工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



6 949008 1404783





净含量:600克 国食注字 YP 20230164

3段

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种Bif-12、磷脂。

生羊乳加工

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
12-36个月	7	31.5	210	3

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。



2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

标签30:

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067	铜	μg	14.6	302.7
蛋白质	g	0.73	15.00	镁	mg	2.0	41.0
脂肪	g	1.20	24.80	铁	mg	0.30	6.20
亚油酸	g	0.10	2.08	锌	mg	0.15	3.20
α-亚麻酸	mg	12	250	钙	mg	25	517
碳水化合物	g	2.5	51.4	磷	mg	17	343
维生素				碘	μg	2.8	56.9
维生素A	μg RE	22	465	氯	mg	24	492
维生素D	μg	0.60	12.40	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.23	4.70	硒	μg	0.71	14.72
维生素K ₁	μg	1.88	38.96	胆碱	mg	6.0	124.0
维生素B ₁	μg	26	531	锰	μg	3.09	63.88
维生素B ₂	μg	33	684	肌醇	mg	3.1	63.1
维生素B ₆	μg	14.8	305.1	牛磺酸	mg	1.8	37.7
维生素B ₁₂	μg	0.126	2.595	左旋肉碱	mg	1.2	25.4
烟酸(烟酰胺)	μg	151	3124	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.2	45.6
叶酸	μg	3.5	72.7	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.3	68.8
泛酸	μg	165	3413	膳食纤维			
维生素C	mg	4.1	83.9	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.77	15.88	低聚果糖	g	0.04	0.93
矿物质				核苷酸	mg	0.6	12.0
钠	mg	7	137	乳铁蛋白	mg	1.1	23.5
钾	mg	28	582	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	81.1

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

儲藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月內食用完毕。

生产者:陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址:陕西省咸阳市彬县泾阳工业园区
官方网站:www.ylshi.com
电话:029-35330333
产地:陕西·咸阳
产品类别:幼儿配方食品
产品属性:乳基粉状
产品标准代号:GB 10767-2021
食品生产许可证编号:SC129610420040829
保质期:24个月
生产日期及批号:见罐底
检验合格证号:同生产日期批号

 **400 6060 780**
 工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



净含量:700克 国食注字 YP20230164

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄, 3段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低果糖浆、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄醇、胆钙化醇、*dlt*-维生素生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、维生素E、盐酸吡哆醇、葡萄糖醛、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化钾碱、左旋肉碱、硬脂酰、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷二酸二钠、5'-鸟苷二酸二钠、5'-肌苷二酸二钠、5'-尿苷二酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种B-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。磷脂。

生羊乳加工

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂 次数
	量匙 数量	乳粉 克数	温开水 (ml)	
12-36个月	7	31.5	210	3

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)
30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，
请洗净、擦干双手。



2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

标签31:

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067	铜	μg	14.6	302.7
蛋白质	g	0.73	15.00	镁	mg	2.0	41.0
脂肪	g	1.20	24.80	铁	mg	0.30	6.20
亚油酸	g	0.10	2.08	锌	mg	0.15	3.20
α-亚麻酸	mg	12	250	钙	mg	25	517
碳水化合物	g	2.5	51.4	磷	mg	17	343
维生素				碘	μg	2.8	56.9
维生素A	μg RE	22	465	氯	mg	24	492
维生素D	μg	0.60	12.40	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.23	4.70	硒	μg	0.71	14.72
维生素K ₁	μg	1.88	38.96	胆碱	mg	6.0	124.0
维生素B ₁	μg	26	531	锰	μg	3.09	63.88
维生素B ₂	μg	33	684	肌醇	mg	3.1	63.1
维生素B ₆	μg	14.8	305.1	牛磺酸	mg	1.8	37.7
维生素B ₁₂	μg	0.126	2.595	左旋肉碱	mg	1.2	25.4
烟酸(烟酰胺)	μg	151	3124	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.2	45.6
叶酸	μg	3.5	72.7	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.3	68.8
泛酸	μg	165	3413	膳食纤维			
维生素C	mg	4.1	83.9	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.77	15.88	低聚果糖	g	0.04	0.93
矿物质				核苷酸	mg	0.6	12.0
钠	mg	7	137	乳铁蛋白	mg	1.1	23.5
钾	mg	28	582	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	81.6

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

儲藏方法

- 1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
- 2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
- 3.开封后，请务必在一个月內食用完毕。

生产者:陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址:陕西省咸阳市乾县杨洪工业园区
官方网站:www.ylshi.com
电话:029-35303033
产地:陕西·咸阳
产品类别:幼儿配方食品
产品属性:乳基粉状
产品标准代号:GB 10767-2021
食品生产许可证编号:SC12961042004829
保质期:24个月
生产日期及批号:见罐底
检验合格证号:同生产日期

 **400 6060 780**
 工作时间 周一至周五 AM08:30 PM05:30



净含量:800克 国食注字 YP20230164

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄, 3段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂）、乳糖、低聚羊乳糖、低聚果糖、核糖、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二硬二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、醋酸视黄醇、胆钙化醇、*dl*-α-胡萝卜素酯、植物甲萘酮、盐酸硫胺素、维生素、盐酸吡哆醇、钴盐、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化钾、左旋肉碱、磷酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠）、动物双歧杆菌乳亚种B-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、嗜酸。

生羊乳加工

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂 次数
	量匙 数量	乳粉 克数	温开水 (ml)	
12-36个月	7	31.5	210	3

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)
30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业
资质人员建议。不当配制和使用不当可能
引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的
奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



1.在调配乳粉之前，
请洗净、擦干双手。



2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。



3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。



4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45℃左右，将正确量煮开过的温水(45℃左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。



5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。



6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

标签32:

营养成分表							
项目	单位	每100KJ	每100g	项目	单位	每100KJ	每100g
能量	kJ	100	2109	钾	mg	21	448
蛋白质	g	0.49	10.27	铜	μg	17.9	377.0
脂肪	g	1.22	25.82	镁	mg	1.6	34.7
亚油酸	g	0.16	3.46	铁	mg	0.19	4.02
α-亚麻酸	mg	20	425	锌	mg	0.18	3.73
碳水化合物	g	2.7	56.58	锰	μg	2.49	52.43
维生素				钙	mg	16	330
维生素A	μg RE	17	367	磷	mg	10	215
维生素D	μg	0.60	12.65	碘	μg	4.5	94.9
维生素E	mg α-TE	0.27	5.79	氯	mg	15	324
维生素K ₁	μg	1.71	36.12	硒	μg	0.90	18.98
维生素B ₁	μg	25	524	可选择成分			
维生素B ₂	μg	35	734	肌醇	mg	3.0	62.8
维生素B ₆	μg	13.5	283.7	牛磺酸	mg	1.6	34.2
维生素B ₁₂	μg	0.124	2.620	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.9
烟酸(烟酰胺)	μg	144	3031	二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.2	109.6
叶酸	μg	4.3	90.5	膳食纤维			
泛酸	μg	171	3615	低聚半乳糖	g	0.03	0.56
维生素C	mg	4.3	91.3	聚葡萄糖	g	0.07	1.57
生物素	μg	0.69	14.51	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.8
胆碱	mg	6.0	126.5	乳铁蛋白	mg	1.5	32.6
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	60.2
钠	mg	9	185	说明：每100mL奶液含乳粉13.5g			

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、乳糖、聚葡萄糖、低聚羊乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸盐、磷酸视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl- α -磷酸生育酚(维生素E)、维生素甲萘醌、维生素B₁、硫酸硫酸素(维生素B₆)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₅)、氰钴胺(维生素B₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸钾、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锌、硫酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳糖、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bb-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、嗜盐菌。



净含量:100克 国食注字 YP20230165

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

婴儿月龄	每次乳粉用量		每24小时 喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
0-1周	60	2	8
1-2周	90	3	6
2-4周	120	4	5
1-2月	150	5	5
2-4月	180	6	5
4-6月	210	7	5

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配和使用不当可能引起健康危害！

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，母乳不足或无母乳时可食用本产品。

产品类别：婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产日期
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC1296104200829

 品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

- 

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮至五分钟左右消毒。
- 

依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
- 

取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。
- 

盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧,并在一个月內用完。



标签33:

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2109	钾	mg 21 448
蛋白质	g	0.49	10.27	铜	µg 17.9 377.0
脂肪	g	1.22	25.82	镁	mg 1.6 34.7
亚油酸	g	0.16	3.46	铁	mg 0.19 4.02
α-亚麻酸	mg	20	425	锌	mg 0.18 3.73
碳水化合物	g	2.7	56.58	锰	µg 2.49 52.43
维生素				钙	mg 16 330
维生素A	µg RE	17	367	磷	mg 10 215
维生素D	µg	0.60	12.65	碘	µg 4.5 94.9
维生素E	mg α-TE	0.27	5.79	氯	mg 15 324
维生素K ₁	µg	1.71	36.12	硒	µg 0.90 18.98
维生素B ₁	µg	25	524	可选择成分	
维生素B ₂	µg	35	734	肌醇	mg 3.0 62.8
维生素B ₆	µg	13.5	283.7	牛磺酸	mg 1.6 34.2
维生素B ₁₂	µg	0.124	2.620	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 4.5 94.9
烟酸(烟酰胺)	µg	144	3031	二十碳四烯酸(ARA)	mg 5.2 109.6
叶酸	µg	4.3	90.5	膳食纤维	
泛酸	µg	171	3615	低聚半乳糖	g 0.03 0.56
维生素C	mg	4.3	91.3	聚葡萄糖	g 0.07 1.57
生物素	µg	0.69	14.51	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 0.2 3.8
胆碱	mg	6.0	126.5	乳铁蛋白	mg 1.5 32.6
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg 2.9 60.2
钠	mg	9	185	说明：每100mL奶液含乳粉13.5g	

配料表	
生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、酪蛋白磷酸肽(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、柠檬酸钠、磷酸三钙、磷酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。	

优利士®



1段

净含量:300克 国食注字 YP20230165

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

喂养用量建议表			
婴儿月龄	每次乳粉用量		每24小时 喂奶次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
0-1周	60	2	8
1-2周	90	3	6
2-4周	120	4	5
1-2月	150	5	5
2-4月	180	6	5
4-6月	210	7	5
说明：每平匙净含量约4.5克			
温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂 哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除 非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起 健康危害！ 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳 不足或无母乳时可食用本产品。			

贮存条件
置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在 一个月内用完。

产品类别：婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

奶具消毒及食用方法




1 调奶之前请洗手，彻底洗净
奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。
将奶具放入沸水中煮五分
钟彻底消毒。



2 依照婴幼儿月龄及喂奶表
的指示，将45℃左右准确份
量的温开水倒入消毒后的
奶瓶。



3 取下固定在罐盖上的量匙，
量取奶粉，依照喂奶表的指
示，加入准确份量的奶粉。



4 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶
粉完全溶解。喂奶前请先确
定奶液温度是否适合宝宝
食用。

 品牌官方网址
www.beiboer.cn

 产品咨询热线
400-029-8003



标签34:

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2109	钾	mg 21 448
蛋白质	g	0.49	10.27	铜	µg 17.9 377.0
脂肪	g	1.22	25.82	镁	mg 1.6 34.7
亚油酸	g	0.16	3.46	铁	mg 0.19 4.02
α-亚麻酸	mg	20	425	锌	mg 0.18 3.73
碳水化合物	g	2.7	56.58	锰	µg 2.49 52.43
维生素				钙	mg 16 330
维生素A	µg RE	17	367	磷	mg 10 215
维生素D	µg	0.60	12.65	碘	µg 4.5 94.9
维生素E	mg α-TE	0.27	5.79	氯	mg 15 324
维生素K ₁	µg	1.71	36.12	硒	µg 0.90 18.98
维生素B ₁	µg	25	524	可选择成分	
维生素B ₂	µg	35	734	肌醇	mg 3.0 62.8
维生素B ₆	µg	13.5	283.7	牛磺酸	mg 1.6 34.2
维生素B ₁₂	µg	0.124	2.620	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 4.5 94.9
烟酸(烟酰胺)	µg	144	3031	二十碳四烯酸(ARA)	mg 5.2 109.6
叶酸	µg	4.3	90.5	膳食纤维	
泛酸	µg	171	3615	低聚半乳糖	g 0.03 0.56
维生素C	mg	4.3	91.3	聚葡萄糖	g 0.07 1.57
生物素	µg	0.69	14.51	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 0.2 3.8
胆碱	mg	6.0	126.5	乳铁蛋白	mg 1.5 32.6
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg 2.9 60.2
钠	mg	9	185	说明：每100mL奶液含乳粉13.5g	

配料表	
生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、酪蛋白磷酸肽(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-磷酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、硫酸镁、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。	

优利士®

贝博儿®



净含量:400克 国食注字 YP20230165

1段

婴儿配方羊乳粉

(0-6月龄,1段)

喂哺用量建议表			
婴儿月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
0-1周	60	2	8
1-2周	90	3	6
2-4周	120	4	5
1-2月	150	5	5
2-4月	180	6	5
4-6月	210	7	5
说明：每平匙净含量约4.5克			
温馨提示:调奶时请使用罐内专用量匙,建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉,请勿随意改变冲调比例,除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害!			
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。			
贮存条件			
置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧,并在一个月内用完。			

奶具消毒及食用方法



① 调奶之前请洗手,彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。



② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示,将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。



③ 取下固定在罐盖上的量匙,量取奶粉,依照喂哺表的指示,加入准确份量的奶粉。



④ 盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

产品类别：婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

品牌官方网址

www.beiboer.cn

产品咨询热线

400-029-8003



6 949008 408613

标签35:

配料表
生乳乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油(DHA)、花生四烯酸油(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

产品类别：婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证书：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2109
蛋白质	g	0.49	10.27
脂肪	g	1.22	25.82
亚油酸	g	0.16	3.46
α-亚麻酸	mg	20	425
碳水化合物	g	2.7	56.58
维生素			
维生素A	μg RE	17	367
维生素D	μg	0.60	12.65
维生素E	mg α-TE	0.27	5.79
维生素K ₁	μg	1.71	36.12
维生素B ₁	μg	25	524
维生素B ₂	μg	35	734
维生素B ₆	μg	13.5	283.7
维生素B ₁₂	μg	0.124	2.620
烟酸(烟酰胺)	μg	144	3031
叶酸	μg	4.3	90.5
泛酸	μg	171	3615
维生素C	μg	4.3	91.3
生物素	μg	0.69	14.51
胆碱	mg	6.0	126.5
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	21	448
铜	μg	17.9	377.0
镁	mg	1.6	34.7
铁	mg	0.19	4.02
锌	mg	0.18	3.73
锰	μg	2.49	52.43
钙	mg	16	330
磷	mg	10	215
碘	μg	4.5	94.9
氯	mg	15	324
硒	μg	0.90	18.98
可选择成分			
肌醇	mg	3.0	62.8
牛磺酸	mg	1.6	34.2
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.9
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.2	109.6
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.07	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.8
乳铁蛋白	mg	1.5	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	60.2

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®

1段

净含量：700克 国食注字 YP20230165

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄, 1段)

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

1 调奶之前请洗手,彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

2 依照婴幼儿月龄及哺喂表的指示,将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶具。

3 取下固定在罐盖上的量匙,量取奶粉,依照喂哺表的指示,加入准确份量的奶粉。

4 盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧,并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
0-1周	60	2	8
1-2周	90	3	6
2-4周	120	4	5
1-2月	150	5	5
2-4月	180	6	5
4-6月	210	7	5

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙,建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉,请勿随意改变冲调比例,除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害!
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签36:

配料表
生乳乳、脱盐羊乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油(DHA)、花生四烯酸油(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氯化钴(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

产品类别：婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2109
蛋白质	g	0.49	10.27
脂肪	g	1.22	25.82
亚油酸	g	0.16	3.46
α-亚麻酸	mg	20	425
碳水化合物	g	2.7	56.58
维生素			
维生素A	μg RE	17	367
维生素D	μg	0.60	12.65
维生素E	mg α-TE	0.27	5.79
维生素K ₁	μg	1.71	36.12
维生素B ₁	μg	25	524
维生素B ₂	μg	35	734
维生素B ₆	μg	13.5	283.7
维生素B ₁₂	μg	0.124	2.620
烟酸(烟酰胺)	μg	144	3031
叶酸	μg	4.3	90.5
泛酸	μg	171	3615
维生素C	mg	4.3	91.3
生物素	μg	0.69	14.51
胆碱	mg	6.0	126.5
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	21	448
铜	μg	17.9	377.0
镁	mg	1.6	34.7
铁	mg	0.19	4.02
锌	mg	0.18	3.73
锰	μg	2.49	52.43
钙	mg	16	330
磷	mg	10	215
碘	μg	4.5	94.9
氯	mg	15	324
硒	μg	0.90	18.98
可选择成分			
肌醇	mg	3.0	62.8
牛磺酸	mg	1.6	34.2
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.9
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.2	109.6
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.07	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.8
乳铁蛋白	mg	1.5	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	60.2

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g



贝博儿®

1段

净含量：800克 国食注字 YP20230165

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄, 1段)



品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

- 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
- 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
- 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。
- 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表			
婴儿月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
0-1周	60	2	8
1-2周	90	3	6
2-4周	120	4	5
1-2月	150	5	5
2-4月	180	6	5
4-6月	210	7	5

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签37:

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2093	钾	mg 23 488
蛋白质	g	0.58	12.10	铜	µg 14.1 294.8
脂肪	g	1.21	25.30	镁	mg 2.0 41.5
亚油酸	g	0.13	2.81	铁	mg 0.30 6.28
α-亚麻酸	mg	16	340	锌	mg 0.18 3.67
碳水化合物	g	2.6	54.97	锰	µg 2.74 57.27
维生素				钙	mg 21 445
维生素A	µg RE	23	471	磷	mg 13 280
维生素D	µg	0.60	12.56	碘	µg 4.5 94.2
维生素E	mg α-TE	0.27	5.56	氯	mg 20 421
维生素K ₁	µg	1.75	36.60	硒	µg 0.66 13.77
维生素B ₁	µg	25	528	可选择成分	
维生素B ₂	µg	30	627	肌醇	mg 2.7 57.0
维生素B ₆	µg	13.8	287.8	牛磺酸	mg 1.6 33.0
维生素B ₁₂	µg	0.117	2.458	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 4.5 94.2
烟酸(烟酰胺)	µg	144	3005	二十碳四烯酸(ARA)	mg 5.4 112.1
叶酸	µg	3.5	72.5	膳食纤维	
泛酸	µg	170	3566	低聚半乳糖	g 0.03 0.56
维生素C	mg	4.4	91.4	聚葡萄糖	g 0.08 1.57
生物素	µg	0.71	14.89	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 0.1 2.6
胆碱	mg	6.0	125.6	乳铁蛋白	mg 1.6 32.6
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg 3.3 69.5
钠	mg	6	123	说明：每100mL奶液含乳粉13.5g	

配料表	
生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、酪蛋白磷酸肽(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三钙、碳酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。	

优利士®

贝博儿®



2段

净含量:300克 国食注字 YP20230166

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

喂哺用量建议表			
月龄	每次乳粉用量		每24小时 喂哺次数
	温开水量 (毫升)	平匙数	
6-12个月	210	7	3-4
说明：每平匙净含量约4.5克			
温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！ 6-12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。			
贮存条件			
置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。			

奶具消毒及食用方法



① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。



② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。



③ 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。



④ 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

产品类别：较大婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003



6 949008 408484

标签38:

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2093	钾	mg 23 488
蛋白质	g	0.58	12.10	铜	µg 14.1 294.8
脂肪	g	1.21	25.30	镁	mg 2.0 41.5
亚油酸	g	0.13	2.81	铁	mg 0.30 6.28
α-亚麻酸	mg	16	340	锌	mg 0.18 3.67
碳水化合物	g	2.6	54.97	锰	µg 2.74 57.27
维生素				钙	mg 21 445
维生素A	µg RE	23	471	磷	mg 13 280
维生素D	µg	0.60	12.56	碘	µg 4.5 94.2
维生素E	mg α-TE	0.27	5.56	氯	mg 20 421
维生素K ₁	µg	1.75	36.60	硒	µg 0.66 13.77
维生素B ₁	µg	25	528	可选择成分	
维生素B ₂	µg	30	627	肌醇	mg 2.7 57.0
维生素B ₆	µg	13.8	287.8	牛磺酸	mg 1.6 33.0
维生素B ₁₂	µg	0.117	2.458	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 4.5 94.2
烟酸(烟酰胺)	µg	144	3005	二十碳四烯酸(ARA)	mg 5.4 112.1
叶酸	µg	3.5	72.5	膳食纤维	
泛酸	µg	170	3566	低聚半乳糖	g 0.03 0.56
维生素C	mg	4.4	91.4	聚葡萄糖	g 0.08 1.57
生物素	µg	0.71	14.89	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 0.1 2.6
胆碱	mg	6.0	125.6	乳铁蛋白	mg 1.6 32.6
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg 3.3 69.5
钠	mg	6	123	说明：每100mL奶液含乳粉13.5g	

配料表	
生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、酪蛋白磷酸酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-脂酰生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三钙、碳酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。	

优利士®

贝博儿®



净含量:400克 国食注字 YP20230166

2段

较大婴儿配方羊乳粉

(6-12月龄,2段)

喂哺用量建议表			
月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
6-12个月	210	7	3-4

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
6-12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

奶具消毒及食用方法	
①	调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
②	依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
③	取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。
④	盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

产品类别：较大婴儿配方食品

生产日期及批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

销售热线：029-81776389

产品属性：乳基粉状

保质期：24个月

产地：陕西 咸阳

产品标准代号：GB 10766-2021

食品生产许可证编号：SC12961042400829

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003



6 949008 408620

标签39:

配料表
生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三钙、碳酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

产品类别：较大婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2093
蛋白质	g	0.58	12.10
脂肪	g	1.21	25.30
亚油酸	g	0.13	2.81
α-亚麻酸	mg	16	340
碳水化合物	g	2.6	54.97
维生素			
维生素A	μg RE	23	471
维生素D	μg	0.60	12.56
维生素E	mg α-TE	0.27	5.56
维生素K ₁	μg	1.75	36.60
维生素B ₁	μg	25	528
维生素B ₂	μg	30	627
维生素B ₆	μg	13.8	287.8
维生素B ₁₂	μg	0.117	2.458
烟酸(烟酰胺)	μg	144	3005
叶酸	μg	3.5	72.5
泛酸	μg	170	3566
维生素C	mg	4.4	91.4
生物素	μg	0.71	14.89
胆碱	mg	6.0	125.6
矿物质			
钠	mg	6	123
钾	mg	23	488
铜	μg	14.1	294.8
镁	mg	2.0	41.5
铁	mg	0.30	6.28
锌	mg	0.18	3.67
锰	μg	2.74	57.27
钙	mg	21	445
磷	mg	13	280
碘	μg	4.5	94.2
氯	mg	20	421
硒	μg	0.66	13.77
可选择成分			
肌醇	mg	2.7	57.0
牛磺酸	mg	1.6	33.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.2
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.4	112.1
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.08	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.6
乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	69.5
说明：每100mL奶液含乳粉13.5g			

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®

净含量:700克 国食注字 YP20230166

2段

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

1 调奶之前请洗手,彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残留。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

2 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示,将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

3 取下固定在罐盖上的量匙,量取奶粉,依照喂哺表的指示,加入准确份量的奶粉。

4 盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧,并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
6-12个月	210	7	3-4

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙,建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉,请勿随意改变冲调比例,除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
6~12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。

标签40:

配料表
生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三钙、碳酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钠、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

产品类别：较大婴儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2093
蛋白质	g	0.58	12.10
脂肪	g	1.21	25.30
亚油酸	g	0.13	2.81
α-亚麻酸	mg	16	340
碳水化合物	g	2.6	54.97
维生素			
维生素A	μg RE	23	471
维生素D	μg	0.60	12.56
维生素E	mg α-TE	0.27	5.56
维生素K ₁	μg	1.75	36.60
维生素B ₁	μg	25	528
维生素B ₂	μg	30	627
维生素B ₆	μg	13.8	287.8
维生素B ₁₂	μg	0.117	2.458
烟酸(烟酰胺)	μg	144	3005
叶酸	μg	3.5	72.5
泛酸	μg	170	3566
维生素C	mg	4.4	91.4
生物素	μg	0.71	14.89
胆碱	mg	6.0	125.6
矿物质			
钠	mg	6	123
钾	mg	23	488
铜	μg	14.1	294.8
镁	mg	2.0	41.5
铁	mg	0.30	6.28
锌	mg	0.18	3.67
锰	μg	2.74	57.27
钙	mg	21	445
磷	mg	13	280
碘	μg	4.5	94.2
氯	mg	20	421
硒	μg	0.66	13.77
可选择成分			
肌醇	mg	2.7	57.0
牛磺酸	mg	1.6	33.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.2
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.4	112.1
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.08	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.6
乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	69.5

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®

净含量:800克 国食注字YP20230166

2段

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄,2段)

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

①

调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残留。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

②

依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③

取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④

盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
6-12个月	210	7	3-4

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。

标签41:

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2067	铜	µg 14.4 298.6
蛋白质	g	0.72	14.80	镁	mg 1.9 38.3
脂肪	g	1.19	24.60	铁	mg 0.30 6.20
亚油酸	g	0.11	2.25	锌	mg 0.15 3.04
α-亚麻酸	mg	12	248	钙	mg 24 503
碳水化合物	g	2.5	52.27	磷	mg 17 354
维生素				碘	µg 2.7 55.7
维生素A	µg RE	23	466	氯	mg 23 484
维生素D	µg	0.60	12.40	可选择成分	
维生素E	mg α-TE	0.26	5.36	硒	µg 0.71 14.74
维生素K ₁	µg	1.79	37.01	胆碱	mg 6.0 124.0
维生素B ₁	µg	26	531	锰	µg 2.91 60.25
维生素B ₂	µg	32	659	肌醇	mg 2.9 60.9
维生素B ₆	µg	13.8	284.3	牛磺酸	mg 1.8 36.4
维生素B ₁₂	µg	0.122	2.519	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 1.5 30.8
烟酸(烟酰胺)	µg	147	3033	二十碳四烯酸(ARA)	mg 2.6 53.4
叶酸	µg	3.5	72.7	膳食纤维	
泛酸	µg	180	3723	低聚半乳糖	g 0.03 0.56
维生素C	mg	3.9	81.5	聚葡萄糖	g 0.08 1.57
生物素	µg	0.76	15.68	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 0.1 2.4
矿物质				乳铁蛋白	mg 1.6 32.6
钠	mg	7	143	酪蛋白磷酸肽	mg 3.9 79.6
钾	mg	27	560	说明：每100mL奶液含乳粉13.5g	

配料表	
生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、酪酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-磷酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、碳酸亚铁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。	
生羊乳加工	

优利士®

贝博儿®



3段

净含量:300克 国食注字 YP20230167

幼儿配方羊乳粉

(12-36月龄,3段)

喂哺用量建议表			
月龄	每次乳粉用量		每24小时 喂哺次数
	温开水量 (毫升)	平匙数	
12-36个月	210	7	3
说明：每平匙净含量约4.5克			
温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！			
贮存条件			
置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。			

奶具消毒及食用方法	
①	调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残留。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
②	依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
③	取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。
④	盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

6 949008 408491

产品类别：幼儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC1296104200829

标签42:

营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2067	铜	µg 14.4 298.6
蛋白质	g	0.72	14.80	镁	mg 1.9 38.3
脂肪	g	1.19	24.60	铁	mg 0.30 6.20
亚油酸	g	0.11	2.25	锌	mg 0.15 3.04
α-亚麻酸	mg	12	248	钙	mg 24 503
碳水化合物	g	2.5	52.27	磷	mg 17 354
维生素				碘	µg 2.7 55.7
维生素A	µg RE	23	466	氯	mg 23 484
维生素D	µg	0.60	12.40	可选择成分	
维生素E	mg α-TE	0.26	5.36	硒	µg 0.71 14.74
维生素K ₁	µg	1.79	37.01	胆碱	mg 6.0 124.0
维生素B ₁	µg	26	531	锰	µg 2.91 60.25
维生素B ₂	µg	32	659	肌醇	mg 2.9 60.9
维生素B ₆	µg	13.8	284.3	牛磺酸	mg 1.8 36.4
维生素B ₁₂	µg	0.122	2.519	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 1.5 30.8
烟酸(烟酰胺)	µg	147	3033	二十碳四烯酸(ARA)	mg 2.6 53.4
叶酸	µg	3.5	72.7	膳食纤维	
泛酸	µg	180	3723	低聚半乳糖	g 0.03 0.56
维生素C	mg	3.9	81.5	聚葡萄糖	g 0.08 1.57
生物素	µg	0.76	15.68	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 0.1 2.4
矿物质				乳铁蛋白	mg 1.6 32.6
钠	mg	7	143	酪蛋白磷酸肽	mg 3.9 79.6
钾	mg	27	560	说明：每100mL奶液含乳粉13.5g	

配料表	
生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、脂酰视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-脂酰生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、碳酸亚铁、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、硫酸锰、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。	
生羊乳加工	

优利士®

贝博儿®



3段

净含量:400克 国食注字YP20230167

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

喂哺用量建议表			
月龄	每次乳粉用量		每24小时 喂哺次数
	温开水量 (毫升)	平匙数	
12-36个月	210	7	3

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

贮存条件	
置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。	

奶具消毒及食用方法



1 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。



2 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45℃左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。



3 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。



4 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。



品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003



6 949008 408637

产品类别：幼儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

标签43:

配料表
生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、维生素A(维生素A)、维生素D(维生素D)、dl-α-生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

生羊乳加工

产品类别：幼儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.72	14.80
脂肪	g	1.19	24.60
亚油酸	g	0.11	2.25
α-亚麻酸	mg	12	248
碳水化合物	g	2.5	52.27
维生素			
维生素A	μg RE	23	466
维生素D	μg	0.60	12.40
维生素E	mg α-TE	0.26	5.36
维生素K ₁	μg	1.79	37.01
维生素B ₁	μg	26	531
维生素B ₂	μg	32	659
维生素B ₆	μg	13.8	284.3
维生素B ₁₂	μg	0.122	2.519
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3033
叶酸	μg	3.5	72.7
泛酸	μg	180	3723
维生素C	mg	3.9	81.5
生物素	μg	0.76	15.68
矿物质			
钠	mg	7	143
钾	mg	27	560
铜	μg	14.4	298.6
镁	mg	1.9	38.3
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.15	3.04
钙	mg	24	503
磷	mg	17	354
碘	μg	2.7	55.7
氯	mg	23	484
可选择成分			
硒	μg	0.71	14.74
胆碱	mg	6.0	124.0
锰	μg	2.91	60.25
肌醇	mg	2.9	60.9
牛磺酸	mg	1.8	36.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.5	30.8
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.6	53.4
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.08	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.4
乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	79.6
说明：每100mL奶液含乳粉13.5g			

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®

净含量:700克 国食注字 YP20230167

3段

幼儿配方羊乳粉

(12-36月龄,3段)

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残留奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③ 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④ 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
12-36个月	210	7	3

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

标签44:

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚羊乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸盐、酪酸钙黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-脂酰生育醇(维生素E)、植物甲萘酚(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氟氯化钙(维生素B₁₂)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bif-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2057
蛋白质	g	0.72	14.80
脂肪	g	1.19	24.60
亚油酸	g	0.11	2.25
α-亚麻酸	mg	12	248
碳水化合物	g	2.5	52.27
维生素A	μg RE	23	466
维生素E	μg	0.60	12.40
维生素D	mg α-TE	0.26	36
维生素K ₁	μg	1.79	37.01
维生素B ₁	μg	26	531
维生素B ₂	μg	32	659
维生素B ₆	μg	13.8	284.3
维生素B ₁₂	μg	0.122	2.519
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3033
叶酸	μg	3.5	72.7
泛酸	μg	180	3723
维生素C	mg	3.9	81.5
矿物质	μg	0.76	15.68
钠	mg	7	143
钾	mg	27	560
铜	μg	14.4	298.6
镁	mg	1.9	38.3
铁	mg	0.30	62.0
锌	mg	0.15	3.04
钙	mg	24	503
磷	mg	17	354
碘	μg	2.7	55.7
氯	mg	23	484
可选择成分			
酒	μg	0.71	14.74
胆碱	mg	6.0	124.0
肌醇	μg	2.91	60.25
锰	mg	2.9	60.9
牛磺酸	mg	1.8	36.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.5	30.8
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.6	53.4
膳食纤维			
低聚羊乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.08	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.4
乳铁蛋白	g	1.6	32.6
酪蛋白磷酸盐	mg	3.9	79.6

生羊乳加工

产品类别：幼儿配方食品
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号：同生产日期号
生产者：陕西优利士乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨洪工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

6 1949008 407968

