

# 附件2 陕西和氏乳业集团陇州有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

## 标签1

### 配料表

生羊乳、脱脂乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、花生油硬脂油酸、二十二碳六烯酸油酸(氢解法)、2'-岩藻糖基乳糖、酪蛋白磷酸盐、胆碱(氯化胆碱)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、牛磺酸、碳酸钾、维生素A(胆酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚生育醇)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、磷酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、柠檬酸钠、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸钾。

### 奶具消毒及调奶方法



1. 调奶之前须洗手, 奶在煮沸前, 奶嘴及奶壶的奶勺。
2. 清洗器具放入沸水中煮五分钟, 晾干。
3. 调奶用水煮沸后自凉至50°C左右。
4. 按照婴儿年龄及(年龄)对量取适量的奶粉, 由少至多, 让宝宝逐步适应奶粉, 直至宝宝不觉得饿的喂养, 打开包装后, 在瓶身内食用完为止。
5. 调奶时(喂奶)用适量温水(40°C)加入适量奶粉(平匙)的奶粉, 只可用专用量匙。
6. 添加奶后直至完全溶解, 即可喂哺婴儿。

高钙奶罐顶部有防伪标识, 只可用专用量匙, 用小勺或多于指定量的奶粉, 由少至多, 让宝宝逐步适应奶粉, 直至宝宝不觉得饿的喂养, 打开包装后, 在瓶身内食用完为止。

客服热线: 400-887-1968

注意: 已冲调好的美贝嘉1段配方羊乳粉在一个小时内食用完为宜。

### 喂哺用量建议表

月龄	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	每日喂哺次数(次)
第0至2周	60	2	7-8
第2至4周	90	3	6-7
第1至2个月	120	4	5-6
第2至4个月	150	5	5-6
第4至6个月	180	6	5-6

奶量约为4.5类羊乳奶, 兑水30毫升  
注意: 未经消毒的奶、奶瓶或不洁的奶嘴, 均会引起婴儿不适, 每次只喂哺一瓶奶, 调好的奶液应立即饮用, 不要将未喝完的奶液留存。



## 美贝嘉®

# 婴儿配方羊乳粉

## (0-6月龄, 1段)



净含量: 800克  
注册号: 国食注字YP20230173

# 1段

### 营养成分表

项目	单位	每100g	每100kcal
能量	kJ	100	2070
蛋白质	g	0.94	11.13
脂肪	g	1.18	24.50
碳水化合物	g	0.13	2.59
总糖	g	15	312
膳食纤维	g	2.7	55.6
维生素			
维生素A	μg RE	19	401
维生素D	μg	0.70	14.45
维生素E	mg α-TE	0.28	5.79
维生素K <sub>1</sub>	μg	3.48	72.00
维生素B <sub>1</sub>	μg	34	699
维生素B <sub>2</sub>	μg	55	1143
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.2	294.6
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.130	2.685
烟酸(烟酰胺)	μg	146	3021
叶酸	μg	5.1	105.0
泛酸	μg	124	2565
维生素C	mg	8.3	171.3
生物素	μg	0.97	20.07
胆碱	mg	6.3	130.4
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	22	456
钙	mg	17.9	371.0
镁	mg	1.7	35.3
铁	mg	0.22	4.52
锌	mg	0.22	4.49
硒	μg	3.25	68.31
铜	μg	18	376
锰	μg	12	247
磷	μg	5.3	109.9
氯	mg	16	339
碘	μg	0.90	18.70
可溶性膳食纤维	mg	5.5	114.1
总膳食纤维	mg	2.3	46.9
左旋肉碱	mg	2.3	47.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	81.0
二十碳五烯酸(EPA/ARA)	mg	4.3	90.0
低聚半乳糖	g	0.05	1.03
低聚果糖	g	0.09	1.88
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.03	0.69
1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	g	0.18	3.82
叶黄素	μg	4.3	90.0
胆碱白磷酸盐	mg	5.9	122.4

即食状态下, 每100毫升含有1段配方羊乳粉13.5克。

### 注意事项

**贮存条件**  
本品应放在阴凉干燥处, 开封后请在四周内食用完, 请勿放入冰箱保存, 每次食用后请密封盖紧罐盖, 以防止受潮或进入异物。

**温馨提示**  
对于0-6月龄的婴儿, 最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

规格: 800克/罐  
保质期: 24个月  
生产日期、生产批号、保质期见罐盖  
检验检疫合格证书号  
产品标准代号: GB10765-2021  
产品类型(属性): 乳基型1段配方食品(粉体)  
生产商: 陕西和氏乳业集团有限公司(A)  
地址: 陕西省宝鸡市陈仓区陈仓工业园西大街100号  
食品生产许可证编号: SC1204103270038  
生产商: 陕西和氏乳业集团陈仓分公司(B)  
地址: 陕西省宝鸡市陈仓区陈仓工业园西大街100号  
食品生产许可证编号: SC1204103270001  
产地: 陕西-宝鸡  
销售电话: 400-887-1968  
电子信箱: heshimilk@126.com  
网址: www.heshimilk.com  
邮编: 721200  
注: 生产日期来自生产代商生产批号对应地址。

# 标签2



## 美贝嘉

### 婴儿配方羊乳粉 (0-6月龄,1段)

#### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、2'-岩藻糖基乳糖、酪蛋白磷酸盐、胆碱氯化胆碱、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、牛磺酸、磷酸钙、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、葡萄糖、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、柠檬酸钠、硫酸锰、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、碘酸钾。

#### 奶具消毒及调奶方法



1. 调奶之前请洗手, 彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的技巧。
  2. 调奶器具放入沸水中煮五分钟, 待凉。
  3. 调奶用水煮沸后冷却至50°C左右。
  4. 依照婴儿年龄及(喂哺用量建议表)的指示, 先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
  5. 再依照(喂哺用量建议表)的指示加入准确份量(平匙)的乳粉, 只可用专用量匙。
  6. 摇动奶瓶直至乳粉完全溶解, 即可喂哺婴儿。
- 调奶时请遵照喂哺用量建议表, 只可用专用量匙, 用少于或多于指定份量的乳粉, 会令婴儿得不到适量的营养。打开包装后, 在四周内食用完为宜。

#### 喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数(次)
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	
第0至2周	60	2	7-8
第2至4周	90	3	6-7
第1至2个月	120	4	5-6
第2至4个月	150	5	5-6
第4至6个月	180	6	5-6

每平匙约4.5克羊乳粉, 兑水30毫升  
注意: 未经煮沸消毒的水, 奶匙或不恰当的温度, 均会令宝宝(婴儿)不适, 每次只喂哺一瓶奶, 调好的奶液应立即饮用, 不要将未喝完的奶液留存。  
● 注意: 已冲调好的美贝嘉1段配方羊乳粉在一个小时内以用完为宜。



净含量: 400克  
注册号: 国食注字YP20230173

1段

#### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	160	377.0
蛋白质	g	15.4	11.3
脂肪	g	1.8	12.50
碳水化合物	g	1.13	7.59
维生素A	μg	15	177
维生素D	μg	2.7	55.5
维生素A	μg RE	19	401
维生素D	μg	0.70	14.45
维生素E	mg α-TE	0.28	5.79
维生素K	μg	3.48	72.00
维生素B1	μg	34	699
维生素B2	μg	62	1143
维生素B6	μg	14.2	294.6
维生素B12	μg	1.30	268.5
烟酸(烟酰胺)	μg	146	3011
叶酸	μg	4.1	85.0
泛酸	μg	174	3585
维生素C	mg	6.3	131.3
生物素	μg	1.97	40.07
牛磺酸	mg	6.3	131.4
胆碱	mg	6	115
肌醇	mg	22	456
左旋肉碱	μg	17.9	371.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	35.8
花生四烯酸(AARA)	mg	1.37	28.2
低聚果糖	mg	1.95	40.31
低聚半乳糖	mg	18	376
葡萄糖基果糖	mg	17	351
2'-岩藻糖基乳糖	mg	15	319.9
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	μg	16	339
叶黄素	μg	16	339
葡萄糖磷酸盐	mg	1.90	39.70
牛磺酸	mg	5.5	114.1
胆碱	mg	4.3	89.6
左旋肉碱	mg	2.3	47.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.3	47.9
花生四烯酸(AARA)	mg	1.7	35.8
低聚果糖	g	0.75	15.5
低聚半乳糖	g	0.09	1.88
葡萄糖基果糖	g	0.03	0.69
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.13	2.70
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	4.3	90.0
叶黄素	g	5.9	122.4

即食状态下, 每 100 毫升含婴儿1段配方羊乳粉 13.5 克。

#### 注意事项

**贮存条件**  
本品应放在阴凉干燥处, 开封后请在四周内食用完, 请勿放入冰箱保存。每次食用后请务必盖紧罐盖, 以防止吸潮或进入异物。

**温馨提示**  
对于0-6月龄的婴儿, 最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



规格: 400克/罐  
保质期: 24个月  
生产日期、生产批号及保质期详见罐体检验合格证号  
产品标准代号: GB10765-2021  
产品类型/属性: 乳基婴儿配方食品(粉状)  
生产商: 陕西和氏乳业集团有限公司(陕)  
地址: 陕西省宝鸡市陈仓区食品工业园区关东路9号

食品生产许可证编号: SC12961032700738  
生产商: 陕西和氏乳业集团有限公司(陕)  
地址: 陕西省宝鸡市陈仓区陈仓镇陈仓路48号  
食品生产许可证编号: SC12961032700891  
产地: 陕西·宝鸡  
销售电话: 029-89240392  
电子邮箱: heshimilk@126.com  
网址: www.heshimilk.com  
邮编: 721200

注: 生产日期单位字母代表生产商及对应地址

咨询热线  
400-887-1968



# 标签3

## 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、2'-岩藻糖基乳糖、酪蛋白磷酸肽、胆碱(氯化胆碱)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、牛磺酸、碳酸钾、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B3(盐酸吡哆醇)、维生素B6(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、柠檬酸钠、硫酸锰、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、碘酸钾。

## 奶具消毒及调奶方法



1.调奶之前请洗手,彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的奶头。  
2.将奶具放入沸水中煮五分钟,待用。  
3.倒掉沸水煮沸后冷却至50°C左右。  
4.取奶具时,年龄及(请参照量建议表)的指示,先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶具。  
5.另依照(请参照量建议表)的指示加入准确份量(平匙)的奶粉,只可用专用量匙。  
6.摇晃奶瓶直至乳粉完全溶解,即可喂哺婴儿。

调奶时请遵照喂哺用量建议表,只可用专用量匙。用少于或多于指定份量的乳粉,会令婴儿得不到适量的营养。打开包装后,在四小时内食用完为佳。

### 喂哺用量建议表

月龄	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	每日喂哺次数
第0至2周	60	2	7-8
第2至4周	90	3	6-7
第1至2个月	120	4	5-6
第2至4个月	150	5	5-6
第4至6个月	180	6	5-6

每平匙约4.5克羊乳粉,兑水30毫升  
注意:未经煮沸消毒的水,奶量或不恰当的浓度,均会引起婴儿不适。每次只需调一匙奶,调好的奶液应立即饮用,不要将未喝完的奶液留存。



●注意:已冲调好的美贝嘉1段配方羊乳粉在一个小时内饮用完为佳。



# 美贝嘉® 婴儿配方羊乳粉 (0-6月龄,1段)



净含量:108克

注册号:国食注字 YP20230173

## 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	160	2070
蛋白质	g	15.4	11.13
脂肪	g	11.8	14.90
碳水化合物	g	13.3	16.59
维生素A	μg RE	19	401
维生素D	μg	0.70	14.45
维生素E	mg α-TE	0.26	5.79
维生素K	μg	3.88	72.00
维生素B1	μg	34	699
维生素B2	μg	55	1143
维生素B6	μg	14.2	294.6
维生素B12	μg	0.130	2.685
叶酸(叶酸酸)	μg	146	3021
烟酸	μg	174	3550
维生素C	mg	83	1713
生物素	μg	0.97	20.07
泛酸	mg	63	130.4
铁	mg	9	185
锌	mg	72	456
铜	μg	179	371.0
锰	μg	1.7	35.8
钾	mg	102	2059
钠	mg	109	2249
钙	mg	135	2793
磷	mg	18	375
镁	mg	12	247
硒	μg	53	109.9
碘	μg	16	339
氯	mg	0.90	18.70
可选择成分			
肌醇	mg	55	114.1
牛磺酸	mg	23	46.9
左旋肉碱	mg	23	46.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	43	87.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	43	87.0
胆碱半乳糖	mg	0.05	1.03
益生元	mg	0.08	1.68
2'-岩藻糖基乳糖	mg	0.03	0.69
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.18	3.62
叶黄素	μg	4.3	90.0
酪蛋白磷酸肽	mg	5.9	122.4

即食状态下,每100毫升含银100微克(配方羊乳粉135克)

## 注意事项

### 贮存条件

本品应放在阴凉干燥处,开封后请在四周内食用完,请勿放入冰箱保存。每次食用后请务必盖紧罐盖,以防止吸潮或进入异物。

### 温馨提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



规格:108克/罐

保质期:24个月

生产日期、生产批号及保质期详见罐底

检验合格证书号

产品标准代号:GB10765-2021

产品类别/属性:乳基婴儿配方食品(乳状)

生产商:陕西和氏乳业集团有限公司(A)

地址:陕西省宝鸡市陈仓区食品工业园区关和路9号

食品生产许可证编号:SC12961032700738

生产商:陕西和氏乳业集团陇州有限公司(B)

地址:陕西省宝鸡市陈仓区陈仓镇陈仓路43号

食品生产许可证编号:SC12961032700881

产地:陕西·宝鸡

销售电话:0917-80240302

电子邮箱:heshimilk@126.com

网址:www.heshimilk.com

邮编:721200

注:生产日期末位字母代表生产商及对应地址



# 标签4

### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物油(大豆油、玉米油、椰子油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、2'-岩藻糖基乳糖、酪蛋白磷酸盐、胆碱(氯化胆碱)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、牛磺酸、碳酸钾、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(di-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、L-抗坏血酸、生物素(D-生物素)、硬脂钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、柠檬酸钠、硫酸锰、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、碘酸钾。

### 奶具消毒及调奶方法



1. 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的奶刷。
2. 将奶具放入沸水中煮沸5分钟，待用。
3. 调奶用沸水调出并冷却至50℃左右。
4. 按照婴儿冲装及(哺喂用量建议表)的指示，先将准确计量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
5. 再按照(哺喂用量建议表)的指示加入准确份量(平匙)的乳粉，只可用专用量匙。
6. 摇匀奶液直至乳粉完全溶解，即可哺喂婴儿。

调奶时请避免用嘴直接接触，只可用专用量匙。由少于或多于指定份量的乳粉，会导致婴儿得不到适量的营养。打开包装后，在四小时内食用完为宜。

客服热线  
400-887-1968

●注意：已冲调好的美贝嘉2段配方羊乳粉在一个小时内饮用完为宜。

### 哺喂用量建议表

每次哺喂份量

月龄	温开水(毫升)	乳粉(平匙)	每日哺喂次数(次)
婴儿至8个月	180	6	4-5
第8至12个月	210	7	3-4

每平匙约4.5克羊乳粉，兑水30毫升  
注意：未经煮沸消毒的水、奶嘴或不相宜的奶器，均会导致婴儿不适，每次只需用一平匙，调好的奶液应立即饮用，不要将未喝的奶液留存。



## 美贝嘉<sup>®</sup>

# 较大婴儿配方羊乳粉

## (6-12月龄, 2段)



2段

净含量: 800克

注册号: 国食注字YP20230174

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2006
蛋白质	g	3.60	12.13
脂肪	g	1.06	21.37
碳水化合物	g	0.13	2.53
α-胡萝卜素	mg	15	307
维生素A	μg RE	23	452
维生素D	μg	0.68	13.60
维生素E	mg α-TE	0.22	4.49
维生素K <sub>1</sub>	μg	3.59	72.00
维生素B <sub>1</sub>	μg	34	689
维生素B <sub>2</sub>	μg	52	1045
维生素B <sub>6</sub>	μg	15.9	320.2
维生素B <sub>12</sub>	μg	9.129	2.981
烟酸(烟酰胺)	μg	151	3041
叶酸	μg	4.9	96.0
泛酸	μg	123	2478
维生素C	mg	8.5	171.3
生物素	μg	0.95	19.13
胆碱	mg	6.1	122.1
钙	mg	10	191
钾	mg	23	453
钠	μg	17.7	356.3
镁	mg	1.9	36.0
锌	mg	0.30	6.10
铁	mg	0.22	4.42
铜	μg	4.38	87.98
锰	mg	24	475
磷	mg	15	299
氯	μg	4.5	90.5
硒	mg	24	476
碘	μg	0.63	12.73
可溶性成分	mg	5.2	104.7
乳糖	mg	2.4	47.3
左旋肉碱	mg	2.3	45.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	81.0
二十二碳四烯酸(ARA)	mg	4.5	90.0
低聚半乳糖	g	0.05	1.03
低聚果糖	g	0.09	1.88
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.03	0.69
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.10
叶黄素	μg	10.5	210.0
胆钙化醇	mg	7.8	153.0

即食状态下，每100毫升较大婴儿(配方羊乳粉)13.5克。

### 注意事项

**贮存条件**  
本品应放在阴凉干燥处，开封后请在四周内食用完，请勿放入冰箱保存。每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止细菌进入并污染。

**温馨提示**  
6个月以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。



规格: 800克/罐  
保质期: 24个月  
生产日期、生产批号及保质期见罐底  
防伪合格证号参见批号  
产品标准代号: GB 10766-2021  
产品类型(属性): 乳基较大婴儿配方食品(粉状)  
生产商: 陕西和氏乳业集团有限公司(A)  
地址: 陕西省宝鸡市陈仓区五宝镇工业园区  
食品生产许可证编号: SC1296102790738  
生产商: 陕西和氏乳业集团有限公司(B)  
地址: 陕西省宝鸡市陈仓区五宝镇工业园区4号  
食品生产许可证编号: SC1296102790003  
产地: 陕西·宝鸡  
服务热线: 029-89340392  
电子邮箱: heheshi@126.com  
网址: www.heheshi.com  
邮编: 721200  
注: 生产日期与批号不代表生产地及贮存地址。

# 标签5



## 美贝嘉

### 较大婴儿配方羊乳粉 (6-12月龄, 2段)

#### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物油(大豆油、玉米油、椰子油)、1,3-二油醇2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油酸、二十二碳六烯酸油酸(发酵法)、2'-岩藻糖基乳糖、酪蛋白磷酸盐、柠檬(氯化钾)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、牛磺酸、亚硫酸、维生素A(维生素A)、维生素D(维生素D)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B3(盐酸吡哆醇)、维生素B6(氯化吡哆醇)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、L-抗坏血酸、生物素(D-生物素)、碳酸钠、偏磷酸钙、磷酸亚铁、磷酸锌、柠檬酸钠、硫酸锰、硫酸铜、硫酸钾、亚硫酸钠、磷酸钾。

#### 奶具消毒及调奶方法



1. 调奶之前请洗手, 彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的奶奶。
2. 将奶瓶放入沸水中煮五分钟, 待用。
3. 调奶用水煮沸后冷却至50°C左右。
4. 按照婴儿年龄及(奶嘴用量建议表)的指示, 先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
5. 再按照(奶嘴用量建议表)的指示加入准确份量(平匙)的乳粉, 只可用专用量匙。
6. 摇匀奶直至乳粉完全溶解, 即可喂哺婴儿。

调奶时请遵照奶嘴用量建议表, 只可用专用量匙。而少于或多于指定份量的乳粉, 会导致婴儿得不到适量的营养, 打开包装后, 在四周内食用完为佳。

#### 喂奶用量建议表

每次喂奶份量

月龄	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	每日喂奶次数(次)
第6-8个月	180	6	4-5
第8-12个月	210	7	3-4

每平匙约4.5克羊乳粉, 兑水30毫升  
注意: 未经煮沸消毒的水、奶基或不恰当浓度, 均会引起婴儿不适。每次只需调一瓶奶, 调好的奶液应立即饮用, 不要将未喝完的奶液留存。

● 注意: 已冲调好的美贝嘉2段配方羊乳粉在一个小时内饮用完为佳。



净含量: 400克  
注册号: 国食注字YP20230174

2段

#### 营养成分表

项目	单位	每100g	每100g
能量	kJ	780	2038
蛋白质	g	16.0	17.0
脂肪	g	1.13	2.53
碳水化合物	g	1.1	3.07
膳食纤维	g	2.9	57.3
维生素A	μg RE	33	452
维生素D	μg	0.168	13.80
维生素E	mg α-TE	0.277	4.44
维生素K	μg	1.58	72.50
维生素B1	μg	34	690
维生素B2	μg	42	1045
维生素B3	μg	72	3007
维生素B6	μg	0.125	3.581
维生素C	mg	157	3041
维生素K	μg	4.6	88.8
维生素E	μg	1.23	2676
维生素C	mg	8.5	171
维生素K	μg	0.6	10.3
维生素E	μg	0.1	1.22
铁	mg	10	161
锌	mg	44	484
铜	μg	17.7	352.3
钾	mg	1.6	38.3
钠	mg	0.30	6.1
钙	mg	0.22	4.4
镁	μg	4.38	87.38
磷	mg	24	475
氯	mg	11	269
碘	μg	4.5	90.5
硒	μg	24	476
锰	μg	7.63	152.7
可溶性膳食纤维	g	2.5	104.7
牛磺酸	mg	2.4	47.4
古罗昔碱	mg	2.1	41.7
二十五个核苷 (DNA)	mg	4.1	81.1
二十二个核苷 (AAARA)	mg	4.7	93.1
胆碱	mg	0.16	3.13
胆碱	mg	0.16	3.13
7-倍乳糖基乳糖	g	0.03	0.63
1,3-二油醇2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.03
时食量	g	10.5	210.0
脱氢白蛋白酸钠	mg	7.6	153.0

即食状态下, 每100毫升含较大婴儿配方羊乳粉13.5克。

#### 注意事项

**贮存条件**  
本品应放在阴凉干燥处, 开封后请在四周内食用完, 请勿放入冰箱保存, 每次食用后请务必盖紧罐盖, 以防止吸潮或进入异物。

#### 温馨提示

6个月龄以上婴儿食用本产品时, 须配合添加辅食。



规格: 400克/罐  
保质期: 24个月  
生产日期、生产批号及保质期详见罐底  
检验合格证书号: 参见批号  
产品标准代号: GB10766-2021  
产品类型/属性: 乳基较大婴儿配方食品/粉状  
生产商: 陕西和氏乳业集团有限公司(A)  
地址: 陕西省宝鸡市眉县食品工业园区关和路9号

食品生产许可证编号: SC12961032700738  
生产商: 陕西和氏乳业集团陆州有限公司(B)  
地址: 陕西省宝鸡市眉县城关镇路48号  
食品生产许可证编号: SC12961032700891  
产地: 陕西-宝鸡  
联系电话: 029-89240392  
电子邮箱: heshimilk@126.com  
网址: www.heshimilk.com  
邮编: 721200

注: 生产日期末位字母代表生产商及对应地址

咨询热线  
400-887-1968



# 标签6

### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、椰子油)、1,3-二油醇-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、低聚半乳糖、二十二碳六烯酸酯(发酵法)、花生四烯酸酯、2'-岩藻糖基乳糖、酪蛋白磷酸盐、胆碱(氯化胆碱)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、牛磺酸、磷酸钾、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B3(盐酸吡哆醇)、维生素B5(泛酸)、维生素B6(吡哆醇)、维生素B12(钴胺素)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、L-抗坏血酸、生物素(D-生物素)、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、柠檬酸钙、硫酸锰、硫酸铜、亚硒酸钠、碘酸钾、维生素A12。

### 奶具消毒及调奶方法



1. 调奶之前请洗手，避免污染奶瓶、奶嘴及奶匙的接触。
2. 奶具用放入沸水中煮五分钟，消毒。
3. 调奶用水煮开后冷却至40℃左右。
4. 若婴幼儿年龄及(或)体重与量匙(勺)的标示不符，请将量匙浸入温开水中入沸水后冷却。
5. 两指捏(或拇指与食指)的指示加入准确量(平匙)的乳粉，只可用专用量匙。
6. 按奶粉瓶直至乳粉完全溶解，即可喂哺幼儿。

请仔细阅读罐身喂养量表，只可用专用量匙，少于或多于定量将影响乳粉，会使幼儿得不到适量的营养。打开包装后，在四小时内食用完为宜。

客服热线: 400-887-1966

注意: 已冲调好的美贝嘉3段配方羊乳粉在一个小时内食用完为宜。

### 喂哺用量建议表

每次喂哺量

月龄	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	每日喂哺次数(次)
第12至24个月	210	7	3-4
第24至36个月	210	7	2-3

每平匙约4.5克羊乳粉，兑水30毫升  
注意: 未经煮沸消毒的水、奶嘴或不恰当的温度，均会影响幼儿不适。每次只喂哺一匙奶，调好的奶液应立即饮用，不要将未喝完的奶液留存。



## 美贝嘉®

### 幼儿配方羊乳粉 (12-36月龄, 3段)



净含量: 800克  
注册号: 国食注字YP20230175

# 3段

### 营养成分表

项目	单位	每200kJ	每100g
能量	kJ	100	2024
蛋白质	g	0.65	13.17
脂肪	g	1.12	22.57
碳水化合物	g	0.12	2.36
膳食纤维	g	15	305
维生素A	μg RE	23	456
维生素D	μg	0.67	13.60
维生素E	mg α-TE	0.22	4.55
维生素K1	μg	3.56	72.00
维生素B1	μg	41	825
维生素B2	μg	50	1005
维生素B3	μg	16.3	329.6
维生素B5	μg	0.122	2.470
维生素B6	μg	162	3285
维生素B12	μg	4.8	98.0
叶酸	μg	120	2430
维生素C	mg	8.7	175.2
生物素	μg	0.90	18.27
矿物质			
钙	mg	12	248
磷	mg	29	583
钾	mg	19.6	396.9
钠	mg	2.5	51.5
镁	mg	0.30	6.08
锌	mg	0.18	3.72
铁	mg	27	548
铜	mg	17	344
锰	μg	4.9	99.2
硒	μg	31	624
可溶膳食纤维			
菊糖	mg	0.64	12.94
低聚糖	mg	6.0	122.0
膳食纤维	mg	4.37	88.38
乳清	mg	4.8	96.2
牛磺酸	mg	2.3	47.0
左旋肉碱	mg	2.2	44.3
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.4	90.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	90.0
低聚半乳糖	g	0.05	1.03
低聚果糖	g	0.09	1.88
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.03	0.69
1,3-二油醇-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.86
叶黄素	μg	10.4	210.0
胆钙磷酸盐	mg	8.3	168.3

即食状态下，每100毫升含幼儿配方羊乳粉13.5克。

### 注意事项

**贮存条件**  
本品存放在阴凉干燥处，开封后请在四周内食用完，请密封放入冰箱保存。每次食用后请务必盖紧瓶盖，以防止受潮或进入异物。

**温馨提示**  
6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合辅食喂养食品。  
规格: 800克/罐  
保质期: 24个月  
生产日期、生产批号及保质期详见罐体  
防伪合格证号参见罐身  
产品标准代号: GB10767-2021  
产品类型/属性: 乳基幼儿配方食品/粉状  
生产商: 陕西和氏乳业集团有限公司  
地址: 陕西省宝鸡市陈仓区工业路天和路9号  
食品生产许可证编号: SC12961032700738  
生产商: 陕西和氏乳业集团有限公司  
地址: 陕西省宝鸡市陈仓区陈仓镇陈仓路46号  
食品生产许可证编号: SC12961032700891  
产地: 陕西·宝鸡  
服务热线: 400-880-4079  
电子邮箱: heshi@126.com  
网址: www.heshimilk.com  
邮编: 721200  
注: 生产日期请以罐体生产信息及实际地址。



# 标签7



## 美贝嘉®

### 幼儿配方羊乳粉 (12-36月龄,3段)

#### 配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、椰子油)、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、低聚半乳糖、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸油酯、D-岩藻糖基乳糖、酪蛋白磷酸肽、胆碱(氯化胆碱)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、牛磺酸、亚硒酸、维生素A(视黄醇棕榈酸酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(泛酸钙)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>3</sub>(烟酰胺)、维生素B<sub>5</sub>(泛酸)、维生素B<sub>6</sub>(吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(钴胺素)、维生素C(抗坏血酸钠、L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、亚硫酸钾、磷酸亚铁、硫酸钾、柠檬酸、柠檬酸钠、硫酸锰、硫酸铜、亚硒酸钠、碘酸钾、**含生羊乳加工**

#### 奶具消毒及调奶方法



- 1.喂奶之前请洗手,彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的奶头。
- 2.将奶具放入沸水中煮五分钟,待用。
- 3.调用的水煮沸后冷却至50°C左右。
- 4.按照婴儿手册及(喂哺用量建议表)的指示,先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
- 5.再按照(喂哺用量建议表)的指示加入准确份量(平匙)的乳粉,只可用专用量匙。
- 6.摇动奶瓶直至乳粉完全溶解,即可喂哺幼儿。

调奶时请遵照喂哺用量建议表,只可用专用量匙。用少于或多于指定份量的乳粉,会使幼儿得不到适量的营养,打开包装后,在四周内食用完为佳。

#### 喂哺用量建议表 每次喂哺份量

月龄	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	每日喂哺次数(次)
第12-24个月	210	7	3-4
第24-36个月	210	7	2-3

每平匙约4.5克羊乳粉,兑水30毫升  
注意:未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度,均会引起幼儿不适。每次只需调一瓶奶,调好的奶液应立即饮用,不要将未喝完的奶液留存。

●注意:已冲调好的美贝嘉3段幼儿配方羊乳粉在一个小时内饮用完为佳。



净含量:400克  
注册号:国食注字YP20230175

# 3段

#### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	190	2024
蛋白质	g	0.65	13.17
脂肪	g	1.12	22.57
碳水化合物	g	0.12	2.36
α-乳白蛋白	mg	15	305
碳水化合物	g	2.7	55.1
维生素A	μg RE	23	456
维生素D	μg	0.67	13.60
维生素E	mg α-TE	0.22	4.55
维生素K <sub>1</sub>	μg	3.96	71.00
维生素B <sub>1</sub>	μg	42	825
维生素B <sub>2</sub>	μg	50	1005
维生素B <sub>3</sub>	μg	15.3	322.6
维生素B <sub>5</sub>	μg	6.122	124.70
维生素B <sub>6</sub>	μg	162	3285
叶酸	μg	4.8	96.0
泛酸	μg	120	2430
维生素C	mg	6.7	135.2
生物素	μg	0.90	18.27
亚硒酸	mg	12	248
铁	mg	26	583
铜	μg	19.6	396.9
钾	mg	1.5	31.5
钙	mg	0.30	6.08
钠	mg	0.18	3.72
锌	mg	27	548
碘	μg	17	344
磷	μg	4.9	99.2
镁	mg	31	634
可溶性成分	μg	5.64	11.94
胆碱	mg	6.0	122.0
肌醇	μg	4.37	88.38
花生四烯酸	mg	4.8	96.2
二十二碳六烯酸	mg	2.3	47.0
左旋肉碱	mg	2.2	44.3
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.4	90.0
二十二碳五烯酸(EPA)	mg	4.4	90.0
亚油酸	g	0.05	1.03
低聚果糖	g	0.09	1.98
D-岩藻糖基乳糖	g	0.03	0.69
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.86
牛磺酸	μg	10.4	210.0
酪蛋白磷酸肽	mg	9.3	188.3

即食状态下,每100毫升含幼儿配方羊乳粉13.5克。

#### 注意事项

##### 贮存条件

本品应放在阴凉干燥处,开封后请在四周内食用完,请勿放入冰箱保存,每次食用后请务必盖紧瓶盖,以防止吸潮或进入异物。

##### 温馨提示

6个月以上婴儿食用本产品时,请配合添加辅食。



规格:400克/罐  
保质期:24个月  
生产日期、生产批号及保质期详见罐底  
检验合格证号参见批号  
产品标准代号:GB10767-2021  
产品类别/属性:乳基幼儿配方食品/粉状  
生产商:陕西和氏乳业集团有限公司(A)  
地址:陕西省宝鸡市陈仓区食品工业园区关和路9号  
食品生产许可证编号:SC12961032700738  
生产商:陕西和氏乳业集团陇州有限公司(B)  
地址:陕西省宝鸡市陈仓区关和路48号  
食品生产许可证编号:SC12961032700891  
产地:陕西·宝鸡  
销售电话:029-89240392  
电子邮箱:heshimilk@126.com  
网址:www.heshimilk.com  
邮编:721200  
注:生产日期末位字母代表生产商及对应地址



咨询热线  
400-887-1968

