

附件 2：陕西雅泰乳业集团有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 1

398.7mm

179.5mm

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2056
蛋白质	g	0.49	10.0
脂肪	g	1.13	23.2
亚油酸	g	0.18	3.6
α-亚麻酸	mg	18	360
碳水化合物	g	2.9	59.3
维生素			
维生素A	μg RE	18	375
维生素D	μg	0.52	10.6
维生素E	mg α-TE	0.61	12.48
维生素K ₁	μg	2.68	55.0
维生素B ₁	μg	24	489
维生素B ₂	μg	39	800
维生素B ₆	μg	23.8	490
维生素B ₁₂	μg	0.151	3.11
烟酸(烟酰胺)	μg	189	3883
叶酸	μg	4.8	99
泛酸	μg	245	5035
维生素C	mg	4.7	96.8
生物素	μg	1.13	23.3
胆碱	mg	8.1	166
矿物质			
钠	mg	9	178
钾	mg	26	526
铜	μg	19.1	391.8
镁	mg	2.3	47.6
铁	mg	0.23	4.7
锌	mg	0.21	4.3
锰	μg	10.36	213
钙	mg	23	466
磷	mg	16	326
碘	μg	5.8	120
氯	mg	22	449
硒	μg	1.15	23.6
可选择成分			
牛磺酸	mg	2.0	41.6
左旋肉碱	mg	1.5	30.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.9	100
二十二碳四烯酸(AAARA)	mg	5.8	120
低聚半乳糖	mg	47	969
低聚果糖	mg	72	1482
叶黄素	μg	4.8	99
乳铁蛋白	mg	4.5	92

即食状态下,每100ml含婴儿1段配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳糖、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸油脂、磷脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、橄榄油、磷酸三钙、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、叶黄素、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种HNO19、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、dl-α-脂酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、醋酸视黄酯、核黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处,每次食用后及时将罐口盖严,请勿置于冰箱内,开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB 10765-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证号参见生产批号
产品类别及属性:乳基婴儿1段配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业集团有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
官方网址:www.znbnf.com
联系方式:400-051-6955



珍纽倍®

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

1



净含量:800克
国食注字:YP20220156

冲调方法



- 1.在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手。
- 2.清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖,放在沸水中至少煮5分钟。
- 3.饮用水煮沸后冷却至55℃左右,参照喂哺表加入正确用水量。
- 4.专用量匙量取奶粉,参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
- 5.盖上瓶盖,摇动奶瓶,直至完全溶解。
- 6.滴一滴奶水在手背上测试温度,确定温度适宜时,即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

- 1.一平勺奶粉约4.5克,听盖内附有专用量勺。
- 2.在饮食中添加本产品时,请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
- 3.每次只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝,如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝有无不适再逐步递增,直到宝宝完全适应。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿,最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6 1942908 016414

307.4mm

148.5mm

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2056
蛋白质	g	0.49	10.0
脂肪	g	1.13	23.2
亚油酸	g	0.18	3.6
α-亚麻酸	mg	18	360
碳水化合物	g	2.9	59.3
维生素			
维生素A	μg RE	18	375
维生素D	μg	0.52	10.6
维生素E	mg α-TE	0.61	12.48
维生素K ₁	μg	2.68	55.0
维生素B ₁	μg	24	489
维生素B ₂	μg	39	800
维生素B ₆	μg	23.8	490
维生素B ₁₂	μg	0.151	3.11
烟酸(烟酰胺)	μg	189	3883
叶酸	μg	4.8	99
泛酸	μg	245	5035
维生素C	mg	4.7	96.8
生物素	μg	1.13	23.3
胆碱	mg	8.1	166
矿物质			
钠	mg	9	178
钾	mg	26	526
铜	μg	19.1	391.8
镁	mg	2.3	47.6
铁	mg	0.23	4.7
锌	mg	0.21	4.3
锰	μg	10.36	213
钙	mg	23	466
磷	mg	16	326
碘	μg	5.8	120
氯	mg	22	449
硒	μg	1.15	23.6
可选择成分			
牛磺酸	mg	2.0	41.6
左旋肉碱	mg	1.5	30.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.9	100
二十二碳四烯酸(AARA)	mg	5.8	120
低聚半乳糖	mg	47	969
低聚果糖	mg	72	1482
叶黄素	μg	4.8	99
乳铁蛋白	mg	4.5	92

即食状态下,每100ml含婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳糖、脱脂羊奶粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸油脂、磷脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、橄榄油、磷酸三钙、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、叶黄素、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、醋酸视黄酯、核黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、葡糖胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处,每次食用后及时将罐口盖严,请勿置于冰箱内,开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB 10765-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证书号:参见生产批号
产品类别及属性:乳基婴儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业集团有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
官方网址:www.zbnf.com
联系方式:400-051-6955



雅泰®
珍纽倍®
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)



1段

净含量:300克
国食注字:YP20220156

冲调方法



- 1.在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手。
- 2.清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖,放在沸水中至少煮5分钟。
- 3.饮用水煮沸后冷却至55℃左右,参照喂哺表加入正确用水量。
- 4.专用量匙量取奶粉,参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
- 5.盖上瓶盖,摇动奶瓶,直至完全溶解。
- 6.滴一滴奶水在手背上测试温度,确定温度适宜时,即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

- 1.一平勺奶粉约4.5克,听盖内附有专用量勺。
- 2.在饮食中添加本产品时,请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
- 3.每次只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝,如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝无不适再逐步递增,直到宝宝完全适应。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6 942908 019408

258.1mm

123.5mm

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2056
蛋白质	g	0.49	10.0
脂肪	g	1.13	23.2
亚油酸	g	0.18	3.6
α-亚麻酸	mg	18	360
碳水化合物	g	2.9	59.3
维生素			
维生素A	μg RE	18	375
维生素D	μg	0.52	10.6
维生素E	mg α-TE	0.61	12.48
维生素K ₁	μg	2.68	55.0
维生素B ₁	μg	24	489
维生素B ₂	μg	39	800
维生素B ₆	μg	23.8	490
维生素B ₁₂	μg	0.151	3.11
烟酸(烟酰胺)	μg	189	3883
叶酸	μg	4.8	99
泛酸	μg	245	5035
维生素C	mg	4.7	96.8
生物素	μg	1.13	23.3
胆碱	mg	8.1	166
矿物质			
钠	mg	9	178
钾	mg	26	526
铜	μg	19.1	391.8
镁	mg	2.3	47.6
铁	mg	0.23	4.7
锌	mg	0.21	4.3
锰	μg	10.36	213
钙	mg	23	466
磷	mg	16	326
碘	μg	5.8	120
硒	μg	22	449
锶	μg	1.15	23.6
可选择成分			
牛磺酸	mg	2.0	41.6
左旋肉碱	mg	1.5	30.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.9	100
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.8	120
低聚半乳糖	mg	47	969
低聚果糖	mg	72	1482
叶黄素	μg	4.8	99
乳铁蛋白	mg	4.5	92

即食状态下, 每100ml含婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳糖、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸油脂、磷脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、橄榄油、磷酸三钙、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、叶黄素、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、dl-α-维生素生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、醋酸视黄醇、核黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、氯化钾、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硝酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处, 每次食用后及时将罐口盖严, 请勿置于冰箱内, 开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB 10765-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证号参见生产批号
产品类别及属性:乳基婴儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业集团有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
官方网址:www.zbnf.com
联系方式:400-051-6955



雅泰®

珍纽倍®
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)



1段

净含量:120克
国食注字:YP20220156

冲调方法



- 1.在调配奶粉之前, 请洗净、擦干双手。
- 2.清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖, 放在沸水中至少煮5分钟。
- 3.饮用水煮沸后冷却至55°C左右, 参照喂哺表加入正确用水量。
- 4.专用量匙取奶粉, 参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
- 5.盖上瓶盖, 摇动奶瓶, 直至完全溶解。
- 6.滴一滴奶水在手背上测试温度, 确定温度适宜时, 即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

- 1.一平勺奶粉约4.5克, 产品附有专用量勺。
- 2.在饮食中添加本产品时, 请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
- 3.每次只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝, 如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适再逐步递增, 直到宝宝完全适应。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6 942908 012102

398.7mm

179.5mm

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.47	9.5
脂肪	g	1.03	20.6
亚油酸	g	0.14	2.9
α -亚麻酸	mg	15	291
碳水化合物	g	3.1	62.4
维生素			
维生素A	μ g RE	19	374
维生素D	μ g	0.49	9.9
维生素E	mg α -TE	0.56	11.24
维生素K ₁	μ g	2.87	57.6
维生素B ₁	μ g	20	409
维生素B ₂	μ g	39	775
维生素B ₆	μ g	28.0	561
维生素B ₁₂	μ g	0.155	3.11
烟酸(烟酰胺)	μ g	192	3843
叶酸	μ g	4.6	93
泛酸	μ g	231	4634
维生素C	mg	4.8	97.0
生物素	μ g	1.14	22.8
胆碱	mg	7.2	144
矿物质			
钠	mg	5	109
钾	mg	23	455
铜	μ g	15.9	318.6
镁	mg	2.4	48.9
铁	mg	0.29	5.9
锌	mg	0.21	4.2
锰	μ g	9.03	181
钙	mg	23	469
磷	mg	15	306
碘	μ g	5.9	118
硒	μ g	21	426
硒	μ g	1.29	25.9
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.8	35.6
左旋肉碱	mg	1.2	24.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	5.0	101
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.1	123
低聚果糖	mg	48	969
叶黄素	mg	75	1494
乳铁蛋白	μ g	10.3	207
	mg	4.6	92

即食状态下, 每100ml含较大婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、乳糖、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、脱脂羊奶粉、低聚果糖、低聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、磷脂、橄榄油、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、叶黄素、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、dl- α -醋酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、核黄素、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、硫酸铜、盐酸吡哆醇、硫酸镁、柠檬酸钠、硫酸亚铁、氯化钾、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处, 每次食用后及时将罐口盖严, 请勿置于冰箱内, 开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB 10766-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证书号参见生产批号
产品类别及属性:乳基较大婴儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业集团有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
官方网站:www.zbnf.com
联系方式:400-051-6955



雅泰®

珍纽倍®
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)



2段

净含量:800克
国食注字:YP20220157

- 含有牛磺酸
- 含有叶黄素

- 含有二十二碳六烯酸(DHA)
- 含有左旋肉碱

冲调方法



1. 在调配奶粉之前, 请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖, 放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55°C左右, 参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉, 参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖, 摇动奶瓶, 直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度, 确定温度适宜时, 即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	7	4
8-12个月	210	7	3

1. 一平勺奶粉约4.5克, 听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时, 请参照以上喂哺用量建议表, 依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物摄入量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝, 如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适再逐步递增, 直到宝宝完全适应。

爱心提示

须配合添加辅助食品。



6 942908 016421

307.4mm

148.5mm

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.47	9.5
脂肪	g	1.03	20.6
亚油酸	g	0.14	2.9
α-亚麻酸	mg	15	291
碳水化合物	g	3.1	62.4
维生素			
维生素A	μg RE	19	374
维生素D	μg	0.49	9.9
维生素E	mg α-TE	0.56	11.24
维生素K ₁	μg	2.87	57.6
维生素B ₁	μg	20	409
维生素B ₂	μg	39	775
维生素B ₆	μg	28.0	561
维生素B ₁₂	μg	0.155	3.11
烟酸(烟酰胺)	μg	192	3843
叶酸	μg	4.6	93
泛酸	μg	231	4634
维生素C	mg	4.8	97.0
生物素	μg	1.14	22.8
胆碱	mg	7.2	144
矿物质			
钠	mg	5	109
钾	mg	23	455
铜	μg	15.9	318.6
镁	mg	2.4	48.9
铁	mg	0.29	5.9
锌	mg	0.21	4.2
锰	μg	9.03	181
钙	mg	23	469
磷	mg	15	306
碘	μg	5.9	118
氯	mg	21	426
硒	μg	1.29	25.9
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.8	35.6
左旋肉碱	mg	1.2	24.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	5.0	101
二十碳四烯酸(AARA)	mg	6.1	123
低聚半乳糖	mg	48	969
低聚果糖	mg	75	1494
叶黄素	μg	10.3	207
乳铁蛋白	mg	4.6	92

即食状态下,每100ml含较大婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、乳糖、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、磷脂、橄榄油、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、叶黄素、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种HNO19、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、核黄素、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、硫酸镁、柠檬酸钠、尿酸、氯化钾、硫酸锰、硫酸锌、硫酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处,每次食用后及时将罐口盖严,请勿置于冰箱内,开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB 10766-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证书号:参见生产批号
产品类别及属性:乳基较大婴儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业集团有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
官方网站:www.znbnf.com
联系方式:400-051-6955



雅泰®
珍纽倍®
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)

2段

净含量:300克
国食注字:YP20220157



- 含有牛磺酸
- 含有二十二碳六烯酸(DHA)
- 含有叶黄素
- 含有左旋肉碱

冲调方法



- 1.在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手。
- 2.清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖,放在沸水中至少煮5分钟。
- 3.用水煮沸后冷却至55℃左右,参照喂哺表加入正确用水量。
- 4.专用量匙量取奶粉,参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
- 5.盖上瓶盖,摇动奶瓶,直至完全溶解。
- 6.滴一滴奶水在手背上测试温度,确定温度适宜时,即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	7	4
8-12个月	210	7	3

- 1.一平勺奶粉约4.5克,听盖内附有专用量勺。
- 2.在饮食中添加本产品时,请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
- 3.每次只准备一次的喂哺,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝,如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝无不适再逐步递增,直到宝宝完全适应。

爱心提示

须配合添加辅助食品。



6 942908 019415

标签 6

398.7mm

179.5mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.47	9.4
脂肪	g	1.03	20.6
亚油酸	g	0.14	2.9
α-亚麻酸	mg	14	290
碳水化合物	g	3.1	62.5
维生素			
维生素A	μg RE	18	368
维生素D	μg	0.51	10.3
维生素E	mg α-TE	0.57	11.42
维生素K ₁	μg	2.87	57.6
维生素B ₁	μg	17	331
维生素B ₂	μg	35	695
维生素B ₆	μg	28.4	569
维生素B ₁₂	μg	0.171	3.42
烟酸(烟酰胺)	μg	194	3881
叶酸	μg	3.6	73
泛酸	μg	244	4897
维生素C	mg	4.9	97.6
生物素	μg	1.26	25.2
矿物质			
钠	mg	5	107
钾	mg	26	527
铜	μg	17.5	350.5
镁	mg	2.1	41.4
铁	mg	0.34	6.9
锌	mg	0.19	3.8
钙	mg	25	502
磷	mg	18	357
碘	μg	5.9	118
氯	mg	26	530
可选择成分			
硒	μg	1.29	25.9
胆碱	mg	6.1	122
锰	μg	9.18	184
牛磺酸	mg	1.7	33.3
左旋肉碱	mg	0.9	18.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	5.0	101
二十碳四烯酸(AARA)	mg	6.1	123
低聚半乳糖	mg	48	969
低聚果糖	mg	75	1499
叶黄素	μg	10.3	207
乳铁蛋白	mg	4.6	92

即食状态下, 每100ml含幼儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、乳糖、脱脂羊乳粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、橄榄油、磷脂、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、叶黄素、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、dl-α-酮酸生育酚、核黄素、胆钙化醇、醋酸视黄酯、氰钴胺、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处, 每次食用后及时将罐口盖严, 请勿置于冰箱内, 开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB 10767-2021
 生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
 保质期:24个月
 食品生产许可证编号:SC12961042300800
 检验合格证号参见生产批号
 产品类别及属性:乳基幼儿配方羊奶粉
 生产商:陕西雅泰乳业集团有限公司
 生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
 产地:陕西 咸阳
 官方网址:www.zbnf.com
 联系方式:400-051-6955



雅泰®

珍纽倍® 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)

3段

净含量:800克
 国食注字:YP20220158



- 含有胆碱
- 含有左旋肉碱
- 含有牛磺酸
- 含有叶黄素

冲泡方法



1. 在调配奶粉之前, 请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖, 放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55°C左右, 参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉, 参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖, 摇动奶瓶, 直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度, 确定温度适宜时, 即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	210	7	2-3

1. 一平勺奶粉约4.5克, 听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时, 请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来设定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝, 如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适再逐步递增, 直到宝宝完全适应。



307.4mm

148.5mm

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.47	9.4
脂肪	g	1.03	20.6
亚油酸	g	0.14	2.9
α -亚油酸	mg	14	290
碳水化合物	g	3.1	62.5
维生素			
维生素A	μ g RE	18	368
维生素D	μ g	0.51	10.3
维生素E	mg α -TE	0.57	11.42
维生素K ₁	μ g	2.87	57.6
维生素B ₁	μ g	17	331
维生素B ₂	μ g	35	695
维生素B ₆	μ g	28.4	569
维生素B ₁₂	μ g	0.171	3.42
烟酸(烟酰胺)	μ g	194	3881
叶酸	μ g	3.6	73
泛酸	μ g	244	4897
维生素C	mg	4.9	97.6
生物素	μ g	1.26	25.2
矿物质			
钠	mg	5	107
钾	mg	26	527
铜	μ g	17.5	350.5
镁	mg	2.1	41.4
铁	mg	0.34	6.9
锌	mg	0.19	3.8
钙	mg	25	502
磷	mg	18	357
碘	μ g	5.9	118
氯	mg	26	530
可选择成分			
硒	μ g	1.29	25.9
胆碱	mg	6.1	122
锰	μ g	9.18	184
牛磺酸	mg	1.7	33.3
左旋肉碱	mg	0.9	18.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	5.0	101
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.1	123
低聚半乳糖	mg	48	969
低聚果糖	mg	75	1499
叶黄素	μ g	10.3	207
乳铁蛋白	mg	4.6	92

即食状态下, 每100ml含幼儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、乳糖、脱脂羊乳粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、橄榄油、磷脂、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、叶黄素、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、dl- α -醋酸生育酚、核黄素、胆钙化醇、醋酸视黄酯、氰钴胺、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处, 每次食用后及时将罐口盖严, 请勿置于冰箱内, 开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB 10767-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证号参见生产批号
产品类别及属性:乳基幼儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业集团有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
官方网址:www.zbnf.com
联系方式:400-051-6955



雅泰®

珍纽倍®
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)

3段

净含量:300克
国食注字:YP20220158



- 含有胆碱
- 含有牛磺酸
- 含有左旋肉碱
- 含有叶黄素

冲调方法



- 1.在调配奶粉之前, 请洗净、擦干双手。
- 2.清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖, 放在沸水中至少煮5分钟。
- 3.饮用水煮沸后冷却至55℃左右, 参照喂哺表加入正确用水量。
- 4.专用量匙量取奶粉, 参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
- 5.盖上瓶盖, 摇动奶瓶, 直至完全溶解。
- 6.滴一滴奶水在手背上测试温度, 确定温度适宜时, 即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	210	7	2-3

- 1.一平勺奶粉约4.5克, 听盖内附有专用量勺。
- 2.在饮食中添加本产品时, 请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物摄入量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依医生的建议而改变。
- 3.每次只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝, 如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适再逐步递增, 直到宝宝完全适应。



398.7mm

179.5mm

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2064
蛋白质	g	0.49	10.1
脂肪	g	1.11	22.9
亚油酸	g	0.18	3.7
α-亚麻酸	mg	19	401
碳水化合物	g	3.0	61.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	376
维生素D	μg	0.51	10.6
维生素E	mg α-TE	0.60	12.29
维生素K ₁	μg	2.66	54.8
维生素B ₁	μg	24	489
维生素B ₂	μg	39	810
维生素B ₆	μg	23.7	490
维生素B ₁₂	μg	0.151	3.12
烟酸(烟酰胺)	μg	188	3887
叶酸	μg	4.8	99
泛酸	μg	245	5053
维生素C	mg	4.7	96.8
生物素	μg	1.13	23.4
胆碱	mg	8.1	167
矿物质			
钠	mg	9	179
钾	mg	26	533
铜	μg	19.0	392.5
镁	mg	2.3	48.3
铁	mg	0.23	4.7
锌	mg	0.21	4.4
钙	μg	10.32	213
磷	mg	23	472
氯	mg	16	332
碘	μg	5.8	120
硒	μg	22	457
硒	μg	1.14	23.6
可选择成分			
牛磺酸	mg	2.0	41.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	100
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	118
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	38	774
乳铁蛋白	mg	4.5	92

即食状态下, 每100ml含婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳糖、脱脂羊乳粉、花生四烯酸油脂、低聚果糖、磷脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核桃油、低聚半乳糖、磷酸三钙、碳酸钾、L-抗坏血酸、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种HNO19、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、d1-α-酮酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、醋酸视黄酯、核黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处, 每次食用后及时将罐口盖严, 请勿置于冰箱内, 开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB 10765-2021
 生产日期、批号、保质期至:请见罐底码
 保质期:24个月
 食品生产许可证编号:SC12961042300800
 检验合格证号参见生产批号
 产品类别及属性:乳基婴儿配方羊奶粉
 生产商:陕西雅泰乳业集团有限公司
 生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
 产地:陕西 咸阳
 联系方式:400-090-5890



朵恩®

馨贝贝®
 婴儿配方羊奶粉
 (0-6月龄, 1段)

1段

净含量:800克
 国食注字: YP20220159

雅泰®

冲调方法



1. 在调配奶粉之前, 请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖, 放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55°C左右, 参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉, 参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖, 摇动奶瓶, 直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度, 确定温度适宜时, 即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

1. 一平勺奶粉约4.5克, 听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时, 请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝, 如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝不适再逐步递增, 直到宝宝完全适应。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6 942908 020183

307.4mm

148.5mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2064
蛋白质	g	0.49	10.1
脂肪	g	1.11	22.9
亚油酸	g	0.18	3.7
α-亚油酸	mg	19	401
碳水化合物	g	3.0	61.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	376
维生素D	μg	0.51	10.6
维生素E	mg α-TE	0.60	12.29
维生素K ₁	μg	2.66	54.8
维生素B ₁	μg	24	489
维生素B ₂	μg	39	810
维生素B ₆	μg	23.7	490
维生素B ₁₂	μg	0.151	3.12
烟酸(烟酰胺)	μg	188	3887
叶酸	μg	4.8	99
泛酸	μg	245	5053
维生素C	mg	4.7	96.8
生物素	μg	1.13	23.4
胆碱	mg	8.1	167
矿物质			
钠	mg	9	179
钾	mg	26	533
铜	μg	19.0	392.5
镁	mg	2.3	48.3
铁	mg	0.23	4.7
锌	mg	0.21	4.4
锰	μg	10.32	213
钙	mg	23	472
磷	mg	16	332
碘	μg	5.8	120
氯	mg	22	457
硒	μg	1.14	23.6
可选择成分			
牛磺酸	mg	2.0	41.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	100
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	118
低聚半乳糖	mg	13	242
低聚果糖	mg	38	774
乳铁蛋白	mg	4.5	92

即食状态下,每100ml含婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表	
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯、乳糖、脱脂羊乳粉、花生四烯酸油脂、低聚果糖、磷脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核桃油、低聚半乳糖、磷酸三钙、碳酸钙、L-抗坏血酸、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、dl-α-脂酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、维生素A、核黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、氯化钾、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。	

贮存条件
本品应存放在阴凉干燥处,每次食用后及时将罐口盖严,请勿置于冰箱内,开罐后请在一个月内食用完。

企业信息
产品标准代号:GB 10765-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证书号:参见生产批号
产品类别及属性:乳基婴儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业集团有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
联系方式:400-090-5890



馨贝贝® 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)



净含量:300克
国食注字:YP20220159

雅泰®

冲调方法



1. 在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖,放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55°C左右,参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉,参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖,摇动奶瓶,直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度,确定温度适宜时,即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

1. 一平勺奶粉约4.5克,听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时,请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物摄入量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝,如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝有无不适再逐步递增,直到宝宝完全适应。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿,最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6 942908 020213

258.1mm

123.5mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2064
蛋白质	g	0.49	10.1
脂肪	g	1.11	22.9
亚油酸	g	0.18	3.7
α-亚油酸	mg	19	401
碳水化合物	g	3.0	61.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	376
维生素D	μg	0.51	10.6
维生素E	mg α-TE	0.60	12.29
维生素K	μg	2.66	54.8
维生素B ₁	μg	24	489
维生素B ₂	μg	39	810
维生素B ₆	μg	23.7	490
维生素B ₁₂	μg	0.151	3.12
烟酸(烟酰胺)	μg	188	3887
叶酸	μg	4.8	99
泛酸	μg	245	5053
维生素C	mg	4.7	96.8
生物素	μg	1.13	23.4
胆碱	mg	8.1	167
矿物质			
钠	mg	9	179
钾	mg	26	533
铜	μg	19.0	392.5
镁	mg	2.3	48.3
铁	mg	0.23	4.7
锌	mg	0.21	4.4
锰	μg	10.32	213
钙	mg	23	472
磷	mg	16	332
碘	μg	5.8	120
氯	mg	22	457
硒	μg	1.14	23.6
可选择成分			
牛磺酸	mg	2.0	41.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	100
十四碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	118
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	38	774
乳铁蛋白	mg	4.5	92

即食状态下, 每100ml含婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳糖、脱脂羊乳粉、花生四烯酸油脂、低聚果糖、磷脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核桃油、低聚半乳糖、磷酸三钙、磷酸钙、L-抗坏血酸、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、dl-α-脂酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、醋酸视黄酯、核黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、氯化钾、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、磷酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处, 每次食用后及时将罐口盖严, 请勿置于冰箱内, 开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号: GB 10765-2021
 生产日期、批号、保质期至: 请见罐底喷码
 保质期: 24个月
 食品生产许可证编号: SC12961042300800
 检验合格证号参见生产批号
 产品类别及属性: 乳基婴儿配方羊奶粉
 生产商: 陕西雅泰乳业有限公司
 生产地址: 陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
 产地: 陕西 咸阳
 联系方式: 400-090-5890



馨贝贝®
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)

1段!

净含量: 120克
 国食注字: YP20220159



冲调方法

1. 在调配奶粉之前, 请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖, 放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55℃左右, 参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙取奶粉, 参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖, 摇动奶瓶, 直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度, 确定温度适宜时, 即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

1. 一平勺奶粉约4.5克, 产品附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时, 请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝, 如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适再逐步递增, 直到宝宝完全适应。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



398.7mm

179.5mm

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2010
蛋白质	g	0.48	9.7
脂肪	g	1.00	20.2
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	17	346
碳水化合物	g	3.2	64.1
维生素			
维生素A	μg RE	18	370
维生素D	μg	0.49	9.9
维生素E	mg α-TE	0.56	11.25
维生素K ₁	μg	2.87	57.6
维生素B ₁	μg	20	410
维生素B ₂	μg	39	780
维生素B ₆	μg	28.0	563
维生素B ₁₂	μg	0.154	3.10
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3847
叶酸	μg	4.6	93
泛酸	μg	230	4630
维生素C	mg	4.8	97.2
生物素	μg	1.13	22.8
胆碱	mg	7.2	144
矿物质			
钠	mg	6	111
钾	mg	23	459
铜	μg	15.9	318.7
镁	mg	2.5	50.0
铁	mg	0.29	5.9
锌	mg	0.21	4.2
锰	μg	9.00	181
钙	mg	24	477
磷	mg	15	309
氯	mg	5.9	119
硒	μg	21	426
碘	μg	1.29	26.0
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.8	35.6
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	5.0	100
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.9	119
低聚果糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	39	786
乳铁蛋白	mg	4.6	92

即食状态下, 每100ml含较大婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、乳糖、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、脱脂羊奶粉、花生四烯酸油脂、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、磷脂、低聚半乳糖、核桃油、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种HNO19、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、dl-α-酮酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、核黄素、维生素K₁、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、硫酸镁、柠檬酸钠、硫酸亚铁、氯化钾、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处, 每次食用后及时将罐口盖严, 请勿置于冰箱内, 开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB 10766-2021
 生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
 保质期:24个月
 食品生产许可证编号:SC12961042300800
 检验合格证号参见生产批号
 产品类别及属性:乳基较大婴儿配方羊奶粉
 生产商:陕西雅泰乳业有限公司
 生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
 产地:陕西 咸阳
 联系方式:400-090-5890



朵恩®

馨贝贝®

较大婴儿配方羊奶粉

2段

(6-12月龄, 2段)

净含量:800克
 国食注字:YP20220160

雅泰®

冲调方法



1. 在调配奶粉之前, 请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴, 放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55°C左右, 参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉, 参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖, 摇动奶瓶, 直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度, 确定温度适宜时, 即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	7	4
8-12个月	210	7	3

1. 一平勺奶粉约4.5克, 听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时, 请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝, 如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝有无不适再逐步递增, 直到宝宝完全适应。

爱心提示

须配合添加辅助食品。



6 942908 020190

307.4mm

148.5mm

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2010
蛋白质	g	0.48	9.7
脂肪	g	1.00	20.2
亚油酸	g	0.16	3.2
D-亚麻酸	mg	17	346
碳水化合物	g	5.2	64.1
维生素			
维生素A	µg RE	18	370
维生素D	µg	0.49	9.9
维生素E	mg α-TE	0.56	11.25
维生素K ₁	µg	2.87	57.6
维生素B ₁	µg	20	410
维生素B ₂	µg	39	780
维生素B ₆	µg	28.0	563
维生素B ₁₂	µg	0.154	3.10
烟酸(烟酰胺)	µg	191	3847
叶酸	µg	4.6	93
泛酸	µg	230	4630
维生素C	mg	4.8	97.2
生物素	µg	1.13	22.8
胆碱	mg	7.2	144
矿物质			
钠	mg	6	111
钾	mg	23	459
铜	µg	15.9	318.7
镁	mg	25	500
铁	mg	0.29	5.9
锌	mg	0.21	4.2
锰	µg	9.00	181
钙	mg	24	477
磷	mg	15	309
碘	µg	5.9	119
氯	mg	21	426
硒	µg	1.29	26.0
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.8	35.6
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	5.0	100
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.9	119
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	39	786
乳铁蛋白	mg	4.6	92

即食状态下, 每100ml含较大婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、乳糖、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、脱脂羊乳粉、花生四烯酸油脂、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、磷脂、低聚半乳糖、核桃油、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、dl-α-维生素生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、核黄素、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、硫酸镁、柠檬酸钠、硫酸亚铁、氯化钾、硫酸锰、硫酸锌、磷酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处, 每次食用后及时将罐口盖严, 请勿置于冰箱内, 开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB 10766-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证号参见生产批号
产品类别及属性:乳基较大婴儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业集团有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
联系方式:400-090-5890



朵恩®

馨贝贝®

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)

净含量:300克
国食注字:YP20220160

雅泰®

冲调方法



1. 在调配奶粉之前, 请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖, 放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55°C左右, 参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉, 参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖, 摇动奶瓶, 直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度, 确定温度适宜时, 即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	7	4
8-12个月	210	7	3

1. 一平勺奶粉约4.5克, 听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时, 请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物摄入量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝, 如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适再逐步递增, 直到宝宝完全适应。

爱心提示

须配合添加辅助食品。



398.7mm

179.5mm

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2020
蛋白质	g	0.47	9.5
脂肪	g	1.02	20.7
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	17	347
碳水化合物	g	3.2	63.8
维生素			
维生素A	μg RE	18	366
维生素D	μg	0.51	10.3
维生素E	mg α-TE	0.57	11.44
维生素K ₁	μg	2.85	57.6
维生素B ₁	μg	16	332
维生素B ₂	μg	35	698
维生素B ₆	μg	28.2	569
维生素B ₁₂	μg	0.169	3.41
烟酸(烟酰胺)	μg	192	3882
叶酸	μg	3.6	73
泛酸	μg	242	4893
维生素C	mg	4.8	97.6
生物素	μg	1.25	25.2
矿物质			
钠	mg	5	108
钾	mg	26	528
铜	μg	17.4	350.5
镁	mg	2.1	41.7
铁	mg	0.34	6.9
锌	mg	0.19	3.8
钙	mg	25	505
磷	mg	18	359
碘	μg	5.9	119
氯	mg	26	529
可选择成分			
硒	μg	1.28	25.9
胆碱	mg	6.0	122
锰	μg	9.11	184
牛磺酸	mg	1.6	33.3
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	5.0	101
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.9	120
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	39	790
乳铁蛋白	mg	4.6	92

即食状态下, 每100ml含幼儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、乳糖、脱脂羊乳粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、花生四烯酸油脂、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、磷脂、核桃油、低聚半乳糖、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种HNO19、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、dl-α-醋酸生育酚、核黄素、胆钙化醇、醋酸视黄醇、氰钴胺、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处, 每次食用后及时将罐口盖严, 请勿置于冰箱内, 开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB 10767-2021
 生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
 保质期:24个月
 食品生产许可证编号:SC12961042300800
 检验合格证书号:参见生产批号
 产品类别及属性:乳基幼儿配方羊奶粉
 生产商:陕西雅泰乳业有限公司
 生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
 产地:陕西 咸阳
 联系方式:400-090-5890



朵恩®

馨贝贝®

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)

3段

净含量:800克
 国食注字: YP20220161

雅泰®

冲调方法



1. 在调配奶粉之前, 请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖, 放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55℃左右, 参照喂哺表加入正确水量。
4. 专用量匙取奶粉, 参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖, 摇动奶瓶, 直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度, 确定温度适宜时, 即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	210	7	2-3

1. 一平勺奶粉约4.5克, 听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时, 请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝, 如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适再逐步递增, 直到宝宝完全适应。



6 942908 020206

307.4mm

148.5mm

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2020
蛋白质	g	0.47	9.5
脂肪	g	1.02	20.7
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	17	347
碳水化合物	g	3.2	63.8
维生素			
维生素A	μg RE	18	366
维生素D	μg	0.51	10.3
维生素E	mg α-TE	0.57	11.44
维生素K ₁	μg	2.85	57.6
维生素B ₁	μg	16	332
维生素B ₂	μg	35	698
维生素B ₆	μg	28.2	569
维生素B ₁₂	μg	0.169	3.41
烟酸(烟酰胺)	μg	192	3882
叶酸	μg	3.6	73
泛酸	μg	242	4893
维生素C	mg	4.8	97.6
生物素	μg	1.25	25.2
矿物质			
钠	mg	5	108
钾	mg	26	528
钙	mg	17.4	350.5
镁	mg	2.1	41.7
铁	mg	0.34	6.9
锌	mg	0.19	3.8
铜	mg	25	505
磷	mg	18	359
碘	μg	5.9	119
硒	μg	26	529
可选择成分			
硒	μg	1.28	25.9
胆碱	mg	6.0	122
锰	μg	9.11	184
牛磺酸	mg	1.6	33.3
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	5.0	101
十四烷酸(AARA)	mg	5.9	120
低聚果糖	mg	12	242
低聚半乳糖	mg	39	790
乳铁蛋白	mg	4.6	92

即食状态下，每100ml(含幼)配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、乳糖、脱脂羊乳粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、花生四烯酸油脂、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、磷脂、核桃油、低聚半乳糖、碳酸钙、氯化胆碱、L-抗坏血酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种HNO19、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、dl-α-酮酸生育酚、核黄素、胆钙化醇、醋酸视黄酯、氰钴胺、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处，每次食用后及时将罐口盖严，请勿置于冰箱内，开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB 10767-2021
 生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
 保质期:24个月
 食品生产许可证编号:SC12961042300800
 检验合格证号参见生产批号
 产品类别及属性:乳基幼儿配方羊奶粉
 生产商:陕西雅泰乳业集团有限公司
 生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
 产地:陕西 咸阳
 联系方式:400-090-5890



朵恩®

馨贝贝®

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)

3段!

净含量:300克
 国食注字:YP20220161

雅泰®

冲调方法



1. 在调配奶粉之前，请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖，放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55°C左右，参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉，参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖，摇动奶瓶，直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度，确定温度适宜时，即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	210	7	2-3

1. 一平勺奶粉约4.5克，听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时，请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝，如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增，直到宝宝完全适应。



6 942908 020237 1

398.7mm

179.5mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2070
蛋白质	g	0.48	10.0
脂肪	g	1.12	23.2
亚油酸	g	0.18	3.8
α-亚麻酸	mg	17	352
碳水化合物	g	2.9	60.8

维生素			
维生素A	μg RE	18	375
维生素D	μg	0.51	10.6
维生素E	mg α-TE	0.62	12.75
维生素K ₁	μg	2.57	53.3
维生素B ₁	μg	24	489
维生素B ₂	μg	39	800
维生素B ₆	μg	23.7	490
维生素B ₁₂	μg	0.150	3.11
烟酸(烟酰胺)	μg	188	3882
叶酸	μg	4.8	99
泛酸	μg	243	5033
维生素C	mg	4.7	96.8
生物素	μg	1.13	23.3
胆碱	mg	7.9	164

矿物质			
钠	mg	9	178
钾	mg	25	524
铜	μg	18.9	391.8
镁	mg	2.3	47.7
铁	mg	0.23	4.7
锌	mg	0.21	4.3
锰	μg	10.29	213
钙	mg	23	466
磷	mg	16	325
碘	μg	5.8	120
硒	μg	22	448
硒	μg	1.14	23.6

可选择成分			
肌醇	mg	3.9	80
牛磺酸	mg	2.0	41.6
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	100
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	117
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	37	774
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	4.01
叶黄素	μg	4.6	96
乳铁蛋白	mg	8.7	180

即食状态下,每100ml含婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳糖、脱脂羊乳粉、花生四烯酸油脂、低聚果糖、磷脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、磷酸三钙、碳酸钙、乳铁蛋白、L-抗坏血酸、氯化胆碱、叶黄素、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、醋酸视黄酯、核黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醒、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、磷酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处,每次食用后及时将罐口盖严,请勿置于冰箱内,开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB10765-2021
 生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
 保质期:24个月
 食品生产许可证编号:SC12961042300800
 检验合格证号参见生产批号
 产品类别及属性:乳基婴儿配方羊奶粉
 生产商:陕西雅泰乳业集团有限公司
 生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
 产地:陕西 咸阳
 公司网址:www.sxytry.com
 联系方式:400-090-5890



雅泰®

朵恩®

1段

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

净含量:800克
 注册号:国食注字YP20220162

冲泡方法



1. 在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖,放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55°C左右,参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙取奶粉,参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖,摇动奶瓶,直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度,确定温度适宜时,即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

1. 一平勺奶粉约4.5克,听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时,请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝,如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝无不适再逐步递增,直到宝宝完全适应。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



307.4mm

148.5mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2070
蛋白质	g	0.48	10.0
脂肪	g	1.12	23.2
亚油酸	g	0.18	3.8
α -亚麻酸	mg	1.7	35.2
碳水化合物	g	2.9	60.8
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	18	375
维生素D	μg	0.51	10.6
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.62	12.75
维生素K ₁	μg	2.57	53.3
维生素B ₁	μg	2.4	48.9
维生素B ₂	μg	30	800
维生素B ₆	μg	23.7	490
维生素B ₁₂	μg	0.150	3.11
烟酸(烟酰胺)	μg	188	3882
叶酸	μg	4.8	99
泛酸	μg	243	5033
维生素C	mg	4.7	96.8
生物素	μg	1.13	23.3
肌醇	mg	7.9	164
矿物质			
钠	mg	9	178
钾	mg	25	524
铜	μg	18.9	391.8
镁	mg	2.3	47.7
铁	mg	0.23	4.7
锌	μg	0.21	4.3
锰	μg	10.39	213
钙	mg	23	466
磷	mg	16	325
氯	mg	5.8	120
氮	mg	22	448
硒	μg	1.14	23.6
可选择成分			
肌醇	mg	3.9	80
牛磺酸	mg	2.0	41.6
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	100
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	117
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	37	774
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	4.01
叶黄素	μg	4.6	96
乳铁蛋白	mg	8.7	180

即食状态下,每100ml含婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳糖、脱脂羊乳粉、花生四烯酸油脂、低聚果糖、磷脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、磷酸三钙、碳酸钙、乳铁蛋白、L-抗坏血酸、氯化胆碱、叶黄素、肌醇、dl- α -醋酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、醋酸视黄酯、核黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘酚、叶酸、硫酸胺素、盐酸吡哆醇、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处,每次食用后及时将罐口盖严,请勿置于冰箱内,开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB10765-2021
 生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
 保质期:24个月
 食品生产许可证编号:SC12961042300800
 检验合格证号参见生产批号
 产品类别及属性:乳基婴儿配方羊奶粉
 生产商:陕西雅泰乳业集团有限公司
 生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
 产地:陕西 咸阳
 公司网址:www.sxytry.com
 联系方式:400-090-5890



雅泰®

朵恩®



婴儿配方羊奶粉
 (0-6月龄,1段)

净含量:300克
 注册号:国食注字YP20220162

冲调方法



1. 在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖,放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55°C左右,参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉,参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖,摇动奶瓶,直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度,确定温度适宜时,即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

1. 一平勺奶粉约4.5克,听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时,请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝,如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝无不适应逐步递增,直到宝宝完全适应。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6 942908 011112

258.1mm

123.5mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2070
蛋白质	g	0.48	10.0
脂肪	g	1.12	23.2
亚油酸	g	0.18	3.8
α-亚麻酸	mg	17	352
碳水化合物	g	2.9	60.8
维生素			
维生素A	μg RE	18	375
维生素D	μg	0.51	10.6
维生素E	mg α-TE	0.62	12.75
维生素K ₁	μg	2.57	53.3
维生素B ₁	μg	24	489
维生素B ₂	μg	39	800
维生素B ₆	μg	23.7	490
维生素B ₁₂	μg	0.150	3.11
烟酸(烟酰胺)	μg	188	3882
叶酸	μg	4.8	99
泛酸	μg	243	5033
维生素C	mg	4.7	96.8
生物素	μg	1.13	23.3
胆碱	mg	7.9	164
矿物质			
钠	mg	9	178
钾	mg	25	524
铜	μg	18.9	391.8
镁	mg	2.3	47.7
铁	mg	0.23	4.7
锌	mg	0.21	4.3
锰	μg	10.29	213
钙	mg	23	466
磷	mg	16	325
碘	μg	5.8	120
硒	μg	24	448
硒	μg	1.14	23.6
可选择成分			
肌醇	mg	3.9	80
牛磺酸	mg	2.0	41.6
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	100
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	117
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	3.7	77.4
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	4.01
叶黄素	μg	4.6	96
乳铁蛋白	mg	8.7	180

即食状态下,每100ml含婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯)、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳糖、脱脂羊乳粉、花生四烯酸油脂、低聚果糖、磷脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、磷酸三钙、碳酸钙、乳铁蛋白、L-抗坏血酸、氯化胆碱、叶黄素、肌醇、dl-α-酮酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、醋酸视黄酯、核黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、葡糖胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处,每次食用后及时将罐口盖严,请勿置于冰箱内,开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB10765-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证号参见生产批号
产品类别及属性:乳基婴儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业集团有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
公司网址:www.sxytry.com
联系方式:400-090-5890



雅泰®

朵恩®



1段

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

净含量:120克

注册号:国食注字YP20220162

冲调方法



1. 在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖,放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55°C左右,参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉,参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖,摇动奶瓶,直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度,确定温度适宜时,即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

1. 一平勺奶粉约4.5克,产品附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时,请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝,如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝无不适再逐步递增,直到宝宝完全适应。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6 942908 012089

398.7mm

179.5mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.47	9.5
脂肪	g	1.02	20.5
亚油酸	g	0.15	3.1
α-亚麻酸	mg	15	293
碳水化合物	g	3.2	64.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	371
维生素D	μg	0.49	9.9
维生素E	mg α-TE	0.57	11.55
维生素K ₁	μg	2.80	56.4
维生素B ₁	μg	20	410
维生素B ₂	μg	39	780
维生素B ₆	μg	27.9	562
维生素B ₁₂	μg	0.154	3.10
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3843
叶酸	μg	4.6	93
泛酸	mg	229	4622
维生素C	mg	4.8	97.1
生物素	μg	1.13	22.8
胆碱	mg	7.0	141
矿物质			
钠	mg	5	109
钾	mg	22	453
钙	μg	15.8	318.3
镁	mg	2.4	49.1
铁	mg	0.29	5.9
锌	mg	0.21	4.2
锰	μg	8.98	181
铜	mg	23	472
磷	mg	15	304
碘	μg	5.9	118
氯	mg	21	421
硒	μg	1.28	25.9
可选择成分			
肌醇	mg	3.6	72
牛磺酸	mg	1.8	35.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	5.0	100
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.9	119
低聚乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	39	786
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.06
叶黄素	μg	10.2	205
乳铁蛋白	mg	8.9	180

即食状态下, 每100ml含较大婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、乳糖、脱盐乳清粉(来源羊乳)、脱脂羊乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、花生四烯酸油脂、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、磷脂、低聚半乳糖、碳酸钙、乳铁蛋白、氯化胆碱、L-抗坏血酸、叶黄素、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、核黄素、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、硫酸镁、柠檬酸钠、硫酸亚铁、氯化钾、硫酸锰、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处, 每次食用后及时将罐口盖严, 请勿置于冰箱内, 开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB10766-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证号参见生产批号
产品类别及属性:乳基较大婴儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业集团有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
公司网址:www.sxytry.com
联系方式:400-090-5890



雅泰®



较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)

净含量: 800克
注册号: 国食注字YP20220163

- ♥ 含有肌醇
- ♥ 含有牛磺酸
- ♥ 含有二十二碳六烯酸(DHA)
- ♥ 含有1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯
- ♥ 含有叶黄素

冲调方法



1. 在调配奶粉之前, 请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖, 放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55°C左右, 参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉, 参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖, 摇动奶瓶, 直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度, 确定温度适宜时, 即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	7	4
8-12个月	210	7	3

1. 一平勺奶粉约4.5克, 听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时, 请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝, 如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适再逐步递增, 直到宝宝完全适应。

爱心提示
须配合添加辅食。



307.4mm

148.5mm

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.47	9.5
脂肪	g	1.02	20.5
亚油酸	g	0.15	3.1
α -亚麻酸	mg	15	293
碳水化合物	g	3.2	64.0
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	18	371
维生素D	μg	0.49	9.9
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.57	11.55
维生素K1	μg	2.80	56.4
维生素B1	μg	20	410
维生素B2	μg	39	780
维生素B6	μg	27.9	562
维生素B12	μg	0.154	3.10
叶酸(烟酰胺)	μg	191	3843
叶酸	μg	4.6	93
泛酸	μg	229	4622
维生素C	mg	4.8	97.1
生物素	μg	1.13	22.8
胆碱	mg	7.0	141
矿物质			
钠	mg	5	109
钾	mg	22	453
铜	mg	15.8	318.3
镁	mg	2.4	49.1
铁	mg	0.29	5.9
锌	mg	0.21	4.2
锰	μg	8.98	181
钙	mg	23	472
磷	mg	15	304
碘	μg	5.0	118
氯	mg	21	421
硒	μg	1.28	25.9
可选择成分			
肌醇	mg	3.6	72
牛磺酸	mg	1.8	35.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	5.0	100
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.9	119
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	39	786
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.06
叶黄素	μg	10.2	205
乳铁蛋白	mg	8.9	180

即食状态下, 每100ml含较大婴儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、乳糖、脱盐乳清粉(来源羊乳)、脱脂羊乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、花生四烯酸油脂、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、磷脂、低聚半乳糖、碳酸钙、乳铁蛋白、氯化胆碱、L-抗坏血酸、叶黄素、肌醇、dl- α -磷酸生育酚、牛磺酸、胆钙化醇、核黄素、维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、氰钴胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、硫酸亚铁、氯化钾、吡哆醇、硫酸镁、柠檬酸钠、硫酸亚铁、氯化钾、硫酸锰、硫酸锌、磷酸钾、硫酸铜、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处, 每次食用后及时将罐口盖严, 请勿置于冰箱内, 开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB10766-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证号参见生产批号
产品类别及属性:乳基较大婴儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
公司网址:www.sxytry.com
联系方式:400-090-5890



雅泰®

朵恩®

2段

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)

净含量: 300克
注册号: 国食注字YP20220163

- ♥含有肌醇
- ♥含有牛磺酸
- ♥含有二十二碳六烯酸(DHA)
- ♥含有1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯
- ♥含有叶黄素

冲泡方法



1. 在调配奶粉之前, 请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖, 放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55°C左右, 参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉, 参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖, 摇动奶瓶, 直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度, 确定温度适宜时, 即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	7	4
8-12个月	210	7	3

1. 一平勺奶粉约4.5克, 听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时, 请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝, 如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝有无不适再逐步递增, 直到宝宝完全适应。

爱心提示
须配合添加辅助食品。



6 942908 011129

398.7mm

179.5mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	0.47	9.5
脂肪	g	1.05	21.3
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	15	295
碳水化合物	g	3.1	63.2
维生素			
维生素A	μg RE	18	369
维生素D	μg	0.51	10.3
维生素E	mg α-TE	0.58	11.74
维生素K ₁	μg	2.78	56.4
维生素B ₁	μg	16	331
维生素B ₂	μg	34	699
维生素B ₆	μg	28.0	569
维生素B ₁₂	μg	0.168	3.42
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3886
叶酸	μg	3.6	73
泛酸	μg	242	4916
维生素C	mg	4.8	97.6
生物素	μg	1.24	25.2
矿物质			
钠	mg	5	109
钾	mg	26	535
钙	mg	17.3	351.2
镁	mg	2.1	42.1
铁	mg	0.34	6.9
锌	mg	0.19	3.8
铜	μg	25	508
锰	μg	18	362
硒	μg	5.9	119
氯	mg	26	538
可选择成分			
硒	μg	1.28	26.0
胆碱	mg	6.0	122
锰	μg	9.06	184
肌醇	mg	2.4	49
牛磺酸	mg	1.7	33.6
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	5.0	101
二十碳四烯酸(AARA)	mg	6.0	121
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	39	788
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.06
叶黄素	μg	10.1	205
乳铁蛋白	mg	8.9	180

即食状态下，每100ml含幼儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、乳糖、脱脂羊乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯、花生四烯酸油脂、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、磷脂、低聚半乳糖、碳酸钙、乳铁蛋白、氯化胆碱、L-抗坏血酸、叶黄素、肌醇、牛磺酸、dl-α-醋酸生育酚、核黄素、胆钙化醇、醋酸视黄酯、氰钴胺、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸吡哆醇、硫酸胺素、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处，每次食用后及时将罐口盖严，请勿置于冰箱内，开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB10767-2021
生产日期、批号、保质期至:请见罐底喷码
保质期:24个月
食品生产许可证编号:SC12961042300800
检验合格证书号:参见生产批号
产品类别及属性:乳基幼儿配方羊奶粉
生产商:陕西雅泰乳业集团有限公司
生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
产地:陕西 咸阳
公司网址:www.sxytry.com
联系方式:400-090-5890



雅泰®

朵恩®



幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)

净含量:800克
注册号:国食注字YP202201164

- ♥ 含有胆碱
- ♥ 含有肌醇
- ♥ 含有牛磺酸
- ♥ 含有1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯
- ♥ 含有叶黄素

冲泡方法



1. 在调配奶粉之前，请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖，放在沸水中至少煮5分钟。
3. 饮用水煮沸后冷却至55°C左右，参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉，参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖，摇动奶瓶，直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度，确定温度适宜时，即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	210	7	2-3

1. 一平勺奶粉约4.5克，听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时，请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度都会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝，如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增，直到宝宝完全适应。



6 942908 016407

标签 21

307.4mm

148.5mm

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	0.47	9.5
脂肪	g	1.05	21.3
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	5	295
碳水化合物	g	3.1	63.2
维生素			
维生素A	μg RE	18	369
维生素D	μg	0.51	10.3
维生素E	mg α-TE	0.58	11.74
维生素K ₁	μg	2.78	56.4
维生素B ₁	μg	16	331
维生素B ₂	μg	34	699
维生素B ₆	μg	28.0	569
维生素B ₁₂	μg	0.168	3.42
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3886
叶酸	μg	3.6	73
泛酸	μg	242	4916
维生素C	mg	4.8	97.6
生物素	μg	1.24	25.2
矿物质			
钠	mg	5	109
钾	mg	26	535
铜	μg	17.3	351.2
镁	mg	2.1	42.1
铁	mg	0.34	6.9
锌	mg	0.19	3.8
钙	mg	25	508
磷	mg	18	362
碘	μg	5.9	119
硒	μg	26	538
可选择成分			
糖	mg	1.28	26.0
胆碱	mg	6.0	122
锰	μg	9.06	184
肌醇	mg	2.4	49
牛磺酸	mg	1.7	33.6
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	5.0	101
二十碳四烯酸(AARA)	mg	6.0	121
低聚半乳糖	mg	12	242
低聚果糖	mg	39	788
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.06
叶黄素	μg	10.1	205
乳铁蛋白	mg	8.9	180

即食状态下,每100ml含幼儿配方羊奶粉13.5g。

配料表

生羊乳、乳糖、脱脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、花生四烯酸油脂、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、磷脂、低聚半乳糖、碳酸钾、乳铁蛋白、氯化胆碱、L-抗坏血酸、叶黄素、肌醇、牛磺酸、dl-α-醋酸生育酚、核黄素、胆钙化醇、醋酸视黄酯、氰钴胺、D-泛酸钙、烟酰胺、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠。

贮存条件

本品应存放在阴凉干燥处,每次食用后及时将罐口盖严,请勿置于冰箱内,开罐后请在一个月内食用完。

企业信息

产品标准代号:GB10767-2021
 生产日期、批号、保质期:请见罐底喷码
 保质期:24个月
 食品生产许可证编号:SC12961042300800
 检验合格证号参见生产批号
 产品类别及属性:乳基幼儿配方羊奶粉
 生产商:陕西雅泰乳业集团有限公司
 生产地址:陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
 产地:陕西 咸阳
 公司网址:www.sxytry.com
 联系方式:400-090-5890



雅泰®

朵恩®

3段

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)

净含量:300克
 注册号:国食注字YP20220164

- ♥ 含有胆碱
- ♥ 含有肌醇
- ♥ 含有牛磺酸
- ♥ 含有1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯
- ♥ 含有叶黄素

冲泡方法



1. 在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖,放在沸水中至少煮5分钟。
3. 专用水煮开后冷却至55°C左右,参照喂哺表加入正确用水量。
4. 专用量匙量取奶粉,参照喂哺表加入正确用量的奶粉。
5. 盖上瓶盖,摇动奶瓶,直至完全溶解。
6. 滴一滴奶水在手背上测试温度,确定温度适宜时,即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	210	7	2-3

1. 一平勺奶粉约4.5克,听盖内附有专用量勺。
2. 在饮食中添加本产品时,请参照以上喂哺用量建议表。依照宝宝的年龄、食欲以及固体食物量来决定奶粉的每次喂哺量与喂哺次数。以上喂哺用量建议表可依照医生的建议而改变。
3. 每次只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

温馨提示

- 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝的不适。
- 喂奶时应抱着宝宝,如果疏忽照顾可能会引起宝宝窒息或其他不适。
- 换奶时替代品牌要逐步增加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝无不适再逐步递增,直到宝宝完全适应。



6 942908 011136