

# 附件 2：陕西恒生乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

## 标签 1

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

### 贮藏方法

- ① 本品宜贮藏于阴凉干燥处。
- ② 请勿阳光暴晒或放置于高温、潮湿环境中，请勿放置于冰箱内，防止产品变质。
- ③ 每次食用后请务必盖紧塑料盖，以防止吸潮或进入异物。
- ④ 开罐后，请于四周内食用完毕。

### 温馨提示

- ① 水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当等都会引起婴儿的不适。
- ② 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能引起窒息。
- ③ 请勿使用沾水的量匙量取奶粉，防止污染奶粉，影响宝宝健康。
- ④ 喂奶用量及次数参照喂奶量建议表执行，用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
- ⑤ 冲调后请一次喝完，勿保留喝剩的奶液。
- ⑥ 使用完毕后，应用清水及时清洗奶瓶、奶嘴等用具。



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100克
能量	kJ	100	2062
蛋白质	g	0.55	11.3
脂肪	g	1.16	23.9
亚油酸	g	0.10	2.11
α-亚麻酸	mg	13	274
碳水化合物	g	2.8	56.9
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	19	391
维生素D	μg	0.57	11.72
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.54	31.8
维生素B <sub>1</sub>	μg	18	378
维生素B <sub>2</sub>	μg	39	800
维生素B <sub>6</sub>	μg	10.8	223
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.058	1.20
烟酸(烟酰胺)	μg	136	2796
叶酸	μg	5.4	110.6
泛酸	μg	152	3131
维生素C	mg	3.4	70.0
生物素	μg	0.59	12.2
胆碱	mg	6.5	135
<b>矿物质</b>			
钠	mg	9	187
钾	mg	18	378
铜	μg	17.7	364
镁	mg	1.7	36.0
铁	mg	0.17	3.60
锌	mg	0.15	3.15
锰	μg	1.53	31.5
钙	mg	17	360
磷	mg	11	231
碘	μg	5.3	109
氯	mg	16	322
硒	μg	0.87	17.9
<b>膳食纤维成分</b>			
牛磺酸	mg	1.5	30
左旋肉碱	mg	0.4	8.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.7	75.6
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.2	86.3
低聚果糖	mg	113	2328
1,3-甘油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.16	3.2
叶黄素	μg	5.0	104

即食状态下，每100mL奶液含婴儿配方羊奶粉13.5克。



## 贝格塔尼 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)



净含量: 800克  
注册号: 国食注字 YP20240068

### 配料表

脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油(发酵法)、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钙、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K<sub>1</sub>(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、生物素(D-生物素)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、叶黄素、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱。

### 喂奶用量建议表

(饮用时请参照喂奶用量建议表,使用专用量匙。)

月龄	温开水用量	奶粉用量(汤匙数)	每日喂奶次数
0~2周	60mL	2	7~8
2周~4周	90mL	3	6~7
1~2月	120mL	4	5~6
2~4月	150mL	5	5~6
4~6月	180mL	6	5~6

每平匙奶粉约4.5g

**注** 以上的喂奶用量建议表是根据平均的需求量而定,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。

全脂羊乳粉原产国: 新西兰 New Zealand

执行标准: GB 10765 - 2021

食品生产许可证编号: SC20161042301016

产品属性: 乳基婴儿配方食品

产品状态: 粉状 生产日期、保质期至: 见罐底

保质期: 24个月 产地: 陕西·西安

公司名称: 陕西恒生乳业有限公司

生产地址: 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾永路中段

联系方式: 029-3638 8888

咨询服务电话: 400-995-1882

网址: www.sxhsry.com

### 冲调方法

- ① 冲调前洗净双手。将奶瓶、奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具清洗干净。
- ② 将干净的奶瓶、奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具放入沸水中煮沸10分钟左右。
- ③ 冲调用水煮沸后冷却至45~55°C,在奶瓶中加入需要量温开水。
- ④ 用已消毒的量匙(晾干)量取准确份量(平匙)的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。
- ⑤ 盖严奶瓶,两手来回搓动奶瓶至奶粉充分溶解。
- ⑥ 滴几滴在手腕内侧检测温度是否适宜后,即可喂奶。



# 附件 2：陕西恒生乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

## 标签 2

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100克
能量	kJ	100	2062
蛋白质	g	0.55	11.3
脂肪	g	1.16	23.9
亚油酸	g	0.10	2.11
α-亚麻酸	mg	13	274
碳水化合物	g	2.8	56.9
维生素			
维生素A	μg RE	19	391
维生素D	μg	0.57	11.72
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.54	31.8
维生素B <sub>1</sub>	μg	18	378
维生素B <sub>2</sub>	μg	39	800
维生素B <sub>6</sub>	μg	10.8	223
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.058	1.20
烟酸(烟酰胺)	μg	136	2796
叶酸	μg	5.4	110.6
泛酸	μg	152	3131
生物素	μg	0.59	12.2
胆碱	mg	6.5	135
矿物质成分			
牛磺酸	mg	1.5	30
左旋肉碱	mg	0.4	8.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.7	75.6
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.2	86.3
低聚果糖	mg	113	2328
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.16	3.2
叶黄素	μg	5.0	104
矿物质			
钠	mg	9	187
钾	mg	18	378
铜	μg	17.7	364
镁	mg	1.7	36.0
铁	mg	0.17	3.60
锌	mg	0.15	3.15
锰	μg	1.53	31.5
钙	mg	17	360
磷	mg	11	231
碘	μg	5.3	109
氯	mg	16	322
硒	μg	0.87	17.9

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。即食状态下，每100mL奶液含婴儿配方羊奶粉13.5克。

### 贮藏方法

①本品宜贮藏于阴凉干燥处。②请勿阳光暴晒或放置于高温、潮湿环境中，请勿放置于冰箱内，防止产品变质。③每次食用后请务必盖紧塑料盖，以防止吸潮或进入异物。④开罐后，请于四周内食用完毕。

### 温馨提示

①水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当等会引起婴儿的不适。②哺喂时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能引起窒息。③请勿使用沾水的量匙量取奶粉，防止污染奶粉，影响宝宝健康。④哺喂用量及次数参照哺喂用量建议表执行，用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。⑤冲调后请一次喝完，勿保留喝剩的奶液。⑥使用完毕后，用清水及时清洗奶瓶、奶嘴等用具。

**贝格塔尼**  
**婴儿配方羊奶粉**  
**(0-6月龄, 1段)**

净含量: 100克  
注册号: 国食注字YP20240068

### 配料表

脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钾、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K<sub>1</sub>(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、生物素(D-生物素)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、叶黄素、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱。

### 哺喂用量建议表

(饮用时请参照哺喂用量建议表, 使用专用量匙。)

年龄	温开水用量	奶粉用量(量匙数)	每日哺喂次数
0~2周	60mL	2	7~8
2周~4周	90mL	3	6~7
1~2月	120mL	4	5~6
2~4月	150mL	5	5~6
4~6月	180mL	6	5~6

每平匙奶粉约4.5g

**注:** 以上的哺喂用量建议表是根据平均的需求量而定, 您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见酌情增减。

全脂羊乳粉原产国: 新西兰 New Zealand  
执行标准: GB 10765-2021  
食品生产许可证编号: SC20161042301016  
产品属性: 乳基婴儿配方食品  
产品状态: 粉状 生产日期、保质期至: 见喷码  
保质期: 24个月 产地: 陕西·西安  
公司名称: 陕西恒生乳业有限公司  
生产地址: 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾永路中段  
联系方式: 029-3638 8888 咨询服务电话: 400-995-1882  
网址: www.sxhsry.com

### 冲调方法

- 冲调前洗净双手。将奶瓶、奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具清洗干净。
- 将干净的奶瓶、奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具放入沸水中煮沸10分钟左右。
- 冲调用水煮沸后冷却至45~55°C, 在奶瓶中加入需要量温开水。
- 用已消毒的量匙(晾干)量取准确份量(平匙)的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。
- 盖严奶瓶, 两手来回搓动奶瓶至奶粉充分溶解。
- 滴几滴水在手腕内侧检测温度是否适宜后, 即可哺喂。

6 922991 340245

保持环境清洁 请勿乱丢垃圾

# 附件 2：陕西恒生乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

## 标签 3

食用本产品时,须配合添加辅助食品。

**贮藏方法**

- ① 本品宜贮藏于阴凉干燥处。
- ② 请勿阳光暴晒或放置于高温、潮湿环境中,请勿放置于冰箱内,防止产品变质。
- ③ 每次食用后请务必盖紧塑料盖,以防止吸潮或进入异物。
- ④ 开罐后,请于四周内食用完毕。

**温馨提示**

- ① 水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当等都会引起婴儿的不适。
- ② 喂奶时应抱着婴儿,如疏忽照顾可能引起窒息。
- ③ 请勿使用沾水的量匙量取奶粉,防止污染奶粉,影响宝宝健康。
- ④ 喂奶用量及次数参照喂奶量建议表执行,用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
- ⑤ 冲调后请一次喝完,勿保留喝剩的奶液。
- ⑥ 使用完毕后,应用清水及时清洗奶瓶、奶嘴等用具。

  保持环境清洁 请勿乱丢垃圾

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100克
能量	kJ	100	1996
蛋白质	g	0.59	11.7
脂肪	g	1.05	21.0
亚油酸	g	0.18	3.62
α-亚麻酸	mg	16	310
碳水化合物	g	3.0	58.9
维生素			
维生素A	μg RE	23	453
维生素D	μg	0.57	11.31
维生素E	mg α-TE	0.25	5.00
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.40	28.0
维生素B <sub>1</sub>	μg	30	608
维生素B <sub>2</sub>	μg	35	695
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.8	296
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.060	1.20
烟酸(烟酰胺)	μg	199	3965
叶酸	μg	5.9	117.4
泛酸	μg	166	3313
维生素C	mg	3.3	66.1
生物素	μg	0.60	12.0
胆碱	mg	5.7	114
矿物质			
钠	mg	7	140
钾	mg	23	454
铜	μg	13.9	278
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.30	6.00
锌	mg	0.18	3.60
锰	μg	0.30	6.0
钙	mg	22	438
磷	mg	15	294
碘	μg	5.3	105
氯	mg	17	340
硒	μg	0.60	12.0
膳食纤维成分			
牛磺酸	mg	1.5	30
左旋肉碱	mg	0.4	8.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.8	75.6
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	87.7
低聚果糖	mg	117	2328
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
叶黄素	μg	10.5	209

即食状态下,每100mL奶液含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。



## 贝格塔尼

### 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄,2段)



**2** 段 净含量:800克  
注册号:国食注字YP20240069

配料表			冲调方法	
脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硫酸钠、碳酸钙、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>12</sub> (氰钴胺)、生物素(D-生物素)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、叶黄素、牛磺酸、氯化胆碱、左旋肉碱。			1 冲调前洗净双手。将奶瓶、奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具清洗干净。	
			2 将干净的奶瓶、奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具放入沸水中煮沸10分钟左右。	
			3 冲调用水煮沸后冷却至45~55°C,在奶瓶中加入需要量温开水。	
			4 用已消毒的量匙(晾干)量取准确份量(平匙)的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。	
			5 盖严奶瓶,两手来回搓动奶瓶至奶粉充分溶解。	
			6 滴几滴在手腕内侧检测温度是否适宜后,即可哺喂。	
哺喂用量建议表				
(饮用时请参照哺喂用量建议表,使用专用量匙。)				
年龄	温开水用量	奶粉用量(量匙数)	每日哺喂次数	
6~9月	180mL	6	4~5	
9~12月	210mL	7	3~4	
每平匙奶粉约4.5g				
<b>注:</b> 以上的哺喂用量建议表是根据平均的需求量而定,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。				
全脂羊乳粉原产国:新西兰 New Zealand 执行标准:GB 10766-2021 食品生产许可证编号:SC20161042301016 产品属性:乳基较大婴儿配方食品 产品状态:粉状 生产日期、保质期至:见喷码 保质期:24个月 产地:陕西·西安 公司名称:陕西恒生乳业有限公司 生产地址:陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾永路中段 联系方式:029-3638 8888 咨询服务电话:400-995-1882 网址:www.sxhsry.com				



# 附件 2：陕西恒生乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

## 标签 4

**食用本产品时，须配合添加辅助食品。**

**贮藏方法**

- 本品宜贮藏于阴凉干燥处。
- 请勿阳光暴晒或放置于高温、潮湿环境中，请勿放置于冰箱内，防止产品变质。
- 每次食用后请务必盖紧塑料盖，以防止吸潮或进入异物。
- 开罐后，请于四周内食用完毕。

**温馨提示**

- 水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当等都会引起婴儿的不适。
- 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能引起窒息。
- 请勿使用沾水的量匙量取奶粉，防止污染奶粉，影响宝宝健康。
- 喂奶用量及次数参照喂养量建议表执行，用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
- 冲调后请一次饮完，勿保留喝剩的奶液。
- 使用完毕后，应用清水及时清洗奶瓶、奶嘴等用具。

**营养成分表**

项目	单位	每100kJ	每100克
能量	kJ	100	2049
蛋白质	g	0.63	12.9
脂肪	g	1.17	24.0
亚油酸	g	0.17	3.50
α-亚麻酸	mg	14	295
碳水化合物	g	2.7	54.3
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	20	402
维生素D	μg	0.61	12.54
维生素E	mg α-TE	0.30	6.09
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.34	27.5
维生素B <sub>1</sub>	μg	22	450
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	557
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.0	287
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.059	1.20
烟酸(烟酰胺)	μg	172	3530
叶酸	μg	5.8	117.9
泛酸	μg	162	3323
维生素C	mg	3.2	66.1
生物素	μg	1.18	24.2
<b>矿物质</b>			
钠	mg	7	140
钾	mg	22	459
铜	μg	13.6	278
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.28	5.74
锌	mg	0.18	3.70
钙	mg	21	438
磷	mg	14	294
碘	μg	2.0	40
氯	mg	17	340
<b>膳食纤维</b>			
硒	μg	0.99	20.2
胆碱	mg	7.0	144
锰	μg	0.72	14.8
牛磺酸	mg	1.5	30
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.4	50.2
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	2.0	40.2
低聚果糖	mg	114	2328
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.1
叶黄素	μg	10.2	209

即食状态下，每100mL奶液含幼儿配方羊奶粉13.5克。



# 贝格塔尼

## 幼儿配方羊奶粉

### (12-36月龄,3段)



3

净含量: 800克  
注册号: 国食注字YP20240070

**配料表**

全脂羊乳粉、脱盐羊乳清粉、乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、碳酸钙、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K<sub>1</sub>(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、生物素(D-生物素)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、叶黄素、牛磺酸、氯化胆碱、左旋肉碱。

**喂养量建议表**

(饮用时请参照喂养量建议表,使用专用量匙。)

月龄	温开水用量	奶粉用量(勺数)	每日喂奶次数
12~36月	240mL	8	3~4

每平匙奶粉约4.5g

**注意** 以上的喂养量建议表是根据平均的需求量而定,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。

全脂羊乳粉原产国:新西兰 New Zealand  
执行标准:GB 10767 - 2021  
食品生产许可证编号:SC20161042301016  
产品属性:乳基幼儿配方食品  
产品状态:粉状 生产日期、保质期至:见喷码  
保质期:24个月 产地:陕西·西安  
公司名称:陕西恒生乳业有限公司  
生产地址:陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾永路中段  
联系方式:029-3638 8888  
咨询服务电话:400-995-1882  
网址:www.sxhsry.com

**冲调方法**

- 冲调前洗净双手。将奶瓶、奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具清洗干净。
- 将干净的奶瓶、奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具放入沸水中煮沸10分钟左右。
- 冲调用开水煮沸后冷却至45~55°C,在奶瓶中加入需要量温开水。
- 用已消毒的量匙(晾干)量取准确份量(平匙)的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。
- 盖严奶瓶,两手来回滚动奶瓶至奶粉充分溶解。
- 滴几滴在手腕内侧检测温度是否适宜后,即可喂奶。



6 922991 330109

# 附件 2：陕西恒生乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

## 标签 5

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品

**温馨提示：**

- 水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当均会引起婴儿的不适。
- 哺喂时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能引起窒息。
- 请勿使用沾水的量匙量取奶粉，防止污染奶粉，影响宝宝健康。
- 喂哺用量及次数参照喂哺用量建议表执行，用少于或多余指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
- 冲调后请一次喝完，勿保留喝剩的奶液。
- 使用完毕后，应用清水及时清洗奶瓶、奶嘴等用具。

**哺喂用量建议表**  
(饮用时请参考哺喂用量建议表，使用专用量匙。)

年龄	温开水用量	奶粉用量(量匙数)	每日哺喂次数
0-2月	60mL	2	7-9
2月-4月	90mL	3	6-7
4-6月	120mL	4	5-6
6-12月	150mL	5	5-6
1-3岁	180mL	6	5-6

每平匙奶粉约4.5克

注：以上的哺喂用量建议表是根据平均的需求量而定，您可根据宝宝的发育状况及营养师或医生的意见而酌情增减

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100克
能量	kJ	100	2057
蛋白质	g	0.52	10.7
脂肪	g	1.17	24.0
亚油酸	g	0.16	3.20
α-亚油酸	mg	14	295
碳水化合物	g	2.8	57.0
<b>维生素</b>			
维生素A	μgRE	16	331
维生素D	μg	0.60	12.40
维生素E	mgα-TE	0.43	8.80
维生素K	μg	2.03	41.8
维生素B <sub>1</sub>	μg	34	696
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	553
维生素B <sub>6</sub>	μg	10.5	215
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.099	2.04
烟酸(烟酰胺)	μg	157	3228
叶酸	μg	6.3	130.6
泛酸	μg	224	4600
维生素C	mg	4.7	96.4
生物素	μg	0.95	19.6
胆碱	mg	7.3	150
<b>矿物质</b>			
钠	mg	8	169
钾	mg	20	409
铜	μg	17.0	350
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.18	3.60
锌	mg	0.20	4.13
锰	μg	5.05	103.8
钙	mg	18	360
磷	mg	11	232
碘	μg	4.5	93
氯	mg	20	408
硒	μg	1.11	22.9
<b>可选择成分</b>			
肌醇	mg	4.0	82
牛磺酸	mg	1.5	30
左旋肉碱	mg	0.4	8.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.5
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.1	104.0
低聚果糖	mg	113	2321
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6
乳铁蛋白	mg	1.2	25.0

注：即食状态下，每100mL奶液含婴儿配方奶粉13.5克



**配料表：**

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油酸(发酵法)、异构化乳糖液、乳铁蛋白、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、氯化钠、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钙、维生素A(维生素A棕榈酸酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、生物素(D-生物素)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱。

**冲调方法：**

- 冲调前洗净双手。将奶瓶、奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具放入沸水中煮沸10分钟左右
- 将干净的奶瓶、奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具放入沸水中煮沸10分钟左右
- 冲调用水煮沸后冷却至40°C左右，在奶瓶中加入需要量温开水
- 用已消毒的量匙(晾干)量取准确份量(平匙)的婴儿配方奶粉加入奶瓶中
- 盖产奶瓶，用手来回揉搓奶瓶至奶粉充分溶解
- 滴几滴在手腕内侧检测温度是否适宜后，即可哺喂

**保存方法：**

- 本品宜贮藏于阴凉干燥处。
- 请勿阳光暴晒或放置于高温、潮湿环境中，请勿放置于冰箱内，防止产品变质。
- 每次食用后请务必盖紧塑料盖，以防止吸潮或进入异物。
- 开罐后，请于四周内食用完毕。

全脂乳粉原产国：新西兰 New Zealand  
执行标准：GB 10765-2021  
产品状态：粉状  
产品属性：乳基婴儿配方食品  
保质期：24个月  
产地：陕西·西安  
生产地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾永路中段  
公司名称：陕西恒生乳业有限公司  
联系方式：029-36388888  
咨询服务电话：400-9951882  
网址：www.sxhsry.com  
食品生产许可证编号：SC20161042301016  
生产日期、保质期至：见罐底喷码

保持环境清洁 请勿乱抛空罐

6 9 2 2 9 9 1 3 3 2 0 6 6

# 附件 2：陕西恒生乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 6

营养成分表							
项目	单位	每100kJ	每100克	项目	单位	每100kJ	每100克
能量	kJ	100	2057	钠	mg	8	169
蛋白质	g	0.52	10.7	钾	mg	20	409
脂肪	g	1.17	24.0	铜	μg	17.0	350
亚油酸	g	0.16	3.20	镁	mg	1.8	36.0
α-亚麻酸	mg	14	295	铁	mg	0.18	3.60
碳水化合物	g	2.8	57.0	锌	mg	0.20	4.13
维生素				锰	μg	5.05	103.8
维生素A	μg RE	16	331	钙	mg	18	360
维生素D	μg	0.60	12.40	磷	mg	11	232
维生素E	mg α-TE	0.43	8.80	碘	μg	4.5	93
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.03	41.8	氯	mg	20	408
维生素B <sub>1</sub>	μg	34	696	硒	μg	1.11	22.9
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	553	可选择成分			
维生素B <sub>6</sub>	μg	10.5	215	肌醇	mg	4.0	82
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.099	2.04	牛磺酸	mg	1.5	30
烟酸(烟酰胺)	μg	157	3228	左旋肉碱	mg	0.4	8.0
叶酸	μg	6.3	130.6	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.5
泛酸	μg	224	4600	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.1	104.0
维生素C	mg	4.7	96.4	低聚果糖	mg	113	2321
生物素	μg	0.95	19.6	1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.18	3.6
胆碱	mg	7.3	150	甘油三酯			
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.2	25.0

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品

**温馨提示：**

1. 水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当等都会引起婴儿的不适。
2. 哺喂时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能引起窒息。
3. 请勿使用沾水的量匙量取奶粉，防止污染奶粉，影响宝宝健康。
4. 哺喂用量及次数参照哺喂用量建议表执行，用少于或多余指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
5. 冲调后请一次饮完，勿保留剩剩的奶液。
6. 使用完后，应用清水及时清洗奶瓶、奶嘴等用具。

**哺喂用量建议表**  
(饮用时请参照哺喂用量建议表，使用专用量匙。)

年龄	温开水用量	奶粉用量(量匙数)	每日哺喂次数
0-2周	60mL	2	7-8
2周-4周	90mL	3	6-7
1-2月	120mL	4	5-6
2-4月	150mL	5	5-6
4-6月	180mL	6	5-6

每平匙奶粉约4.5克



**配料表：**

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油(发酵法)、异构化乳糖液、乳铁蛋白、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、氯化钠、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钙、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K<sub>1</sub>(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、生物素(D-生物素)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱。

**冲调方法：**

1. 冲调前洗净双手。将奶瓶、奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具清洗干净。
2. 将干净的奶瓶奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具放入沸水中煮沸10分钟左右。
3. 冲调用水煮沸后冷却至40℃左右，在奶瓶中加入需要量温开水。
4. 用已消毒的量匙(晾干)量取准确份量(平匙)的婴儿配方奶粉加入奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶，两手来回搓动奶瓶至奶粉充分溶解。
6. 滴几滴在手腕内侧检测温度是否适宜后，即可哺喂。

**储存方法：**

1. 本品宜贮藏于阴凉干燥处。
2. 请勿阳光暴晒或放置于高温、潮湿环境中，请勿放置于冰箱内，防止产品变质。
3. 每次食用后请务必盖紧塑料盖，以防止吸潮或进入异物。
4. 开罐后，请于四周内食用完毕。

全脂乳粉原产国：新西兰 New Zealand  
执行标准：GB 10765-2021  
产品状态：粉状  
产品属性：乳基婴儿配方食品  
保质期：24个月  
产地：陕西·西安  
生产地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾永路中段  
公司名称：陕西恒生乳业有限公司  
联系方式：029-36388888  
咨询服务电话：400-9951882  
网址：www.sxhsry.com  
食品生产许可证编号：SC20161042301016  
生产日期、保质期至：见罐底喷码

保持环境清洁 请勿乱抛空罐

6 9 2 2 9 9 1 1 3 3 2 0 3 5

# 附件 2：陕西恒生乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

## 标签 7

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

**温馨提示：**

- 1、水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当等都会引起较大婴儿的不适。
- 2、喂奶时应抱着较大婴儿，如疏忽照顾可能引起窒息。
- 3、请勿使用沾水的量匙量取奶粉，防止污染奶粉，影响宝宝健康。
- 4、喂奶用量及次数参照喂奶用量建议表执行，用少于或多余指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
- 5、冲调后请一次喝完，勿保留喝剩的奶液。
- 6、使用完毕后，应用清水及时清洗奶瓶、奶嘴等用具。

**喂奶用量建议表**  
(饮用时请参考喂奶用量建议表，使用专用量匙。)

年龄	温开水用量	奶粉用量(量匙数)	每日喂奶次数
6-9月	180mL	6	4-5
9-12月	210mL	7	3-4

每平匙奶粉约4.5克

注：以上的喂奶用量建议表是根据平均的需求量而定，您可根据宝宝的发育状况及营养师专家或医生的意见而酌情增减

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100克
能量	kJ	100	2010
蛋白质	g	0.57	11.5
脂肪	g	1.08	21.8
亚油酸	g	0.17	3.41
α-亚麻酸	mg	16	318
碳水化合物	g	2.9	58.2
维生素			
维生素A	μg RE	20	400
维生素D	μg	0.60	12.00
维生素E	mg α-TE	0.41	8.25
维生素K	μg	2.09	42.0
维生素B <sub>1</sub>	μg	35	699
维生素B <sub>2</sub>	μg	26	528
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.9	299
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.097	1.94
烟酸(烟酰胺)	μg	162	3249
叶酸	μg	6.4	129.2
泛酸	μg	212	4270
维生素C	mg	4.8	96.4
生物素	μg	1.10	22.2
胆碱	mg	9.9	199
矿物质			
钠	mg	6	122
钾	mg	23	459
钙	mg	13.9	280
镁	mg	1.7	33.3
铁	mg	0.30	6.00
锌	mg	0.21	4.15
锰	μg	5.23	105.2
铜	μg	18	358
磷	mg	11	228
碘	μg	4.1	83
硒	μg	15	292
锶	μg	0.60	12.0
可选择成分			
胆碱	mg	4.1	82
牛磺酸	mg	1.5	30
左旋肉碱	mg	0.4	8.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	93.5
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.2	104.0
低聚果糖	mg	115	2321
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
乳铁蛋白	mg	1.2	25.0

注：即食状态下，每100mL奶液含较大婴儿配方奶粉13.5克

**怡美生**

**2段**

净含量：800克/罐 注册号：国食注字YP20240072

**较大婴儿配方奶粉(6-12月龄，2段)**

**配料表：**

脱脂乳清粉、全脂乳粉、乳糖、食用植物油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸(酯交换法)、异构化乳糖液、乳铁蛋白、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、柠檬酸钾、柠檬酸钠、碳酸钙、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、生物素(D-生物素)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱。

**冲调方法：**

1. 冲调前洗净双手。将奶瓶、奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具放入沸水中煮沸10分钟左右。
2. 将干净的奶瓶、奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具放入沸水中煮沸10分钟左右。
3. 冲调用水煮沸后冷却至40°C左右，在奶瓶中加入需要量温开水。
4. 用已消毒的量匙(晾干)量取准确份量(平匙)的较大婴儿配方奶粉加入奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶，两手来回转动奶瓶至奶粉充分溶解。
6. 滴几滴在手腕内侧检测温度是否适宜后，即可喂奶。

**保持环境清洁 请勿乱抛空罐**

**储存方法：**

- 1、本品宜贮藏于阴凉干燥处。
- 2、请勿阳光暴晒或放置于高温、潮湿环境中，请勿放置于冰箱内，防止产品变质。
- 3、每次食用后请务必盖紧塑料盖，以防止吸潮或进入异物。
- 4、开罐后，请于四周内食用完毕。

全脂乳粉原产国：新西兰 New Zealand  
执行标准：GB 10766-2021  
产品状态：粉状  
产品属性：乳基较大婴儿配方食品  
保质期：24个月  
产地：陕西·西安  
生产地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾永路中段  
公司名称：陕西恒生乳业有限公司  
联系方式：029-36388888  
咨询服务电话：400-9951882  
网址：www.sxhsry.com  
食品生产许可证编号：SC20161042301016  
生产日期、保质期至：见罐底喷码

6 9 2 2 9 9 1 3 3 2 0 7 3

# 附件 2：陕西恒生乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

## 标签 8

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

**温馨提示：**

- 1、水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当等均会引起幼儿的不适。
- 2、喂奶时应抱着幼儿，如疏忽照顾可能引起窒息。
- 3、请勿使用沾水的量匙取奶粉，防止污染奶粉，影响宝宝健康。
- 4、喂奶用量及次数参照哺乳用量建议表执行，用少于或多余指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
- 5、冲调后请一次饮完，勿保留喝剩的奶液。
- 6、使用完毕后，应用清水及时清洗奶瓶、奶嘴等用具。

**哺乳用量建议表**  
(饮用时请参考哺乳用量建议表，使用专用量匙。)

年龄	温开水用量	奶粉用量(罐匙数)	每日哺乳次数
12-36月	240mL	8	3-4

每平匙奶粉约4.5克

注：以上的哺乳用量建议表是根据平均的需求量而定，您可依据宝宝的发育状况及营养师专家或医生的意见而酌情增减

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100克
能量	kJ	100	2021
蛋白质	g	0.60	12.1
脂肪	g	1.12	22.6
亚油酸	g	0.16	3.20
α-亚油酸	mg	15	301
碳水化合物	g	2.8	56.5
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	19	376
维生素D	μg	0.60	12.20
维生素E	mg α-TE	0.41	8.22
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.08	42.0
维生素B <sub>1</sub>	μg	35	703
维生素B <sub>2</sub>	μg	34	688
维生素B <sub>6</sub>	μg	13.4	271
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.105	2.12
烟酸(烟酰胺)	μg	161	3263
叶酸	μg	6.5	131.1
泛酸	μg	213	4307
维生素C	mg	4.8	96.4
生物素	μg	1.16	23.5
<b>矿物质</b>			
钠	mg	6	129
钾	mg	23	459
钙	mg	13.9	280
镁	mg	1.8	35.9
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.16	3.21
铜	mg	19	391
磷	mg	13	256
碘	μg	4.1	83
硒	μg	15	302
<b>可选择成分</b>			
碘	μg	0.91	18.4
胆碱	mg	9.6	195
锰	μg	5.23	105.7
肌醇	mg	4.1	82
牛磺酸	mg	1.5	30
左旋肉碱	mg	0.4	8.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	91.5
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.1	104.0
低聚果糖	mg	115	2321
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
乳铁蛋白	mg	1.2	25.0

注：即食状态下，每100mL奶液含幼儿配方奶粉13.5克



**配料表：**

全脂乳粉、脱盐乳清粉、乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、食用植物油和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、异构化乳糖液、乳铁蛋白、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、柠檬酸钾、柠檬酸钠、硫酸钙、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、生物素(D-生物素)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱。

**冲调方法：**

1. 冲调前洗净双手，将奶瓶、奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具清洗干净。
2. 将干净的奶瓶奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具放入沸水中煮沸10分钟左右。
3. 冲调用水煮沸后冷却至40℃左右，在奶瓶中加入需要量温开水。
4. 用已消毒的量匙(晾干)量取准确份量(平匙)的幼儿配方奶粉加入奶瓶中。
5. 盖平奶瓶，两手来回搓动奶瓶盖奶粉充分溶解。
6. 滴几滴在手腕内侧检测温度是否适宜后，即可哺喂。

**储存方法：**

- 1、本品宜贮藏于阴凉干燥处。
- 2、请勿阳光暴晒或放置于高温、潮湿环境中，请勿放置于冰箱内，防止产品变质。
- 3、每次食用后请务必盖紧塑料盖，以防止吸潮或进入异物。
- 4、开罐后，请于四周内食用完毕。

全脂乳粉原产国：新西兰 New Zealand  
执行标准：GB 10767-2021  
产品状态：粉状  
产品属性：乳基幼儿配方食品  
保质期：24个月  
产地：陕西·西安  
生产地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾永路中段  
公司名称：陕西恒生乳业有限公司  
联系方式：029-36388888  
咨询服务电话：400-9951882  
网 址：www.sxhsry.com  
食品生产许可证编号：SC20161042301016  
生产日期、保质期至：见罐底喷码

保持环境清洁 请勿乱倒空罐

6 9 2 2 9 9 1 3 3 2 0 8 0

# 附件 2：陕西恒生乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 9

营养成分表							
项目	单位	每100kJ	每100克	项目	单位	每100kJ	每100克
能量	kJ	100	2021	钾	mg	23	459
蛋白质	g	0.60	12.1	铜	μg	13.9	280
脂肪	g	1.12	22.6	镁	mg	1.8	35.9
亚油酸	g	0.16	3.20	铁	mg	0.32	6.50
α-亚麻酸	mg	15	301	锌	mg	0.16	3.21
碳水化合物	g	2.8	56.5	钙	mg	19	391
维生素				磷	mg	13	256
维生素A	μg RE	19	376	钠	mg	4.1	83
维生素D	μg	0.60	12.20	氯	mg	15	302
维生素E	mg α-TE	0.41	8.22	可选择成分			
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.08	42.0	硒	μg	0.91	18.4
维生素B <sub>1</sub>	μg	35	703	胆碱	mg	9.6	195
维生素B <sub>2</sub>	μg	34	688	锰	μg	5.23	105.7
维生素B <sub>6</sub>	μg	13.4	271	肌醇	mg	4.1	82
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.105	2.12	牛磺酸	mg	1.5	30
烟酸(烟酰胺)	μg	161	3263	左旋肉碱	mg	0.4	8.0
叶酸	μg	6.5	131.1	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	91.5
泛酸	μg	213	4307	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.1	104.0
维生素C	mg	4.8	96.4	低聚果糖	mg	115	2321
生物素	μg	1.16	23.5	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯	g	0.15	3.0
矿物质				甘油二酯			
钠	mg	6	129	乳铁蛋白	mg	1.2	25.0

食用本产品时，须配合添加辅食。  
注：即食状态下，每100mL奶液含幼儿配方奶粉13.5克

**温馨提示：**  
1、水和奶未经过消毒或奶液浓度不当等均会引起幼儿的不适。2、喂奶时应抱着幼儿，如疏忽照顾可能引起窒息。3、请勿使用沾水的量匙量取奶粉，防止污染奶粉，影响宝宝健康。4、喂奶用量及次数参照喂奶量建议表执行，用少于或多余指定份量的奶粉会让宝宝得不到适当的营养或导致脱水。5、冲调后请一次喝完，勿保留剩余的奶液。6、使用完毕后，应用清水及时清洗奶瓶、奶嘴等用具。

**喂奶量建议表**  
(饮用时请参考喂奶量建议表，使用专用量匙。)

年龄	温开水用量	奶粉用量(量匙数)	每日喂奶次数
12-36月	240mL	8	3-4

每平匙奶粉约4.5克  
注：以上的喂奶量建议表是根据平均的需求量制定，您可依据宝宝的发育状况及营养师专家或医生的意见调整喂奶量。



**配料表：**  
全脂乳粉、脱盐乳清粉、乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯、食用植物油和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸(左旋法)、再构化乳清球、乳铁蛋白、磷酸亚铁、磷酸锌、磷酸钙、磷酸钾、磷酸铝、磷酸钾、氯化钾、柠檬酸钾、柠檬酸钙、磷酸钙、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K<sub>1</sub>(甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(钴胺素)、生物素(维生素H)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱。

**冲调方法：**  
1. 冲调前洗净双手，将奶瓶、奶嘴、量匙和奶嘴盖等用具清洗并晾干。  
2. 将干净的奶嘴奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具放入沸水中煮沸10分钟左右。  
3. 冲调用水煮沸后冷却至40℃左右，在奶瓶中加入需要量温开水。  
4. 用已消毒的量匙(晾干)量取准确份量(平匙的奶勺)配方奶粉加入奶瓶中。  
5. 盖严奶瓶，用手来回滚动奶瓶至奶粉充分溶解。  
6. 滴几滴在手腕内侧检测温度是否适宜后，即可哺喂。

**保持环境清洁 请勿乱抛空罐**

**配料表：**  
全脂乳粉、脱盐乳清粉、乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯、食用植物油和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸(左旋法)、再构化乳清球、乳铁蛋白、磷酸亚铁、磷酸锌、磷酸钙、磷酸钾、磷酸铝、磷酸钾、氯化钾、柠檬酸钾、柠檬酸钙、磷酸钙、磷酸钾、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K<sub>1</sub>(甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(钴胺素)、生物素(维生素H)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱。

**储存方法：**  
1、本品宜贮藏于阴凉干燥处。  
2、请勿阳光暴晒或放置于高温、潮湿环境中，请勿放置于冰箱内，防止产品变质。  
3、每次食用后请务必盖紧塑料盖，以防止吸潮或进入异物。  
4、开罐后，请于四周内食用完毕。

全脂乳粉原产国：新西兰 New Zealand  
执行标准：GB 10767-2021  
产品状态：粉状  
产品属性：乳基幼儿配方食品  
保质期：24个月  
产地：陕西·西安  
生产地址：陕西省西咸新区沣河新城永隆镇沣永路中段  
公司名称：陕西恒生乳业有限公司  
联系方式：029-36388888  
咨询服务电话：400-9951882  
网址：www.sxhsry.com  
食品生产许可证编号：SC20161042301016  
生产日期、保质期：见罐底喷码

6 9 2 2 9 9 1 3 3 2 0 5 9

# 附件 2：陕西恒生乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 10

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

**温馨提示：**

- 1、水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当等都会引起婴儿的不适。
- 2、喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能引起窒息。
- 3、请勿使用沾水的量匙量取奶粉，防止污染奶粉，影响宝宝健康。
- 4、喂奶用量及次数参照喂奶用量建议表执行，用少于或多余指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
- 5、冲调后请一次喝完，勿保留喝剩的奶液。
- 6、使用完毕后，应用清水及时清洗奶瓶、奶嘴等用具。

**喂奶用量建议表**  
(饮用时请参考喂奶用量建议表，使用专用量匙。)

年龄	温开水用量	奶粉用量(量匙数)	每日喂奶次数
0-2周	60mL	2	7-8
2周-4周	90mL	3	6-7
1-2月	120mL	4	5-6
2-4月	150mL	5	5-6
4-6月	180mL	6	5-6

每平匙奶粉约4.5克

注：以上的喂奶用量建议表是根据平均的需求量而定，您可根据宝宝的发育状况及营养师或医生的意见而酌情增减。

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100克
能量	kJ	100	2062
蛋白质	g	0.49	10.2
脂肪	g	1.16	23.9
亚油酸	g	0.14	2.86
α-亚麻酸	mg	15	309
碳水化合物	g	2.8	58.0
<b>维生素</b>			
维生素A	μgRE	15	318
维生素D	μg	0.60	12.36
维生素E	mg α-TE	0.32	6.70
维生素K	μg	1.66	34.3
维生素B <sub>1</sub>	μg	19	384
维生素B <sub>2</sub>	μg	24	490
维生素B <sub>6</sub>	μg	13.4	277
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.057	1.17
烟酸(烟酰胺)	μg	143	2949
叶酸	μg	4.8	98.9
泛酸	μg	120	2482
维生素C	mg	2.9	58.9
生物素	μg	0.68	14.1
胆碱	mg	6.0	124
<b>矿物质</b>			
钠	mg	8	166
钾	mg	18	373
铜	μg	16.3	336
铁	mg	1.5	30.7
锌	mg	0.15	3.04
钙	mg	0.15	3.09
锰	μg	3.83	79.0
硒	μg	13	275
磷	mg	9	190
碘	μg	4.5	93
氟	mg	16	321
铬	μg	0.89	18.3
<b>可选择成分</b>			
肌醇	mg	4.5	92
牛磺酸	mg	0.9	19
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.8	77.9
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	102.2
低聚果糖	mg	11.3	232.8
1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	g	0.19	4.0
叶黄素	μg	4.9	101.0
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

注：即食状态下，每100mL奶液含婴儿配方奶粉13.5克



怡美生



1段

注册号：国食注字YP20240110

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

净含量：800克/罐

**配料表：**

脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯、低聚果糖、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、乳铁蛋白、叶黄素、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钙、维生素A(维生素E)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K<sub>1</sub>(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸。

**冲调方法：**

1. 冲调前洗净双手，将奶瓶、奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具清洗干净。
2. 将干净的奶瓶、奶嘴和奶瓶盖等用具放入沸水中煮沸10分钟左右。
3. 冲调用水煮沸后冷却至40℃左右，在奶瓶中加入需要量温开水。
4. 用已消毒的量匙(晾干)量取准确份量(平匙)的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶。
5. 盖紧奶瓶，两手来回揉搓奶瓶至奶粉充分溶解。
6. 滴几滴在手腕内侧检测温度是否适宜后，即可喂奶。

**储存方法：**

- 1、本品宜贮藏于阴凉干燥处。
- 2、请勿阳光暴晒或放置于高温、潮湿环境中，请勿放置于冰箱内，防止产品变质。
- 3、每次食用后请务必盖紧塑料盖，以防止吸潮或进入异物。
- 4、开罐后，请于四周内食用完毕。

全脂羊乳粉原产国：新西兰 New Zealand  
执行标准：GB 10765-2021  
产品状态：粉状  
产品属性：乳基婴儿配方食品  
保质期：24个月  
产地：陕西·西安  
生产地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾永路中段  
公司名称：陕西恒生乳业有限公司  
联系方式：029-36388888  
咨询服务电话：400-9951882  
网址：www.sxhsry.com  
食品生产许可证编号：SC20161042301016  
生产日期、保质期至：见罐底喷码

保护环境清洁 请勿乱丢空罐

6 922991 332103

# 附件 2：陕西恒生乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 11

营养成分表							
项目	单位	每100kJ	每100克	项目	单位	每100kJ	每100克
能量	kJ	100	2062	钠	mg	8	166
蛋白质	g	0.49	10.2	钾	mg	18	373
脂肪	g	1.16	23.9	铜	μg	16.3	336
亚油酸	g	0.14	2.86	镁	mg	1.5	30.7
α-亚麻酸	mg	15	309	铁	mg	0.15	3.04
碳水化合物	g	2.8	58.0	锌	mg	0.15	3.09
维生素				锰	μg	3.83	79.0
维生素A	μgRE	15	318	钙	mg	13	275
维生素D	μg	0.60	12.36	磷	mg	9	190
维生素E	mg α-TE	0.32	6.70	碘	μg	4.5	93
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.66	34.3	氯	mg	16	321
维生素B <sub>1</sub>	μg	19	384	硒	μg	0.89	18.3
维生素B <sub>2</sub>	μg	24	490	可选择成分			
维生素B <sub>6</sub>	μg	13.4	277	肌醇	mg	4.5	92
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.057	1.17	牛磺酸	mg	0.9	19
烟酸(烟酰胺)	μg	143	2949	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.8	77.9
叶酸	μg	4.8	98.9	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	102.2
泛酸	μg	120	2482	低聚果糖	mg	113	2328
维生素C	mg	2.9	58.9	1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.19	4.0
生物素	μg	0.68	14.1	甘油三酯			
胆碱	mg	6.0	124	叶黄素	μg	4.9	101.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

对于0~6月龄婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。注：即食状态下，每100mL奶液含婴儿配方羊奶粉13.5克

**温馨提示：**

1、水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当等会引起婴儿的不适。2、喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能引起窒息。3、请勿使用沾水的量匙量取奶粉，防止污染奶粉，影响宝宝健康。4、喂奶用量及次数参照哺喂用量建议表执行，用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。5、冲调后请一次喝完，勿保留喝剩的奶液。6、使用完毕后，应用清水及时清洗奶瓶、奶嘴等用具。

**哺喂用量建议表** (饮用时请参照哺喂用量建议表，使用专用量匙。)

年龄	温开水用量	奶粉用量(量匙数)	每日哺喂次数
0~2周	60mL	2	7~8
2周~4周	90mL	3	6~7
1~2月	120mL	4	5~6
2~4月	150mL	5	5~6
4~6月	180mL	6	5~6

每平匙奶粉约4.5克

YUMSENSE  
怡美生

怡美生



1段

注册号：国食注字YP20240110

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

净含量：100克/罐

## 配料表：

脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、乳铁蛋白、叶黄素、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、柠檬酸钠、磷酸二钙、硬脂钙、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K<sub>1</sub>(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸。

## 储存方法：

- 1、本品宜贮藏于阴凉干燥处。
- 2、请勿阳光暴晒或放置于高温、潮湿环境中，请勿放置于冰箱内，防止产品变质。
- 3、每次食用后请务必盖紧塑料盖，以防止吸潮或进入异物。
- 4、开罐后，请于四周内食用完毕。

全脂羊乳粉原产国：新西兰 New Zealand

执行标准：GB 10765-2021

产品状态：粉状

产品属性：乳基婴儿配方食品

保质期：24个月

产地：陕西·西安

生产地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾永路中段

公司名称：陕西恒生乳业有限公司

联系方式：029-36388888

咨询服务电话：400-9951882

网 址：www.sxhsry.com

食品生产许可证编号：SC20161042301016

生产日期、保质期至：见罐底喷码

## 冲调方法：

冲调前洗净双手。将奶瓶、奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具清洗干净。

将干净的奶瓶奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具放入沸水中煮沸10分钟左右。

冲调用开水煮沸后冷却至40℃左右，在奶瓶中加入需要量温开水。

用已消毒的量匙(晾干)量取准确份量(平匙)的婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中。

盖严奶瓶，两手来回搓动奶瓶至奶粉充分溶解。

滴几滴在手腕内侧检测温度是否适宜后，即可哺喂。

保持环境清洁  
请勿乱抛空罐



6 922991 319708

# 附件 2：陕西恒生乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

## 标签 12

**食用本产品时,须配合添加辅助食品。**

**温馨提示:**

- 1、水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当等都会引起较大婴儿的不适。
- 2、哺喂时应抱着较大婴儿,如疏忽照顾可能引起窒息。
- 3、请勿使用沾水的量匙量取奶粉,防止污染奶粉,影响宝宝健康。
- 4、喂哺用量及次数参照喂哺用量建议表执行,用少于或多余指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
- 5、冲调后请一次饮完,勿保留喝剩的奶液。
- 6、使用完毕后,应用清水及时清洗奶瓶、奶嘴等用具。

**哺喂用量建议表**  
(使用时请参考喂哺用量建议表,使用专用量匙。)

年龄	温开水用量	奶粉用量(量匙数)	每日哺喂次数
6-9月	180mL	6	4-5
9-12月	210mL	7	3-4

每平匙奶粉约4.5克

注:以上的哺喂用量建议表是根据平均的需求量而定,您可依据宝宝的发育状况及营养师或医生的意见而酌情增减。

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100克
能量	kJ	100	1996
蛋白质	g	0.58	11.6
脂肪	g	1.05	20.9
亚油酸	g	0.14	2.85
α-亚麻酸	mg	15	306
碳水化合物	g	3.0	59.2
<b>维生素</b>			
维生素A	μgRE	20	391
维生素D	μg	0.60	12.00
维生素E	mgα-TE	0.31	6.21
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.72	34.4
维生素B <sub>1</sub>	μg	18	363
维生素B <sub>2</sub>	μg	24	473
维生素B <sub>6</sub>	μg	15.4	307
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.063	1.25
烟酸(烟酰胺)	μg	151	3007
叶酸	μg	4.6	91.9
泛酸	μg	129	2579
维生素C	mg	3.0	58.9
生物素	μg	0.74	14.7
胆碱	mg	6.0	120
<b>矿物质</b>			
钠	mg	5	105
钾	mg	20	398
铜	μg	13.2	264
镁	mg	1.5	29.9
铁	mg	0.29	5.76
锌	mg	0.18	3.64
锰	μg	4.04	80.6
钙	mg	21	410
磷	mg	13	259
碘	μg	5.1	102
硒	μg	19	379
钴	μg	0.64	12.8
<b>可选择成分</b>			
肌醇	mg	4.5	90
牛磺酸	mg	1.0	20
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	77.9
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.2	104.3
低聚果糖	mg	11.7	232.8
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0
叶黄素	μg	9.5	190.4

注:即食状态下,每100mL奶液含较大婴儿配方羊奶粉13.5克



怡美生



2段

注册号:国食注字YP20240111

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

净含量: 800克/罐

**配料表:**

脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、乳铁、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、乳铁蛋白、叶黄素、硫酸亚铁、硫酸钾、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钙、维生素A(β-胡萝卜素)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K<sub>1</sub>(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸。

**冲调方法:**

- 1 冲调前洗净双手,将奶瓶、奶嘴、量匙和奶盖等用具清洗干净
- 2 将干净的奶瓶、量匙和奶盖等用具放入沸水中煮沸10分钟左右
- 3 冲调用水煮沸后冷却至40°C左右,在奶瓶中加入需要量温开水
- 4 用已消毒的量匙(略干)量取准确份量(平匙)的较大婴儿配方羊奶粉加入奶瓶中
- 5 盖严奶瓶,两手来回搓动奶瓶至奶粉充分溶解
- 6 滴几滴在手腕内侧检测温度是否适宜后,即可哺喂

**储存方法:**

- 1、本品宜贮藏于阴凉干燥处。
- 2、请勿阳光暴晒或放置于高温、潮湿环境中,请勿放置于冰箱内,防止产品变质。
- 3、每次食用后请务必盖紧塑料盖,以防止吸潮或进入异物。
- 4、开罐后,请于四周内食用完毕。

全脂羊乳粉原产国: 新西兰 New Zealand  
执行标准: GB 10766-2021  
产品状态: 粉状  
产品属性: 乳基较大婴儿配方食品  
保质期: 24个月  
产地: 陕西·西安  
生产地址: 陕西省西咸新区沣河新城永乐镇泾永路中段  
公司名称: 陕西恒生乳业有限公司  
联系方式: 029-36388888  
咨询服务电话: 400-9951882  
网 址: www.sxhsry.com  
食品生产许可证编号: SC20161042301016  
生产日期、保质期至: 见罐底喷码

保持环境清洁 请勿乱扔空罐

6 922991 332110

# 附件 2：陕西恒生乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 13

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

**温馨提示：**

- 1、水和奶瓶未经过消毒或奶液浓度不当等都会引起幼儿的不适。
- 2、哺喂时应抱着幼儿，如疏忽照顾可能引起窒息。
- 3、请勿使用沾水的量匙量取奶粉，防止污染奶粉，影响宝宝健康。
- 4、喂哺用量及次数参照喂哺用量建议表执行，用少于或多余指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
- 5、冲调后请一次喝完，勿保留喝剩的奶液。
- 6、使用完毕后，应用清水及时清洗奶瓶、奶嘴等用具。

**哺喂用量建议表**  
(饮用时请参照喂哺用量建议表，使用专用量匙。)

年龄	温开水用量	奶粉用量(量匙数)	每日哺喂次数
12-36月	240ml	8	3-4

每平匙奶粉约4.5克

注：以上的哺喂用量建议表是根据平均的需求量而定，您可根据宝宝的发育状况及营养师或医生的指导下酌情增减。

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100克
能量	kJ	100	2045
蛋白质	g	0.64	13.0
脂肪	g	1.17	23.9
亚油酸	g	0.14	2.83
α-亚油酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.7	54.2
<b>维生素</b>			
维生素A	μgRE	20	410
维生素D	μg	0.60	12.22
维生素E	mgα-TE	0.30	6.22
维生素K	μg	1.68	34.3
维生素B <sub>1</sub>	μg	18	374
维生素B <sub>2</sub>	μg	24	484
维生素B <sub>6</sub>	μg	15.2	311
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.076	1.56
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3068
叶酸	μg	4.5	92.7
泛酸	μg	132	2701
维生素C	mg	2.9	58.9
生物素	μg	0.75	15.3
<b>矿物质</b>			
钠	mg	6	116
钾	mg	23	465
铜	μg	14.2	290
镁	mg	2.0	41.0
铁	mg	0.28	5.76
锌	mg	0.17	3.54
钙	mg	21	433
磷	mg	15	313
碘	μg	5.7	116
硒	μg	25	516
<b>可选择成分</b>			
糖	μg	0.63	12.8
胆碱	mg	6.0	122
锰	μg	4.02	82.3
肌醇	mg	4.1	84
牛磺酸	mg	1.0	20
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.8	77.9
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.2	106.8
低聚果糖	mg	11.4	2328
1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	g	0.15	3.0
叶黄素	μg	9.3	190.4
乳铁蛋白	mg	1.5	30.0

注：即食状态下，每100mL奶液含幼儿配方羊奶粉13.5克

YUMSENSE  
怡美生

怡美生



3段

注册号：国食注字YP20240112

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄，3段)

净含量：800克/罐

**配料表：**

全脂羊乳粉、脱盐羊乳清粉、1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯、食用植物油调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、乳铁蛋白、叶黄素、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钙、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K<sub>1</sub>(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸。

**冲调方法：**

- 1 冲调前洗净双手，将奶瓶、奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具放入沸水中煮沸10分钟左右
- 2 将干净的奶瓶奶嘴、量匙和奶瓶盖等用具放入沸水中煮沸10分钟左右
- 3 冲调用水煮沸后冷却至40°C左右，在奶瓶中加入需要量温开水
- 4 用已消毒的量匙(平匙)准确称量(平匙)的幼儿配方羊奶粉加入奶瓶中
- 5 盖紧奶瓶，两手来回滚动奶瓶至奶粉充分溶解
- 6 滴几滴在手腕内侧检测温度是否适宜后，即可哺喂

**保持环境清洁 请勿乱丢垃圾**

**配料表：**

- 1、本品宜贮藏于阴凉干燥处。
- 2、请勿阳光暴晒或放置于高温、潮湿环境中，请勿放置于冰箱内，防止产品变质。
- 3、每次食用后请务必盖紧塑料盖，以防止吸潮或进入异物。
- 4、开罐后，请于四周内食用完毕。

全脂羊乳粉原产国：新西兰 New Zealand  
执行标准：GB 10767-2021  
产品状态：粉状  
保质期：24个月  
产地：陕西·西安  
生产地址：陕西省西咸新区沣河新城永乐镇泾永路中段  
公司名称：陕西恒生乳业有限公司  
联系方式：029-36388888  
咨询服务电话：400-9951882  
网址：www.sxhsry.com  
食品生产许可证编号：SC20161042301016  
生产日期、保质期至：见罐底喷码

6 9 2 2 9 9 1 3 3 2 1 2 7