

附件 2：陕西秦龙天润乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签1

258.1x119.5mm 2025110710

258.1mm



标签2

307.4mm

307.4x139.5mm 2025110710



140mm

标签3

393.8mm

2025110716

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2072
蛋白质	克	0.56	11.6
脂肪	克	1.23	25.5
亚油酸	克	0.16	3.39
α-亚麻酸	毫克	15	307
碳水化合物	克	2.6	53.8
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	18.6	385
维生素D	微克	0.59	12.2
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.38	7.96
维生素K ₁	微克	2.31	47.8
维生素B ₁	微克	27	553
维生素B ₂	微克	37	773
维生素B ₆	微克	16.2	336
维生素B ₁₂	微克	0.077	1.6
烟酰胺(烟酰胺)	微克	3263	
叶酸	微克	4.4	91.7
泛酸	微克	152	3156
维生素C	毫克	5.0	103.6
维生素	微克	0.75	15.5
胆碱	毫克	6.7	139
矿物质			
钠	毫克	7.4	153
钾	毫克	20.3	420
铜	微克	14.3	297
镁	毫克	1.7	35.4
铁	毫克	0.16	3.32
锌	毫克	0.16	3.36
锰	微克	4.53	93.9
钙	毫克	16.1	334
磷	毫克	10.7	222
碘	微克	4.3	88.6
氯	毫克	17	354
硒	微克	0.82	17
可选择成分			
二十二碳六烯酸(DHA)	毫克	4.3	89.3
二十碳四烯酸(AA/ARA)	毫克	4.8	100
低聚半乳糖	毫克	57.0	1181
低聚果糖	毫克	45.8	950
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	克	0.15	3.13
叶黄素	微克	3.6	74.1
乳铁蛋白	毫克	1.60	33.1

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、动物双歧杆菌亚种Bb-12、乳铁蛋白、叶黄素、维生素A(脂溶性黄质)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物叶绿醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氯钴胺)、烟酰胺(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、钠(柠檬酸钠)、钾(氯化钾)、磷(硫酸钾)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙)、磷酸三钙、碘(碘酸钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

重要声明

对于0-6月龄的婴儿最理想的是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

本品贮于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。每次食用后,请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。

相关信息

产品类别: 婴儿配方羊奶粉
产品属性: 乳基· 粉状
产品标准代号: GB 10765-2021
生产日期、批号: 见底部喷码
保质期: 24个月
食品生产许可证编号: SC10661011408008
生产商: 陕西省秦龙天润乳业有限公司
地址: 陕西省西安市阎良区人民东路东延线
产地: 陕西· 西安
咨询电话: 400-881-9877
曾用名: 秦龙

秦龙 QINLONG

纽维康

1 段

国食注字YP20240053 净含量: 700克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量 平勺	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
0~2周	2	60	7~8
2~4周	3	90	6~7
1~2月	4	120	5~6
2~4月	5	150	5~6
4~6月	6	180	5~6

① 调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用少于或多于指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。
 ② 请使用罐内专业量勺。
 ③ 没有煮沸的水,没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
 ④ 冲奶时请按照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。
 ⑤ 本喂哺用量建议表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的建议酌情增减。
 ⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

冲调方法

① 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。
 ② 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C。
 ③ 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
 ④ 参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。
 ⑤ 将量取的奶粉倒入奶瓶中,盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。
 ⑥ 在为宝宝喂哺奶液前,请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温,温度适宜即可喂哺。

6 973464 882779

175mm

标签4

393.8mm

2025090616



175mm

标签5

258.1x119.5mm 2025110710

258.1mm

120mm

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2016
蛋白质	克	0.64	12.9
脂肪	克	1.15	23.2
亚油酸	克	0.20	4.06
α-亚麻酸	毫克	17	348
碳水化合物	克	2.7	53.9
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	21.6	435
维生素D	微克	0.61	12.2
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.41	8.24
维生素K ₁	微克	2.37	47.8
维生素B ₁	微克	27	549
维生素B ₂	微克	38	763
维生素B ₆	微克	17.2	347
维生素B ₁₂	微克	0.079	1.6
烟酸(烟酰胺)	毫克	162	3264
叶酸	微克	4.2	85.4
泛酸	毫克	160	3228
维生素C	毫克	5.1	103.6
生物素	微克	0.79	16.0
胆碱	毫克	6.7	136
矿物质			
钠	毫克	5.6	112
钾	毫克	24.7	497
铜	微克	12.9	260
镁	毫克	1.7	34.3
铁	毫克	0.27	5.42
锌	毫克	0.16	3.27
锰	微克	5.01	101
钙	毫克	19.1	386
磷	毫克	12.8	259
碘	微克	4.3	87.3
氯	毫克	21	433
硒	微克	0.74	15
可选择成分			
DHA	毫克	4.4	89.3
AA/ARA	毫克	5.1	103
低聚半乳糖	毫克	87.9	1772
低聚果糖	毫克	47.1	950
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	克	0.13	2.59
叶黄素	微克	10.1	204
乳铁蛋白	毫克	0.99	19.9

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、乳糖、食用植物油和油(大豆油、玉米油)、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十碳六烯酸油脂(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、叶黄素、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物中苯醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酰辅酶A)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、钾(氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(碳酸钙)、磷酸三钙)、碘(磷酸三钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

重要声明

须配合添加辅助食品。

贮存条件

本品贮于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。每次食用后,请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。

相关信息

产品类别:较大婴儿配方羊奶粉
产品属性:乳基·粉状
产品标准代号:GB 10766-2021
食品生产许可证编号:SC10661011408008
生产日期、批号:见底部喷码
保质期:24个月
产地:陕西·西安
启用名:秦龙
生产商:陕西秦龙乳业有限公司
地址:陕西省西安市阎良区人民东路东延线
咨询电话:400-881-9877

喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量 平勺	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
6~8月	6	180	4~5
8~12月	7	210	3~4

① 调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用少于或多于指定份量的奶粉,会令较大婴儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。
② 请使用罐内专业量勺。
③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
④ 冲奶时请按照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。
⑤ 本喂哺用量建议表是参照正常发育较大婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
⑥ 喂奶时多加照顾,以防宝宝呛奶。

冲调方法

- 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮5分钟,进行消毒。
- 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C。
- 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
- 参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。
- 将量取的奶粉倒入奶瓶中,盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。
- 在给宝宝喂哺奶液前,请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温,温度适宜即可喂哺。

2段

国食注字YP20240054 净含量:180克

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

6 973464 882663

标签6

307.4mm

307.4x139.5mm 2025110710

140mm



标签7

393.8mm

2025110716

175mm



标签8

393.8mm

2025090616



175mm

标签9

258.1x119.5mm 2025110710

258.1mm

120mm

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2029
蛋白质	克	0.76	15.5
脂肪	克	1.20	24.3
亚油酸	克	0.17	3.44
α-亚麻酸	毫克	14	293
碳水化合物	克	2.4	49.7
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	21.8	443
维生素D	微克	0.60	12.2
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.40	8.07
维生素K ₁	微克	2.36	47.8
维生素B ₁	微克	28	565
维生素B ₂	微克	33	670
维生素B ₆	微克	17.6	357
维生素B ₁₂	微克	0.099	2.0
烟酸(烟酰胺)	微克	164	3331
叶酸	微克	4.3	86.3
泛酸	微克	189	3829
维生素C	毫克	3.8	76.4
生物素	微克	0.91	18.5
矿物质			
钠	毫克	8.2	166
钾	毫克	29.3	594
铜	微克	14.3	291
镁	毫克	2.2	43.9
铁	毫克	0.30	6.14
锌	毫克	0.14	2.87
钙	毫克	22.4	454
磷	毫克	15.1	307
碘	微克	3.5	70.9
氯	毫克	24	483
可选择成分			
硒	微克	0.79	16
胆碱	毫克	6.6	133
锰	微克	4.98	101
二十二碳六烯酸(DHA)	毫克	2.1	42.5
二十碳四烯酸(AA/ARA)	毫克	2.4	49.3
低聚半乳糖	毫克	87.3	1772
低聚果糖	毫克	46.8	950
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	克	0.13	2.55
叶黄素	微克	10.1	204
乳铁蛋白	毫克	0.98	19.9

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸、动物双歧杆菌亚种Bb-12、乳铁蛋白、叶黄素、维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D₃（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K₁（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氯钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱、铜（硫酸铜）、镁（硫酸镁）、铁（硫酸亚铁）、锌（硫酸锌）、钙（碳酸钙）、碘（碘酸钾）、硒（亚硒酸钠）。

贮存条件

本品贮于阴凉、干燥处，请勿置于冰箱内。每次食用后，请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。

相关信息

产品类别：幼儿配方羊奶粉
产品属性：乳基，粉状
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC10661011408008
生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
生产日期、批号：见底部喷码
保质期：24个月
产地：陕西·西安
食用名：秦龙
地址：陕西省西安市阎良区人民东路东延线
咨询电话：400-881-9877

喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量 平勺	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
12~24月	7	210	3~4
24~36月	7	210	2~3

① 调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调，用少于或多于指定份量的奶粉，会令幼儿得不到适当的营养或导致脱水，未经医生建议切勿改变奶粉的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。
② 请使用罐内专业量勺。
③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
④ 冲奶时请按照喂哺用量建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
⑤ 本喂哺用量建议表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见酌情增减。
⑥ 喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。

冲调方法

- 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，并在沸水中至少煮5分钟，进行消毒。
- 将饮用水煮沸5分钟后冷却至40°C-45°C。
- 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
- 参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。
- 将量取的奶粉倒入奶瓶中，盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。
- 在给宝宝喂哺奶液前，请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温，温度适宜即可喂哺。

6 973464 882670

标签10

307.4mm

307.4x139.5mm 2025110710

140mm

纽维康®

秦龙 QINLONG

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油）、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸、动物双歧杆菌亚种 Bb-12、乳铁蛋白、叶黄素、维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(d-α-醋酸生育酚)、维生素 K(植物甲萘醌)、维生素 B₁(盐酸硫胺素)、维生素 B₂(核黄素)、维生素 B₆(盐酸吡哆醇)、维生素 B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、铜(硫酸铜)、镁(硫酸镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、钙(碳酸钙)、碘(碘酸钾)、硒(亚硒酸钠)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	千焦	100	2029
蛋白质	克	0.76	15.5
脂肪	克	1.20	24.3
亚油酸	克	0.17	3.44
α-亚麻酸	毫克	14	293
碳水化合物	克	2.4	49.7
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	21.8	443
维生素D	微克	0.60	12.2
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.40	8.07
维生素K ₁	微克	2.36	47.8
维生素B ₁	微克	28	565
维生素B ₂	微克	33	670
维生素B ₆	微克	17.6	357
维生素B ₁₂	微克	0.099	2.0
烟酸(烟酰胺)	微克	164	3331
叶酸	微克	4.3	86.3
泛酸	微克	189	3829
维生素C	毫克	3.8	76.4
生物素	微克	0.91	18.5
矿物质			
钠	毫克	8.2	166
钾	毫克	29.3	594
铜	微克	14.3	291
镁	毫克	2.2	43.9
铁	毫克	0.30	6.14
锌	毫克	0.14	2.87
钙	毫克	22.4	454
磷	毫克	15.1	307
碘	微克	3.5	70.9
氯	毫克	24	483
可选择成分			
硒	微克	0.79	16
胆碱	毫克	6.6	133
锰	微克	4.98	101
二十二碳六烯酸(DHA)	毫克	2.1	42.5
二十碳四烯酸(AA/ARA)	毫克	2.4	49.3
低聚半乳糖	毫克	87.3	1772
低聚果糖	毫克	46.8	950
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	克	0.13	2.55
叶黄素	微克	10.1	204
乳铁蛋白	毫克	0.98	19.9

贮存条件

本品贮于阴凉、干燥处,请勿置于冰箱内。每次食用后,请盖紧罐盖。开罐后请于四周内用完。

相关信息

产品类别：幼儿配方羊奶粉
产品属性：乳基·粉状
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC10661011408008
生产商：陕西秦龙天润乳业有限公司
生产日期/批号：见底部喷码
保质期：24个月
产地：陕西·西安
品牌名：秦龙
地址：陕西省西安市雁塔区人民东路东延线
咨询电话：400-881-9877

国食注字YP20240055 净含量：350克

3段 幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

喂哺用量建议表

年龄	每次奶粉用量 平勺	加温开水(毫升)	每天喂哺次数
12~24月	7	210	3~4
24~36月	7	210	2~3

① 调奶时注意参照喂哺用量建议表中的奶粉量和温开水进行冲调,用少于或多于指定份量的奶粉,会令幼儿得不到适当的营养或导致脱水,未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为 4.5 克。
 ② 请使用罐内专业量勺。
 ③ 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
 ④ 冲奶时请按照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。
 ⑤ 本喂哺用量建议表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况及营养专家或医生的意见而酌情增减。
 ⑥ 喂哺时多加照顾,以防宝宝呛奶。

冲调方法

- 先将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,并在沸水中至少煮 5 分钟,进行消毒。
- 将饮用水煮沸 5 分钟后冷却至 40°C-45°C。
- 将冷却后的饮用水倒入经消毒后的奶瓶中。
- 参照“喂哺用量建议表”使用量勺量取适量的奶粉。
- 将量取的奶粉倒入奶瓶中,盖紧瓶盖后摇匀至奶粉充分溶解。
- 在为宝宝喂哺奶液前,请先将一小滴奶液滴至手背测试奶温,温度适宜即可喂哺。

6 973464 882700

标签11

393.8mm

2025110716



175mm

标签12

393.8mm

2025090616

