

附件 2：西安百跃羊乳集团有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 1



对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲调方法



- ① 冲调前请洗手；
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
- ③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40°C-50°C；
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；
- ⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压平；
- ⑥ 盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用奶杯冲调，可用搅拌法搅匀。待奶温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

婴儿月龄	0~2周	2周~1月	1~2月	2~3月	3~4月	4~6月
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平匙)	2	3	4	5	6	7
每日喂哺次数(次)	8	6-7	6	6	5-6	5

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放在阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

每次请只准备一次的奶量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
喂哺时应多加照顾以预防婴儿呛奶或其他不适。

全国服务热线
NATIONAL SERVICE HOTLINE
400-029-6612



跃小羊®
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)



国食注字YP20220153

1段

净含量:75克

营养成分表		
项目	单位	每100kJ 每100g
能量	kJ	100 2067
蛋白质	g	0.58 12.0
脂肪	g	1.21 25.0
亚油酸	g	0.09 1.90
α-亚麻酸	mg	15 320
碳水化合物	g	2.6 53.50
维生素		
维生素A	μg RE	20 420
维生素D	μg	0.58 12.0
维生素E	mg α-TE	0.24 5.00
维生素K ₁	μg	1.69 35.0
维生素B ₁	μg	29 600
维生素B ₂	μg	48 1000
维生素B ₆	μg	14.5 300
维生素B ₁₂	μg	0.058 1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	145 3000
叶酸	μg	4.8 100
泛酸	μg	135 2800
维生素C	mg	4.8 100.0
生物素	μg	0.73 15.0
胆碱	mg	7.3 150
矿物质		
钠	mg	8 160
钾	mg	18 370
铜	μg	16.9 350
镁	mg	1.5 32.0
铁	mg	0.19 4.00
锌	mg	0.17 3.50
锰	μg	2.42 50.0
钙	mg	15 320
磷	mg	10 210
碘	μg	4.8 100
氯	mg	15 315
硒	μg	0.87 18.0
可选择成分		
肌醇	mg	2.9 60.0
牛磺酸	mg	1.7 35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9 80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6 115
低聚半乳糖	mg	44 900
低聚果糖	mg	126 2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22 4.5

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾；维生素：L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、硫酸硫胺素、氰钴胺；矿物质：碳酸钙、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商：西安百跃羊乳集团有限公司
地址：陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号：SC12961011400840
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
生产日期、保质期至、批号：见罐底喷码
保质期：24个月
电话：029-86823388
销售中心电话：029-68959277
客服中心电话：400-029-6612
网址：www.yuexiaoyang.com



6 931708 017998

标签 2



6-12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

冲泡方法



- ① 冲泡前请洗手;
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;
- ③ 将饮用水煮沸5分钟,冷却至40°C-50°C;
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中;
- ⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中,量取奶粉时请勿刻意压平;
- ⑥ 盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

较大婴儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
6-9月	7	210	4-5
9-12月	8	240	3-4

每一平匙羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。喂哺时应多加照顾,以防较大婴儿呛奶或其他不适。



400-029-6612



跃小羊®

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄,2段)

国食注字YP20230154



净含量:75克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2028
蛋白质	g	0.76	15.5
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚油酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.6	52.20
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	5.00
维生素K ₁	μg	1.73	35.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	17.3	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	123	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
铜	μg	14.8	300
镁	mg	1.7	35.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
锰	μg	2.47	50.0
钙	mg	21	425
磷	mg	12	240
氯	μg	4.9	100
碘	mg	14	280
硒	μg	0.64	13.0
可选择成分			
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	115
低聚半乳糖	mg	35	700
低聚果糖	mg	128	2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号:SC12961011400840
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保质期:24个月
电话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网址:www.yuexiaoyang.com



6 931708 015529

标签 3



冲调方法



- ① 冲调前请洗手;
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;
- ③ 将饮用水煮沸5分钟,冷却至40°C~50°C;
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中;
- ⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中,量取奶粉时请勿刻意压平;
- ⑥ 盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

幼儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
12-24月	8	240	3
24-36月	8	240	2

每一平匙羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

每次请只准备一次的奶量,并及时给幼儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

全国服务热线
NATIONAL SERVICE HOTLINE
400-029-6612

跃小羊® 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)

国食注字YP20230155



3段

净含量:75克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2003
蛋白质	g	0.77	15.5
脂肪	g	1.15	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚油酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.5	50.30
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K ₁	μg	1.65	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	50	1000
维生素B ₆	μg	20.0	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	155	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	140	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
铜	μg	15.5	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	12	250
硫	μg	2.2	45.0
氯	mg	14	280
可选择成分			
硒	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.50	50.0
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚半乳糖	mg	60	1200
低聚果糖	mg	150	3000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、氯化胆碱、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号:SC12961011400840
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号:GB 10767-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保质期:24个月
电话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网址:www.vuexiaoyang.com



6 931708 018001

标签 4



对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲泡方法



- ① 冲泡前请洗手；
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
- ③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40°C-50°C；
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；
- ⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压平；
- ⑥ 盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用奶杯冲调，可用搅拌法搅匀。待奶温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请参照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

婴儿月龄	0-2周	2周-1月	1-2月	2-3月	3-4月	4-6月
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平匙)	2	3	4	5	6	7
每日喂哺次数(次)	8	6-7	6	6	5-6	5

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

- 每次请只准备一次的奶量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾以防婴儿呛奶或其他不适。



400-029-6612



跃小羊® 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)

国食注字YYP20230153



净含量:300克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.58	12.0
脂肪	g	1.21	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚麻酸	mg	15	320
碳水化合物	g	2.6	53.50
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.69	35.0
维生素B ₁	μg	29	600
维生素B ₂	μg	48	1000
维生素B ₆	μg	14.5	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	4.8	100
泛酸	μg	135	2800
维生素C	mg	4.8	100.0
生物素	μg	0.73	15.0
胆碱	mg	7.3	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	16.9	350
镁	mg	1.5	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.42	50.0
钙	mg	15	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.8	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	60.0
牛磺酸	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	44	900
低聚果糖	mg	126	2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾；维生素：L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺；矿物质：碳酸钙、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路中段
食品生产许可证编号:SC12961011400840
产品类型及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保质期:24个月
电话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网址:www.yuexiaoyang.com



标签 5



6-12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

冲调方法



- ① 冲调前请洗手;
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;
- ③ 将饮用水煮沸5分钟,冷却至40°C-50°C;
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中;
- ⑤ 用专用量匙将正确的粉量加入到奶瓶中,量取奶粉时请勿刻意压实;
- ⑥ 盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

较大婴儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
6-9月	7	210	4-5
9-12月	8	240	3-4

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

- 每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾,以防较大婴儿呛奶或其他不适。



400-029-6612



跃小羊®

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄,2段)

国食注字YP20230154



净含量:300克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2028
蛋白质	g	0.76	15.5
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.6	52.20
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	5.00
维生素K	μg	17.8	350
维生素B1	μg	30	600
维生素B2	μg	49	1000
维生素B6	μg	17.8	350
维生素B12	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	123	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
钙	μg	14.8	300
镁	mg	1.7	35.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
锰	μg	2.47	50.0
铜	mg	21	425
磷	mg	12	240
碘	μg	4.9	100
硒	mg	14	280
铬	μg	0.64	13.0
可选择成分			
加糖	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	115
低聚半乳糖	mg	35	700
低聚果糖	mg	128	2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号:SC12961011400840
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保质期:24个月
电话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网址:www.yuexiaoyang.com



标签 6



冲泡方法



- ① 冲泡前请洗手;
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;
- ③ 将饮用水煮沸5分钟,冷却至40°C-50°C;
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中;
- ⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中,量取奶粉时请勿刻意压实;
- ⑥ 盖紧奶瓶,然后摇晃,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶粉或不恰当的温度可能引起不适。

幼儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
12-24月	8	240	3
24-36月	8	240	2

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

·每次请只准备一次的奶量,并及时给幼儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。



400-029-6612

跃小羊® 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)

国食注字YP20230155



净含量:300克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2003
蛋白质	g	0.77	15.5
脂肪	g	1.15	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.5	50.30
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K	μg	1.65	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	50	1000
维生素B ₆	μg	20.0	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	155	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	140	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
铜	μg	15.5	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	12	250
碘	μg	2.2	45.0
氯	mg	14	280
可选择成分			
硒	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.50	50.0
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚半乳糖	mg	60	1200
低聚果糖	mg	150	3000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、氯化胆碱、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、D-α-酮酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号:SC12961011400840
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号:GB 10767-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保质期:24个月
电话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网址:www.yuexiaoyang.com



标签 7



对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲泡方法



- ① 冲泡前请洗手；
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
- ③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40°C-50°C；
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；
- ⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压平；
- ⑥ 盖紧奶瓶，然后摇晃，如果用奶杯冲调，可用搅拌法搅匀。待奶温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请参照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

婴儿月龄	0-2周	2周-1月	1-2月	2-3月	3-4月	4-6月
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平匙)	2	3	4	5	6	7
每日喂哺次数(次)	8	6-7	6	6	5-6	5

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

- 每次请只准备一次的奶量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾以防婴儿呛奶或其他不适。



400-029-6612



跃小羊®

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)

国食注字YYP202020153



净含量:400克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.58	12.0
脂肪	g	1.21	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚麻酸	mg	15	320
碳水化合物	g	2.6	53.50
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K	μg	1.69	35.0
维生素B ₁	μg	29	600
维生素B ₂	μg	48	1000
维生素B ₆	μg	14.5	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	4.8	100
泛酸	μg	135	2800
维生素C	mg	4.8	100.0
生物素	μg	0.73	15.0
胆碱	mg	7.3	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	16.9	350
镁	mg	1.5	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.42	50.0
钙	mg	15	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.8	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	60.0
牛磺酸	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	44	900
低聚果糖	mg	126	2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾、维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺；矿物质：碳酸钙、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号:SC12961011400840
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保质期:24个月
电话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网址:www.yuexiaoyang.com



标签 8



6-12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

冲调方法



- ① 冲调前请洗手;
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;
- ③ 将饮用水煮沸5分钟,冷却至40°C-50°C;
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中;
- ⑤ 用专用量匙将正确的粉量加入到奶瓶中,量取奶粉时请勿刻意压实;
- ⑥ 盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

较大婴儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
6-9月	7	210	4-5
9-12月	8	240	3-4

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

- 每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾,以防较大婴儿呛奶或其他不适。



400-029-6612



跃小羊®

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄,2段)

国食注字YP20230154



净含量:400克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2028
蛋白质	g	0.76	15.5
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.6	52.20
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	5.00
维生素K	μg	17.8	350
维生素B1	μg	30	600
维生素B2	μg	49	1000
维生素B6	μg	17.8	350
维生素B12	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	123	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
钙	μg	14.8	300
镁	mg	1.7	35.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	μg	0.15	3.00
锰	μg	2.47	50.0
铜	mg	21	425
磷	mg	12	240
碘	μg	4.9	100
硒	mg	14	280
铬	μg	0.64	13.0
可选择成分			
加糖	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	115
低聚半乳糖	mg	35	700
低聚果糖	mg	128	2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钙、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、硫酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号:SC12961011400840
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保质期:24个月
电话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网址:www.yuexiaoyang.com



6 931708 017974

标签 9



冲泡方法



- ① 冲泡前请洗手;
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;
- ③ 将饮用水煮沸5分钟,冷却至40°C-50°C;
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中;
- ⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中,量取奶粉时请勿刻意压实;
- ⑥ 盖紧奶瓶,然后摇晃,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶粉或不恰当的温度可能引起不适。

幼儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
12-24月	8	240	3
24-36月	8	240	2

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

·每次请只准备一次的奶量,并及时给幼儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。



400-029-6612

跃小羊®
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)

国食注字YP20230155



净含量:400克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2003
蛋白质	g	0.77	15.5
脂肪	g	1.15	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.5	50.30
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K	μg	1.65	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	50	1000
维生素B ₆	μg	20.0	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	155	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	140	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
铜	μg	15.5	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	12	250
碘	μg	2.2	45.0
氯	mg	14	280
可选择成分			
硒	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.50	50.0
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚半乳糖	mg	60	1200
低聚果糖	mg	150	3000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、氯化胆碱、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、D-α-酮酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号:SC12961011400840
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号:GB 10767-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保质期:24个月
电话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网址:www.yuexiaoyang.com



标签 10



对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲调方法



- ① 冲调前请洗手；
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
- ③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40°C-50°C；
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；
- ⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入至奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压实；
- ⑥ 盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用奶杯冲调，可用搅拌法搅匀。待奶温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

婴儿月龄	0-2周	2周-1月	1-2月	2-3月	3-4月	4-6月
避开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶分量(平匙)	2	3	4	5	6	7
每日喂哺次数(次)	8	6-7	6	6	5-6	5

每一平匙羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

- 每次请只准备一次的奶量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应多加照顾以防婴儿呛奶或其他不适。



400-029-6612



跃小羊®

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

国食注字YP20230153



净含量:700克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.58	12.0
脂肪	g	1.21	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚油酸	mg	15	320
碳水化合物	g	2.6	53.50
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.69	35.0
维生素B ₁	μg	29	600
维生素B ₂	μg	48	1000
维生素B ₆	μg	14.5	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	4.8	100
泛酸	μg	135	2800
维生素C	mg	4.8	100.0
生物素	μg	0.73	15.0
胆碱	mg	7.3	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	16.9	350
钙	mg	1.5	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.42	50.0
钙	mg	15	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.8	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	60.0
牛磺酸	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	44	900
低聚果糖	mg	126	2600
1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	g	0.22	4.5

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾；维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-磷酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺；矿物质：碳酸钙、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号:SC12961011400840
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码
保质期:24个月
电话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网址:www.yuexiaoyang.com





6-12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

冲调方法



- ① 冲调前请洗手;
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;
- ③ 将饮用水煮沸5分钟,冷却至40°C-50°C;
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中;
- ⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中,量取奶粉时请勿刻意压实;
- ⑥ 盖紧奶瓶,然后摇晃,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

较大婴儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
6-9月	7	210	4-5
9-12月	8	240	3-4

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月內食用完。

温馨提示

- 每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾,以防较大婴儿呛奶或其他不适。



400-029-6612



跃小羊®
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)



国食注字YP20230154



净含量:700克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2028
蛋白质	g	0.76	15.5
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.6	52.20
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	5.00
维生素K	μg	1.73	35.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	17.3	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	123	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
铜	μg	14.8	300
钙	mg	1.7	35.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
锰	μg	2.47	50.0
磷	mg	21	425
碘	mg	12	240
硒	μg	4.9	100
氯	mg	14	280
硫	μg	0.64	13.0
可选择成分			
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	115
低聚半乳糖	mg	35	700
低聚果糖	mg	128	2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-脂酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植酸甲奈醒、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北侧
食品生产许可证编号:SC12961011400940
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保质期:24个月
电话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网址:www.yuexiaoyang.com



6 931708 017912

标签 12



冲调方法



- ① 冲调前请洗手;
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;
- ③ 将饮用水煮沸5分钟,冷却至40°C-50°C;
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中;
- ⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中,量取奶粉时请勿刻意压实;
- ⑥ 盖紧奶瓶,然后摇晃;如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

幼儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
12-24月	8	240	3
24-36月	8	240	2

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放在阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请置于冰箱内存放。开封后请在一个月食用完。

温馨提示

·每次请只准备一次的奶量,并及时给幼儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。



400-029-6612

跃小羊® 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段)



国食注字YP20220155



净含量:700克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2003
蛋白质	g	0.77	15.5
脂肪	g	1.15	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.5	50.30
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K ₁	μg	1.65	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	50	1000
维生素B ₆	μg	20.0	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	155	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	140	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钙	mg	6	125
铜	mg	23	465
钾	μg	15.5	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
钙	mg	22	440
磷	mg	12	250
钠	μg	2.2	45.0
氯	mg	14	280
可选择成分			
硒	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.50	50.0
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚半乳糖	mg	60	1200
低聚果糖	mg	150	3000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、氯化胆碱、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、D-泛酸、维生素K₁、烟酰胺、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、硫酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号:SC12961011400840
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号:GB 10767-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保质期:24个月
电话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网址:www.yuexiaoyang.com



6 931708 017929

标签 13



对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲调方法



- ① 冲调前请洗手；
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
- ③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40°C-50°C；
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；
- ⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入至奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压实；
- ⑥ 盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用奶杯冲调，可用搅拌均匀。待奶温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

婴儿月龄	0-2周	2周-1月	1-2月	2-3月	3-4月	4-6月
避开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶分量(平匙)	2	3	4	5	6	7
每日喂哺次数(次)	8	6-7	6	6	5-6	5

每一平匙羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

- 每次请只准备一次的奶量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应多加照顾以防婴儿呛奶或其他不适。



400-029-6612



跃小羊®

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

国食注字YP20230153



净含量:750克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.58	12.0
脂肪	g	1.21	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚油酸	mg	15	320
碳水化合物	g	2.6	53.50
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.69	35.0
维生素B ₁	μg	29	600
维生素B ₂	μg	48	1000
维生素B ₆	μg	14.5	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	4.8	100
泛酸	μg	135	2800
维生素C	mg	4.8	100.0
生物素	μg	0.73	15.0
胆碱	mg	7.3	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	16.9	350
钙	mg	1.5	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.42	50.0
钙	mg	15	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.8	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	60.0
牛磺酸	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	44	900
低聚果糖	mg	126	2600
1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	g	0.22	4.5

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾；维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-磷酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺；矿物质：碳酸钙、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号:SC12961011400840
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保质期:24个月
电话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网址:www.yuexiaoyang.com





6-12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

冲调方法



- ① 冲调前请洗手;
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;
- ③ 将饮用水煮沸5分钟,冷却至40°C-50°C;
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中;
- ⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中,量取奶粉时请勿刻意压平;
- ⑥ 盖紧奶瓶,然后摇匀,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

较大婴儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
6-9月	7	210	4-5
9-12月	8	240	3-4

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

- 每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾,以防较大婴儿呛奶或其他不适。



400-029-6612



跃小羊®
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)



国食注字YP20230154



净含量:750克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2028
蛋白质	g	0.76	15.5
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.6	52.20
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	5.00
维生素K	μg	1.73	35.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	17.3	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	123	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
铜	μg	14.8	300
钙	mg	1.7	35.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
锰	μg	2.47	50.0
钴	mg	21	425
碘	mg	12	240
硒	μg	4.9	100
氯	mg	14	280
硫	μg	0.64	13.0
可选择成分			
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	115
低聚半乳糖	mg	35	700
低聚果糖	mg	128	2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-脂酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植酸甲奈醒、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号:SC12961011400940
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保质期:24个月
电话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网址:www.yuexiaoyang.com



6 931708 017943

标签 16



对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲调方法



- ① 冲调前请洗手；
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净，使用前沸水煮5分钟消毒，然后盖好直至使用时；
- ③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至40°C-50°C；
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中；
- ⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入至奶瓶中，量取奶粉时请勿刻意压实；
- ⑥ 盖紧奶瓶，然后摇匀，如果用奶杯冲调，可用搅拌法搅匀。待奶温度适中（将奶滴在手腕内侧，确定已达到宝宝可以饮用的温度），方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

婴儿月龄	0-2周	2周-1月	1-2月	2-3月	3-4月	4-6月
避开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶分量(平匙)	2	3	4	5	6	7
每日喂哺次数(次)	8	6-7	6	6	5-6	5

每一平匙羊奶粉约为4.5克。

每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处，开封后请密封存放，避免强光直射，请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

- 每次请只准备一次的奶量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应多加照顾以防婴儿呛奶或其他不适。



400-029-6612



跃小羊® 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)



国食注字YP20230153



净含量:800克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.58	12.0
脂肪	g	1.21	25.0
亚油酸	g	0.09	1.90
α-亚油酸	mg	15	320
碳水化合物	g	2.6	53.50
维生素			
维生素A	μg RE	20	420
维生素D	μg	0.58	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	5.00
维生素K ₁	μg	1.69	35.0
维生素B ₁	μg	29	600
维生素B ₂	μg	48	1000
维生素B ₆	μg	14.5	300
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	4.8	100
泛酸	μg	135	2800
维生素C	mg	4.8	100.0
生物素	μg	0.73	15.0
胆碱	mg	7.3	150
矿物质			
钠	mg	8	160
钾	mg	18	370
铜	μg	16.9	350
钙	mg	1.5	32.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.17	3.50
锰	μg	2.42	50.0
钙	mg	15	320
磷	mg	10	210
碘	μg	4.8	100
氯	mg	15	315
硒	μg	0.87	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	60.0
牛磺酸	mg	1.7	35.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.6	115
低聚半乳糖	mg	44	900
低聚果糖	mg	126	2600
1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	g	0.22	4.5

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾；维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-磷酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺；矿物质：碳酸钙、柠檬酸钠、氯化钠、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号:SC12961011400840
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保质期:24个月
电话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网址:www.yuexiaoyang.com





6-12月龄较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

冲调方法



- ① 冲调前请洗手;
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;
- ③ 将饮用水煮沸5分钟,冷却至40°C-50°C;
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中;
- ⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中,量取奶粉时请勿刻意压平;
- ⑥ 盖紧奶瓶,然后摇晃,如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

较大婴儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
6-9月	7	210	4-5
9-12月	8	240	3-4

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请勿置于冰箱内存放。开封后请在一个月内食用完。

温馨提示

- 每次请只准备一次的奶量,并及时给较大婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应多加照顾,以防较大婴儿呛奶或其他不适。



400-029-6612



跃小羊®
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)



国食注字YP20230154



净含量:800克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2028
蛋白质	g	0.76	15.5
脂肪	g	1.13	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.6	52.20
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	5.00
维生素K	μg	1.73	35.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	17.3	350
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.2
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	123	2500
维生素C	mg	4.9	100.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	6.4	130
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	460
铜	μg	14.8	300
钙	mg	1.7	35.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
锰	μg	2.47	50.0
磷	mg	21	425
碘	mg	12	240
硒	μg	4.9	100
氯	mg	14	280
硫	μg	0.64	13.0
可选择成分			
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	115
低聚半乳糖	mg	35	700
低聚果糖	mg	128	2600
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、dl-α-脂酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、植酸甲素、叶酸、D-生物素、盐酸硫胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号:SC12961011400940
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保质期:24个月
电话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网址:www.yuexiaoyang.com



6 931708 014812



冲调方法



- ① 冲调前请洗手;
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖清洗干净,使用前沸水煮5分钟消毒,然后盖好直至使用时;
- ③ 将饮用水煮沸5分钟,冷却至40°C-50°C;
- ④ 参照喂哺用量建议表取所需冲调水量加入奶瓶中;
- ⑤ 用专用量匙将正确的奶粉分量加入到奶瓶中,量取奶粉时请勿刻意压实;
- ⑥ 盖紧奶瓶,然后摇晃;如果用奶杯冲调,可用搅拌法搅匀。待奶温度适中(将奶滴在手腕内侧,确定已达到宝宝可以饮用的温度),方可喂哺。

喂哺用量建议表

喂哺用量建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度可能引起不适。

幼儿月龄	奶粉量(平匙)	温开水量(毫升)	每日喂哺次数(次)
12-24月	8	240	3
24-36月	8	240	2

每一平匙羊奶粉约为4.5克。
每100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水。

贮藏方法

本品应存放在阴凉干燥处,开封后请密封存放,避免强光直射,请置于冰箱内存放。开封后请在一个月食用完。

温馨提示

·每次请只准备一次的奶量,并及时给幼儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。



400-029-6612

跃小羊®
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)



国食注字YP20230155



净含量:800克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2003
蛋白质	g	0.77	15.5
脂肪	g	1.15	23.0
亚油酸	g	0.09	1.80
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	2.5	50.30
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K ₁	μg	1.65	33.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	50	1000
维生素B ₆	μg	20.0	400
维生素B ₁₂	μg	0.065	1.3
烟酸(烟酰胺)	μg	155	3100
叶酸	μg	4.0	80.0
泛酸	μg	140	2800
维生素C	mg	5.0	100.0
生物素	μg	0.65	13.0
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	23	465
钙	μg	15.5	310
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.31	6.30
锌	mg	0.15	3.00
铜	mg	22	440
磷	mg	12	250
碘	μg	2.2	45.0
氯	mg	14	280
可选择成分			
硒	μg	0.65	13.0
胆碱	mg	6.5	130
锰	μg	2.50	50.0
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.0	60.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.0
低聚半乳糖	mg	60	1200
低聚果糖	mg	150	3000
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、氯化胆碱、牛磺酸、肌醇、磷脂、氢氧化钾;维生素:L-抗坏血酸钠、D-泛酸、维生素K₁、烟酰胺、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸、植物甲萘醌、叶酸、D-生物素、硫酸胺素、核黄素、氰钴胺;矿物质:碳酸钙、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

产品信息

生产商:西安百跃羊乳集团有限公司
地址:陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段
食品生产许可证编号:SC12961011400840
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号:GB 10767-2021
生产日期、保质期至、批号:见罐底喷码区
保质期:24个月
电话:029-86823388
销售中心电话:029-68959277
客服中心电话:400-029-6612
网址:www.yuexiaoyang.com



标签 19 (盖贴):

跃小羊®系列:
75g、300g、400g、700g、
750g、800g 所有包装通用

