附件 2：陕西红星美羚乳业股份有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 1



标签 2


食用量建议表
婴儿月龄 0-1周 1-2周 2周-1个月 1-2个月 3-4个月 4-6个月
婴儿体重(千克) 约3 ≤3.5 3-4.5 4-5.5 5-7 6-7.5
温开水量(毫升) 60 90 120 150 180 210
奶粉量(平勺) 2 3 4 5 6 7
每天食用(次) 7-8 6-7 5-6 5-6 4-5 4-5
注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 -2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂 (发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种 Bi-07、鼠李糖乳酪杆菌 HN001、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K1(植物甲萘醌)、维生素 B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素 B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。
致敏物质:本产品含有坚果、乳成分
企业信息
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10765-2021
产品属性及类别:乳基粉状婴儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月
全国客服热线4008-168-698
清洁环境 爱护自然
6 920486 048256
食用方法
5min
1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。
40℃-50℃
2.加入温开水:参照"食用量建议表",将烧开放凉到40℃~50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。
羊奶粉
3.加入适量奶粉:参照"食用量建议表",加入所需奶粉数量。
4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。
贮存条件
开罐前 ①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。②请在保质期前食用完该产品。
开罐后 ①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。②建议在一个月内将本产品食用完。
爱心提示
①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
特别提示:
对于 0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
美羚 MEILING
国食注字 YP20170618
德瑞兰帝
净含量:400克
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)
1段
生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区
营养成分表
项目 单位 每100kJ 每100g
能量 kJ 100 2105
蛋白质 g 0.56 11.70
脂肪 g 1.24 26.20
亚油酸 g 0.17 3.60
α-亚麻酸 mg 16 330
碳水化合物 g 2.6 53.8
维生素
维生素A μg RE 19 400
维生素D μg 0.60 12.60
维生素E mg α-TE 0.31 6.50
维生素K1 μg 1.80 37.80
维生素B1 μg 22 460
维生素B2 μg 31 646
维生素B6 μg 14.9 314.0
维生素B12 μg 0.095 2.000
烟酸(烟酰胺) μg 138 2900
叶酸 μg 3.8 80.0
泛酸 μg 152 3200
维生素C mg 4.0 85.0
生物素 μg 0.67 14.00
胆碱 mg 6.0 127.0
矿物质
钠 mg 9 185
钾 mg 23 482
铜 μg 18.0 378.0
镁 mg 2.0 42.0
铁 mg 0.21 4.40
锌 mg 0.20 4.20
锰 μg 2.85 60.00
钙 mg 16 340
磷 mg 11 222
碘 μg 4.5 95.0
氯 mg 18 376
硒 μg 0.90 19.00
可选择成分
肌醇 mg 1.9 41.0
左旋肉碱 mg 0.6 13.5
二十二碳六烯酸(DHA) mg 4.5 95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA) mg 7.3 153.0
低聚半乳糖 g 0.11 2.40
多聚果糖 g 0.02 0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 g 0.2 4.0
叶黄素 μg 3.8 80.0
注:即食状态下,每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

标签 3


食用量建议表
幼儿月龄 12-36个月
奶粉量(平勺) 8
温开水量(毫升) 240
每天食用(次) 3
注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 -2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、鼠李糖乳酪杆菌 HN001、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素 B6(盐酸吡哆醇)、维生素 B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。
致敏物质:本产品含有坚果、乳成分
企业信息
生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10767-2021
产品属性及类别: 乳基粉状幼儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
保质期: 24个月
全国客服热线:4008-168-698
清洁环境 爱护自然
6 920486 000353
食用方法
5min
1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。
40℃-50℃
2.加入温开水:参照"食用量建议表",将烧开放凉到 40℃~50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。
羊奶粉
3.加入适量奶粉:参照"食用量建议表",加入所需奶粉数量。
4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。
贮存条件
开罐前 ①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后 ①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。
爱心提示
①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
美羚 MEILING
国食注字 YP20170620
德瑞兰帝
净含量:800克
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)
3段
生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区
营养成分表
项目 单位 每100kJ 每100g
能量 kJ 100 2022
蛋白质 g 0.73 14.80
脂肪 g 1.15 23.30
亚油酸 g 0.16 3.20
α-亚麻酸 mg 15 304
碳水化合物 g 2.6 51.8
维生素
维生素A μg RE 23 460
维生素D μg 0.62 12.60
维生素E mg α-TE 0.30 6.00
维生素K1 μg 1.98 40.00
维生素B1 μg 23 462
维生素B2 μg 25 505
维生素B6 μg 16.2 328.0
维生素B12 μg 0.109 2.200
烟酸(烟酰胺) μg 153 3100
叶酸 μg 3.1 63.0
泛酸 μg 128 2588
维生素C mg 3.2 64.0
生物素 μg 0.69 14.00
矿物质
钠 mg 6 125
钾 mg 29 577
铜 μg 13.9 281.0
镁 mg 2.2 44.0
铁 mg 0.32 6.50
锌 mg 0.18 3.60
钙 mg 24 494
磷 mg 15 300
碘 μg 5.0 101.0
氯 mg 15 303
可选择成分
硒 μg 0.73 14.80
胆碱 mg 6.0 121.0
锰 μg 2.70 54.50
肌醇 mg 2.0 40.0
左旋肉碱 mg 0.5 10.8
二十二碳六烯酸(DHA) mg 4.2 84.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)mg 6.9 139.0
低聚半乳糖 g 0.15 3.00
多聚果糖 g 0.02 0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 g 0.1 2.9
叶黄素 μg 8.9 180.0
注:即食状态下,每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

标签 4


食用量建议表
幼儿月龄 12-36个月
奶粉量(平勺) 8
温开水量(毫升) 240
每天食用(次) 3
注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 -2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、鼠李糖乳酪杆菌HN001、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素 B6(盐酸吡哆醇)、维生素 B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。
致敏物质:本产品含有坚果、乳成分
企业信息
生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10767-2021
产品属性及类别: 乳基粉状幼儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
保质期: 24个月
全国客服热线:4008-168-698
清洁环境 爱护自然
6 920486 048249
食用方法
5min
1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。
40℃-50℃
2.加入温开水:参照"食用量建议表",将烧开放凉到 40℃~50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。
羊奶粉
3.加入适量奶粉:参照"食用量建议表",加入所需奶粉数量。
4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。
贮存条件
开罐前 ①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后 ①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。
爱心提示
①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
美羚 MEILING
国食注字 YP20170620
德瑞兰帝
净含量:850克
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)
3段
生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区
营养成分表
项目 单位 每100kJ 每100g
能量 kJ 100 2022
蛋白质 g 0.73 14.80
脂肪 g 1.15 23.30
亚油酸 g 0.16 3.20
α-亚麻酸 mg 15 304
碳水化合物 g 2.6 51.8
维生素
维生素A μg RE 23 460
维生素D μg 0.62 12.60
维生素E mg α-TE 0.30 6.00
维生素K1 μg 1.98 40.00
维生素B1 μg 23 462
维生素B2 μg 25 505
维生素B6 μg 16.2 328.0
维生素B12 μg 0.109 2.200
烟酸(烟酰胺) μg 153 3100
叶酸 μg 3.1 63.0
泛酸 μg 128 2588
维生素C mg 3.2 64.0
生物素 μg 0.69 14.00
矿物质
钠 mg 6 125
钾 mg 29 577
铜 μg 13.9 281.0
镁 mg 2.2 44.0
铁 mg 0.32 6.50
锌 mg 0.18 3.60
钙 mg 24 494
磷 mg 15 300
碘 μg 5.0 101.0
氯 mg 15 303
可选择成分
硒 μg 0.73 14.80
胆碱 mg 6.0 121.0
锰 μg 2.70 54.50
肌醇 mg 2.0 40.0
左旋肉碱 mg 0.5 10.8
二十二碳六烯酸(DHA) mg 4.2 84.0
二十碳四烯酸(AA/ARA) mg 6.9 139.0
低聚半乳糖 g 0.15 3.00
多聚果糖 g 0.02 0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 g 0.1 2.9
叶黄素 μg 8.9 180.0
注:即食状态下,每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

标签 5



食用量建议表

较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平勺)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天食用(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 -2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、鼠李糖乳酪杆菌 HN001、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K_1 (植物甲萘醌)、维生素 B_1 (盐酸硫胺素)、维生素 B_2 (核黄素)、维生素 B_6 (盐酸吡哆醇)、维生素 B_{12} (氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有坚果、乳成分

企业信息
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10766-2021
产品属性及类别:乳基粉状较大婴儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月

全国客服热线
4008-168-698

6 920486 001930

食用方法

1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。

2.加入温开水:参照"食用量建议表",将烧开放凉到40°C-50°C准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。

3.加入适量奶粉:参照"食用量建议表",加入所需奶粉数量。

4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现驻汇破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

爱心提示

①冲调奶时注意使用温开水(40°C-50°C)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
特别提示:
须配合添加辅助食品。

美羚® MEILING

国食注字 YP20170619

德瑞兰帝

净含量:100克

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄,2段) 2段

生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2053**
蛋白质	**g**	**0.63**	**13.00**
脂肪	**g**	**1.18**	**24.30**
亚油酸	g	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	15	314
碳水化合物	**g**	**2.6**	**53.3**
维生素			
维生素A	μg RE	23	462
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.26	5.34
维生素K_1	μg	1.70	35.00
维生素B_1	μg	22	451
维生素B_2	μg	28	575
维生素B_6	μg	16.1	330.0
维生素B_{12}	μg	0.113	2.320
烟酸(烟酰胺)	μg	146	3000
叶酸	μg	3.1	64.0
泛酸	μg	120	2464
维生素C	mg	3.2	65.7
生物素	μg	0.69	14.20
胆碱	mg	6.0	123.0
矿物质			
钠	mg	5	110
钾	mg	24	490
铜	μg	11.0	226.0
镁	mg	2.0	41.0
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.19	3.90
锰	μg	2.63	54.00
钙	mg	21	441
磷	mg	13	268
碘	μg	4.6	94.0
氯	mg	15	300
硒	μg	0.70	14.40
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	34.9
左旋肉碱	mg	0.6	12.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.7	137.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
多聚果糖	g	0.02	0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.7
叶黄素	μg	8.8	180.0

注:即食状态下,每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。

标签 6


食用量建议表
较大婴儿月龄 6-8个月 8-12个月
奶粉量(平勺) 7 8
温开水量(毫升) 210 240
每天食用(次) 4 3
注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、鼠李糖乳酪杆菌HN001、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。
致敏物质:本产品含有坚果、乳成分
企业信息
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10766-2021
产品属性及类别:乳基粉状较大婴儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月
全国客服热线:4008-168-698
清洁环境 爱护自然
6 920486 048263
食用方法
5min
1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。
40℃-50℃
2.加入温开水:参照"食用量建议表",将烧开放凉到40℃-50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。
羊奶粉
3.加入适量奶粉:参照"食用量建议表",加入所需奶粉数量。
4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。
贮存条件
开罐前 ①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后 ①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。
爱心提示
①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
特别提示:
须配合添加辅助食品。
美羚 MEILING
国食注字 YP20170619
德瑞兰帝
净含量:400克
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)
2段
生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区
营养成分表
项目 单位 每100kJ 每100g
能量 kJ 100 2053
蛋白质 g 0.63 13.00
脂肪 g 1.18 24.30
亚油酸 g 0.16 3.30
α-亚麻酸 mg 15 314
碳水化合物 g 2.6 53.3
维生素
维生素A μg RE 23 462
维生素D μg 0.61 12.50
维生素E mg α-TE 0.26 5.34
维生素K1 μg 1.70 35.00
维生素B1 μg 22 451
维生素B2 μg 28 575
维生素B6 μg 16.1 330.0
维生素B12 μg 0.113 2.320
烟酸(烟酰胺) μg 146 3000
叶酸 μg 3.1 64.0
泛酸 μg 120 2464
维生素C mg 3.2 65.7
生物素 μg 0.69 14.20
胆碱 mg 6.0 123.0
矿物质
钠 mg 5 110
钾 mg 24 490
铜 μg 11.0 226.0
镁 mg 2.0 41.0
铁 mg 0.30 6.20
锌 mg 0.19 3.90
锰 μg 2.63 54.00
钙 mg 21 441
磷 mg 13 268
碘 μg 4.6 94.0
氯 mg 15 300
硒 μg 0.70 14.40
可选择成分
肌醇 mg 1.7 34.9
左旋肉碱 mg 0.6 12.0
二十二碳六烯酸(DHA) mg 4.6 94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA) mg 6.7 137.0
低聚半乳糖 g 0.15 3.00
多聚果糖 g 0.02 0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 g 0.2 3.7
叶黄素 μg 8.8 180.0
注:即食状态下,每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。

标签 7


食用量建议表
较大婴儿月龄 6-8个月 8-12个月
奶粉量(平勺) 7 8
温开水量(毫升) 210 240
每天食用(次) 4 3
注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 -2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、鼠李糖乳酪杆菌HN001.维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素 B6(盐酸吡哆醇)、维生素 B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。
致敏物质:本产品含有坚果、乳成分
企业信息
生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10766-2021
产品属性及类别: 乳基粉状较大婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
保质期: 24个月
全国客服热线:4008-168-698
清洁环境 爱护自然
6 920486 000346
食用方法
5min
1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。
40℃-50℃
2.加入温开水:参照"食用量建议表",将烧开放凉到 40℃~50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。
羊奶粉
3.加入适量奶粉:参照"食用量建议表",加入所需奶粉数量。
4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。
贮存条件
开罐前 ①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后 ①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。
爱心提示
①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
特别提示:
须配合添加辅助食品。
美羚 MEILING
国食注字 YP20170619
德瑞兰帝
净含量:800克
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)
2段
生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区
营养成分表
项目 单位 每100kJ 每100g
能量 kJ 100 2053
蛋白质 g 0.63 13.00
脂肪 g 1.18 24.30
亚油酸 g 0.16 3.30
α-亚麻酸 mg 15 314
碳水化合物 g 2.6 53.3
维生素
维生素A μg RE 23 462
维生素D μg 0.61 12.50
维生素E mg α-TE 0.26 5.34
维生素K1 μg 1.70 35.00
维生素B1 μg 22 451
维生素B2 μg 28 575
维生素B6 μg 16.1 330.0
维生素B12 μg 0.113 2.320
烟酸(烟酰胺) μg 146 3000
叶酸 μg 3.1 64.0
泛酸 μg 120 2464
维生素C mg 3.2 65.7
生物素 μg 0.69 14.20
胆碱 mg 6.0 123.0
矿物质
钠 mg 5 110
钾 mg 24 490
铜 μg 11.0 226.0
镁 mg 2.0 41.0
铁 mg 0.30 6.20
锌 mg 0.19 3.90
锰 μg 2.63 54.00
钙 mg 21 441
磷 mg 13 268
碘 μg 4.6 94.0
氯 mg 15 300
硒 μg 0.70 14.40
可选择成分
肌醇 mg 1.7 34.9
左旋肉碱 mg 0.6 12.0
二十二碳六烯酸(DHA) mg 4.6 94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA) mg 6.7 137.0
低聚半乳糖 g 0.15 3.00
多聚果糖 g 0.02 0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 g 0.2 3.7
叶黄素 μg 8.8 180.0
注:即食状态下,每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。

标签 8


食用量建议表
较大婴儿月龄 6-8个月 8-12个月
奶粉量(平勺) 7 8
温开水量(毫升) 210 240
每天食用(次) 4 3
注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 -2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、鼠李糖乳酪杆菌HN001.维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素 B6(盐酸吡哆醇)、维生素 B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。
致敏物质:本产品含有坚果、乳成分
企业信息
生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10766-2021
产品属性及类别: 乳基粉状较大婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
保质期: 24个月
全国客服热线:4008-168-698
清洁环境 爱护自然
6 920486 048232
食用方法
5min
1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。
40℃-50℃
2.加入温开水:参照"食用量建议表",将烧开放凉到 40℃~50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。
羊奶粉
3.加入适量奶粉:参照"食用量建议表",加入所需奶粉数量。
4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。
贮存条件
开罐前 ①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后 ①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。
爱心提示
①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
特别提示:
须配合添加辅助食品。
美羚 MEILING
国食注字 YP20170619
德瑞兰帝
净含量:850克
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)
2段
生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区
营养成分表
项目 单位 每100kJ 每100g
能量 kJ 100 2053
蛋白质 g 0.63 13.00
脂肪 g 1.18 24.30
亚油酸 g 0.16 3.30
α-亚麻酸 mg 15 314
碳水化合物 g 2.6 53.3
维生素
维生素A μg RE 23 462
维生素D μg 0.61 12.50
维生素E mg α-TE 0.26 5.34
维生素K1 μg 1.70 35.00
维生素B1 μg 22 451
维生素B2 μg 28 575
维生素B6 μg 16.1 330.0
维生素B12 μg 0.113 2.320
烟酸(烟酰胺) μg 146 3000
叶酸 μg 3.1 64.0
泛酸 μg 120 2464
维生素C mg 3.2 65.7
生物素 μg 0.69 14.20
胆碱 mg 6.0 123.0
矿物质
钠 mg 5 110
钾 mg 24 490
铜 μg 11.0 226.0
镁 mg 2.0 41.0
铁 mg 0.30 6.20
锌 mg 0.19 3.90
锰 μg 2.63 54.00
钙 mg 21 441
磷 mg 13 268
碘 μg 4.6 94.0
氯 mg 15 300
硒 μg 0.70 14.40
可选择成分
肌醇 mg 1.7 34.9
左旋肉碱 mg 0.6 12.0
二十二碳六烯酸(DHA) mg 4.6 94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA) mg 6.7 137.0
低聚半乳糖 g 0.15 3.00
多聚果糖 g 0.02 0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 g 0.2 3.7
叶黄素 μg 8.8 180.0
注:即食状态下,每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。

标签 9


食用量建议表
幼儿月龄 12-36个月
奶粉量(平勺) 8
温开水量(毫升) 240
每天食用(次) 3
注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 -2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、鼠李糖乳酪杆菌 HN001、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K1 (植物甲萘醌)、维生素 B1 (盐酸硫胺素)、维生素 B2 (核黄素)、维生素 B6 (盐酸吡哆醇)、维生素 B12 (氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。
致敏物质:本产品含有坚果、乳成分
企业信息
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10767-2021
产品属性及类别:乳基粉状幼儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
生产日期、批号、溯源信息:见罐底部喷码区
保质期:24个月
全国客服热线
4008-168-698
6 920486 001947
食用方法
5min
40℃-50℃
羊奶粉
1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。
2.加入温开水:参照"食用量建议表",将烧开放凉到40℃-50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。
3.加入适量奶粉:参照"食用量建议表",加入所需奶粉数量。
4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。
贮存条件
开罐前
①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。
②请在保质期前食用完该产品。
开罐后
①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。
②建议在一个月内将本产品食用完。
爱心提示
①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
美羚®
MEILING
国食注字 YP20170620
德瑞兰帝
净含量:100克
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)
3段
生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区
营养成分表
项目 单位 每100kJ 每100g
能量 kJ 100 2022
蛋白质 g 0.73 14.80
脂肪 g 1.15 23.30
亚油酸 g 0.16 3.20
α-亚麻酸 mg 15 304
碳水化合物 g 2.6 51.8
维生素
维生素A μg RE 23 460
维生素D μg 0.62 12.60
维生素E mg α-TE 0.30 6.00
维生素K1 μg 1.98 40.00
维生素B1 μg 23 462
维生素B2 μg 25 505
维生素B6 μg 16.2 328.0
维生素B12 μg 0.109 2.200
烟酸(烟酰胺) μg 153 3100
叶酸 μg 3.1 63.0
泛酸 μg 128 2588
维生素C mg 3.2 64.0
生物素 μg 0.69 14.00
矿物质
钠 mg 6 125
钾 mg 29 577
铜 μg 13.9 281.0
镁 mg 2.2 44.0
铁 mg 0.32 6.50
锌 mg 0.18 3.60
钙 mg 24 494
磷 mg 15 300
碘 μg 5.0 101.0
氯 mg 15 303
可选择成分
硒 μg 0.73 14.80
胆碱 mg 6.0 121.0
锰 μg 2.70 54.50
肌醇 mg 2.0 40.0
左旋肉碱 mg 0.5 10.8
二十二碳六烯酸(DHA) mg 4.2 84.0
二十碳四烯酸(AA/ARA) mg 6.9 139.0
低聚半乳糖 g 0.15 3.00
多聚果糖 g 0.02 0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 g 0.1 2.9
叶黄素 μg 8.9 180.0
注:即食状态下,每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

标签 10


食用量建议表
幼儿月龄 12-36个月
奶粉量(平勺) 8
温开水量(毫升) 240
每天食用(次) 3
注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种 Bi-07、鼠李糖乳酪杆菌 HN001、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。
致敏物质:本产品含有坚果、乳成分
企业信息
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10767-2021
产品属性及类别:乳基粉状幼儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月
全国客服热线:4008-168-698
清洁环境 爱护自然
6 920486 048270
食用方法
5min
1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。
40℃-50℃
2.加入温开水:参照"食用量建议表",将烧开放凉到40℃-50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。
羊奶粉
3.加入适量奶粉:参照"食用量建议表",加入所需奶粉数量。
4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。
贮存条件
开罐前 ①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。②请在保质期前食用完该产品。
开罐后 ①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。②建议在一个月内将本产品食用完。
爱心提示
①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
美羚 MEILING
国食注字 YP20170620
德瑞兰帝
净含量:400克
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段) 3段
生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区
营养成分表
项目 单位 每100kJ 每100g
能量 kJ 100 2022
蛋白质 g 0.73 14.80
脂肪 g 1.15 23.30
亚油酸 g 0.16 3.20
α-亚麻酸 mg 15 304
碳水化合物 g 2.6 51.8
维生素
维生素A μg RE 23 460
维生素D μg 0.62 12.60
维生素E mg α-TE 0.30 6.00
维生素K1 μg 1.98 40.00
维生素B1 μg 23 462
维生素B2 μg 25 505
维生素B6 μg 16.2 328.0
维生素B12 μg 0.109 2.200
烟酸(烟酰胺) μg 153 3100
叶酸 μg 3.1 63.0
泛酸 μg 128 2588
维生素C mg 3.2 64.0
生物素 μg 0.69 14.00
矿物质
钠 mg 6 125
钾 mg 29 577
铜 μg 13.9 281.0
镁 mg 2.2 44.0
铁 mg 0.32 6.50
锌 mg 0.18 3.60
钙 mg 24 494
磷 mg 15 300
碘 μg 5.0 101.0
氯 mg 15 303
可选择成分
硒 μg 0.73 14.80
胆碱 mg 6.0 121.0
锰 μg 2.70 54.50
肌醇 mg 2.0 40.0
左旋肉碱 mg 0.5 10.8
二十二碳六烯酸(DHA) mg 4.2 84.0
二十碳四烯酸(AA/ARA) mg 6.9 139.0
低聚半乳糖 g 0.15 3.00
多聚果糖 g 0.02 0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 g 0.1 2.9
叶黄素 μg 8.9 180.0
注:即食状态下,每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

标签 11


食用量建议表
婴儿月龄 0-1周 1-2周 2周-1个月 1-2个月 3-4个月 4-6个月
婴儿体重(千克) 约3 ≤3.5 3-4.5 4-5.5 5-7 6-7.5
温开水量(毫升) 60 90 120 150 180 210
奶粉量(平勺) 2 3 4 5 6 7
每天食用(次) 7-8 6-7 5-6 5-6 4-5 4-5
注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 -2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、鼠李糖乳酪杆菌HN001、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。
致敏物质:本产品含有坚果、乳成分
企业信息
生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10765-2021
产品属性及类别: 乳基粉状婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
保质期: 24个月
全国客服热线:4008-168-698
清洁环境 爱护自然
6 920486 000339
食用方法
5min
1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。
40℃-50℃
2.加入温开水:参照"食用量建议表",将烧开放凉到 40℃~50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。
3.加入适量奶粉:参照"食用量建议表",加入所需奶粉数量。
4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。
贮存条件
开罐前 ①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后 ①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。
爱心提示
①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
特别提示:
对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
美羚 MEILING
国食注字 YP20170618
德瑞兰帝
净含量:800克
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)
1段
生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区
营养成分表
项目 单位 每100kJ 每100g
能量 kJ 100 2105
蛋白质 g 0.56 11.70
脂肪 g 1.24 26.20
亚油酸 g 0.17 3.60
α-亚麻酸 mg 16 330
碳水化合物 g 2.6 53.8
维生素
维生素A μg RE 19 400
维生素D μg 0.60 12.60
维生素E mg α-TE 0.31 6.50
维生素K1 μg 1.80 37.80
维生素B1 μg 22 460
维生素B2 μg 31 646
维生素B6 μg 14.9 314.0
维生素B12 μg 0.095 2.000
烟酸(烟酰胺) μg 138 2900
叶酸 μg 3.8 80.0
泛酸 μg 152 3200
维生素C mg 4.0 85.0
生物素 μg 0.67 14.00
胆碱 mg 6.0 127.0
矿物质
钠 mg 9 185
钾 mg 23 482
铜 μg 18.0 378.0
镁 mg 2.0 42.0
铁 mg 0.21 4.40
锌 mg 0.20 4.20
锰 μg 2.85 60.00
钙 mg 16 340
磷 mg 11 222
碘 μg 4.5 95.0
氯 mg 18 376
硒 μg 0.90 19.00
可选择成分
肌醇 mg 1.9 41.0
左旋肉碱 mg 0.6 13.5
二十二碳六烯酸(DHA) mg 4.5 95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA) mg 7.3 153.0
低聚半乳糖 g 0.11 2.40
多聚果糖 g 0.02 0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 g 0.2 4.0
叶黄素 μg 3.8 80.0
注:即食状态下,每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

标签 12


食用量建议表
婴儿月龄 0-1周 1-2周 2周-1个月 1-2个月 3-4个月 4-6个月
婴儿体重(千克) 约3 ≤3.5 3-4.5 4-5.5 5-7 6-7.5
温开水量(毫升) 60 90 120 150 180 210
奶粉量(平勺) 2 3 4 5 6 7
每天食用(次) 7-8 6-7 5-6 5-6 4-5 4-5
注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 -2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、多聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、鼠李糖乳酪杆菌HN001、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。
致敏物质:本产品含有坚果、乳成分
企业信息
生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10765-2021
产品属性及类别: 乳基粉状婴儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
保质期: 24个月
全国客服热线:4008-168-698
清洁环境 爱护自然
6 920486 048225
食用方法
5min
40℃-50℃
羊奶粉
1.洗净消毒:用瓶刷洗奶瓶,仔细检查颈部和螺纹处,确定洗净后,将奶具放在沸水中煮5分钟彻底消毒。
2.加入温开水:参照"食用量建议表",将烧开放凉到 40℃~50℃准确数量的温开水倒入已消毒的奶瓶中。
3.加入适量奶粉:参照"食用量建议表",加入所需奶粉数量。
4.摇动均匀:盖好奶瓶,将奶瓶轻轻摇动,使奶粉溶解均匀,把奶液滴到手腕,确定温度适宜时即可喂哺。
贮存条件
开罐前 ①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后 ①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。
爱心提示
①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
特别提示:
对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
美羚 MEILING
国食注字 YP20170618
德瑞兰帝
净含量:850克
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)
1段
生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区
营养成分表
项目 单位 每100kJ 每100g
能量 kJ 100 2105
蛋白质 g 0.56 11.70
脂肪 g 1.24 26.20
亚油酸 g 0.17 3.60
α-亚麻酸 mg 16 330
碳水化合物 g 2.6 53.8
维生素
维生素A μg RE 19 400
维生素D μg 0.60 12.60
维生素E mg α-TE 0.31 6.50
维生素K1 μg 1.80 37.80
维生素B1 μg 22 460
维生素B2 μg 31 646
维生素B6 μg 14.9 314.0
维生素B12 μg 0.095 2.000
烟酸(烟酰胺) μg 138 2900
叶酸 μg 3.8 80.0
泛酸 μg 152 3200
维生素C mg 4.0 85.0
生物素 μg 0.67 14.00
胆碱 mg 6.0 127.0
矿物质
钠 mg 9 185
钾 mg 23 482
铜 μg 18.0 378.0
镁 mg 2.0 42.0
铁 mg 0.21 4.40
锌 mg 0.20 4.20
锰 μg 2.85 60.00
钙 mg 16 340
磷 mg 11 222
碘 μg 4.5 95.0
氯 mg 18 376
硒 μg 0.90 19.00
可选择成分
肌醇 mg 1.9 41.0
左旋肉碱 mg 0.6 13.5
二十二碳六烯酸(DHA) mg 4.5 95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA) mg 7.3 153.0
低聚半乳糖 g 0.11 2.40
多聚果糖 g 0.02 0.40
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 g 0.2 4.0
叶黄素 μg 3.8 80.0
注:即食状态下,每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

标签 13

食用方法



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净，用沸水煮5分钟。
3. 饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右，预备使用。
4. 参照"食用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶，使用专用量勺加入奶粉。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度，确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平勺)	2	3	4	5	6	7
每天食用(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5
每天辅食(次)	-	-	-	-	-	1-2

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉 (来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素 B2(核黄素)、维生素 B6(盐酸吡哆醇)、维生素 B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有乳成分

爱心提示及特别提示

爱心提示：①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示：
对于 0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息

生产企业名称：陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址：陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话：0913-8214088
网址：WWW.china-hxry.com.cn
生产许可证编号：SC12961052800859
产品标准代号：GB 10765-2021
产品属性及类别：乳基粉状婴儿配方食品
产地：陕西 渭南 富平
保质期：24个月
全国客服热线:4008-168-698

清洁环境 爱护自然

6 920486 048195

美羚® MEILING

国食注字 YP20230402

羚恩贝贝

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)



1段

净含量:100克

生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区


营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2077**
蛋白质	**g**	**0.55**	**11.40**
脂肪	**g**	**1.20**	**24.90**
亚油酸	g	0.22	4.50
α-亚麻酸	mg	21	437
碳水化合物	**g**	**2.7**	**55.2**
维生素			
维生素A	μg RE	18	376
维生素D	μg	0.63	13.00
维生素E	mg α-TE	0.33	6.80
维生素K_1	μg	1.61	33.40
维生素B_1	μg	22	463
维生素B_2	μg	32	658
维生素B_6	μg	16.6	345.0
维生素B_{12}	μg	0.096	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	140	2900
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	149	3100
维生素C	mg	3.5	73.0
生物素	μg	0.67	14.00
胆碱	mg	6.1	127.0
矿物质			
钠	mg	9	182
钾	mg	23	469
铜	μg	17.9	372.0
镁	mg	1.9	40.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.22	4.50
锰	μg	2.21	45.80
钙	mg	16	330
磷	mg	10	214
碘	μg	4.5	94.0
氯	mg	17	360
硒	μg	0.91	19.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	41.0
左旋肉碱	mg	0.7	15.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	145.0
低聚半乳糖	g	0.12	2.50
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	0.96	20.00

注:即食状态下,每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

标签 14

食用方法



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净，用沸水煮5分钟。
3. 饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右，预备使用。
4. 参照"食用量建议表"，将准确份量的水倒入奶瓶，使用专用量勺加入奶粉。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度，确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平勺)	2	3	4	5	6	7
每天食用(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5
每天辅食(次)	-	-	-	-	-	1-2

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉 (来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素 B2(核黄素)、维生素 B6(盐酸吡哆醇)、维生素 B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有乳成分

爱心提示及特别提示

爱心提示：①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示：
对于 0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息
生产企业名称：陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址：陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话：0913-8214088
网址：www.china-hxry.com.cn

生产许可证编号：SC12961052800859
产品标准代号：GB 10765-2021
产品属性及类别：乳基粉状婴儿配方食品
产地：陕西 渭南 富平
保质期：24个月

全国客服热线:4008-168-698

6 920486 048164

美羚® MEILING

国食注字 YP20230402

羚恩贝贝

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)



1段

净含量:400克

生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2077**
蛋白质	**g**	**0.55**	**11.40**
脂肪	**g**	**1.20**	**24.90**
亚油酸	g	0.22	4.50
α-亚麻酸	mg	21	437
碳水化合物	**g**	**2.7**	**55.2**
维生素			
维生素A	μg RE	18	376
维生素D	μg	0.63	13.00
维生素E	mg α-TE	0.33	6.80
维生素K_1	μg	1.61	33.40
维生素B_1	μg	22	463
维生素B_2	μg	32	658
维生素B_6	μg	16.6	345.0
维生素B_{12}	μg	0.096	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	140	2900
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	149	3100
维生素C	mg	3.5	73.0
生物素	μg	0.67	14.00
胆碱	mg	6.1	127.0
矿物质			
钠	mg	9	182
钾	mg	23	469
铜	μg	17.9	372.0
镁	mg	1.9	40.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.22	4.50
锰	μg	2.21	45.80
钙	mg	16	330
磷	mg	10	214
碘	μg	4.5	94.0
氯	mg	17	360
硒	μg	0.91	19.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	41.0
左旋肉碱	mg	0.7	15.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	145.0
低聚半乳糖	g	0.12	2.50
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	0.96	20.00

注:即食状态下,每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

标签 15

食用方法



冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。

将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮5分钟。

饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右,预备使用。

参照"食用量建议表",将准确份量的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。

盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。

滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平勺)	2	3	4	5	6	7
每天食用(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5
每天辅食(次)	-	-	-	-	-	1-2

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K_1(植物甲萘醌)、维生素 B_1(盐酸硫胺素)、维生素 B_2(核黄素)、维生素 B_6(盐酸吡哆醇)、维生素 B_{12}(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有乳成分

爱心提示及特别提示

爱心提示:

①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。

②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。

③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。

⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示:

对于 0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息

生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:www.china-hxry.com.cn

生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10765-2021
产品属性及类别:乳基粉状婴儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月

全国客服热线:4008-168-698

清洁环境 爱护自然

6 920486 000360

美羚® MEILING

国食注字 YP20230402

羚恩贝贝

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)



1段

净含量:800克

生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2077**
蛋白质	**g**	**0.55**	**11.40**
脂肪	**g**	**1.20**	**24.90**
亚油酸	g	0.22	4.50
α-亚麻酸	mg	21	437
碳水化合物	**g**	**2.7**	**55.2**
维生素			
维生素A	μg RE	18	376
维生素D	μg	0.63	13.00
维生素E	mg α-TE	0.33	6.80
维生素K_1	μg	1.61	33.40
维生素B_1	μg	22	463
维生素B_2	μg	32	658
维生素B_6	μg	16.6	345.0
维生素B_{12}	μg	0.096	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	140	2900
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	149	3100
维生素C	mg	3.5	73.0
生物素	μg	0.67	14.00
胆碱	mg	6.1	127.0
矿物质			
钠	mg	9	182
钾	mg	23	469
铜	μg	17.9	372.0
镁	mg	1.9	40.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.22	4.50
锰	μg	2.21	45.80
钙	mg	16	330
磷	mg	10	214
碘	μg	4.5	94.0
氯	mg	17	360
硒	μg	0.91	19.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	41.0
左旋肉碱	mg	0.7	15.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	145.0
低聚半乳糖	g	0.12	2.50
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	0.96	20.00

注:即食状态下,每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

标签 16

食用方法



冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。

将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮5分钟。

饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右,预备使用。

参照"食用量建议表",将准确份量的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。

盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。

滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平勺)	2	3	4	5	6	7
每天食用(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5
每天辅食(次)	-	-	-	-	-	1-2

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-乌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K_1(植物甲萘醌)、维生素B_1(盐酸硫胺素)、维生素B_2(核黄素)、维生素B_6(盐酸吡哆醇)、维生素B_{12}(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有乳成分

爱心提示及特别提示

爱心提示:
①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示:
对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:WWW.china-hxry.com.cn

生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10765-2021
产品属性及类别:乳基粉状婴儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月

全国客服热线:4008-168-698

清洁环境 爱护自然

6 920486 048133

美羚® MEILING

国食注字 YP20230402

羚恩贝贝

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)



1段

净含量:850克

生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2077**
蛋白质	**g**	**0.55**	**11.40**
脂肪	**g**	**1.20**	**24.90**
亚油酸	g	0.22	4.50
α-亚麻酸	mg	21	437
碳水化合物	**g**	**2.7**	**55.2**
维生素			
维生素A	μg RE	18	376
维生素D	μg	0.63	13.00
维生素E	mg α-TE	0.33	6.80
维生素K_1	μg	1.61	33.40
维生素B_1	μg	22	463
维生素B_2	μg	32	658
维生素B_6	μg	16.6	345.0
维生素B_{12}	μg	0.096	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	140	2900
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	149	3100
维生素C	mg	3.5	73.0
生物素	μg	0.67	14.00
胆碱	mg	6.1	127.0
矿物质			
钠	mg	9	182
钾	mg	23	469
铜	μg	17.9	372.0
镁	mg	1.9	40.0
铁	mg	0.19	4.00
锌	mg	0.22	4.50
锰	μg	2.21	45.80
钙	mg	16	330
磷	mg	10	214
碘	μg	4.5	94.0
氯	mg	17	360
硒	μg	0.91	19.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	41.0
左旋肉碱	mg	0.7	15.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	145.0
低聚半乳糖	g	0.12	2.50
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	0.96	20.00

注:即食状态下,每100mL含婴儿配方羊奶粉13.5克。

标签 17

食用方法



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净，用沸水煮5分钟。
3. 饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右，预备使用。
4. 参照"食用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。使用专用量勺加入奶粉。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度，确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平勺)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天喂哺(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K(植物甲萘醌)、维生素 B(盐酸硫胺素)、维生素 B_2(核黄素)、维生素 B_6(盐酸吡哆醇)、维生素 B_{12}(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有乳成分

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

爱心提示及特别提示

爱心提示:

①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。

②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。

③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。

⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示:

须配合添加辅助食品。

企业信息

生产企业名称：陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址：陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话：0913-8214088
网址：www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号：SC12961052800859
产品标准代号：GB 10766-2021
产品属性及类别：乳基粉状较大婴儿配方食品
产地：陕西 渭南 富平
保质期：24个月

全国客服热线:4008-168-698

清洁环境 爱护自然

6 920486 001985

美羚® MEILING

国食注字 YP20230403

羚恩贝贝

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)



2段

净含量:100克

生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区


营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2036**
蛋白质	**g**	**0.64**	**13.00**
脂肪	**g**	**1.15**	**23.50**
亚油酸	g	0.18	3.60
α-亚麻酸	mg	17	350
碳水化合物	**g**	**2.7**	**54.0**
维生素			
维生素A	μg RE	23	459
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.28	5.70
维生素K_1	μg	1.87	38.00
维生素B_1	μg	20	407
维生素B_2	μg	29	590
维生素B_6	μg	16.2	330.0
维生素B_{12}	μg	0.118	2.400
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3000
叶酸	μg	3.2	65.0
泛酸	μg	126	2565
维生素C	mg	3.1	63.0
生物素	μg	0.69	14.00
胆碱	mg	6.0	122.0
矿物质			
钠	mg	6	113
钾	mg	23	461
铜	μg	11.0	224.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	2.70	55.00
钙	mg	22	440
磷	mg	13	268
碘	μg	4.6	93.0
氯	mg	16	326
硒	μg	0.71	14.50
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	37.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	143.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	1.03	21.00

注:即食状态下,每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。

标签 18

食用方法



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净，用沸水煮5分钟。
3. 饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右，预备使用。
4. 参照"食用量建议表"，将准确份量的水倒入奶瓶，使用专用量勺加入奶粉。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度，确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平勺)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天喂哺(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-乌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K1(植物甲萘醌)、维生素 B1(盐酸硫胺素)、维生素 B2(核黄素)、维生素 B6(盐酸吡哆醇)、维生素 B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有乳成分

爱心提示及特别提示

爱心提示：

①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调，冲调好的奶液应及时食用。

②冲调奶时，请使用本产品配套专用量勺，每平勺奶粉净含量约为4.5克。

③喂养时应抱着宝宝，疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④喂养剩余奶液请弃掉，勿留于下次喂养，每次喂养请重新冲调。

⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中，应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示：须配合添加辅助食品。

贮存条件

开罐前	①请常温保存，避免长期处于高温下，如开罐前发现封口破损，请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧，并放置阴凉、干燥处，切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息

生产企业名称：陕西红星美羚乳业股份有限公司

地址：陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号

电话：0913-8214088

网址：www.china-hxry.com.cn

生产许可证编号：SC12961052800859

产品标准代号：GB 10766-2021

产品属性及类别：乳基粉状较大婴儿配方食品

产地：陕西 渭南 富平

保质期：24个月

全国客服热线:4008-168-698

清洁环境 爱护自然

6 920486 048171

美羚® MEILING

国食注字 YP20230403

羚恩贝贝

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄,2段)



2段

净含量:400克

生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2036**
蛋白质	**g**	**0.64**	**13.00**
脂肪	**g**	**1.15**	**23.50**
亚油酸	g	0.18	3.60
α-亚麻酸	mg	17	350
碳水化合物	**g**	**2.7**	**54.0**
维生素			
维生素A	μg RE	23	459
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.28	5.70
维生素K_1	μg	1.87	38.00
维生素B_1	μg	20	407
维生素B_2	μg	29	590
维生素B_6	μg	16.2	330.0
维生素B_{12}	μg	0.118	2.400
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3000
叶酸	μg	3.2	65.0
泛酸	μg	126	2565
维生素C	mg	3.1	63.0
生物素	μg	0.69	14.00
胆碱	mg	6.0	122.0
矿物质			
钠	mg	6	113
钾	mg	23	461
铜	μg	11.0	224.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	2.70	55.00
钙	mg	22	440
磷	mg	13	268
碘	μg	4.6	93.0
氯	mg	16	326
硒	μg	0.71	14.50
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	37.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	143.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	1.03	21.00

注:即食状态下,每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。

标签 19


食用方法
1
冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2
将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮5分钟。
3
40℃-50℃
饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右,预备使用。
4
参照"食用量建议表",将准确份量的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。
5
盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。
6
滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。
食用量建议表
较大婴儿月龄 6-8个月 8-12个月
奶粉量(平勺) 7 8
温开水量(毫升) 210 240
每天喂哺(次) 4 3
注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-乌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。
致敏物质:本产品含有乳成分
贮存条件
开罐前 ①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。②请在保质期前食用完该产品。
开罐后 ①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。②建议在一个月内将本产品食用完。
爱心提示及特别提示
爱心提示:
①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗯或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
特别提示:
须配合添加辅助食品。
企业信息
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:WWW.china-hxry.com.cn
生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10766-2021
产品属性及类别:乳基粉状较大婴儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月
全国客服热线:4008-168-698
清洁环境 爱护自然
6 920486 000377
美羚 MEILING
国食注字 YP20230403
羚恩贝贝
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)
2段
净含量:800克
生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区
营养成分表
项目 单位 每100kJ 每100g
能量 kJ 100 2036
蛋白质 g 0.64 13.00
脂肪 g 1.15 23.50
亚油酸 g 0.18 3.60
α-亚麻酸 mg 17 350
碳水化合物 g 2.7 54.0
维生素
维生素A μg RE 23 459
维生素D μg 0.61 12.50
维生素E mg α-TE 0.28 5.70
维生素K1 μg 1.87 38.00
维生素B1 μg 20 407
维生素B2 μg 29 590
维生素B6 μg 16.2 330.0
维生素B12 μg 0.118 2.400
烟酸(烟酰胺) μg 147 3000
叶酸 μg 3.2 65.0
泛酸 μg 126 2565
维生素C mg 3.1 63.0
生物素 μg 0.69 14.00
胆碱 mg 6.0 122.0
矿物质
钠 mg 6 113
钾 mg 23 461
钙 μg 11.0 224.0
镁 mg 2.0 40.0
铁 mg 0.30 6.20
锌 mg 0.20 4.00
锰 μg 2.70 55.00
钙 mg 22 440
磷 mg 13 268
碘 μg 4.6 93.0
氯 mg 16 326
硒 μg 0.71 14.50
可选择成分
肌醇 mg 1.8 37.0
左旋肉碱 mg 0.5 10.0
二十二碳六烯酸(DHA) mg 4.5 92.0
二十碳四烯酸(AA/ARA) mg 7.0 143.0
低聚半乳糖 g 0.15 3.00
低聚果糖 g 0.02 0.40
核苷酸 mg 1.03 21.00
注:即食状态下,每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。

标签 20

食用方法



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净，用沸水煮5分钟。
3. 饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右，预备使用。
4. 参照"食用量建议表"，将准确份量的水倒入奶瓶，使用专用量勺加入奶粉。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度，确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平勺)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天喂哺(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定，仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-乌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K_1(植物甲萘醌)、维生素B_1(盐酸硫胺素)、维生素B_2(核黄素)、维生素B_6(盐酸吡哆醇)、维生素B_{12}(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有乳成分

爱心提示及特别提示

爱心提示:

①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调，冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时，请使用本产品配套专用量勺，每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝，疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉，勿留于下次喂养，每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中，应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示:

须配合添加辅助食品。

贮存条件

开罐前	①请常温保存，避免长期处于高温下，如开罐前发现封口破损，请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧，并放置阴凉、干燥处，切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息
生产企业名称：陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址：陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话：0913-8214088
网址：WWW.china-hxry.com.cn

生产许可证编号：SC12961052800859
产品标准代号：GB 10766-2021
产品属性及类别：乳基粉状较大婴儿配方食品
产地：陕西 渭南 富平
保质期：24个月

全国客服热线:4008-168-698

清洁环境 爱护自然

6 920486 048140

美羚® MEILING

国食注字 YP20230403

羚恩贝贝
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄，2段)



2段

净含量:850克

生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2036**
蛋白质	**g**	**0.64**	**13.00**
脂肪	**g**	**1.15**	**23.50**
亚油酸	g	0.18	3.60
α-亚麻酸	mg	17	350
碳水化合物	**g**	**2.7**	**54.0**
维生素			
维生素A	μg RE	23	459
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.28	5.70
维生素K_1	μg	1.87	38.00
维生素B_1	μg	20	407
维生素B_2	μg	29	590
维生素B_6	μg	16.2	330.0
维生素B_{12}	μg	0.118	2.400
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3000
叶酸	μg	3.2	65.0
泛酸	μg	126	2565
维生素C	mg	3.1	63.0
生物素	μg	0.69	14.00
胆碱	mg	6.0	122.0
矿物质			
钠	mg	6	113
钾	mg	23	461
铜	μg	11.0	224.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	2.70	55.00
钙	mg	22	440
磷	mg	13	268
碘	μg	4.6	93.0
氯	mg	16	326
硒	μg	0.71	14.50
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	37.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.0	143.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.00
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	1.03	21.00

注:即食状态下，每100mL含较大婴儿配方羊奶粉13.5克。

标签 21

食用方法



冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。

将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮5分钟。

饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右,预备使用。

参照"食用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。使用专用量勺加入奶粉。

盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。

滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平勺)	8
温开水量(毫升)	240
每天喂哺(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K(植物甲萘醌)、维生素 B_1(盐酸硫胺素)、维生素 B_2(核黄素)、维生素 B_6(盐酸吡哆醇)、维生素 B_{12}(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有乳成分

爱心提示

①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:www.china-hxry.com.cn

生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10767-2021
产品属性及类别:乳基粉状幼儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月

全国客服热线:4008-168-698

清洁环境 爱护自然

6 920486 001992

美羚® MEILING

国食注字 YP20230404

羚恩贝贝

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)



3段

净含量:100克

生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区


营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2015**
蛋白质	**g**	**0.73**	**14.80**
脂肪	**g**	**1.14**	**23.00**
亚油酸	g	0.15	3.00
α-亚麻酸	mg	15	303
碳水化合物	**g**	**2.6**	**52.0**
维生素			
维生素A	μg RE	23	454
维生素D	μg	0.62	12.50
维生素E	mg α-TE	0.29	5.80
维生素K_1	μg	2.00	40.30
维生素B_1	μg	21	425
维生素B_2	μg	24	484
维生素B_6	μg	16.4	330.0
维生素B_{12}	μg	0.119	2.400
烟酸(烟酰胺)	μg	159	3200
叶酸	μg	3.2	64.0
泛酸	μg	133	2680
维生素C	mg	3.1	62.0
生物素	μg	0.74	15.00
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	27	553
铜	μg	14.0	283.0
镁	mg	2.1	43.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	25	498
磷	mg	15	303
碘	μg	5.0	100.0
氯	mg	15	302
可选择成分			
硒	μg	0.72	14.50
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	2.48	50.00
肌醇	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	13.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	85.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.9	140.0
低聚半乳糖	g	0.16	3.20
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	1.09	22.00

注:即食状态下,每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

标签 22

食用方法



冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。

将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮5分钟。

饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右,预备使用。

参照"食用量建议表",将准确份量的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。

盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。

滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平勺)	8
温开水量(毫升)	240
每天喂哺(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉 (来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K1(植物甲萘醌)、维生素 B1(盐酸硫胺素)、维生素 B2(核黄素)、维生素 B6(盐酸吡哆醇)、维生素 B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有乳成分

爱心提示

①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息

生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:WWW.china-hxry.com.cn

生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10767-2021
产品属性及类别:乳基粉状幼儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月

全国客服热线:4008-168-698

清洁环境 爱护自然

6 920486 048188

美羚® MEILING

国食注字 YP20230404

羚恩贝贝

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄,3段)



3段

净含量:400克

生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2015**
蛋白质	**g**	**0.73**	**14.80**
脂肪	**g**	**1.14**	**23.00**
亚油酸	g	0.15	3.00
α-亚麻酸	mg	15	303
碳水化合物	**g**	**2.6**	**52.0**
维生素			
维生素A	μg RE	23	454
维生素D	μg	0.62	12.50
维生素E	mg α-TE	0.29	5.80
维生素K_1	μg	2.00	40.30
维生素B_1	μg	21	425
维生素B_2	μg	24	484
维生素B_6	μg	16.4	330.0
维生素B_{12}	μg	0.119	2.400
烟酸(烟酰胺)	μg	159	3200
叶酸	μg	3.2	64.0
泛酸	μg	133	2680
维生素C	mg	3.1	62.0
生物素	μg	0.74	15.00
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	27	553
铜	μg	14.0	283.0
镁	mg	2.1	43.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	25	498
磷	mg	15	303
碘	μg	5.0	100.0
氯	mg	15	302
可选择成分			
硒	μg	0.72	14.50
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	2.48	50.00
肌醇	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	13.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	85.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.9	140.0
低聚半乳糖	g	0.16	3.20
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	1.09	22.00

注:即食状态下,每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

标签 23

食用方法



1 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净，用沸水煮5分钟。
3 饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右，预备使用。
4 参照"食用量建议表"，将准确份量的水倒入奶瓶，使用专用量勺加入奶粉。
5 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6 滴一滴奶液在手背测试温度，确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平勺)	8
温开水量(毫升)	240
每天喂哺(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定，仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠）、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素[维生素 A（醋酸视黄酯）、维生素 D（胆钙化醇）、维生素 E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素 K_1（植物甲萘醌）、维生素 B_1（盐酸硫胺素）、维生素 B_2（核黄素）、维生素 B_6（盐酸吡哆醇）、维生素 B_{12}（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素 C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、胆碱（氯化胆碱）]、矿物质（硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠）、碳酸钾。

致敏物质：本产品含有乳成分

爱心提示

①冲调奶时注意使用温开水（40℃-50℃）并按照食用量建议表进行冲调，冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时，请使用本产品配套专用量勺，每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝，疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉，勿留下次喂养，每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中，应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

贮存条件

开罐前	①请常温保存，避免长期处于高温下，如开罐前发现封口破损，请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧，并放置阴凉、干燥处，切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息
生产企业名称：陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址：陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话：0913-8214088
网址：WWW.china-hxry.com.cn

生产许可证编号：SC12961052800859
产品标准代号：GB 10767-2021
产品属性及类别：乳基粉状幼儿配方食品
产地：陕西 渭南 富平
保质期：24个月

全国客服热线：4008-168-698

清洁环境 爱护自然

6 920486 000384

美羚® MEILING

国食注字 YP20230404

羚恩贝贝

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄，3段)



3段

净含量：800克

生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2015
蛋白质	g	0.73	14.80
脂肪	g	1.14	23.00
亚油酸	g	0.15	3.00
α-亚麻酸	mg	15	303
碳水化合物	g	2.6	52.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	454
维生素D	μg	0.62	12.50
维生素E	mg α-TE	0.29	5.80
维生素 K_1	μg	2.00	40.30
维生素 B_1	μg	21	425
维生素 B_2	μg	24	484
维生素 B_6	μg	16.4	330.0
维生素 B_{12}	μg	0.119	2.400
烟酸（烟酰胺）	μg	159	3200
叶酸	μg	3.2	64.0
泛酸	μg	133	2680
维生素C	mg	3.1	62.0
生物素	μg	0.74	15.00
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	27	553
铜	μg	14.0	283.0
镁	mg	2.1	43.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	25	498
磷	mg	15	303
碘	μg	5.0	100.0
氯	mg	15	302
可选择成分			
硒	μg	0.72	14.50
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	2.48	50.00
肌醇	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	13.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	85.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.9	140.0
低聚半乳糖	g	0.16	3.20
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	1.09	22.00

注：即食状态下，每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

标签 24

食用方法



1 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净，用沸水煮5分钟。
3 饮用水煮沸5分钟冷却至40℃-50℃左右，预备使用。
4 参照"食用量建议表"，将准确份量的水倒入奶瓶，使用专用量勺加入奶粉。
5 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6 滴一滴奶液在手背测试温度，确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平勺)	8
温开水量(毫升)	240
每天喂哺(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定，仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-乌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K_1(植物甲萘醌)、维生素 B_1(盐酸硫胺素)、维生素 B_2(核黄素)、维生素 B_6(盐酸吡哆醇)、维生素 B_{12}(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有乳成分

爱心提示

①冲调奶时注意使用温开水(40℃-50℃)并按照食用量建议表进行冲调，冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时，请使用本产品配套专用量勺，每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝，疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉，勿留于下次喂养，每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中，应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

贮存条件

开罐前	①请常温保存，避免长期处于高温下，如开罐前发现封口破损，请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧，并放置阴凉、干燥处，切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

企业信息
生产企业名称：陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址：陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话：0913-8214088
网址：WWW.china-hxry.com.cn

生产许可证编号：SC12961052800859
产品标准代号：GB 10767-2021
产品属性及类别：乳基粉状幼儿配方食品
产地：陕西 渭南 富平
保质期：24个月

全国客服热线:4008-168-698

清洁环境 爱护自然

6 920486 048157

美羚® MEILING

国食注字 YP20230404

羚恩贝贝

幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄，3段)



3段

净含量:850克

生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2015**
蛋白质	**g**	**0.73**	**14.80**
脂肪	**g**	**1.14**	**23.00**
亚油酸	g	0.15	3.00
α-亚麻酸	mg	15	303
碳水化合物	**g**	**2.6**	**52.0**
维生素			
维生素A	μg RE	23	454
维生素D	μg	0.62	12.50
维生素E	mg α-TE	0.29	5.80
维生素 K_1	μg	2.00	40.30
维生素 B_1	μg	21	425
维生素 B_2	μg	24	484
维生素 B_6	μg	16.4	330.0
维生素 B_{12}	μg	0.119	2.400
烟酸(烟酰胺)	μg	159	3200
叶酸	μg	3.2	64.0
泛酸	μg	133	2680
维生素C	mg	3.1	62.0
生物素	μg	0.74	15.00
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	27	553
铜	μg	14.0	283.0
镁	mg	2.1	43.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	25	498
磷	mg	15	303
碘	μg	5.0	100.0
氯	mg	15	302
可选择成分			
硒	μg	0.72	14.50
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	2.48	50.00
肌醇	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	13.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	85.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.9	140.0
低聚半乳糖	g	0.16	3.20
低聚果糖	g	0.02	0.40
核苷酸	mg	1.09	22.00

注:即食状态下，每100mL含幼儿配方羊奶粉13.5克。

标签 25

食用方法



1 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖等清洗干净,用沸水煮5分钟。
3 饮用水煮沸5分钟冷却45℃-55℃左右,预备使用。
4 参照"食用量建议表",将准确体积的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。
5 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。
6 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平勺)	2	3	4	5	6	7
每天喂哺(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、核桃油、乳铁蛋白、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有坚果、乳成分

爱心提示及特别提示

爱心提示:①冲调奶时注意使用温开水(45℃-55℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
特别提示:对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

全国客服热线:4008-168-698

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

曾用名:富羊羊
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10765-2021
产品属性及类别:乳基粉状婴儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月

清洁环境 爱护自然 6 920486 001640

美羚® MEILING

多养慧

国食注字 YP20170615



婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) 1段

净含量:100克 生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2076
蛋白质	g	0.57	11.80
脂肪	g	1.19	24.80
亚油酸	g	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	15	312
碳水化合物	g	2.6	55.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	383
维生素D	μg	0.60	12.40
维生素E	mg α-TE	0.29	6.00
维生素K1	μg	1.70	35.20
维生素B1	μg	21	434
维生素B2	μg	33	687
维生素B6	μg	17.6	366.0
维生素B12	μg	0.096	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	145	3000
维生素C	mg	4.3	90.0
生物素	μg	0.75	15.50
胆碱	mg	6.0	125.0
矿物质			
钠	mg	9	182
钾	mg	22	447
铜	μg	18.0	373.0
镁	mg	1.8	38.0
铁	mg	0.22	4.50
锌	mg	0.22	4.50
锰	μg	2.65	55.00
钙	mg	15	314
磷	mg	10	208
碘	μg	4.5	94.0
氯	mg	15	320
硒	μg	0.90	18.70
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.1	23.0
左旋肉碱	mg	0.8	15.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.4	153.0
低聚半乳糖	g	0.08	1.70
低聚果糖	g	0.06	1.20
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.5
乳铁蛋白	mg	1.5	31.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.2	45.7

注:每100mL奶液=13.5克婴儿配方羊奶粉+90mL温开水。

标签 26

食用方法



1 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖等清洗干净,用沸水煮5分钟。
3 饮用水煮沸5分钟冷却45℃-55℃左右,预备使用。
4 参照"食用量建议表",将准确体积的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。
5 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。
6 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平勺)	2	3	4	5	6	7
每天喂哺(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、核桃油、乳铁蛋白、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有坚果、乳成分

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

爱心提示及特别提示

爱心提示:①冲调奶时注意使用温开水(45℃-55℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
特别提示:对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

全国客服热线:4008-168-698

曾用名 富羊羊
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10765-2021
产品属性及类别:乳基粉状婴儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月

清洁环境 爱护自然

6 920486 001657

美羚® MEILING

国食注字 YP20170615

多养慧



婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) 1段

净含量:400克 生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2076
蛋白质	g	0.57	11.80
脂肪	g	1.19	24.80
亚油酸	g	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	15	312
碳水化合物	g	2.6	55.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	383
维生素D	μg	0.60	12.40
维生素E	mg α-TE	0.29	6.00
维生素K_1	μg	1.70	35.20
维生素B_1	μg	21	434
维生素B_2	μg	33	687
维生素B_6	μg	17.6	366.0
维生素B_{12}	μg	0.096	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	145	3000
维生素C	mg	4.3	90.0
生物素	μg	0.75	15.50
胆碱	mg	6.0	125.0
矿物质			
钠	mg	9	182
钾	mg	22	447
铜	μg	18.0	373.0
镁	mg	18	38.0
铁	mg	0.22	4.50
锌	mg	0.22	4.50
锰	μg	2.65	55.00
钙	mg	15	314
磷	mg	10	208
碘	μg	4.5	94.0
氯	mg	15	320
硒	μg	0.90	18.70
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.1	23.0
左旋肉碱	mg	0.8	15.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.4	153.0
低聚半乳糖	g	0.08	1.70
低聚果糖	g	0.06	1.20
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.5
乳铁蛋白	mg	15	310
酪蛋白磷酸肽	mg	2.2	45.7

注:每100mL奶液=13.5克婴儿配方羊奶粉+90mL温开水。

标签 27

食用方法



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖等清洗干净。用沸水煮5分钟。
3. 饮用水煮沸5分钟冷却45℃-55℃左右，预备使用。
4. 参照"食用量建议表"，将准确体积的水倒入奶瓶，使用专用量勺加入奶粉。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度，确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平勺)	2	3	4	5	6	7
每天喂哺(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、核桃油、乳铁蛋白、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K_1(植物甲萘醌)、维生素B_1(盐酸硫胺素)、维生素B_2(核黄素)、维生素B_6(盐酸吡哆醇)、维生素B_{12}(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有坚果、乳成分

爱心提示及特别提示

爱心提示:
①冲调奶时注意使用温开水(45℃-55℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
特别提示:
对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

全国客服热线:4008-168-698

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

曾用名:富羊羊
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:WWW.china-hxry.com.cn
生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10765-2021
产品属性及类别:乳基粉状婴儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月


清洁环境
爱护自然

6 920486 001664

美羚® MEILING

国食注字 YP20170615

多养慧



婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段) 1段

净含量:800克 生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2076
蛋白质	g	0.57	11.80
脂肪	g	1.19	24.80
亚油酸	g	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	15	312
碳水化合物	g	2.6	55.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	383
维生素D	μg	0.60	12.40
维生素E	mg α-TE	0.29	6.00
维生素K_1	μg	1.70	35.20
维生素B_1	μg	21	434
维生素B_2	μg	33	687
维生素B_6	μg	17.6	366.0
维生素B_{12}	μg	0.096	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	145	3000
维生素C	mg	4.3	90.0
生物素	μg	0.75	15.50
胆碱	mg	6.0	125.0
矿物质			
钠	mg	9	182
钾	mg	22	447
铜	μg	18.0	373.0
镁	mg	1.8	38.0
铁	mg	0.22	4.50
锌	mg	0.22	4.50
锰	μg	2.65	55.00
钙	mg	15	314
磷	mg	10	208
碘	μg	4.5	94.0
氯	mg	15	320
硒	μg	0.90	18.70
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.1	23.0
左旋肉碱	mg	0.8	15.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.4	153.0
低聚半乳糖	g	0.08	1.70
低聚果糖	g	0.06	1.20
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.5
乳铁蛋白	mg	1.5	31.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.2	45.7

注:每100mL奶液=13.5克婴儿配方羊奶粉+90mL温开水。

标签 28

食用方法



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖等清洗干净。用沸水煮5分钟。
3. 饮用水煮沸5分钟冷却45℃-55℃左右，预备使用。
4. 参照"食用量建议表"，将准确体积的水倒入奶瓶，使用专用量勺加入奶粉。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度，确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

婴儿月龄	0-1周	1-2周	2周-1个月	1-2个月	3-4个月	4-6个月
婴儿体重(千克)	约3	≤3.5	3-4.5	4-5.5	5-7	6-7.5
温开水量(毫升)	60	90	120	150	180	210
奶粉量(平勺)	2	3	4	5	6	7
每天喂哺(次)	7-8	6-7	5-6	5-6	4-5	4-5

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 -2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、核桃油、乳铁蛋白、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K_1(植物甲萘醌)、维生素 B_1(盐酸硫胺素)、维生素 B_2(核黄素)、维生素 B_6(盐酸吡哆醇)、维生素 B_{12}(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有坚果、乳成分

爱心提示及特别提示

爱心提示:
①冲调奶时注意使用温开水(45℃-55℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉
特别提示:
对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

曾用名:富羊羊
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:WWW.china-hxry.com.cn
生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10765-2021
产品属性及类别:乳基粉状婴儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月

清洁环境
爱护自然

6 920486 002524

全国客服热线:4008-168-698

美羚® MEILING

国食注字 YP20170615

多养慧



婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段) 1段

净含量:850克 生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2076**
蛋白质	**g**	**0.57**	**11.80**
脂肪	**g**	**1.19**	**24.80**
亚油酸	g	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	15	312
碳水化合物	**g**	**2.6**	**55.0**
维生素			
维生素A	μg RE	18	383
维生素D	μg	0.60	12.40
维生素E	mg α-TE	0.29	6.00
维生素 K_1	μg	1.70	35.20
维生素 B_1	μg	21	434
维生素 B_2	μg	33	687
维生素 B_6	μg	17.6	366.0
维生素 B_{12}	μg	0.096	2.000
烟酸(烟酰胺)	μg	145	3000
叶酸	μg	3.9	80.0
泛酸	μg	145	3000
维生素C	mg	4.3	90.0
生物素	μg	0.75	15.50
胆碱	mg	6.0	125.0
矿物质			
钠	mg	9	182
钾	mg	22	447
铜	μg	18.0	373.0
镁	mg	1.8	38.0
铁	mg	0.22	4.50
锌	mg	0.22	4.50
锰	μg	2.65	55.00
钙	mg	15	314
磷	mg	10	208
碘	μg	4.5	94.0
氯	mg	15	320
硒	μg	0.90	18.70
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.1	23.0
左旋肉碱	mg	0.8	15.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.4	153.0
低聚半乳糖	g	0.08	1.70
低聚果糖	g	0.06	1.20
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.5
乳铁蛋白	mg	1.5	31.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.2	45.7

注:每100mL奶液=13.5克婴儿配方羊奶粉+90mL温开水。

标签 29

食用方法



1 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖等清洗干净,用沸水煮5分钟。
3 饮用水煮沸5分钟冷却45℃-55℃左右,预备使用。
4 参照"食用量建议表",将准确体积的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。
5 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。
6 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平勺)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天喂哺(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉 (来源羊乳)、食用植物调和油 (大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸 -2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳清蛋白粉 (来源羊乳)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、核桃油、乳铁蛋白、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有坚果、乳成分

爱心提示及特别提示

爱心提示:①冲调奶时注意使用温开水(45℃-55℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
特别提示:须配合添加辅助食品。

全国客服热线:4008-168-698

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。


曾用名 富羊羊
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10766-2021
产品属性及类别:乳基粉状较大婴儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月

清洁环境 爱护自然 6 920486 001671

美羚® MEILING

国食注字 YP20170616

多养慧



较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄,2段) 2段

净含量:100克 生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2044
蛋白质	g	0.67	13.70
脂肪	g	1.16	23.70
亚油酸	g	0.18	3.60
α-亚麻酸	mg	15	315
碳水化合物	g	2.6	53.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	465
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.25	5.11
维生素K_1	μg	1.96	40.00
维生素B_1	μg	24	497
维生素B_2	μg	30	613
维生素B_6	μg	16.2	332.0
维生素B_{12}	μg	0.112	2.280
烟酸(烟酰胺)	μg	152	3100
叶酸	μg	3.2	65.0
泛酸	μg	140	2862
维生素C	mg	4.0	81.0
生物素	μg	0.67	13.60
胆碱	mg	6.0	123.0
矿物质			
钠	mg	5	104
钾	mg	23	470
铜	μg	12.0	245.0
镁	mg	2.0	41.0
铁	mg	0.30	6.13
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	2.45	50.00
钙	mg	22	450
磷	mg	14	281
碘	μg	4.5	92.0
氯	mg	15	307
硒	μg	0.71	14.60
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.9
牛磺酸	mg	1.4	28.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.2
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.3	150.0
低聚半乳糖	g	0.12	2.50
低聚果糖	g	0.06	1.20
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.1
乳铁蛋白	mg	1.6	32.7
酪蛋白磷酸肽	mg	2.3	47.0

注:每100mL奶液=14.1克较大婴儿配方羊奶粉+90mL温开水。

标签 30

食用方法



1 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖等清洗干净,用沸水煮5分钟。
3 饮用水煮沸5分钟冷却45℃-55℃左右,预备使用。
4 参照"食用量建议表",将准确体积的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。
5 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。
6 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平勺)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天喂哺(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉 (来源羊乳)、食用植物调和油 (大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳清蛋白粉 (来源羊乳)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、核桃油、乳铁蛋白、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有坚果、乳成分

爱心提示及特别提示

爱心提示:①冲调奶时注意使用温开水(45℃-55℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。
特别提示:须配合添加辅助食品。

全国客服热线:4008-168-698

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

曾用名:富羊羊
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10766-2021
产品属性及类别:乳基粉状较大婴儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月


清洁环境 爱护自然

6 920486 001688

美羚® MEILING

国食注字 YP20170616

多养慧



较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) 2段

净含量:400克 生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2044
蛋白质	g	0.67	13.70
脂肪	g	1.16	23.70
亚油酸	g	0.18	3.60
α-亚麻酸	mg	15	315
碳水化合物	g	2.6	53.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	465
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.25	5.11
维生素K1	μg	1.96	40.00
维生素B1	μg	24	497
维生素B2	μg	30	613
维生素B6	μg	16.2	332.0
维生素B12	μg	0.112	2.280
烟酸(烟酰胺)	μg	152	3100
叶酸	μg	3.2	65.0
泛酸	μg	140	2862
维生素C	mg	4.0	81.0
生物素	μg	0.67	13.60
胆碱	mg	6.0	123.0
矿物质			
钠	mg	5	104
钾	mg	23	470
铜	μg	12.0	245.0
镁	mg	2.0	41.0
铁	mg	0.30	6.13
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	2.45	50.00
钙	mg	22	450
磷	mg	14	281
碘	μg	4.5	92.0
氯	mg	15	307
硒	μg	0.71	14.60
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.9
牛磺酸	mg	1.4	28.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.2
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸 (AA/ARA)	mg	7.3	150.0
低聚半乳糖	g	0.12	2.50
低聚果糖	g	0.06	1.20
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.1
乳铁蛋白	mg	1.6	32.7
酪蛋白磷酸肽	mg	2.3	47.0

注:每100mL奶液=14.1克较大婴儿配方羊奶粉+90mL温开水。

标签 31

食用方法



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖等清洗干净,用沸水煮5分钟。
3. 饮用水煮沸5分钟冷却45℃-55℃左右,预备使用。
4. 参照"食用量建议表",将准确体积的水倒入奶瓶,使用专用量勺加入奶粉。
5. 盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平勺)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天喂哺(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、核桃油、乳铁蛋白、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K_1(植物甲萘醌)、维生素B_1(盐酸硫胺素)、维生素B_2(核黄素)、维生素B_6(盐酸吡哆醇)、维生素B_{12}(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有坚果、乳成分

爱心提示及特别提示

爱心提示:
①冲调奶时注意使用温开水(45℃-55℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示:
须配合添加辅助食品。

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

曾用名:富羊羊
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:WWW.china-hxry.com.cn
生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10766-2021
产品属性及类别:乳基粉状较大婴儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月

清洁环境
爱护自然

6 920486 001695

全国客服热线:4008-168-698

美羚® MEILING

国食注字 YP20170616

多养慧



较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) 2段

净含量:800克 生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2044**
蛋白质	**g**	**0.67**	**13.70**
脂肪	**g**	**1.16**	**23.70**
亚油酸	g	0.18	3.60
α-亚麻酸	mg	15	315
碳水化合物	**g**	**2.6**	**53.2**
维生素			
维生素A	μg RE	23	465
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.25	5.11
维生素K_1	μg	1.96	40.00
维生素B_1	μg	24	497
维生素B_2	μg	30	613
维生素B_6	μg	16.2	332.0
维生素B_{12}	μg	0.112	2.280
烟酸(烟酰胺)	μg	152	3100
叶酸	μg	3.2	65.0
泛酸	μg	140	2862
维生素C	mg	4.0	81.0
生物素	μg	0.67	13.60
胆碱	mg	6.0	123.0
矿物质			
钠	mg	5	104
钾	mg	23	470
铜	μg	12.0	245.0
镁	mg	2.0	41.0
铁	mg	0.30	6.13
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	2.45	50.00
钙	mg	22	450
磷	mg	14	281
碘	μg	4.5	92.0
氯	mg	15	307
硒	μg	0.71	14.60
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.9
牛磺酸	mg	1.4	28.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.2
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.3	150.0
低聚半乳糖	g	0.12	2.50
低聚果糖	g	0.06	1.20
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.1
乳铁蛋白	mg	1.6	32.7
酪蛋白磷酸肽	mg	2.3	47.0

注:每100mL奶液=14.1克较大婴儿配方羊奶粉+90mL温开水。

标签 32

食用方法



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖等清洗干净。用沸水煮5分钟。
3. 饮用水煮沸5分钟冷却45℃-55℃左右，预备使用。
4. 参照"食用量建议表"，将准确体积的水倒入奶瓶，使用专用量勺加入奶粉。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度，确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

较大婴儿月龄	6-8个月	8-12个月
奶粉量(平勺)	7	8
温开水量(毫升)	210	240
每天喂哺(次)	4	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、核桃油、乳铁蛋白、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K_1(植物甲萘醌)、维生素B_1(盐酸硫胺素)、维生素B_2(核黄素)、维生素B_6(盐酸吡哆醇)、维生素B_{12}(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、胆碱(氯化胆碱)]、矿物质(硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有坚果、乳成分

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

爱心提示及特别提示

爱心提示:

①冲调奶时注意使用温开水(45℃-55℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。

②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。

③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。

⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

特别提示:

须配合添加辅助食品。

全国客服热线:4008-168-698

曾用名:富羊羊
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:WWW.china-hxry.com.cn
生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10766-2021
产品属性及类别:乳基粉状较大婴儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月

清洁环境
爱护自然

6 920486 002531

美羚® MEILING

国食注字 YP20170616

多养慧



较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄,2段) 2段

净含量:850克 生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2044**
蛋白质	**g**	**0.67**	**13.70**
脂肪	**g**	**1.16**	**23.70**
亚油酸	g	0.18	3.60
α-亚麻酸	mg	15	315
碳水化合物	**g**	**2.6**	**53.2**
维生素			
维生素A	μg RE	23	465
维生素D	μg	0.61	12.50
维生素E	mg α-TE	0.25	5.11
维生素K_1	μg	1.96	40.00
维生素B_1	μg	24	497
维生素B_2	μg	30	613
维生素B_6	μg	16.2	332.0
维生素B_{12}	μg	0.112	2.280
烟酸(烟酰胺)	μg	152	3100
叶酸	μg	3.2	65.0
泛酸	μg	140	2862
维生素C	mg	4.0	81.0
生物素	μg	0.67	13.60
胆碱	mg	6.0	123.0
矿物质			
钠	mg	5	104
钾	mg	23	470
铜	μg	12.0	245.0
镁	mg	2.0	41.0
铁	mg	0.30	6.13
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	2.45	50.00
钙	mg	22	450
磷	mg	14	281
碘	μg	4.5	92.0
氯	mg	15	307
硒	μg	0.71	14.60
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.9
牛磺酸	mg	1.4	28.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.2
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.3	150.0
低聚半乳糖	g	0.12	2.50
低聚果糖	g	0.06	1.20
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.1
乳铁蛋白	mg	1.6	32.7
酪蛋白磷酸肽	mg	2.3	47.0

注:每100mL奶液=14.1克较大婴儿配方羊奶粉+90mL温开水。

标签 33

食用方法



1 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。

2 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖等清洗干净，用沸水煮5分钟。

3 饮用水煮沸5分钟冷却45℃-55℃左右，预备使用。

4 参照"食用量建议表"，将准确体积的水倒入奶瓶，使用专用量勺加入奶粉。

5 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。

6 滴一滴奶液在手背测试温度，确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平勺)	8
温开水量(毫升)	240
每天喂哺(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定，仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、核桃油、乳铁蛋白、胆碱(氯化胆碱)、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)]、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有坚果、乳成分

爱心提示

爱心提示:①冲调奶时注意使用温开水(45℃-55℃)并按照食用量建议表进行冲调，冲调好的奶液应及时食用。

②冲调奶时，请使用本产品配套专用量勺，每平勺奶粉净含量约为4.5克。

③喂养时应抱着宝宝，疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。

④喂养剩余奶液请弃掉，勿留于下次喂养，每次喂养请重新冲调。

⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中，应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

全国客服热线:4008-168-698

贮存条件

开罐前	①请常温保存，避免长期处于高温下，如开罐前发现封口破损，请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧，并放置阴凉、干燥处，切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

曾用名 富羊羊
生产企业名称: 陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址: 陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话: 0913-8214088
网址: www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号: SC12961052800859
产品标准代号: GB 10767-2021
产品属性及类别: 乳基粉状幼儿配方食品
产地: 陕西 渭南 富平
保质期: 24个月


清洁环境 爱护自然

6 920486 001701

美羚® MEILING

国食注字 YP20170617

多养慧



幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段) 3段

净含量:100克 生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2020
蛋白质	g	0.74	15.00
脂肪	g	1.14	23.00
亚油酸	g	0.16	3.16
α-亚麻酸	mg	15	302
碳水化合物	g	2.6	52.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	464
维生素D	μg	0.62	12.60
维生素E	mg α-TE	0.28	5.70
维生素K_1	μg	1.98	40.00
维生素B_1	μg	22	437
维生素B_2	μg	25	505
维生素B_6	μg	16.4	332.0
维生素B_{12}	μg	0.112	2.260
烟酸(烟酰胺)	μg	158	3200
叶酸	μg	3.1	63.0
泛酸	μg	128	2586
维生素C	mg	4.0	81.0
生物素	μg	0.72	14.50
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	464
铜	μg	14.8	299.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	23	455
磷	mg	14	278
碘	μg	4.9	98.0
氯	mg	16	323
可选择成分			
硒	μg	0.73	14.80
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	3.08	62.22
肌醇	mg	2.2	45.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.5	9.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	92.0
二十碳四烯酸 (AA/ARA)	mg	7.6	154.0
低聚半乳糖	g	0.12	2.50
低聚果糖	g	0.06	1.20
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.7
乳铁蛋白	mg	1.6	32.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.3	46.5

注:每100mL奶液=14.1克幼儿配方羊奶粉+90mL温开水。

标签 34

食用方法



1 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖等清洗干净，用沸水煮5分钟。
3 饮用水煮沸5分钟冷却45℃-55℃左右，预备使用。
4 参照"食用量建议表"，将准确体积的水倒入奶瓶，使用专用量勺加入奶粉。
5 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6 滴一滴奶液在手背测试温度，确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平勺)	8
温开水量(毫升)	240
每天喂哺(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定，仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、核桃油、乳铁蛋白、胆碱(氯化胆碱)、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素[维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)]、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有坚果、乳成分

爱心提示

爱心提示：①冲调奶时注意使用温开水(45℃-55℃)并按照食用量建议表进行冲调，冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时，请使用本产品配套专用量勺，每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝，疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉，勿留于下次喂养，每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中，应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

全国客服热线:4008-168-698

贮存条件

开罐前	①请常温保存，避免长期处于高温下，如开罐前发现封口破损，请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧，并放置阴凉、干燥处，切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。


曾用名 富羊羊
生产企业名称：陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址：陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话：0913-8214088
网址：www.china-hxry.com.cn
生产许可证编号：SC12961052800859
产品标准代号：GB 10767-2021
产品属性及类别：乳基粉状幼儿配方食品
产地：陕西 渭南 富平
保质期：24个月

清洁环境 爱护自然
6 920486 001718

美羚® MEILING

国食注字 YP20170617

多养慧



幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄，3段) 3段

净含量:400克 生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2020
蛋白质	g	0.74	15.00
脂肪	g	1.14	23.00
亚油酸	g	0.16	3.16
α-亚麻酸	mg	15	302
碳水化合物	g	2.6	52.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	464
维生素D	μg	0.62	12.60
维生素E	mg α-TE	0.28	5.70
维生素K1	μg	1.98	40.00
维生素B1	μg	22	437
维生素B2	μg	25	505
维生素B6	μg	16.4	332.0
维生素B12	μg	0.112	2.260
烟酸(烟酰胺)	μg	158	3200
叶酸	μg	3.1	63.0
泛酸	μg	128	2586
维生素C	mg	4.0	81.0
生物素	μg	0.72	14.50
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	464
铜	μg	14.8	299.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	23	455
磷	mg	14	278
碘	μg	4.9	98.0
氯	mg	16	323
可选择成分			
硒	μg	0.73	14.80
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	3.08	62.22
肌醇	mg	2.2	45.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.5	9.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	92.0
二十碳四烯酸 (AA/ARA)	mg	7.6	154.0
低聚半乳糖	g	0.12	2.50
低聚果糖	g	0.06	1.20
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.7
乳铁蛋白	mg	1.6	32.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.3	46.5

注:每100mL奶液=14.1克幼儿配方羊奶粉+90mL温开水。

标签 35

食用方法



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖等清洗干净。用沸水煮5分钟。
3. 饮用水煮沸5分钟冷却45℃-55℃左右，预备使用。
4. 参照"食用量建议表"，将准确体积的水倒入奶瓶，使用专用量勺加入奶粉。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度，确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平勺)	8
温开水量(毫升)	240
每天喂哺(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、核桃油、乳铁蛋白、胆碱(氯化胆碱)、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K_1(植物甲萘醌)、维生素 B_1(盐酸硫胺素)、维生素 B_2(核黄素)、维生素 B_6(盐酸吡哆醇)、维生素 B_{12}(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)]、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有坚果、乳成分

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

爱心提示

爱心提示:
①冲调奶时注意使用温开水(45℃-55℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

曾用名:富羊羊
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:WWW.china-hxry.com.cn
生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10767-2021
产品属性及类别:乳基粉状幼儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月

清洁环境
爱护自然

6 920486 001725

全国客服热线:4008-168-698

美羚® MEILING

国食注字 YP20170617

多养慧



幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段) 3段

净含量:800克 生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2020**
蛋白质	**g**	**0.74**	**15.00**
脂肪	**g**	**1.14**	**23.00**
亚油酸	g	0.16	3.16
α-亚麻酸	mg	15	302
碳水化合物	**g**	**2.6**	**52.0**
维生素			
维生素A	μg RE	23	464
维生素D	μg	0.62	12.60
维生素E	mg α-TE	0.28	5.70
维生素K_1	μg	1.98	40.00
维生素B_1	μg	22	437
维生素B_2	μg	25	505
维生素B_6	μg	16.4	332.0
维生素B_{12}	μg	0.112	2.260
烟酸(烟酰胺)	μg	158	3200
叶酸	μg	3.1	63.0
泛酸	μg	128	2586
维生素C	mg	4.0	81.0
生物素	μg	0.72	14.50
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	464
铜	μg	14.8	299.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	23	455
磷	mg	14	278
碘	μg	4.9	98.0
氯	mg	16	323
可选择成分			
硒	μg	0.73	14.80
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	3.08	62.22
肌醇	mg	2.2	45.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.5	9.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	92.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.6	154.0
低聚半乳糖	g	0.12	2.50
低聚果糖	g	0.06	1.20
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.7
乳铁蛋白	mg	1.6	32.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.3	46.5

注:每100mL奶液=14.1克幼儿配方羊奶粉+90mL温开水。

标签 36

食用方法



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖等清洗干净。用沸水煮5分钟。
3. 饮用水煮沸5分钟冷却45℃-55℃左右，预备使用。
4. 参照"食用量建议表"，将准确体积的水倒入奶瓶，使用专用量勺加入奶粉。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度，确定温度适宜时即可喂哺。

食用量建议表

幼儿月龄	12-36个月
奶粉量(平勺)	8
温开水量(毫升)	240
每天喂哺(次)	3

注:以上的食用量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、核桃油、乳铁蛋白、胆碱(氯化胆碱)、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素[维生素 A(醋酸视黄酯)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 K_1(植物甲萘醌)、维生素 B_1(盐酸硫胺素)、维生素 B_2(核黄素)、维生素 B_6(盐酸吡哆醇)、维生素 B_{12}(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素 C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)]、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠)、碳酸钾。

致敏物质:本产品含有坚果、乳成分

贮存条件

开罐前	①请常温保存,避免长期处于高温下,如开罐前发现封口破损,请勿再食用。 ②请在保质期前食用完该产品。
开罐后	①请将盖子盖紧,并放置阴凉、干燥处,切忌将奶粉倒入另一容器中保存食用。 ②建议在一个月内将本产品食用完。

爱心提示

爱心提示:
①冲调奶时注意使用温开水(45℃-55℃)并按照食用量建议表进行冲调,冲调好的奶液应及时食用。
②冲调奶时,请使用本产品配套专用量勺,每平勺奶粉净含量约为4.5克。
③喂养时应抱着宝宝,疏忽照顾可能引起宝宝打嗝或其他不适。
④喂养剩余奶液请弃掉,勿留于下次喂养,每次喂养请重新冲调。
⑤切忌将奶粉长时间暴露在空气中,应随手盖紧奶粉罐或密封奶粉袋。

全国客服热线:4008-168-698

曾用名:富羊羊
生产企业名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司
地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路52号
电话:0913-8214088
网址:WWW.china-hxry.com.cn
生产许可证编号:SC12961052800859
产品标准代号:GB 10767-2021
产品属性及类别:乳基粉状幼儿配方食品
产地:陕西 渭南 富平
保质期:24个月

清洁环境
爱护自然

6 920486 002548

美羚® MEILING

多养慧

国食注字 YP20170617



幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄,3段) 3段

净含量:850克 生产日期、保质期到期日、批号和溯源信息见罐底部喷码区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2020**
蛋白质	**g**	**0.74**	**15.00**
脂肪	**g**	**1.14**	**23.00**
亚油酸	g	0.16	3.16
α-亚麻酸	mg	15	302
碳水化合物	**g**	**2.6**	**52.0**
维生素			
维生素A	μg RE	23	464
维生素D	μg	0.62	12.60
维生素E	mg α-TE	0.28	5.70
维生素K_1	μg	1.98	40.00
维生素B_1	μg	22	437
维生素B_2	μg	25	505
维生素B_6	μg	16.4	332.0
维生素B_{12}	μg	0.112	2.260
烟酸(烟酰胺)	μg	158	3200
叶酸	μg	3.1	63.0
泛酸	μg	128	2586
维生素C	mg	4.0	81.0
生物素	μg	0.72	14.50
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	23	464
铜	μg	14.8	299.0
镁	mg	2.0	40.0
铁	mg	0.32	6.50
锌	mg	0.18	3.60
钙	mg	23	455
磷	mg	14	278
碘	μg	4.9	98.0
氯	mg	16	323
可选择成分			
硒	μg	0.73	14.80
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	3.08	62.22
肌醇	mg	2.2	45.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.5	9.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	92.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.6	154.0
低聚半乳糖	g	0.12	2.50
低聚果糖	g	0.06	1.20
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.7
乳铁蛋白	mg	1.6	32.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.3	46.5

注:每100mL奶液=14.1克幼儿配方羊奶粉+90mL温开水。