附件 2：陕西美力源乳业集团有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签1：



标签2：

美力源®
Mileyn®

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

陕西美力源乳业集团有限公司

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西-咸阳
产品标准代码：GB 10765-2021
产品类别、属性及状态：婴儿配方乳粉、乳基粉状

冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。
3. 参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完。将喂剩下的奶液弃掉。

温馨提示：
1. 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2. 喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。

6 955801 119298

美力源®
Mileyn®



美力源®
婴儿配方羊奶粉
（0-6月龄，1段）

国食注字 YP 20230202

1 段

净含量：300克

生产日期及保质期到期日见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	**100**	**2107**
蛋白质	g	**0.55**	**11.49**
脂肪	g	**1.31**	**27.57**
亚油酸	g	0.19	4.040
α-亚麻酸	mg	18.15	382.33
碳水化合物	g	**2.4**	**50.64**
维生素			
维生素A	μg RE	15	323
维生素D	μg	0.484	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.33
维生素K_1	μg	2.72	57.28
维生素B_1	μg	25	532
维生素B_2	μg	57	1198
维生素B_6	μg	18.1	380.6
维生素B_{12}	μg	0.109	2.299
烟酸(烟酰胺)	μg	207	4366
叶酸	μg	5.1	107
泛酸	μg	154	3253
维生素C	mg	4.2	87.8
生物素	μg	0.96	20.26
胆碱	mg	6.3	131.8
矿物质			
钠	mg	7.21	152
钾	mg	22	474
铜	μg	15.4	325.3
镁	mg	1.7	36.6
铁	mg	0.17	3.58
锌	mg	0.18	3.897
锰	μg	3.07	64.72
钙	mg	21	444
磷	mg	13	282
碘	μg	4.9	103.5
氯	mg	17	360
硒	μg	0.74	15.52
可选择成分			
肌醇	mg	3.6	75.6
牛磺酸	mg	1.4	29
左旋肉碱	mg	1.8	37.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.3	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	100.1
低聚半乳糖	mg	141.53	2982
低聚果糖	mg	38.87	819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	217.56	4584
乳铁蛋白	mg	1.7	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	6.13	129.18

注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量(ml)	奶粉用量(平勺)
0-2周	8-10	30-90	1-3
2周-1月龄	6-7	90-120	3-4
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5-6	120-180	4-6
4-6月龄	5	180-210	6-7

注意：每平勺约4.5克羊奶粉

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇；维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B_1（盐酸硫胺素）、维生素B_2（核黄素）、维生素B_6（盐酸吡哆醇）、维生素B_{12}（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

标签3：

美力源®
Mileyn®

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

陕西美力源乳业集团有限公司

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
产品标准代码：GB 10765-2021
产品类别、属性及状态：婴儿配方乳粉、乳基粉状

6 955801 119663

冲调方法

1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。

2.饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。

3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。

4.使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。

5.盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。

6.滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。

温馨提示：
1.对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2.喂奶时应抱着宝宝，如有疑惑可能导致宝宝窒息。
3.配制不当或使用不当可能会影响健康。

美力源®
Mileyn®



婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）

1 段

净含量：708克

生产日期及保质期到期日见罐底

国食注字 YP 20230202

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2107**
蛋白质	**g**	**0.55**	**11.49**
脂肪	**g**	**1.31**	**27.57**
亚油酸	g	0.19	4.040
α-亚麻酸	mg	18.15	382.33
碳水化合物	**g**	**2.4**	**50.64**
维生素			
维生素A	μg RE	15	323
维生素D	μg	0.484	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.33
维生素K_1	μg	2.72	57.28
维生素B_1	μg	25	532
维生素B_2	μg	57	1198
维生素B_6	μg	18.1	380.6
维生素B_{12}	μg	0.109	2.299
烟酸(烟酰胺)	μg	207	4366
叶酸	μg	5.1	107
泛酸	μg	154	3253
维生素C	mg	4.2	87.8
生物素	μg	0.96	20.26
胆碱	mg	6.3	131.8
矿物质			
钠	mg	7.21	152
钾	mg	22	474
铜	μg	15.4	325.3
镁	mg	1.7	36.6
铁	mg	0.17	3.58
锌	mg	0.18	3.897
锰	μg	3.07	64.72
钙	mg	21	444
磷	mg	13	282
碘	μg	4.9	103.5
氯	mg	17	360
硒	μg	0.74	15.52
可选择成分			
肌醇	mg	3.6	75.6
牛磺酸	mg	1.4	29
左旋肉碱	mg	1.8	37.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.3	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	100.1
低聚半乳糖	mg	141.53	2982
低聚果糖	mg	38.87	819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	217.56	4584
乳铁蛋白	mg	1.7	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	6.13	129.18

注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量（ml）	奶粉用量（平勺）
0-2周	8-10	30-90	1-3
2周-1月龄	6-7	90-120	3-4
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5-6	120-180	4-6
4-6月龄	5	180-210	6-7

注意：每平勺约4.5克羊奶粉

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇；维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B_1（盐酸硫胺素）、维生素B_2（核黄素）、维生素B_6（盐酸吡哆醇）、维生素B_{12}（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

标签4：

美力源
Mileyn

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

陕西美力源乳业集团有限公司

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
产品标准代码：GB 10765-2021
产品类别、属性及状态：婴儿配方乳粉、乳基粉状

冲调方法

1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。

2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55°C。

3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。

4.使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。

5.盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。

6.滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。

温馨提示：
1.对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2.喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3.配制不当或使用不当可能会影响健康。

6 955801 118918

美力源
Mileyn

国食注字 YP 20230202



美力源®
婴儿配方羊奶粉
（0-6月龄，1段）

1 段

净含量：800克

生产日期及保质期到期日见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2107**
蛋白质	**g**	**0.55**	**11.49**
脂肪	**g**	**1.31**	**27.57**
亚油酸	g	0.19	4.040
α-亚麻酸	mg	18.15	382.33
碳水化合物	**g**	**2.4**	**50.64**
维生素			
维生素A	μg RE	15	323
维生素D	μg	0.484	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.33
维生素K_1	μg	2.72	57.28
维生素B_1	μg	25	532
维生素B_2	μg	57	1198
维生素B_6	μg	18.1	380.6
维生素B_{12}	μg	0.109	2.299
烟酸(烟酰胺)	μg	207	4366
叶酸	μg	5.1	107
泛酸	μg	154	3253
维生素C	mg	4.2	87.8
生物素	μg	0.96	20.26
胆碱	mg	6.3	131.8
矿物质			
钠	mg	7.21	152
钾	mg	22	474
铜	μg	15.4	325.3
镁	mg	1.7	36.6
铁	mg	0.17	3.58
锌	mg	0.18	3.897
锰	μg	3.07	64.72
钙	mg	21	444
磷	mg	13	282
碘	μg	4.9	103.5
氯	mg	17	360
硒	μg	0.74	15.52
可选择成分			
肌醇	mg	3.6	75.6
牛磺酸	mg	1.4	29
左旋肉碱	mg	1.8	37.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.3	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	100.1
低聚半乳糖	mg	141.53	2982
低聚果糖	mg	38.87	819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	217.56	4584
乳铁蛋白	mg	1.7	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	6.13	129.18

注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量（ml）	奶粉用量（平勺）
0-2周	8-10	30-90	1-3
2周-1月龄	6-7	90-120	3-4
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5-6	120-180	4-6
4-6月龄	5	180-210	6-7

注意：每平勺约4.5克羊奶粉

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇；维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B_1（盐酸硫胺素）、维生素B_2（核黄素）、维生素B_6（盐酸吡哆醇）、维生素B_{12}（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

标签5：


本品含肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、膳食纤维、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯，二十二碳六烯酸(DHA)有助于婴儿视力的正常发育。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。膳食纤维是低能量物质。
贮存方法
请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。
提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。
陕西美力源乳业集团有限公司
生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
产品标准代码：GB 10766-2021
产品类别、属性及状态：较大婴儿配方乳粉、乳基粉状
冲调方法
1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2.饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。
3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。
4.使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5.盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6.滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。
温馨提示：
1.食用本品时须配合添加辅助食品。
2.喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3.配制不当或使用不当可能会影响健康。
6 955801 119755
美力源
Mileyn
国食注字 YP20230203
美力源®
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄，2段)
2段
净含量：108克
生产日期及保质期到期日见罐底
营养成分表
项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g
能量 | kJ | 100 | 2020
蛋白质 | g | 0.63 | 12.69
脂肪 | g | 1.15 | 23.26
亚油酸 | g | 0.17 | 3.493
α-亚麻酸 | mg | 16 | 323
碳水化合物 | g | 2.7 | 53.78
维生素
维生素A | μg RE | 19 | 378
维生素D | μg | 0.505 | 10.2
维生素E | mg α-TE | 0.21 | 4.3
维生素K1 | μg | 2.75 | 55.47
维生素B1 | μg | 27 | 536
维生素B2 | μg | 64 | 1299
维生素B6 | μg | 19.6 | 395
维生素B12 | μg | 0.117 | 2.37
烟酸(烟酰胺) | μg | 222 | 4476
叶酸 | μg | 5.1 | 102.2
泛酸 | μg | 166 | 3346
维生素C | mg | 4.4 | 88.1
生物素 | μg | 1.06 | 21.45
胆碱 | mg | 6.9 | 139.9
矿物质
钠 | mg | 6.19 | 125
钾 | mg | 20 | 402
铜 | μg | 16.3 | 330.2
镁 | mg | 1.8 | 36.3
铁 | mg | 0.25 | 5.1
锌 | mg | 0.18 | 3.61
锰 | μg | 3.89 | 78.59
钙 | mg | 24 | 480
磷 | mg | 14 | 285
碘 | μg | 5.4 | 109.3
氯 | mg | 15 | 300
硒 | μg | 0.72 | 14.49
可选择成分
肌醇 | mg | 4.0 | 80.13
牛磺酸 | mg | 1.5 | 31
左旋肉碱 | mg | 2.0 | 40.9
二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.0 | 100.1
低聚半乳糖 | mg | 147.62 | 2982
低聚果糖 | mg | 40.54 | 819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯 | mg | 177.13 | 3578
乳铁蛋白 | mg | 1.78 | 35.89
酪蛋白磷酸肽 | mg | 7.01 | 141.66
注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。
喂哺用量建议表
较大婴儿月龄 | 每日喂哺次数 | 加水量(ml) | 奶粉用量(平勺)
6-9月龄 | 4-5 | 180-240 | 6-8
9-12月龄 | 4 | 180-210 | 6-7
注意：每平勺约4.5克羊奶粉
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、低聚半乳糖、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇；
维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B1（盐酸硫胺素）、维生素B2（核黄素）、维生素B6（盐酸吡哆醇）、维生素B12（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。
致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

标签6：


本品含肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、膳食纤维、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、二十二碳六烯酸(DHA)有助于婴儿视力的正常发育。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。膳食纤维是低能量物质。
贮存方法
请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。
提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。
陕西美力源乳业集团有限公司
生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
产品标准代码：GB 10766-2021
产品类别、属性及状态：较大婴儿配方乳粉、乳基粉状
6 955801 119304
冲调方法
1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2.饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55°C。
3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。
4.使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5.盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6.滴一滴奶在手背测试温度，如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。
温馨提示：
1.食用本品时须配合添加辅助食品。
2.喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3.配制不当或使用不当可能会影响健康。
美力源
Mileyn
国食注字 YP20230203
美力源®
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄，2段)
2段
净含量：300克
生产日期及保质期到期日见罐底
营养成分表
项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g
能量 | kJ | 100 | 2020
蛋白质 | g | 0.63 | 12.69
脂肪 | g | 1.15 | 23.26
亚油酸 | g | 0.17 | 3.493
α-亚麻酸 | mg | 16 | 323
碳水化合物 | g | 2.7 | 53.78
维生素
维生素A | μg RE | 19 | 378
维生素D | μg | 0.505 | 10.2
维生素E | mg α-TE | 0.21 | 4.3
维生素K1 | μg | 2.75 | 55.47
维生素B1 | μg | 27 | 536
维生素B2 | μg | 64 | 1299
维生素B6 | μg | 19.6 | 395
维生素B12 | μg | 0.117 | 2.37
烟酸(烟酰胺) | μg | 222 | 4476
叶酸 | μg | 5.1 | 102.2
泛酸 | μg | 166 | 3346
维生素C | mg | 4.4 | 88.1
生物素 | μg | 1.06 | 21.45
胆碱 | mg | 6.9 | 139.9
矿物质
钠 | mg | 6.19 | 125
钾 | mg | 20 | 402
铜 | μg | 16.3 | 330.2
镁 | mg | 1.8 | 36.3
铁 | mg | 0.25 | 5.1
锌 | mg | 0.18 | 3.61
锰 | μg | 3.89 | 78.59
钙 | mg | 24 | 480
磷 | mg | 14 | 285
碘 | μg | 5.4 | 109.3
氯 | mg | 15 | 300
硒 | μg | 0.72 | 14.49
可选择成分
肌醇 | mg | 4.0 | 80.13
牛磺酸 | mg | 1.5 | 31
左旋肉碱 | mg | 2.0 | 40.9
二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.0 | 100.1
低聚半乳糖 | mg | 147.62 | 2982
低聚果糖 | mg | 40.54 | 819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯 | mg | 177.13 | 3578
乳铁蛋白 | mg | 1.78 | 35.89
酪蛋白磷酸肽 | mg | 7.01 | 141.66
注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。
喂哺用量建议表
较大婴儿月龄 | 每日喂哺次数 | 加水量(ml) | 奶粉用量(平勺)
6-9月龄 | 4-5 | 180-240 | 6-8
9-12月龄 | 4 | 180-210 | 6-7
注意：每平勺约4.5克羊奶粉
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、低聚半乳糖、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇；
维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B1（盐酸硫胺素）、维生素B2（核黄素）、维生素B6（盐酸吡哆醇）、维生素B12（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。
致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

标签7：


本品含肌醇.牛磺酸.左旋肉碱.二十二碳六烯酸(DHA).膳食纤维.1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯.二十二碳六烯酸(DHA)有助于婴儿视力的正常发育。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。膳食纤维是低能量物质。
贮存方法
请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。
提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。
陕西美力源乳业集团有限公司
生产者:陕西美力源乳业集团有限公司
地址:陕西省咸阳市武功县工业园
电话:400-600-8670
网址:www.sxmlyry.com
生产许可证编号:SC12961043100837
保质期:24个月
产地:陕西·咸阳
产品标准代码:GB 10766-2021
产品类别.属性及状态:较大婴儿配方乳粉.乳基粉状
6 955801 119670
冲调方法
1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2.饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。
3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。
4.使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5.盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6.滴一滴奶在手背测试温度，如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。
温馨提示：
1.食用本品时须配合添加辅助食品。
2.喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3.配制不当或使用不当可能会影响健康。
美力源
Mileyn
国食注字 YP20230203
美力源®
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)
2段
净含量:708克
生产日期及保质期到期日见罐底
营养成分表
项目 单位 每100kJ 每100g
能量 kJ 100 2020
蛋白质 g 0.63 12.69
脂肪 g 1.15 23.26
亚油酸 g 0.17 3.493
α-亚麻酸 mg 16 323
碳水化合物 g 2.7 53.78
维生素
维生素A μg RE 19 378
维生素D μg 0.505 10.2
维生素E mg α-TE 0.21 4.3
维生素K1 μg 2.75 55.47
维生素B1 μg 27 536
维生素B2 μg 64 1299
维生素B6 μg 19.6 395
维生素B12 μg 0.117 2.37
烟酸(烟酰胺) μg 222 4476
叶酸 μg 5.1 102.2
泛酸 μg 166 3346
维生素C mg 4.4 88.1
生物素 μg 1.06 21.45
胆碱 mg 6.9 139.9
矿物质
钠 mg 6.19 125
钾 mg 20 402
铜 μg 16.3 330.2
镁 mg 1.8 36.3
铁 mg 0.25 5.1
锌 mg 0.18 3.61
锰 μg 3.89 78.59
钙 mg 24 480
磷 mg 14 285
碘 μg 5.4 109.3
氯 mg 15 300
硒 μg 0.72 14.49
可选择成分
肌醇 mg 4.0 80.13
牛磺酸 mg 1.5 31
左旋肉碱 mg 2.0 40.9
二十二碳六烯酸(DHA) mg 4.5 91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA) mg 5.0 100.1
低聚半乳糖 mg 147.62 2982
低聚果糖 mg 40.54 819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯 mg 177.13 3578
乳铁蛋白 mg 1.78 35.89
酪蛋白磷酸肽 mg 7.01 141.66
注:即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。
喂哺用量建议表
较大婴儿月龄 每日喂哺次数 加水量(ml) 奶粉用量(平勺)
6-9月龄 4-5 180-240 6-8
9-12月龄 4 180-210 6-7
注意：每平勺约4.5克羊奶粉
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、低聚半乳糖、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇；
维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B1（盐酸硫胺素）、维生素B2（核黄素）、维生素B6（盐酸吡哆醇）、维生素B12（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。
致敏物质提示:本产品含有坚果、乳成分

标签8：

本品含肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、膳食纤维、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、二十二碳六烯酸(DHA)有助于婴儿视力的正常发育。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。膳食纤维是低能量物质。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖，开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

陕西美力源乳业集团有限公司

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西-咸阳
产品标准代码：GB 10766-2021
产品类别、属性及状态：较大婴儿配方乳粉、乳基粉状

6 955801 118925

冲调方法

1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。

2.饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。

3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。

4.使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。

5.盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。

6.滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。

温馨提示：
1.食用本品时须配合添加辅助食品。
2.喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3.配制不当或使用不当可能会影响健康。

美力源 Mileyn

国食注字 YP20230203



美力源®

较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）

2段

净含量：800克

生产日期及保质期到期日见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2020**
蛋白质	**g**	**0.63**	**12.69**
脂肪	**g**	**1.15**	**23.26**
亚油酸	g	0.17	3.493
α-亚麻酸	mg	16	323
碳水化合物	**g**	**2.7**	**53.78**
维生素			
维生素A	μg RE	19	378
维生素D	μg	0.505	10.2
维生素E	mg α-TE	0.21	4.3
维生素K_1	μg	2.75	55.47
维生素B_1	μg	27	536
维生素B_2	μg	64	1299
维生素B_6	μg	19.6	395
维生素B_{12}	μg	0.117	2.37
烟酸(烟酰胺)	μg	222	4476
叶酸	μg	5.1	102.2
泛酸	μg	166	3346
维生素C	mg	4.4	88.1
生物素	μg	1.06	21.45
胆碱	mg	6.9	139.9
矿物质			
钠	mg	6.19	125
钾	mg	20	402
铜	μg	16.3	330.2
镁	mg	1.8	36.3
铁	mg	0.25	5.1
锌	mg	0.18	3.61
锰	μg	3.89	78.59
钙	mg	24	480
磷	mg	14	285
碘	μg	5.4	109.3
氯	mg	15	300
硒	μg	0.72	14.49
可选择成分			
肌醇	mg	4.0	80.13
牛磺酸	mg	1.5	31
左旋肉碱	mg	2.0	40.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	100.1
低聚半乳糖	mg	147.62	2982
低聚果糖	mg	40.54	819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	177.13	3578
乳铁蛋白	mg	1.78	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	7.01	141.66

注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。

喂哺用量建议表

较大婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量(ml)	奶粉用量(平勺)
6-9月龄	4-5	180-240	6-8
9-12月龄	4	180-210	6-7

注意：每平勺约4.5克羊奶粉

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、低聚半乳糖、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇；
维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B_1（盐酸硫胺素）、维生素B_2（核黄素）、维生素B_6（盐酸吡哆醇）、维生素B_{12}（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

标签9：

本品含硒、胆碱、锰、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

陕西美力源乳业集团有限公司

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
产品标准代码：GB 10767-2021
产品类别、属性及状态：幼儿配方乳粉、乳基粉状

冲调方法

1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。

2.饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。

3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。

4.使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。

5.盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。

6.滴一滴奶在手背测试温度，如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。

温馨提示：
1.喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
2.配制不当或使用不当可能会影响健康。

6 955801 119762

美力源 Mileyn



国食注字 YP20230204

美力源®
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄，3段)

3段

净含量：108克

生产日期及保质期到期日见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**1952**
蛋白质	**g**	**0.76**	**14.9**
脂肪	**g**	**1.04**	**20.3**
亚油酸	g	0.16	3.161
α-亚麻酸	mg	12.74	248.6
碳水化合物	**g**	**2.8**	**54**
维生素			
维生素A	μg RE	20	392
维生素D	μg	0.523	10.2
维生素E	mg α-TE	0.18	3.46
维生素K_1	μg	2.78	54.23
维生素B_1	μg	27	531
维生素B_2	μg	72	1414
维生素B_6	μg	22.4	436.8
维生素B_{12}	μg	0.121	2.36
烟酸(烟酰胺)	μg	232	4535
叶酸	μg	5.5	107.5
泛酸	μg	174	3392
维生素C	mg	4.5	88.7
生物素	μg	1.25	24.35
矿物质			
钠	mg	7.81	152.4
钾	mg	26	515
铜	μg	17.5	341.6
镁	mg	2.0	38.7
铁	mg	0.26	5.17
锌	mg	0.17	3.28
钙	mg	28	546
磷	mg	17	338
碘	μg	5.2	102.2
氯	mg	22	429
可选择成分			
硒	μg	0.64	12.4
胆碱	mg	7.8	152.8
锰	μg	4.56	88.95
肌醇	mg	4.1	80.7
牛磺酸	mg	1.7	34
左旋肉碱	mg	2.4	47.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.1	100.1
低聚半乳糖	mg	152.77	2982
低聚果糖	mg	41.96	819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	165.34	3227.5
乳铁蛋白	mg	1.84	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	8.00	156.17

注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。

喂哺用量建议表

幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量(ml)	奶粉用量(平勺)
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注意：每平勺约4.5克羊奶粉

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、低聚半乳糖、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油）、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇；
维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B_1（盐酸硫胺素）、维生素B_2（核黄素）、维生素B_6（盐酸吡哆醇）、维生素B_{12}（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

注：生羊乳加工

标签10：

本品含硒、胆碱、锰、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维.1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

陕西美力源乳业集团有限公司

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西-咸阳
产品标准代码：GB 10767-2021
产品类别、属性及状态：幼儿配方乳粉、乳基粉状

冲调方法

1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。

2.饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。

3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。

4.使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。

5.盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。

6.滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。

温馨提示：
1.喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
2.配制不当或使用不当可能会影响健康。

6955801119311

美力源 Mileyn®

国食注字 YP20230204



美力源®
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄，3段)

3段

净含量：300克

生产日期及保质期到期日见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**1952**
蛋白质	**g**	**0.76**	**14.9**
脂肪	**g**	**1.04**	**20.3**
亚油酸	g	0.16	3.161
α-亚麻酸	mg	12.74	248.6
碳水化合物	**g**	**2.8**	**54**
维生素			
维生素A	μg RE	20	392
维生素D	μg	0.523	10.2
维生素E	mg α-TE	0.18	3.46
维生素K	μg	2.78	54.23
维生素B_1	μg	27	531
维生素B_2	μg	72	1414
维生素B_6	μg	22.4	436.8
维生素B_{12}	μg	0.121	2.36
烟酸(烟酰胺)	μg	232	4535
叶酸	μg	5.5	107.5
泛酸	μg	174	3392
维生素C	mg	4.5	88.7
生物素	μg	1.25	24.35
矿物质			
钠	mg	7.81	152.4
钾	mg	26	515
铜	μg	17.5	341.6
镁	mg	2.0	38.7
铁	mg	0.26	5.17
锌	mg	0.17	3.28
钙	mg	28	546
磷	mg	17	338
碘	μg	5.2	102.2
氯	mg	22	429
可选择成分			
硒	μg	0.64	12.4
胆碱	mg	7.8	152.8
锰	μg	4.56	88.95
肌醇	mg	4.1	80.7
牛磺酸	mg	1.7	34
左旋肉碱	mg	2.4	47.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.1	100.1
低聚半乳糖	mg	152.77	2982
低聚果糖	mg	41.96	819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	165.34	3227.5
乳铁蛋白	mg	1.84	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	8.00	156.17

注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。

喂哺用量建议表

幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量(ml)	奶粉用量(平勺)
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注意：每平勺约4.5克羊奶粉

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、低聚半乳糖、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油）、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇；维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B_1（盐酸硫胺素）、维生素B_2（核黄素）、维生素B_6（盐酸吡哆醇）、维生素B_{12}（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；矿物质：碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

注：生羊乳加工

标签11：

本品含硒、胆碱、锰、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维.1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖，开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

陕西美力源乳业集团有限公司

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
产品标准代码：GB 10767-2021
产品类别、属性及状态：幼儿配方乳粉、乳基粉状

6 955801 119687

冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。
3. 参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度，如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。

温馨提示：
1. 喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
2. 配制不当或使用不当可能会影响健康。

美力源 Mileyn

国食注字 YP20230204



美力源®
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄，3段)

3段

净含量：708克

生产日期及保质期到期日见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**1952**
蛋白质	**g**	**0.76**	**14.9**
脂肪	**g**	**1.04**	**20.3**
亚油酸	g	0.16	3.161
α-亚麻酸	mg	12.74	248.6
碳水化合物	**g**	**2.8**	**54**
维生素			
维生素A	μg RE	20	392
维生素D	μg	0.523	10.2
维生素E	mg α-TE	0.18	3.46
维生素K_1	μg	2.78	54.23
维生素B_1	μg	27	531
维生素B_2	μg	72	1414
维生素B_6	μg	22.4	436.8
维生素B_{12}	μg	0.121	2.36
烟酸(烟酰胺)	μg	232	4535
叶酸	μg	5.5	107.5
泛酸	μg	174	3392
维生素C	mg	4.5	88.7
生物素	μg	1.25	24.35
矿物质			
钠	mg	7.81	152.4
钾	mg	26	515
铜	μg	17.5	341.6
镁	mg	2.0	38.7
铁	mg	0.26	5.17
锌	mg	0.17	3.28
钙	mg	28	546
磷	mg	17	338
碘	μg	5.2	102.2
氯	mg	22	429
可选择成分			
硒	μg	0.64	12.4
胆碱	mg	7.8	152.8
锰	μg	4.56	88.95
肌醇	mg	4.1	80.7
牛磺酸	mg	1.7	34
左旋肉碱	mg	2.4	47.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.1	100.1
低聚半乳糖	mg	152.77	2982
低聚果糖	mg	41.96	819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	165.34	3227.5
乳铁蛋白	mg	1.84	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	8.00	156.17

注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。

喂哺用量建议表

幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量(ml)	奶粉用量(平勺)
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注意：每平勺约4.5克羊奶粉

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、低聚半乳糖、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油）、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇；维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B_1（盐酸硫胺素）、维生素B_2（核黄素）、维生素B_6（盐酸吡哆醇）、维生素B_{12}（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；矿物质：碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

注：生羊乳加工

标签12：

本品含硒、胆碱、锰、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

陕西美力源乳业集团有限公司

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西-咸阳
产品标准代码：GB 10767-2021
产品类别、属性及状态：幼儿配方乳粉、乳基粉状

6 955801 118932

冲调方法

1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。

2.饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55°C。

3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。

4.使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。

5.盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。

6.滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。

温馨提示：
1.喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
2.配制不当或使用不当可能会影响健康。

美力源 Mileyn

国食注字 YP20230204



美力源®

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄，3段)

3段

净含量：800克

生产日期及保质期到期日见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**1952**
蛋白质	**g**	**0.76**	**14.9**
脂肪	**g**	**1.04**	**20.3**
亚油酸	g	0.16	3.161
α-亚麻酸	mg	12.74	248.6
碳水化合物	**g**	**2.8**	**54**
维生素			
维生素A	μg RE	20	392
维生素D	μg	0.523	10.2
维生素E	mg α-TE	0.18	3.46
维生素K_1	μg	2.78	54.23
维生素B_1	μg	27	531
维生素B_2	μg	72	1414
维生素B_6	μg	22.4	436.8
维生素B_{12}	μg	0.121	2.36
烟酸(烟酰胺)	μg	232	4535
叶酸	μg	5.5	107.5
泛酸	μg	174	3392
维生素C	mg	4.5	88.7
生物素	μg	1.25	24.35
矿物质			
钠	mg	7.81	152.4
钾	mg	26	515
铜	μg	17.5	341.6
镁	mg	2.0	38.7
铁	mg	0.26	5.17
锌	mg	0.17	3.28
钙	mg	28	546
磷	mg	17	338
碘	μg	5.2	102.2
氯	mg	22	429
可选择成分			
硒	μg	0.64	12.4
胆碱	mg	7.8	152.8
锰	μg	4.56	88.95
肌醇	mg	4.1	80.7
牛磺酸	mg	1.7	34
左旋肉碱	mg	2.4	47.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.1	100.1
低聚半乳糖	mg	152.77	2982
低聚果糖	mg	41.96	819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	165.34	3227.5
乳铁蛋白	mg	1.84	35.89
酪蛋白磷酸肽	mg	8.00	156.17

注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。

喂哺用量建议表

幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量(ml)	奶粉用量(平勺)
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注意：每平勺约4.5克羊奶粉

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、低聚半乳糖、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油）、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷酯、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇；维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B_1（盐酸硫胺素）、维生素B_2（核黄素）、维生素B_6（盐酸吡哆醇）、维生素B_{12}（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；矿物质：碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

注：生羊乳加工

标签13：


爱优素
贮存方法
请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。
提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。
陕西美力源乳业集团有限公司
生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
产品标准代码：GB 10765-2021
产品类别、属性及状态：婴儿配方乳粉、乳基粉状
6 955801 119366
冲调方法
1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2.饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。
3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。
4.使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5.盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6.滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。
温馨提示：
1、对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。2、喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。3、配制不当或使用不当可能会影响健康。
美力源 Mileyn
爱优素®
国食注字 YP20230205
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄，1段)
1 段
净含量：108克
生产日期及保质期到期日见罐底
营养成分表
项目 单位 每100kJ 每100g
能量 kJ 100 2105
蛋白质 g 0.53 11.25
脂肪 g 1.30 27.45
亚油酸 g 0.19 4.049
α-亚麻酸 mg 16.91 356
碳水化合物 g 2.4 51
维生素
维生素A μg RE 15 322
维生素D μg 0.485 10.2
维生素E mg α-TE 0.21 4.33
维生素K1 μg 2.72 57.28
维生素B1 μg 25 532
维生素B2 μg 57 1199
维生素B6 μg 18.0 379.4
维生素B12 μg 0.110 2.305
烟酸(烟酰胺) μg 208 4371
叶酸 μg 5.1 106.8
泛酸 μg 155 3258
维生素C mg 4.2 87.8
生物素 μg 0.96 20.19
胆碱 mg 6.3 131.7
矿物质
钠 mg 7.17 151
钾 mg 22 471
铜 μg 15.4 325.1
镁 mg 1.7 36.3
铁 mg 0.17 3.58
锌 mg 0.18 3.89
锰 μg 3.06 64.44
钙 mg 21 440
磷 mg 13 279
碘 μg 4.9 103.1
氯 mg 17 356
硒 μg 0.74 15.51
可选择成分
二十二碳六烯酸(DHA) mg 4.3 91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA) mg 4.8 100.1
低聚半乳糖 mg 141.66 2982
低聚果糖 mg 38.91 819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯 mg 217.48 4578
叶黄素 μg 3.25 68.47
核苷酸 mg 1.4 29.57
乳铁蛋白 mg 1.71 35.89
注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。
喂哺用量建议表
婴儿月龄 每日喂哺次数 加水量(ml) 奶粉用量(平勺)
0-2周 8-10 30-90 1-3
2周-1月龄 6-7 90-120 3-4
1-2月龄 5-6 120 4
2-4月龄 5-6 120-180 4-6
4-6月龄 5 180-210 6-7
注：每平勺约4.5克羊奶粉
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、乳铁蛋白、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素；
维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；
矿物质：磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。
致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

标签14：


爱优素
贮存方法
请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。
提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。
陕西美力源乳业集团有限公司
生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西-咸阳
产品标准代码：GB 10765-2021
产品类别、属性及状态：婴儿配方乳粉、乳基粉状
冲调方法
1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2.饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55°C。
3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。
4.使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5.盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6.滴一滴奶在手背测试温度，如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。
温馨提示：
1、对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。2、喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。3、配制不当或使用不当可能会影响健康。
6955801119328
美力源 Mileyn
国食注字 YP20230205
爱优素®
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄，1段)
1 段
净含量：300克
生产日期及保质期到期日见罐底
营养成分表
项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g
能量 | kJ | 100 | 2105
蛋白质 | g | 0.53 | 11.25
脂肪 | g | 1.30 | 27.45
亚油酸 | g | 0.19 | 4.049
α-亚麻酸 | mg | 16.91 | 356
碳水化合物 | g | 2.4 | 51
维生素
维生素A | μg RE | 15 | 322
维生素D | μg | 0.485 | 10.2
维生素E | mg α-TE | 0.21 | 4.33
维生素K1 | μg | 2.72 | 57.28
维生素B1 | μg | 25 | 532
维生素B2 | μg | 57 | 1199
维生素B6 | μg | 18.0 | 379.4
维生素B12 | μg | 0.110 | 2.305
烟酸(烟酰胺) | μg | 208 | 4371
叶酸 | μg | 5.1 | 106.8
泛酸 | μg | 155 | 3258
维生素C | mg | 4.2 | 87.8
生物素 | μg | 0.96 | 20.19
胆碱 | mg | 6.3 | 131.7
矿物质
钠 | mg | 7.17 | 151
钾 | mg | 22 | 471
铜 | μg | 15.4 | 325.1
镁 | mg | 1.7 | 36.3
铁 | mg | 0.17 | 3.58
锌 | mg | 0.18 | 3.89
锰 | μg | 3.06 | 64.44
钙 | mg | 21 | 440
磷 | mg | 13 | 279
碘 | μg | 4.9 | 103.1
氯 | mg | 17 | 356
硒 | μg | 0.74 | 15.51
可选择成分
二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.3 | 91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 4.8 | 100.1
低聚半乳糖 | mg | 141.66 | 2982
低聚果糖 | mg | 38.91 | 819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯 | mg | 217.48 | 4578
叶黄素 | μg | 3.25 | 68.47
核苷酸 | mg | 1.4 | 29.57
乳铁蛋白 | mg | 1.71 | 35.89
注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。
喂哺用量建议表
婴儿月龄 | 每日喂哺次数 | 加水量(ml) | 奶粉用量(平勺)
0-2周 | 8-10 | 30-90 | 1-3
2周-1月龄 | 6-7 | 90-120 | 3-4
1-2月龄 | 5-6 | 120 | 4
2-4月龄 | 5-6 | 120-180 | 4-6
4-6月龄 | 5 | 180-210 | 6-7
注意：每平勺约4.5克羊奶粉
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、乳铁蛋白、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-乌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素；
维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；
矿物质：磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。
致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

标签15：


爱优素
贮存方法
请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。
提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。
陕西美力源乳业集团有限公司
生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
产品标准代码：GB 10765-2021
产品类别、属性及状态：婴儿配方乳粉、乳基粉状
冲调方法
1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55°C。
3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。
4.使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5.盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6.滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。
温馨提示：
1、对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。2、喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。3、配制不当或使用不当可能会影响健康。
6 955801 118970
美力源 Mileyn
爱优素®
国食注字 YP20230205
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄，1段)
1 段
净含量：800克
生产日期及保质期到期日见罐底
营养成分表
项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g
能量 | kJ | 100 | 2105
蛋白质 | g | 0.53 | 11.25
脂肪 | g | 1.30 | 27.45
亚油酸 | g | 0.19 | 4.049
α-亚麻酸 | mg | 16.91 | 356
碳水化合物 | g | 2.4 | 51
维生素
维生素A | μg RE | 15 | 322
维生素D | μg | 0.485 | 10.2
维生素E | mg α-TE | 0.21 | 4.33
维生素K1 | μg | 2.72 | 57.28
维生素B1 | μg | 25 | 532
维生素B2 | μg | 57 | 1199
维生素B6 | μg | 18.0 | 379.4
维生素B12 | μg | 0.110 | 2.305
烟酰(烟酰胺) | μg | 208 | 4371
叶酸 | μg | 5.1 | 106.8
泛酸 | μg | 155 | 3258
维生素C | mg | 4.2 | 87.8
生物素 | μg | 0.96 | 20.19
胆碱 | mg | 6.3 | 131.7
矿物质
钠 | mg | 7.17 | 151
钾 | mg | 22 | 471
铜 | μg | 15.4 | 325.1
镁 | mg | 1.7 | 36.3
铁 | mg | 0.17 | 3.58
锌 | mg | 0.18 | 3.89
锰 | μg | 3.06 | 64.44
钙 | mg | 21 | 440
磷 | mg | 13 | 279
碘 | μg | 4.9 | 103.1
氯 | mg | 17 | 356
硒 | μg | 0.74 | 15.51
可选择成分
二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.3 | 91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 4.8 | 100.1
低聚半乳糖 | mg | 141.66 | 2982
低聚果糖 | mg | 38.91 | 819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯 | mg | 217.48 | 4578
叶黄素 | μg | 3.25 | 68.47
核苷酸 | mg | 1.4 | 29.57
乳铁蛋白 | mg | 1.71 | 35.89
注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。
喂哺用量建议表
婴儿月龄 | 每日喂哺次数 | 加水量(ml) | 奶粉用量(平勺)
0-2周 | 8-10 | 30-90 | 1-3
2周-1月龄 | 6-7 | 90-120 | 3-4
1-2月龄 | 5-6 | 120 | 4
2-4月龄 | 5-6 | 120-180 | 4-6
4-6月龄 | 5 | 180-210 | 6-7
注意：每平勺约4.5克羊奶粉
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、乳铁蛋白、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素；
维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；
矿物质：磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。
致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

标签16：


美力源 Mileyn
爱优素®
国食注字 YP20230206
本品含二十二碳六烯酸(DHA)、膳食纤维、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。二十二碳六烯酸(DHA)有助于婴儿视力的正常发育。
贮存方法
请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。
提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。
陕西美力源乳业集团有限公司
生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
产品标准代码：GB 10766-2021
产品类别、属性及状态：较大婴儿配方乳粉、乳基粉状
冲调方法
1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2.饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55°C。
3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。
4.使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5.盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6.滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。
温馨提示：
1、食用本品时须配合添加辅助食品。
2、喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3、配制不当或使用不当可能会影响健康。
6 955801 119731
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄，2段)
2段
净含量：108克
生产日期及保质期到期日见罐底
营养成分表
项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g
能量 | kJ | 100 | 2033
蛋白质 | g | 0.61 | 12.34
脂肪 | g | 1.17 | 23.86
亚油酸 | g | 0.18 | 3.601
α-亚麻酸 | mg | 16.18 | 329
碳水化合物 | g | 2.6 | 53.5
维生素
维生素A | μg RE | 19 | 378
维生素D | μg | 0.50 | 10.2
维生素E | mg α-TE | 0.21 | 4.31
维生素K1 | μg | 2.75 | 55.85
维生素B1 | μg | 26 | 536
维生素B2 | μg | 63 | 1290
维生素B6 | μg | 19.4 | 393.7
维生素B12 | μg | 0.116 | 2.363
烟酸(烟酰胺) | μg | 220 | 4465
叶酸 | μg | 5.0 | 102.1
泛酸 | μg | 164 | 3338
维生素C | mg | 4.3 | 88.1
生物素 | μg | 1.05 | 21.34
胆碱 | mg | 6.8 | 139.2
矿物质
钠 | mg | 6.10 | 124
钾 | mg | 20 | 398
铜 | μg | 16.2 | 329.8
镁 | mg | 1.8 | 36
铁 | mg | 0.25 | 5.1
锌 | mg | 0.16 | 3.28
锰 | μg | 3.85 | 78.26
钙 | mg | 23 | 477
磷 | mg | 14 | 283
碘 | μg | 5.4 | 108.8
氯 | mg | 15 | 297
硒 | μg | 0.71 | 14.47
可选择成分
二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 4.9 | 100.1
低聚半乳糖 | mg | 146.68 | 2982
低聚果糖 | mg | 40.29 | 819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯 | mg | 175.80 | 3574
叶黄素 | μg | 8.98 | 182.58
核苷酸 | mg | 1.52 | 30.83
乳铁蛋白 | mg | 1.77 | 35.89
注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。
喂哺用量建议表
较大婴儿月龄 | 每日喂哺次数 | 加水量(ml) | 奶粉用量(平勺)
6-9月龄 | 4-5 | 180-240 | 6-8
9-12月龄 | 4 | 180-210 | 6-7
注意：每平勺约4.5克羊奶粉
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、乳铁蛋白、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素；
维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。
致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

标签17：


本品含二十二碳六烯酸(DHA)、膳食纤维、13-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能;二十二碳六烯酸(DHA)有助于婴儿视力的正常发育。
贮存方法
请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。
提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。
陕西美力源乳业集团有限公司
生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西-咸阳
产品标准代码：GB 10766-2021
产品类别、属性及状态：较大婴儿配方乳粉、乳基粉状
冲调方法
1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2.饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。
3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。
4.使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5.盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6.滴一滴奶在手背测试温度，如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。
温馨提示：
1、食用本品时须配合添加辅助食品。
2、喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3、配制不当或使用不当可能会影响健康。
6 955801 119335
美力源 Milleyn
爱优素®
国食注字 YP20230206
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄，2段)
2 段
净含量:300克
生产日期及保质期到期日见罐底
营养成分表
项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g
能量 | kJ | 100 | 2033
蛋白质 | g | 0.61 | 12.34
脂肪 | g | 1.17 | 23.86
亚油酸 | g | 0.18 | 3.601
α-亚麻酸 | mg | 16.18 | 329
碳水化合物 | g | 2.6 | 53.5
维生素
维生素A | μg RE | 19 | 378
维生素D | μg | 0.50 | 10.2
维生素E | mg α-TE | 0.21 | 4.31
维生素K1 | μg | 2.75 | 55.85
维生素B1 | μg | 26 | 536
维生素B2 | μg | 63 | 1290
维生素B6 | μg | 19.4 | 393.7
维生素B12 | μg | 0.116 | 2.363
烟酸(烟酰胺) | μg | 220 | 4465
叶酸 | μg | 5.0 | 102.1
泛酸 | μg | 164 | 3338
维生素C | mg | 4.3 | 88.1
生物素 | μg | 1.05 | 21.34
胆碱 | mg | 6.8 | 139.2
矿物质
钠 | mg | 6.10 | 124
钾 | mg | 20 | 398
铜 | μg | 16.2 | 329.8
镁 | mg | 1.8 | 36
铁 | mg | 0.25 | 5.1
锌 | mg | 0.16 | 3.28
锰 | μg | 3.85 | 78.26
钙 | mg | 23 | 477
磷 | mg | 14 | 283
碘 | μg | 5.4 | 108.8
氯 | mg | 15 | 297
硒 | μg | 0.71 | 14.47
可选择成分
二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 4.9 | 100.1
低聚半乳糖 | mg | 146.68 | 2982
低聚果糖 | mg | 40.29 | 819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯 | mg | 175.80 | 3574
叶黄素 | μg | 8.98 | 182.58
核苷酸 | mg | 1.52 | 30.83
乳铁蛋白 | mg | 1.77 | 35.89
注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。
喂哺用量建议表
较大婴儿月龄 | 每日喂哺次数 | 加水量(ml) | 奶粉用量(平勺)
6-9月龄 | 4-5 | 180-240 | 6-8
9-12月龄 | 4 | 180-210 | 6-7
注意：每平勺约4.5克羊奶粉
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、乳铁蛋白、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素；
维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。
致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

标签18：


美力源
Mileyn
爱优素®
国食注字 YP20230206
本品含二十二碳六烯酸(DHA)、膳食纤维、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸、膳食纤维有助于维持正常的肠道功能,二十二碳六烯酸(DHA)有助于婴儿视力的正常发育。
贮存方法
请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。
提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。
陕西美力源乳业集团有限公司
生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
产品标准代码：GB 10766-2021
产品类别、属性及状态：较大婴儿配方乳粉、乳基粉状
6 955801 118987
冲调方法
1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2.饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。
3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。
4.使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5.盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6.滴一滴奶在手背测试温度，如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。
温馨提示：
1、食用本品时须配合添加辅助食品。
2、喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3、配制不当或使用不当可能会影响健康。
较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄，2段)
2段
净含量：800克
生产日期及保质期到期日见罐底
营养成分表
项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g
能量 | kJ | 100 | 2033
蛋白质 | g | 0.61 | 12.34
脂肪 | g | 1.17 | 23.86
亚油酸 | g | 0.18 | 3.601
α-亚麻酸 | mg | 16.18 | 329
碳水化合物 | g | 2.6 | 53.5
维生素
维生素A | μg RE | 19 | 378
维生素D | μg | 0.50 | 10.2
维生素E | mg α-TE | 0.21 | 4.31
维生素K1 | μg | 2.75 | 55.85
维生素B1 | μg | 26 | 536
维生素B2 | μg | 63 | 1290
维生素B6 | μg | 19.4 | 393.7
维生素B12 | μg | 0.116 | 2.363
烟酸(烟酰胺) | μg | 220 | 4465
叶酸 | μg | 5.0 | 102.1
泛酸 | μg | 164 | 3338
维生素C | mg | 4.3 | 88.1
生物素 | μg | 1.05 | 21.34
胆碱 | mg | 6.8 | 139.2
矿物质
钠 | mg | 6.10 | 124
钾 | mg | 20 | 398
铜 | μg | 16.2 | 329.8
镁 | mg | 1.8 | 36
铁 | mg | 0.25 | 5.1
锌 | mg | 0.16 | 3.28
锰 | μg | 3.85 | 78.26
钙 | mg | 23 | 477
磷 | mg | 14 | 283
碘 | μg | 5.4 | 108.8
氯 | mg | 15 | 297
硒 | μg | 0.71 | 14.47
可选择成分
二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.5 | 91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 4.9 | 100.1
低聚半乳糖 | mg | 146.68 | 2982
低聚果糖 | mg | 40.29 | 819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯 | mg | 175.80 | 3574
叶黄素 | μg | 8.98 | 182.58
核苷酸 | mg | 1.52 | 30.83
乳铁蛋白 | mg | 1.77 | 35.89
注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。
喂哺用量建议表
较大婴儿月龄 | 每日喂哺次数 | 加水量(ml) | 奶粉用量(平勺)
6-9月龄 | 4-5 | 180-240 | 6-8
9-12月龄 | 4 | 180-210 | 6-7
注意：每平勺约4.5克羊奶粉
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、乳铁蛋白、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素；
维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠。
致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

标签19：


美力源 Mileyn
爱优素®
国食注字 YP20230207
本品含硒、胆碱、锰、膳食纤维.1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯,核苷酸。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。
贮存方法
请将本产品置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。
提示:请勿用微波炉加热,以免烫伤。请遵守说明,按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议,否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。
陕西美力源乳业集团有限公司
生产者:陕西美力源乳业集团有限公司
地址:陕西省咸阳市武功县工业园
电话:400-600-8670
网址:www.sxmlyry.com
生产许可证编号:SC12961043100837
保质期:24个月
产地:陕西·咸阳
产品标准代码:GB 10767-2021
产品类别、属性及状态:幼儿配方乳粉、乳基粉状
6 955801 119748
冲调方法
1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手,将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒,用沸水煮5分钟。
2.饮用水沸水煮5分钟,冷却至50-55°C。
3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。
4.使用专用量勺加入奶粉,请勿压紧专用量勺里的奶粉,每瓶奶液需要单独调配。
5.盖紧奶瓶,摇匀至奶粉充分溶解。
6.滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐,必须将奶液冷藏并在24小时内食用完,将喂剩下的奶液弃掉。
温馨提示:
1、喂奶时应抱着宝宝,如有疏忽可能导致宝宝窒息。
2、配制不当或使用不当可能会影响健康。
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)
3段
净含量:108克
生产日期及保质期到期日见罐底
营养成分表
项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g
能量 | kJ | 100 | 1952
蛋白质 | g | 0.75 | 14.68
脂肪 | g | 1.04 | 20.3
亚油酸 | g | 0.16 | 3.128
α-亚麻酸 | mg | 12.48 | 243.68
碳水化合物 | g | 2.8 | 54.27
维生素
维生素A | μg RE | 20 | 393
维生素D | μg | 0.523 | 10.2
维生素E | mg α-TE | 0.18 | 3.46
维生素K1 | μg | 2.78 | 54.23
维生素B1 | μg | 27 | 532
维生素B2 | μg | 73 | 1418
维生素B6 | μg | 22.4 | 437.2
维生素B12 | μg | 0.121 | 2.364
烟酸(烟酰胺) | μg | 233 | 4541
叶酸 | μg | 5.5 | 107.6
泛酸 | μg | 174 | 3397
维生素C | mg | 4.5 | 88.7
生物素 | μg | 1.25 | 24.39
矿物质
钠 | mg | 7.84 | 153
钾 | mg | 26 | 516
铜 | μg | 17.5 | 341.8
镁 | mg | 2.0 | 38.8
铁 | mg | 0.26 | 5.17
锌 | mg | 0.17 | 3.28
钙 | mg | 28 | 546
磷 | mg | 17 | 339
碘 | μg | 5.2 | 102.3
氯 | mg | 22 | 430
可选择成分
硒 | μg | 0.64 | 12.41
胆碱 | mg | 7.8 | 153.1
锰 | μg | 4.56 | 89.05
二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.7 | 91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.1 | 100.1
低聚半乳糖 | mg | 152.77 | 2982
低聚果糖 | mg | 41.96 | 819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯 | mg | 165.47 | 3230
叶黄素 | μg | 9.35 | 182.58
核苷酸 | mg | 1.64 | 32.07
乳铁蛋白 | mg | 1.84 | 35.89
注:即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。
喂哺用量建议表
幼儿月龄 | 每日喂哺次数 | 加水量(ml) | 奶粉用量(平勺)
12-24月龄 | 3 | 180 | 6
24-36月龄 | 2 | 240 | 8
注意：每平勺约4.5克羊奶粉
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、乳铁蛋白、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素;维生素:维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱;矿物质:碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。
注:生羊乳加工
致敏物质提示:本产品含有坚果、乳成分

标签20：


本品含硒、胆碱、锰、膳食纤维、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。
贮存方法
请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。
提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。
陕西美力源乳业集团有限公司
生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
产品标准代码：GB 10767-2021
产品类别、属性及状态：幼儿配方乳粉、乳基粉状
冲调方法
1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2.饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。
3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。
4.使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5.盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6.滴一滴奶在手背测试温度，如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。
温馨提示：
1.喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
2.配制不当或使用不当可能会影响健康。
6955801119342
美力源 Mileyn
国食注字 YP20230207
爱优素®
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄，3段)
3 段
净含量：300克
生产日期及保质期到期日见罐底
营养成分表
项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g
能量 | kJ | 100 | 1952
蛋白质 | g | 0.75 | 14.68
脂肪 | g | 1.04 | 20.3
亚油酸 | g | 0.16 | 3.128
α-亚麻酸 | mg | 12.48 | 243.68
碳水化合物 | g | 2.8 | 54.27
维生素
维生素A | μg RE | 20 | 393
维生素D | μg | 0.523 | 10.2
维生素E | mg α-TE | 0.18 | 3.46
维生素K1 | μg | 2.78 | 54.23
维生素B1 | μg | 27 | 532
维生素B2 | μg | 73 | 1418
维生素B6 | μg | 22.4 | 437.2
维生素B12 | μg | 0.121 | 2.364
烟酸(烟酰胺) | μg | 233 | 4541
叶酸 | μg | 5.5 | 107.6
泛酸 | μg | 174 | 3397
维生素C | mg | 4.5 | 88.7
生物素 | μg | 1.25 | 24.39
矿物质
钠 | mg | 7.84 | 153
钾 | mg | 26 | 516
铜 | μg | 17.5 | 341.8
镁 | mg | 2.0 | 38.8
铁 | mg | 0.26 | 5.17
锌 | mg | 0.17 | 3.28
钙 | mg | 28 | 546
磷 | mg | 17 | 339
碘 | μg | 5.2 | 102.3
氯 | mg | 22 | 430
可选择成分
硒 | μg | 0.64 | 12.41
胆碱 | mg | 7.8 | 153.1
锰 | μg | 4.56 | 89.05
二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.7 | 91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.1 | 100.1
低聚半乳糖 | mg | 152.77 | 2982
低聚果糖 | mg | 41.96 | 819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯 | mg | 165.47 | 3230
叶黄素 | μg | 9.35 | 182.58
核苷酸 | mg | 1.64 | 32.07
乳铁蛋白 | mg | 1.84 | 35.89
注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。
喂哺用量建议表
幼儿月龄 | 每日喂哺次数 | 加水量(ml) | 奶粉用量(平勺)
12-24月龄 | 3 | 180 | 6
24-36月龄 | 2 | 240 | 8
注意：每平勺约4.5克羊奶粉
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、乳铁蛋白、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素；维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；矿物质：碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。
注：生羊乳加工
致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

标签21：


美力源
Mileyn
爱优素®
国食注字 YP20230207
本品含硒、胆碱、锰、膳食纤维、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。
贮存方法
请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。
提示：请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按照要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。
陕西美力源乳业集团有限公司
生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
电话：400-600-8670
网址：www.sxmlyry.com
生产许可证编号：SC12961043100837
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
产品标准代码：GB 10767-2021
产品类别、属性及状态：幼儿配方乳粉、乳基粉状
冲调方法
1.冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2.饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55℃。
3.参照"喂哺用量建议表"将准确份量的水倒入奶瓶。
4.使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5.盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6.滴一滴奶在手背测试温度，如需一次冲调多瓶，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的液弃掉。
温馨提示：
1.喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
2.配制不当或使用不当可能会影响健康。
6 955801 118994
幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄，3段)
3段
净含量：800克
生产日期及保质期到期日见罐底
营养成分表
项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g
能量 | kJ | 100 | 1952
蛋白质 | g | 0.75 | 14.68
脂肪 | g | 1.04 | 20.3
亚油酸 | g | 0.16 | 3.128
α-亚麻酸 | mg | 12.48 | 243.68
碳水化合物 | g | 2.8 | 54.27
维生素
维生素A | μg RE | 20 | 393
维生素D | μg | 0.523 | 10.2
维生素E | mg α-TE | 0.18 | 3.46
维生素K1 | μg | 2.78 | 54.23
维生素B1 | μg | 27 | 532
维生素B2 | μg | 73 | 1418
维生素B12 | μg | 22.4 | 437.2
维生素B11 | μg | 0.121 | 2.364
烟酸(烟酰胺) | μg | 233 | 4541
叶酸 | μg | 5.5 | 107.6
泛酸 | μg | 174 | 3397
维生素C | mg | 4.5 | 88.7
生物素 | μg | 1.25 | 24.39
矿物质
钠 | mg | 7.84 | 153
钾 | mg | 26 | 516
铜 | μg | 17.5 | 341.8
镁 | mg | 2.0 | 38.8
铁 | mg | 0.26 | 5.17
锌 | mg | 0.17 | 3.28
钙 | mg | 28 | 546
磷 | mg | 17 | 339
碘 | μg | 5.2 | 102.3
氯 | mg | 22 | 430
可选择成分
硒 | μg | 0.64 | 12.41
胆碱 | mg | 7.8 | 153.1
锰 | μg | 4.56 | 89.05
二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.7 | 91.24
二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 5.1 | 100.1
低聚半乳糖 | mg | 152.77 | 2982
低聚果糖 | mg | 41.96 | 819
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯 | mg | 165.47 | 3230
叶黄素 | μg | 9.35 | 182.58
核苷酸 | mg | 1.64 | 32.07
乳铁蛋白 | mg | 1.84 | 35.89
注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g。
喂哺用量建议表
幼儿月龄 | 每日喂哺次数 | 加水量(ml) | 奶粉用量(平勺)
12-24月龄 | 3 | 180 | 6
24-36月龄 | 2 | 240 | 8
注意：每平勺约4.5克羊奶粉
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、低聚半乳糖、食用植物调和油(大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油)、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、乳铁蛋白、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素；维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；矿物质：碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。
注：生羊乳加工
致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

标签22：

冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮 5 分钟。
2. 饮用水沸水煮 5 分钟，冷却至 50-55°C。
3. 参照“ 喂哺用量建议表 ”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在 24 小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别：婴儿配方食品
产品属性及状态：乳基粉状
生产许可证编号：SC12961043100837
产品标准代码：GB 10765-2021
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
邮编：712200

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (mL)	奶粉用量 (平勺)
0-2周	8-10	30-90	1-3
2周-1月龄	6-7	90-120	3-4
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5-6	120-180	4-6
4-6月龄	5	180-210	6-7

注意：每平勺约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：

请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

6 955801 119892

美力源 Mileyn

爱赋

国食注字 YP20250046

婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）

1段

净含量：108克

生产日期及保质期到期日见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2040
蛋白质	g	0.57	11.56
脂肪	g	1.21	24.64
亚油酸	g	0.15	3.153
α-亚麻酸	mg	15.93	325.00
碳水化合物	g	2.6	52.6
维生素			
维生素A	μg RE	18	358
维生素D	μg	0.583	11.9
维生素E	mg α-TE	0.20	4.01
维生素K_1	μg	2.93	59.71
维生素B_1	μg	25	518
维生素B_2	μg	52	1051
维生素B_6	μg	16.9	344.1
维生素B_{12}	μg	0.083	1.686
烟酸(烟酰胺)	μg	163	3318
叶酸	μg	4.7	95
泛酸	μg	128	2613
维生素C	mg	3.8	76.6
生物素	μg	1.00	20.36
胆碱	mg	5.6	113.3
矿物质			
钠	mg	7.65	156
钾	mg	21	425
铜	μg	15.2	310.4
镁	mg	1.9	38.7
铁	mg	0.17	3.54
锌	mg	0.16	3.332
锰	μg	2.43	49.59
钙	mg	19	380
磷	mg	13	272
碘	μg	5.6	113.3
氯	mg	18	365
硒	μg	0.78	15.97
可选择成分			
肌醇	mg	4.2	85.7
牛磺酸	mg	1.5	30
左旋肉碱	mg	2.1	42.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	98.33
低聚半乳糖	mg	152.99	3121
低聚果糖	mg	40.25	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0295	0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT)	g	0.0088	0.180
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	220.59	4500
叶黄素	μg	3.97	80.92
核苷酸	mg	1.15	23.45

注：即食状态下，每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）、乳糖-N-新四糖（LNnT）、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、叶黄素；
维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B_1（盐酸硫胺素）、维生素B_2（核黄素）、维生素B_6（盐酸吡哆醇）、维生素B_{12}（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

温馨提示：

1、对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2、喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3、配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670

官方网址 www.sxmlyry.com

标签23：


冲调方法
1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55°C。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。
生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别：婴儿配方食品
产品属性及状态：乳基粉状
生产许可证编号：SC12961043100837
产品标准代码：GB 10765-2021
保质期：24个月
产地：陕西-咸阳
邮编：712200
喂哺用量建议表
婴儿月龄 | 每日喂哺次数 | 加水量(mL) | 奶粉用量(平勺)
0-2周 | 8-10 | 30-90 | 1-3
2周-1月龄 | 6-7 | 90-120 | 3-4
1-2月龄 | 5-6 | 120 | 4
2-4月龄 | 5-6 | 120-180 | 4-6
4-6月龄 | 5 | 180-210 | 6-7
注意：每平勺约4.5克羊奶粉。
贮存方法
请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。
提示：
请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。
6 955801 119908
美力源 Pilleyn
爱赋
国食注字 YP20250046
婴儿配方羊奶粉
（0-6月龄，1段）
1段
净含量:300克
生产日期及保质期到期日见罐底
营养成分表
项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g
能量 | kJ | 100 | 2040
蛋白质 | g | 0.57 | 11.56
脂肪 | g | 1.21 | 24.64
亚油酸 | g | 0.15 | 3.153
α-亚麻酸 | mg | 15.93 | 325.00
碳水化合物 | g | 2.6 | 52.6
维生素
维生素A | μg RE | 18 | 358
维生素D | μg | 0.583 | 11.9
维生素E | mg α-TE | 0.20 | 4.01
维生素K1 | μg | 2.93 | 59.71
维生素B1 | μg | 25 | 518
维生素B2 | μg | 52 | 1051
维生素B6 | μg | 16.9 | 344.1
维生素B12 | μg | 0.083 | 1.686
烟酸(烟酰胺) | μg | 163 | 3318
叶酸 | μg | 4.7 | 95
泛酸 | μg | 128 | 2613
维生素C | mg | 3.8 | 76.6
生物素 | μg | 1.00 | 20.36
胆碱 | mg | 5.6 | 113.3
矿物质
钠 | mg | 7.65 | 156
钾 | mg | 21 | 425
铜 | μg | 15.2 | 310.4
镁 | mg | 1.9 | 38.7
铁 | mg | 0.17 | 3.54
锌 | mg | 0.16 | 3.332
锰 | μg | 2.43 | 49.59
钙 | mg | 19 | 380
磷 | mg | 13 | 272
碘 | μg | 5.6 | 113.3
氯 | mg | 18 | 365
硒 | μg | 0.78 | 15.97
可选择成分
肌醇 | mg | 4.2 | 85.7
牛磺酸 | mg | 1.5 | 30
左旋肉碱 | mg | 2.1 | 42.8
二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.0 | 81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 4.8 | 98.33
低聚半乳糖 | mg | 152.99 | 3121
低聚果糖 | mg | 40.25 | 821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL) | g | 0.0295 | 0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT) | g | 0.0088 | 0.180
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯 | mg | 220.59 | 4500
叶黄素 | μg | 3.97 | 80.92
核苷酸 | mg | 1.15 | 23.45
注：即食状态下，每100mL奶液中含有该产品13.5g
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）、乳糖-N-新四糖（LNnT）、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、叶黄素；
维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B1（盐酸硫胺素）、维生素B2（核黄素）、维生素B6（盐酸吡哆醇）、维生素B12（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。
该配方含有乳糖、乳成分
温馨提示：
1. 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2. 喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。
客户热线 400-600-8670
官方网址 www.sxmlyry.com

标签24：


喂哺用量建议表
婴儿月龄 | 每日喂哺次数 | 加水量(mL) | 奶粉用量(平勺)
0-2周 | 8-10 | 30-90 | 1-3
2周-1月龄 | 6-7 | 90-120 | 3-4
1-2月龄 | 5-6 | 120 | 4
2-4月龄 | 5-6 | 120-180 | 4-6
4-6月龄 | 5 | 180-210 | 6-7
注意：每平勺约4.5克羊奶粉。
冲调方法
1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮5分钟。
2. 饮用水沸水煮5分钟，冷却至50-55°C。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在24小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。
贮存方法
请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。
提示：
请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。
6955801119915
生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别：婴儿配方食品
产品属性及状态：乳基粉状
生产许可证编号：SC12961043100837
产品标准代码：GB 10765-2021
保质期：24个月
产地：陕西-咸阳
邮编：712200
美力源 Mileyn
国食注字 YP20250046
爱赋
婴儿配方羊奶粉
（0-6月龄，1段）
1段
净含量：700克
生产日期及保质期到期日见罐底
营养成分表
项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g
能量 | kJ | 100 | 2040
蛋白质 | g | 0.57 | 11.56
脂肪 | g | 1.21 | 24.64
亚油酸 | g | 0.15 | 3.153
α-亚麻酸 | mg | 15.93 | 325.00
碳水化合物 | g | 2.6 | 52.6
维生素
维生素A | μg RE | 18 | 358
维生素D | μg | 0.583 | 11.9
维生素E | mg α-TE | 0.20 | 4.01
维生素K1 | μg | 2.93 | 59.71
维生素B1 | μg | 25 | 518
维生素B2 | μg | 52 | 1051
维生素B6 | μg | 16.9 | 344.1
维生素B12 | μg | 0.083 | 1.686
烟酸(烟酰胺) | μg | 163 | 3318
叶酸 | μg | 4.7 | 95
泛酸 | μg | 128 | 2613
维生素C | mg | 3.8 | 76.6
生物素 | μg | 1.00 | 20.36
胆碱 | mg | 5.6 | 113.3
矿物质
钠 | mg | 7.65 | 156
钾 | mg | 21 | 425
铜 | μg | 15.2 | 310.4
镁 | mg | 1.9 | 38.7
铁 | mg | 0.17 | 3.54
锌 | mg | 0.16 | 3.332
锰 | μg | 2.43 | 49.59
钙 | mg | 19 | 380
磷 | mg | 13 | 272
碘 | μg | 5.6 | 113.3
氯 | mg | 18 | 365
硒 | μg | 0.78 | 15.97
可选择成分
肌醇 | mg | 4.2 | 85.7
牛磺酸 | mg | 1.5 | 30
左旋肉碱 | mg | 2.1 | 42.8
二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.0 | 81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 4.8 | 98.33
低聚半乳糖 | mg | 152.99 | 3121
低聚果糖 | mg | 40.25 | 821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL) | g | 0.0295 | 0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT) | g | 0.0088 | 0.180
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯 | mg | 220.59 | 4500
叶黄素 | μg | 3.97 | 80.92
核苷酸 | mg | 1.15 | 23.45
注：即食状态下，每100ml奶液中含有该产品13.5g
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）、乳糖-N-新四糖（LNnT）、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、叶黄素；
维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B1（盐酸硫胺素）、维生素B2（核黄素）、维生素B6（盐酸吡哆醇）、维生素B12（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。
致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分
温馨提示：
1、对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2、喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3、配制不当或使用不当可能会影响健康。
服务热线 400-600-8670
官方网址 www.sxmlyry.com

标签25：


美力源
Mileyn
爱赋
国食注字 YP20250046
冲调方法
1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮 5 分钟。
2. 饮用水沸水煮 5 分钟，冷却至 50-55°C。
3. 参照 “ 喂哺用量建议表 ” 将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在 24 小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。
生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别：婴儿配方食品
产品属性及状态：乳基粉状
生产许可证编号：SC12961043100837
产品标准代码：GB 10765-2021
保质期：24个月
产地：陕西-咸阳
邮编：712200
喂哺用量建议表
婴儿月龄 | 每日喂哺次数 | 加水量 (mL) | 奶粉用量 (平勺)
0-2周 | 8-10 | 30-90 | 1-3
2周-1月龄 | 6-7 | 90-120 | 3-4
1-2月龄 | 5-6 | 120 | 4
2-4月龄 | 5-6 | 120-180 | 4-6
4-6月龄 | 5 | 180-210 | 6-7
注意：每平勺约4.5克羊奶粉。
贮存方法
请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。
提示：
请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺婴儿或参考喂哺用量建议表以配合婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。
6 955801 118949
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄，1段)
1段
净含量:800克
生产日期及保质期到期日见罐底
营养成分表
项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g
能量 | kJ | 100 | 2040
蛋白质 | g | 0.57 | 11.56
脂肪 | g | 1.21 | 24.64
亚油酸 | g | 0.15 | 3.153
α-亚麻酸 | mg | 15.93 | 325.00
碳水化合物 | g | 2.6 | 52.6
维生素
维生素A | μgRE | 18 | 358
维生素D | μg | 0.583 | 11.9
维生素E | mg α-TE | 0.20 | 4.01
维生素K1 | μg | 2.93 | 59.71
维生素B1 | μg | 25 | 518
维生素B2 | μg | 52 | 1051
维生素B6 | μg | 16.9 | 344.1
维生素B12 | μg | 0.083 | 1.686
烟酸(烟酰胺) | μg | 163 | 3318
叶酸 | μg | 4.7 | 95
泛酸 | μg | 128 | 2613
维生素C | mg | 3.8 | 76.6
生物素 | μg | 1.00 | 20.36
胆碱 | mg | 5.6 | 113.3
矿物质
钠 | mg | 7.65 | 156
钾 | mg | 21 | 425
铜 | μg | 15.2 | 310.4
镁 | mg | 1.9 | 38.7
铁 | mg | 0.17 | 3.54
锌 | mg | 0.16 | 3.332
锰 | μg | 2.43 | 49.59
钙 | mg | 19 | 380
磷 | mg | 13 | 272
碘 | μg | 5.6 | 113.3
氯 | mg | 18 | 365
硒 | μg | 0.78 | 15.97
可选择成分
肌醇 | mg | 4.2 | 85.7
牛磺酸 | mg | 1.5 | 30
左旋肉碱 | mg | 2.1 | 42.8
二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 4.0 | 81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA) | mg | 4.8 | 98.33
低聚半乳糖 | mg | 152.99 | 3121
低聚果糖 | mg | 40.25 | 821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL) | g | 0.0295 | 0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT) | g | 0.0088 | 0.180
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯 | mg | 220.59 | 4500
叶黄素 | μg | 3.97 | 80.92
核苷酸 | mg | 1.15 | 23.45
注：即食状态下，每100mL奶液中含有该产品13.5g
配料表
生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）、乳糖-N-新四糖（LNnT）、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、叶黄素；
维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B1（盐酸硫胺素）、维生素B2（核黄素）、维生素B6（盐酸吡哆醇）、维生素B12（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。
致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分
温馨提示：
1、对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2、喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3、配制不当或使用不当可能会影响健康。
服务热线 400-600-8670
官方网址 www.sxmlyry.com

标签26：

本品含肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。膳食纤维是低能量物质。

冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮 5 分钟。
2. 饮用水沸水煮 5 分钟，冷却至 50-55℃。
3. 参照“ 喂哺用量建议表 ”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在 24 小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园

产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性及状态：乳基粉状
生产许可证编号：SC12961043100837
产品标准代码：GB 10766-2021
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
邮编：712200

喂哺用量建议表

较大婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量（mL）	奶粉用量（平勺）
6-9月龄	4-5	180-240	6-8
9-12月龄	4	180-210	6-7

注意：每平勺约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：

请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

6 955801 119922

美力源 Mileyn

爱赋

国食注字 YP20250047

较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）

2 段

净含量：108克

生产日期及保质期到期日见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2084**
蛋白质	**g**	**0.58**	**12.06**
脂肪	**g**	**1.29**	**26.84**
亚油酸	g	0.18	3.758
α-亚麻酸	mg	19.47	405.68
碳水化合物	**g**	**2.4**	**49.9**
维生素			
维生素A	μg RE	22	453
维生素D	μg	0.571	11.9
维生素E	mg α-TE	0.20	4.21
维生素K_1	μg	2.97	61.80
维生素B_1	μg	25	515
维生素B_2	μg	48	995
维生素B_6	μg	16.3	339.1
维生素B_{12}	μg	0.078	1.630
烟酸(烟酰胺)	μg	160	3326
叶酸	μg	4.3	89
泛酸	μg	126	2622
维生素C	mg	3.7	76.6
生物素	μg	1.01	21.08
胆碱	mg	5.2	109.2
矿物质			
钠	mg	6.29	131
钾	mg	19	406
铜	μg	14.9	310.2
镁	mg	1.9	38.7
铁	mg	0.27	5.62
锌	mg	0.15	3.091
锰	μg	3.14	65.48
钙	mg	21	444
磷	mg	14	287
碘	μg	5.4	112.8
氯	mg	15	321
硒	μg	0.72	14.91
可选择成分			
肌醇	mg	4.0	82.7
牛磺酸	mg	1.5	31
左旋肉碱	mg	2.0	40.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.7	98.33
低聚半乳糖	mg	149.76	3121
低聚果糖	mg	39.40	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0289	0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT)	g	0.0086	0.180
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	167.71	3495
叶黄素	μg	9.71	202.30
核苷酸	mg	1.11	23.20

注：即食状态下，每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、低聚半乳糖、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）、乳糖-N-新四糖（LNnT）、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、叶黄素；
维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B_1（盐酸硫胺素）、维生素B_2（核黄素）、维生素B_6（盐酸吡哆醇）、维生素B_{12}（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

温馨提示：

1、食用本品时须配合添加辅助食品。
2、喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3、配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670
官方网址 www.sxmlyry.com

标签27：

本品含肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸，膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。膳食纤维是低聚糖物质。

冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮 5 分钟。
2. 饮用水沸水煮 5 分钟，冷却至 50-55°C。
3. 参照“ 喂哺用量建议表 ”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在 24 小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园

产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性及状态：乳基粉状
生产许可证编号：SC12961043100837
产品标准代码：GB 10766-2021
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
邮编：712200

喂哺用量建议表

较大婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量（mL）	奶粉用量（平勺）
6-9月龄	4-5	180-240	6-8
9-12月龄	4	180-210	6-7

注意：每平勺约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：

请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

6 955801 119939

美力源 Pilleyn

国食注字 YP20250047

爱赋



较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）2段

净含量：300克

生产日期及保质期到期日见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2084
蛋白质	g	0.58	12.06
脂肪	g	1.29	26.84
亚油酸	g	0.18	3.758
α-亚麻酸	mg	19.47	405.68
碳水化合物	g	2.4	49.9
维生素			
维生素A	μg RE	22	453
维生素D	μg	0.571	11.9
维生素E	mg α-TE	0.20	4.21
维生素K_1	μg	2.97	61.80
维生素B_1	μg	25	515
维生素B_2	μg	48	995
维生素B_6	μg	16.3	339.1
维生素B_{12}	μg	0.078	1.630
烟酸(烟酰胺)	μg	160	3326
叶酸	μg	4.3	89
泛酸	μg	126	2622
维生素C	mg	3.7	76.6
生物素	μg	1.01	21.08
胆碱	mg	5.2	109.2
矿物质			
钠	mg	6.29	131
钾	mg	19	406
铜	μg	14.9	310.2
镁	mg	1.9	38.7
铁	mg	0.27	5.62
锌	mg	0.15	3.091
锰	μg	3.14	65.48
钙	mg	21	444
磷	mg	14	287
碘	μg	5.4	112.8
氯	mg	15	321
硒	μg	0.72	14.91
可选择成分			
肌醇	mg	4.0	82.7
牛磺酸	mg	1.5	31
左旋肉碱	mg	2.0	40.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.7	98.33
低聚半乳糖	mg	149.76	3121
低聚果糖	mg	39.40	821
2'-岩藻糖基乳糖($2'$-FL)	g	0.0289	0.602
乳糖-*N*-新四糖(LNnT)	g	0.0086	0.180
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	167.71	3495
叶黄素	μg	9.71	202.30
核苷酸	mg	1.11	23.20

注：即食状态下，每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、低聚半乳糖、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）、乳糖-*N*-新四糖（LNnT）、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、叶黄素；
维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B_1（盐酸硫胺素）、维生素B_2（核黄素）、维生素B_6（盐酸吡哆醇）、维生素B_{12}（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳果、乳成分

温馨提示：

1、食用本品时须配合添加辅助食品。
2、喂奶时应抱着宝宝，如有噎怒可能导致宝宝窒息。
3、配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670
官方网址 www.sxmlyry.com

标签28：

本品含肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。膳食纤维是低能量物质。

冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮 5 分钟。
2. 饮用水沸水煮 5 分钟，冷却至 50-55℃。
3. 参照“ 喂哺用量建议表 ”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在 24 小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性及状态：乳基粉状
生产许可证编号：SC12961043100837
产品标准代码：GB 10766-2021
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
邮编：712200

喂哺用量建议表

较大婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量 (mL)	奶粉用量 (平勺)
6-9月龄	4-5	180-240	6-8
9-12月龄	4	180-210	6-7

注意：每平勺约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：

请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

6 955801 119946

美力源 Mileyn

爱赋

国食注字 YP20250047



较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）

2段

净含量：700克

生产日期及保质期到期日见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	**100**	**2084**
蛋白质	g	**0.58**	**12.06**
脂肪	g	**1.29**	**26.84**
亚油酸	g	0.18	3.758
α-亚麻酸	mg	19.47	405.68
碳水化合物	g	**2.4**	**49.9**
维生素			
维生素A	μg RE	22	453
维生素D	μg	0.571	11.9
维生素E	mg α-TE	0.20	4.21
维生素K_1	μg	2.97	61.80
维生素B_1	μg	25	515
维生素B_2	μg	48	995
维生素B_6	μg	16.3	339.1
维生素B_{12}	μg	0.078	1.630
烟酸(烟酰胺)	μg	160	3326
叶酸	μg	4.3	89
泛酸	μg	126	2622
维生素C	mg	3.7	76.6
生物素	μg	1.01	21.08
胆碱	mg	5.2	109.2
矿物质			
钠	mg	6.29	131
钾	mg	19	406
铜	μg	14.9	310.2
镁	mg	1.9	38.7
铁	mg	0.27	5.62
锌	mg	0.15	3.091
锰	μg	3.14	65.48
钙	mg	21	444
磷	mg	14	287
碘	μg	5.4	112.8
氯	mg	15	321
硒	μg	0.72	14.91
可选择成分			
肌醇	mg	4.0	82.7
牛磺酸	mg	1.5	31
左旋肉碱	mg	2.0	40.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.7	98.33
低聚半乳糖	mg	149.76	3121
低聚果糖	mg	39.40	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0289	0.602
乳糖-*N*-新四糖(LNnT)	g	0.0086	0.180
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	167.71	3495
叶黄素	μg	9.71	202.30
核苷酸	mg	1.11	23.20

注：即食状态下，每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、低聚半乳糖、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、乳糖-*N*-新四糖(LNnT)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素；
维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B_1(盐酸硫胺素)、维生素B_2(核黄素)、维生素B_6(盐酸吡哆醇)、维生素B_{12}(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

温馨提示：

1、食用本品时须配合添加辅助食品。
2、喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3、配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670

官方网址 www.sxmlyry.com

标签29：

本品含肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。膳食纤维是低能量物质。

冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮 5 分钟。
2. 饮用水沸水煮 5 分钟，冷却至 50-55°C。
3. 参照“ 喂哺用量建议表 ”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在 24 小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性及状态：乳基粉状
生产许可证编号：SC12961043100837
产品标准代码：GB 10766-2021
保质期：24个月
产地：陕西-咸阳
邮编：712200

喂哺用量建议表

较大婴儿月龄	每日喂哺次数	加水量（mL）	奶粉用量（平勺）
6-9月龄	4-5	180-240	6-8
9-12月龄	4	180-210	6-7

注意：每平勺约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：

请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺较大婴儿或参考喂哺用量建议表以配合较大婴儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

6 955801 118956

美力源 Mileyn

国食注字 YP20250047

爱赋



较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）

2 段

净含量：800克

生产日期及保质期到期日见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2084
蛋白质	g	0.58	12.06
脂肪	g	1.29	26.84
亚油酸	g	0.18	3.758
α-亚麻酸	mg	19.47	405.68
碳水化合物	g	2.4	49.9
维生素			
维生素A	μg RE	22	453
维生素D	μg	0.571	11.9
维生素E	mg α-TE	0.20	4.21
维生素K	μg	2.97	61.80
维生素B_1	μg	25	515
维生素B_2	μg	48	995
维生素B_6	μg	16.3	339.1
维生素B_{12}	μg	0.078	1.630
烟酸(烟酰胺)	μg	160	3326
叶酸	μg	4.3	89
泛酸	μg	126	2622
维生素C	mg	3.7	76.6
生物素	μg	1.01	21.08
胆碱	mg	5.2	109.2
矿物质			
钠	mg	6.29	131
钾	mg	19	406
铜	μg	14.9	310.2
镁	mg	1.9	38.7
铁	mg	0.27	5.62
锌	mg	0.15	3.091
锰	μg	3.14	65.48
钙	mg	21	444
磷	mg	14	287
碘	μg	5.4	112.8
氯	mg	15	321
硒	μg	0.72	14.91
可选择成分			
肌醇	mg	4.0	82.7
牛磺酸	mg	1.5	31
左旋肉碱	mg	2.0	40.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.7	98.33
低聚半乳糖	mg	149.76	3121
低聚果糖	mg	39.40	821
2'-岩藻糖基乳糖($2'$-FL)	g	0.0289	0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT)	g	0.0086	0.180
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	mg	167.71	3495
叶黄素	μg	9.71	202.30
核苷酸	mg	1.11	23.20

注：即食状态下，每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、低聚半乳糖、1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）、乳糖-N-新四糖（LNnT）、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、叶黄素；
维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B_1（盐酸硫胺素）、维生素B_2（核黄素）、维生素B_6（盐酸吡哆醇）、维生素B_{12}（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

温馨提示：

1. 食用本品时须配合添加辅助食品。
2. 喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
3. 配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670

官方网址 www.sxmlyry.com

标签30：

本品含硒、锰、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1，3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。膳食纤维是低能量物质。

冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮 5 分钟。
2. 饮用水沸水煮 5 分钟，冷却至 50-55°C。
3. 参照“ 喂哺用量建议表 ”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在 24 小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园

产品类别：幼儿配方食品
产品属性及状态：乳基粉状

生产许可证编号：SC12961043100837
产品标准代码：GB 10767-2021

保质期：24个月
产地：陕西·咸阳

邮编：712200

喂哺用量建议表

幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量（mL）	奶粉用量（平勺）
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注意：每平勺约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：

请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

6 955801 119953

美力源 Mileyn

爱赋

国食注字 YP20250048

幼儿配方羊奶粉（12–36月龄，3段）3段

净含量：108克

生产日期及保质期到期日见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**1977**
蛋白质	**g**	**0.72**	**14.28**
脂肪	**g**	**1.09**	**21.48**
亚油酸	g	0.15	2.902
α-亚麻酸	mg	13.77	272.31
碳水化合物	**g**	**2.7**	**53.04**
维生素			
维生素A	μg RE	24	468
维生素D	μg	0.602	11.9
维生素E	mg α-TE	0.19	3.69
维生素K_1	μg	2.92	57.75
维生素B_1	μg	26	523
维生素B_2	μg	53	1057
维生素B_6	μg	17.4	344.2
维生素B_{12}	μg	0.084	1.652
烟酸(烟酰胺)	μg	174	3435
叶酸	μg	4.6	90
泛酸	μg	139	2739
维生素C	mg	3.9	76.6
生物素	μg	1.16	22.91
矿物质			
钠	mg	7.64	151
钾	mg	23	450
铜	μg	16.0	315.5
镁	mg	2.0	39.9
铁	mg	0.27	5.34
锌	mg	0.14	2.731
钙	mg	23	450
磷	mg	16	307
碘	μg	5.3	105.5
氯	mg	21	419
可选择成分			
硒	μg	0.67	13.17
胆碱	mg	5.7	112.0
锰	μg	3.48	68.89
肌醇	mg	4.5	88.6
牛磺酸	mg	1.8	35
左旋肉碱	mg	2.1	41.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	98.33
低聚半乳糖	mg	157.87	3121
低聚果糖	mg	41.53	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0305	0.602
乳糖-*N*-新四糖(LNnT)	g	0.0091	0.180
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	155.29	3070
叶黄素	μg	10.23	202.30
核苷酸	mg	1.25	24.70

注：即食状态下，每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、低聚半乳糖、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油）、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）、乳糖-*N*-新四糖（LNnT）、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、叶黄素；
维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B_1（盐酸硫胺素）、维生素B_2（核黄素）、维生素B_6（盐酸吡哆醇）、维生素B_{12}（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

注：生羊乳加工

致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

温馨提示：

1、喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
2、配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670

官方网址 www.sxmlyry.com

标签31：

本品含硒、锰、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1，3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。膳食纤维是低能量物质。

冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮 5 分钟。
2. 饮用水沸水煮 5 分钟，冷却至 50-55°C。
3. 参照 “ 喂哺用量建议表 ” 将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在 24 小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别：幼儿配方食品
产品属性及状态：乳基粉状
生产许可证编号：SC12961043100837
产品标准代码：GB 10767-2021
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
邮编：712200

喂哺用量建议表

幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量（mL）	奶粉用量（平勺）
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注意：每平勺约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：

请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

6 955801 119960

美力源 Mileyn

爱赋

国食注字 YP20250048



幼儿配方羊奶粉（12-36月龄，3段）3段

净含量：300克

生产日期及保质期到期日见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1977
蛋白质	g	0.72	14.28
脂肪	g	1.09	21.48
亚油酸	g	0.15	2.902
α-亚麻酸	mg	13.77	272.31
碳水化合物	g	2.7	53.04
维生素			
维生素A	μg RE	24	468
维生素D	μg	0.602	11.9
维生素E	mg α-TE	0.19	3.69
维生素K_1	μg	2.92	57.75
维生素B_1	μg	26	523
维生素B_2	μg	53	1057
维生素B_6	μg	17.4	344.2
维生素B_{12}	μg	0.084	1.652
烟酸(烟酰胺)	μg	174	3435
叶酸	μg	4.6	90
泛酸	μg	139	2739
维生素C	mg	3.9	76.6
生物素	μg	1.16	22.91
矿物质			
钠	mg	7.64	151
钾	mg	23	450
铜	μg	16.0	315.5
镁	mg	2.0	39.9
铁	mg	0.27	5.34
锌	mg	0.14	2.731
钙	mg	23	450
磷	mg	16	307
碘	μg	5.3	105.5
氯	mg	21	419
可选择成分			
硒	μg	0.67	13.17
胆碱	mg	5.7	112.0
锰	μg	3.48	68.89
肌醇	mg	4.5	88.6
牛磺酸	mg	1.8	35
左旋肉碱	mg	2.1	41.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	98.33
低聚半乳糖	mg	157.87	3121
低聚果糖	mg	41.53	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0305	0.602
乳糖-N-新四糖(LNnT)	g	0.0091	0.180
1，3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	mg	155.29	3070
叶黄素	μg	10.23	202.30
核苷酸	mg	1.25	24.70

注：即食状态下，每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、低聚半乳糖、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油）、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）、乳糖-N-新四糖（LNnT）、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、叶黄素；
维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B_1（盐酸硫胺素）、维生素B_2（核黄素）、维生素B_6（盐酸吡哆醇）、维生素B_{12}（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

注：生羊乳加工

温馨提示：

1. 喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
2. 配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670

官方网站 www.sxmlyry.com

标签32：

本品含硒、锰、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1，3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸。膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。膳食纤维是低能量物质。

冲调方法


1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮 5 分钟。


2. 饮用水沸水煮 5 分钟，冷却至 50-55°C。


3. 参照“ 喂哺用量建议表 ”将准确份量的水倒入奶瓶。


4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。


5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。


6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在 24 小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别：幼儿配方食品
产品属性及状态：乳基粉状
生产许可证编号：SC12961043100837
产品标准代码：GB 10767-2021
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
邮编：712200

喂哺用量建议表

幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量（mL）	奶粉用量（平勺）
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注意：每平勺约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：

请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

6 955801 119977

美力源 Mlleyn

爱赋

国食注字 YP20250048



幼儿配方羊奶粉（12-36月龄，3段）3段

净含量：700克

生产日期及保质期到期日见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	**100**	**1977**
蛋白质	g	**0.72**	**14.28**
脂肪	g	**1.09**	**21.48**
亚油酸	g	0.15	2.902
α-亚麻酸	mg	13.77	272.31
碳水化合物	g	**2.7**	**53.04**
维生素			
维生素A	μg RE	24	468
维生素D	μg	0.602	11.9
维生素E	mg α-TE	0.19	3.69
维生素K_1	μg	2.92	57.75
维生素B_1	μg	26	523
维生素B_2	μg	53	1057
维生素B_6	μg	17.4	344.2
维生素B_{12}	μg	0.084	1.652
烟酸(烟酰胺)	μg	174	3435
叶酸	μg	4.6	90
泛酸	μg	139	2739
维生素C	mg	3.9	76.6
生物素	μg	1.16	22.91
矿物质			
钠	mg	7.64	151
钾	mg	23	450
铜	μg	16.0	315.5
镁	mg	2.0	39.9
铁	mg	0.27	5.34
锌	mg	0.14	2.731
钙	mg	23	450
磷	mg	16	307
碘	μg	5.3	105.5
氯	mg	21	419
可选择成分			
硒	μg	0.67	13.17
胆碱	mg	5.7	112.0
锰	μg	3.48	68.89
肌醇	mg	4.5	88.6
牛磺酸	mg	1.8	35
左旋肉碱	mg	2.1	41.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	98.33
低聚半乳糖	mg	157.87	3121
低聚果糖	mg	41.53	821
2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)	g	0.0305	0.602
乳糖-*N*-新四糖(LNnT)	g	0.0091	0.180
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	mg	155.29	3070
叶黄素	μg	10.23	202.30
核苷酸	mg	1.25	24.70

注：即食状态下，每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、低聚半乳糖、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油）、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）、乳糖-*N*-新四糖（LNnT）、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、叶黄素；
维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B_1（盐酸硫胺素）、维生素B_2（核黄素）、维生素B_6（盐酸吡哆醇）、维生素B_{12}（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

注：生羊乳加工

致敏物质提示：本产品含有坚果、乳成分

温馨提示：

1. 喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
2. 配制不当或使用不当可能会影响健康。

服务热线 400-600-8670

官方网址 www.sxmlyry.com

标签33：

本品含硒、锰、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、膳食纤维、1，3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸、膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。膳食纤维是低能量物质。

冲调方法

1. 冲调奶粉前应彻底洗净和擦干手，将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗消毒，用沸水煮 5 分钟。
2. 饮用水沸水煮 5 分钟，冷却至 50-55℃。
3. 参照“喂哺用量建议表”将准确份量的水倒入奶瓶。
4. 使用专用量勺加入奶粉，请勿压紧专用量勺里的奶粉，每瓶奶液需要单独调配。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
6. 滴一滴奶在手背测试温度。如需一次冲调多餐，必须将奶液冷藏并在 24 小时内食用完，将喂剩下的奶液弃掉。

生产者：陕西美力源乳业集团有限公司
地址：陕西省咸阳市武功县工业园
产品类别：幼儿配方食品
产品属性及状态：乳基粉状
生产许可证编号：SC12961043100837
产品标准代码：GB 10767-2021
保质期：24个月
产地：陕西·咸阳
邮编：712200

喂哺用量建议表

幼儿月龄	每日喂哺次数	加水量（mL）	奶粉用量（平勺）
12-24月龄	3	180	6
24-36月龄	2	240	8

注意：每平勺约4.5克羊奶粉。

贮存方法

请将本产品置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。每次使用后请盖紧罐盖。开封后建议尽快食用，未开封的产品请在包装注明的保质期内食用。

提示：

请勿用微波炉加热，以免烫伤。请遵守说明，按要求对奶瓶和奶嘴进行清洗消毒。请按照医护人员的指示喂哺幼儿或参考喂哺用量建议表以配合幼儿食量或胃口。除非有医生建议，否则不要改变奶粉比例。不当的冲调方式可能会给您的宝宝带来不适。

6 955801 118963

美力源 Mileyn

国食注字 YP20250048

爱赋



幼儿配方羊奶粉（12-36月龄，3段）

3段

净含量：800克

生产日期及保质期到期日见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	**100**	**1977**
蛋白质	g	**0.72**	**14.28**
脂肪	g	**1.09**	**21.48**
亚油酸	g	0.15	2.902
α-亚麻酸	mg	13.77	272.31
碳水化合物	g	**2.7**	**53.04**
维生素			
维生素A	μg RE	24	468
维生素D	μg	0.602	11.9
维生素E	mg α-TE	0.19	3.69
维生素K_1	μg	2.92	57.75
维生素B_1	μg	26	523
维生素B_2	μg	53	1057
维生素B_6	μg	17.4	344.2
维生素B_{12}	μg	0.084	1.652
烟酸(烟酰胺)	μg	174	3435
叶酸	μg	4.6	90
泛酸	μg	139	2739
维生素C	mg	3.9	76.6
生物素	μg	1.16	22.91
矿物质			
钠	mg	7.64	151
钾	mg	23	450
铜	μg	16.0	315.5
镁	mg	2.0	39.9
铁	mg	0.27	5.34
锌	mg	0.14	2.731
钙	mg	23	450
磷	mg	16	307
碘	μg	5.3	105.5
氯	mg	21	419
可选择成分			
硒	μg	0.67	13.17
胆碱	mg	5.7	112.0
锰	μg	3.48	68.89
肌醇	mg	4.5	88.6
牛磺酸	mg	1.8	35
左旋肉碱	mg	2.1	41.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	81.23
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	98.33
低聚半乳糖	mg	157.87	3121
低聚果糖	mg	41.53	821
2'-岩藻糖基乳糖($2'$-FL)	g	0.0305	0.602
乳糖-*N*-新四糖(LNnT)	g	0.0091	0.180
1，3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	mg	155.29	3070
叶黄素	μg	10.23	202.30
核苷酸	mg	1.25	24.70

注：即食状态下，每100mL奶液中含有该产品13.5g

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、低聚半乳糖、食用植物调和油（大豆油、玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油）、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）、乳糖-*N*-新四糖（LNnT）、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸油脂、核桃油、磷脂、柠檬酸钾、磷酸二氢钠、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、核苷酸（5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、叶黄素；
维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B_1（盐酸硫胺素）、维生素B_2（核黄素）、维生素B_6（盐酸吡哆醇）、维生素B_{12}（氰钴胺）、维生素C（L-抗坏血酸钠）、烟酸（烟酰胺）、泛酸（D-泛酸钙）、叶酸、生物素（D-生物素）、氯化胆碱；
矿物质：碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

注：生羊乳加工

敏感物质提示：本产品含有坚果、乳成分

温馨提示：


1. 喂奶时应抱着宝宝，如有疏忽可能导致宝宝窒息。
2. 配制不当或使用不当可能会影响健康。

客户热线 400-600-8670

官方网址 www.sxmlyry.com

标签34：美力源系列产品顶盖图形

美力源系列：
108g、300g、708g和
800g所有包装通用



标签35：爱优素系列产品顶盖图形

爱优素系列：
108g、300g和800g所有包装通用

