附件 2：陕西优利士乳业集团有限责任公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签1：



标签2：

奶具消毒及食用方法


调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。


将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。


调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45°C左右。


依照婴幼儿年龄及**推荐喂哺表**的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。


再依**推荐喂哺表**的指示加入准确份量(条)的乳粉。


摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时建议按照**推荐喂哺表**用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

对于0～6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

6 949008 407883

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量			每日喂哺次数
	温开水(mL)	乳粉		
		(g)	(条)	乳粉（次）
0-1周	60	9	1	8
1-2周	90	13.5	1.5	6
2-4周	120	18	2	5
1-2月	150	22.5	2.5	5
2-4月	180	27	3	5
4-6月	210	31.5	3.5	5

说明：每条乳粉约9g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳

产品信息及产品资料查询 www.sxruyo.com
产品咨询热线 400-692-8998

优利士®

金瑞优®



1段

净含量：270克(9克x30)　国食注字 YP20170648　生产日期、保质期至:见罐底

婴儿配方羊乳粉
(0－6月龄，1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2081	镁	mg	1.7	34.8
蛋白质	g	0.49	10.20	铁	mg	0.19	3.90
脂肪	g	1.18	24.50	锌	mg	0.19	3.90
亚油酸	g	0.15	3.16	锰	μg	2.78	57.94
α-亚麻酸	mg	20	410	钙	mg	16	325
碳水化合物	g	2.8	57.82	磷	mg	11	226
维生素				碘	μg	4.5	93.6
维生素A	μg RE	18	383	氯	mg	15	321
维生素D	μg	0.60	12.49	硒	μg	0.90	18.73
维生素E	mg α-TE	0.27	5.71	可选择成分			
维生素K_1	μg	1.85	38.60	肌醇	mg	3.2	66.8
维生素B_1	μg	25	510	牛磺酸	mg	1.7	36.2
维生素B_2	μg	39	815	左旋肉碱	mg	1.5	31.8
维生素B_6	μg	15.1	313.9	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.6
维生素B_{12}	μg	0.131	2.725	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	111.8
烟酸（烟酰胺）	μg	148	3090	膳食纤维			
叶酸	μg	4.3	90.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	158	3296	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.7	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.71	14.82	1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.26	5.33
胆碱	mg	6.0	124.9	甘油三酯			
矿物质				叶黄素	μg	1.9	40.0
钠	mg	9	182	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	21	442	酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	62.3
铜	μg	17.9	372.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、脂酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K_1)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B_1)、核黄素(维生素B_2)、盐酸吡哆醇(维生素B_6)、氰钴胺(维生素B_{12})、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、磷酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。
本产品含有乳成分。

标签3：

奶具消毒及食用方法



调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。



将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。



调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。



依照婴幼儿年龄及**推荐喂哺表**的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。



再依**推荐喂哺表**指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。



摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照**推荐喂哺表**用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量			每日喂哺次数
	温开水（mL）	乳粉		乳粉（次）
		（g）	（平匙）	
0-1周	60	9	2	8
1-2周	90	13.5	3	6
2-4周	120	18	4	5
1-2月	150	22.5	5	5
2-4月	180	27	6	5
4-6月	210	31.5	7	5

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳

产品信息及产品资料查询 www.sxruyo.com
产品咨询热线 400-692-8998

优利士®

金瑞优®



段

净含量：700克 国食注字 YP20170648 生产日期、保质期至：见罐底

婴儿配方羊乳粉
（0—6月龄，1段）

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2081	镁	mg	1.7	34.8
蛋白质	g	0.49	10.20	铁	mg	0.19	3.90
脂肪	g	1.18	24.50	锌	mg	0.19	3.90
亚油酸	g	0.15	3.16	锰	μg	2.78	57.94
α-亚麻酸	mg	20	410	钙	mg	16	325
碳水化合物	g	2.8	57.82	磷	mg	11	226
维生素				碘	μg	4.5	93.6
维生素A	μg RE	18	383	氯	mg	15	321
维生素D	μg	0.60	12.49	硒	μg	0.90	18.73
维生素E	mg α-TE	0.27	5.71	可选择成分			
维生素K	μg	1.85	38.60	肌醇	mg	3.2	66.8
维生素B_1	μg	25	510	牛磺酸	mg	1.7	36.2
维生素B_2	μg	39	815	左旋肉碱	mg	1.5	31.8
维生素B_6	μg	15.1	313.9	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.6
维生素B_{12}	μg	0.131	2.725	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	111.8
烟酸（烟酰胺）	μg	148	3090	膳食纤维			
叶酸	μg	4.3	90.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	158	3296	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.7	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.71	14.82	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.33
胆碱	mg	6.0	124.9				
矿物质				叶黄素	μg	1.9	40.0
钠	mg	9	182	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	21	442	酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	62.3
铜	μg	17.9	372.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯（维生素A）、胆钙化醇（维生素D）、dl-α-醋酸生育酚（维生素E）、植物甲萘醌（维生素K）、L-抗坏血酸钠（维生素C）、盐酸硫胺素（维生素B_1）、核黄素（维生素B_2）、盐酸吡哆醇（维生素B_6）、氰钴胺（维生素B_{12}）、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙（泛酸）、烟酰胺、D-生物素（生物素）、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。
本产品含有乳成分。

6 949008 408101

标签4：

奶具消毒及食用方法



① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

② 将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

③ 调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

④ 依照婴幼儿年龄及**推荐喂哺表**的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

⑤ 再依**推荐喂哺表**指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

⑥ 摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照**推荐喂哺表**用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

对于0～6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量			每日喂哺次数
	温开水（mL）	乳粉		乳粉（次）
		（g）	（平匙）	
0-1周	60	9	2	8
1-2周	90	13.5	3	6
2-4周	120	18	4	5
1-2月	150	22.5	5	5
2-4月	180	27	6	5
4-6月	210	31.5	7	5

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10765-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳

产品信息及产品资料查询 www.sxruyo.com
产品咨询热线 400-692-8998

优利士®

金瑞优®



1 段

净含量：718克 国食注字 YP20170648 生产日期、保质期至：见罐底

婴儿配方羊乳粉
（0－6月龄，1段）

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2081	镁	mg	1.7	34.8
蛋白质	g	0.49	10.20	铁	mg	0.19	3.90
脂肪	g	1.18	24.50	锌	mg	0.19	3.90
亚油酸	g	0.15	3.16	锰	μg	2.78	57.94
α-亚麻酸	mg	20	410	钙	mg	16	325
碳水化合物	g	2.8	57.82	磷	mg	11	226
维生素				碘	μg	4.5	93.6
维生素A	μg RE	18	383	氯	mg	15	321
维生素D	μg	0.60	12.49	硒	μg	0.90	18.73
维生素E	mg α-TE	0.27	5.71	可选择成分			
维生素K_1	μg	1.85	38.60	肌醇	mg	3.2	66.8
维生素B_1	μg	25	510	牛磺酸	mg	1.7	36.2
维生素B_2	μg	39	815	左旋肉碱	mg	1.5	31.8
维生素B_6	μg	15.1	313.9	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.6
维生素B_{12}	μg	0.131	2.725	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	111.8
烟酸（烟酰胺）	μg	148	3090	膳食纤维			
叶酸	μg	4.3	90.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	158	3296	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.7	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.71	14.82	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.33
胆碱	mg	6.0	124.9	叶黄素	μg	1.9	40.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钠	mg	9	182	酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	62.3
钾	mg	21	442				
铜	μg	17.9	372.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯（维生素A）、胆钙化醇（维生素D）、dl-α-醋酸生育酚（维生素E）、植物甲萘醌（维生素K_1）、L-抗坏血酸钠（维生素C）、盐酸硫胺素（维生素B_1）、核黄素（维生素B_2）、盐酸吡哆醇（维生素B_6）、氰钴胺（维生素B_{12}）、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙（泛酸）、烟酰胺、D-生物素（生物素）、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、碘盐。

本产品含有乳成分。

6 949008 409580

标签5：


奶具消毒及食用方法
调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。
将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。
调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。
依照婴幼儿年龄及推荐喂哺表的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
再依推荐喂哺表的指示加入准确份量(条)的乳粉。
摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。
温馨提示：调奶时建议按照推荐喂哺表用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
6～12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
6 949008 407890
推荐喂哺表
月龄
每次喂哺份量
温开水(mL)
乳粉
(g)
(条)
每日喂哺次数
乳粉(次)
6-12月
210
31.5
3.5
3-4
说明：每条乳粉约9g。
贮存条件
本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。
产品类别：较大婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10766-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯
产品信息及产品资料查询
www.sxruyo.com
产品咨询热线
400-692-8998
优利士
金瑞优
2
段
净含量：270克(9克x30)
国食注字 YP20170649
生产日期、保质期至:见罐底
较大婴儿配方羊乳粉
(6—12月龄，2段)
营养成分表
项目 单位 每100kJ 每100g
能量 kJ 100 2078
蛋白质 g 0.58 12.10
脂肪 g 1.18 24.60
亚油酸 g 0.13 2.74
α-亚麻酸 mg 17 361
碳水化合物 g 2.7 55.52
维生素
维生素A μg RE 23 468
维生素D μg 0.60 12.47
维生素E mg α-TE 0.27 5.53
维生素K1 μg 1.88 39.07
维生素B1 μg 25 514
维生素B2 μg 35 718
维生素B6 μg 14.8 308.0
维生素B12 μg 0.125 2.602
烟酸(烟酰胺) μg 148 3069
叶酸 μg 3.5 72.5
泛酸 μg 157 3265
维生素C mg 4.0 83.8
生物素 μg 0.73 15.19
胆碱 mg 6.0 124.7
矿物质
钠 mg 6 123
钾 mg 24 503
铜 μg 13.4 277.9
镁 mg 1.9 40.0
铁 mg 0.30 6.23
锌 mg 0.18 3.82
锰 μg 3.02 62.80
钙 mg 21 442
磷 mg 14 292
碘 μg 4.5 93.5
氯 mg 19 405
硒 μg 0.69 14.27
可选择成分
肌醇 mg 3.0 61.8
牛磺酸 mg 1.7 35.3
左旋肉碱 mg 1.5 31.5
二十二碳六烯酸(DHA) mg 4.5 93.5
二十碳四烯酸(AA/ARA) mg 5.5 114.1
膳食纤维
低聚半乳糖 g 0.027 0.560
低聚果糖 g 0.007 0.149
聚葡萄糖 g 0.08 1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 g 0.21 4.33
叶黄素 μg 7.8 162.0
乳铁蛋白 mg 1.6 32.6
酪蛋白磷酸肽 mg 3.3 68.2
说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。
配料表
生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K1)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B1)、核黄素(维生素B2)、盐酸吡哆醇(维生素B6)、氰钴胺(维生素B12)、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。
本产品含有乳成分。

标签6：

奶具消毒及食用方法



1. 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。
2. 将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。
3. 调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。
4. 依照婴幼儿年龄及**推荐喂哺表**的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
5. 再依**推荐喂哺表**指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。
6. 摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙。建议按照**推荐喂哺表**用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量			每日喂哺次数
	温开水（mL）	乳粉		
		（g）	（平匙）	乳粉（次）
6-12月	210	31.5	7	3-4

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：较大婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10766-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳

产品信息及产品资料查询 www.sxruyo.com
产品咨询热线 400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

优利士®

金瑞优®



2 段

净含量：700克 国食注字 YP20170649 生产日期、保质期至：见罐底

较大婴儿配方羊乳粉
（6—12月龄，2段）

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2078	镁	mg	1.9	40.0
蛋白质	g	0.58	12.10	铁	mg	0.30	6.23
脂肪	g	1.18	24.60	锌	mg	0.18	3.82
亚油酸	g	0.13	2.74	锰	μg	3.02	62.80
α-亚麻酸	mg	17	361	钙	mg	21	442
碳水化合物	g	2.7	55.52	磷	mg	14	292
维生素				碘	μg	4.5	93.5
维生素A	μg RE	23	468	氯	mg	19	405
维生素D	μg	0.60	12.47	硒	μg	0.69	14.27
维生素E	mg α-TE	0.27	5.53	可选择成分			
维生素K_1	μg	1.88	39.07	肌醇	mg	3.0	61.8
维生素B_1	μg	25	514	牛磺酸	mg	1.7	35.3
维生素B_2	μg	35	718	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B_6	μg	14.8	308.0	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.5
维生素B_{12}	μg	0.125	2.602	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.5	114.1
烟酸（烟酰胺）	μg	148	3069	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	157	3265	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.8	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.73	15.19	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.33
胆碱	mg	6.0	124.7				
矿物质				叶黄素	μg	7.8	162.0
钠	mg	6	123	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	24	503	酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	68.2
铜	μg	13.4	277.9				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯（维生素A）、胆钙化醇（维生素D）、dl-α-醋酸生育酚（维生素E）、植物甲萘醌（维生素K）、L-抗坏血酸钠（维生素C）、盐酸硫胺素（维生素B_1）、核黄素（维生素B_2）、盐酸吡哆醇（维生素B_6）、氰钴胺（维生素B_{12}）、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙（泛酸）、烟酰胺、D-生物素（生物素）、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸钠、硫酸镁、磷酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。

本产品含有乳成分。

6 949008 407807

标签7：

奶具消毒及食用方法



调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。



将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。



调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。



依照婴幼儿年龄及**推荐喂哺表**的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。



再依**推荐喂哺表**指示加入准确份量（平匙）的乳粉，只可用专用量匙。



摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照**推荐喂哺表**用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量			每日喂哺次数
	温开水（mL）	乳粉		
		（g）	（平匙）	乳粉（次）
6-12月	210	31.5	7	3-4

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：较大婴儿配方食品
产品标准代号：GB 10766-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳

产品信息及产品资料查询 www.sxruyo.com
产品咨询热线 400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

优利士®

金瑞优®



2 段

净含量：718克 国食注字 YP20170649 生产日期、保质期至:见罐底

较大婴儿配方羊乳粉
(6—12月龄，2段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2078	镁	mg	1.9	40.0
蛋白质	g	0.58	12.10	铁	mg	0.30	6.23
脂肪	g	1.18	24.60	锌	mg	0.18	3.82
亚油酸	g	0.13	2.74	锰	μg	3.02	62.80
α-亚麻酸	mg	17	361	钙	mg	21	442
碳水化合物	g	2.7	55.52	磷	mg	14	292
维生素				碘	μg	4.5	93.5
维生素A	μg RE	23	468	氯	mg	19	405
维生素D	μg	0.60	12.47	硒	μg	0.69	14.27
维生素E	mg α-TE	0.27	5.53	可选择成分			
维生素K_1	μg	1.88	39.07	肌醇	mg	3.0	61.8
维生素B_1	μg	25	514	牛磺酸	mg	1.7	35.3
维生素B_2	μg	35	718	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B_6	μg	14.8	308.0	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.5
维生素B_{12}	μg	0.125	2.602	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.5	114.1
烟酸（烟酰胺）	μg	148	3069	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.5	低聚半乳糖	g	0.027	0.560
泛酸	μg	157	3265	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	4.0	83.8	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.73	15.19	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.33
胆碱	mg	6.0	124.7				
矿物质				叶黄素	μg	7.8	162.0
钠	mg	6	123	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	24	503	酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	68.2
铜	μg	13.4	277.9				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、花生四烯酸油脂、核桃油、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、酪酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B_1)、核黄素(维生素B_2)、盐酸吡哆醇(维生素B_6)、氰钴胺(维生素B_{12})、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化钾、磷脂。
本产品含有乳成分。

6 949008 409634

标签8：

奶具消毒及食用方法



调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。



将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。



调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45°C左右。



依照婴幼儿年龄及**推荐喂哺表**的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。



再依**推荐喂哺表**的指示加入准确份量（条）的乳粉。



摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时建议按照**推荐喂哺表**用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

6 949008 407906



推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量			每日喂哺次数
	温开水（mL）	乳粉		乳粉（次）
		（g）	（条）	
12个月起	210	31.5	3.5	3

说明：每条乳粉约9g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品
产品标准代号：GB 10767-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

产品信息及产品资料查询 www.sxruyo.com
产品咨询热线 400-692-8998

优利士

金瑞优®



3 段

净含量：270克（9克×30） 国食注字 YP20170650 生产日期、保质期至：见罐底

幼儿配方羊乳粉
（12–36月龄，3段）

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2053	铁	mg	0.30	6.16
蛋白质	g	0.74	15.20	锌	mg	0.16	3.21
脂肪	g	1.17	24.00	钙	mg	25	521
亚油酸	g	0.09	1.90	磷	mg	17	349
α-亚麻酸	mg	12	246	碘	μg	2.5	51.5
碳水化合物	g	2.5	52.25	氯	mg	24	499
维生素				可选择成分			
维生素A	μg RE	23	462	硒	μg	0.75	15.32
维生素D	μg	0.60	12.32	胆碱	mg	6.0	123.6
维生素E	mg α-TE	0.26	5.27	锰	μg	3.31	68.05
维生素K_1	μg	1.93	39.63	肌醇	mg	3.1	63.3
维生素B_1	μg	25	518	牛磺酸	mg	1.8	37.9
维生素B_2	μg	35	710	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B_6	μg	14.9	305.1	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.9	60.2
维生素B_{12}	μg	0.127	2.608	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.6	94.9
烟酸（烟酰胺）	μg	150	3086	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.7	低聚半乳糖	g	0.028	0.575
泛酸	μg	164	3376	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	3.9	80.0	聚葡萄糖	g	0.08	1.62
生物素	μg	0.78	16.01	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
矿物质				叶黄素	μg	7.9	162.0
钠	mg	7	151	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	29	595	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	80.5
铜	μg	13.8	282.4				
镁	mg	1.9	39.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、核桃油、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯（维生素A）、胆钙化醇（维生素D）、dl-α-醋酸生育酚（维生素E）、植物甲萘醌（维生素K_1）、L-抗坏血酸钠（维生素C）、盐酸硫胺素（维生素B_1）、核黄素（维生素B_2）、盐酸吡哆醇（维生素B_6）、氰钴胺（维生素B_{12}）、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙（泛酸）、烟酰胺、D-生物素（生物素）、牛磺酸、磷酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、磷脂。
本产品含有乳成分。

生羊乳加工

标签9：

奶具消毒及食用方法

1. 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。
2. 将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。
3. 调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。
4. 依照婴幼儿年龄及**推荐喂哺表**的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
5. 再依**推荐喂哺表**指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。
6. 摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照**推荐喂哺表**用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量			每日喂哺次数
	温开水（mL）	乳粉		
		（g）	（平匙）	乳粉（次）
12个月起	210	31.5	7	3

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品　　产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10767-2021　　保质期：24个月
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司　　产地：陕西 咸阳
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品信息及产品资料查询 www.sxruyo.com　　产品咨询热线 400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

优利士®

金瑞优®



3 段

净含量：700克　国食注字 YP20170650　生产日期、保质期至:见罐底

幼儿配方羊乳粉
(12–36月龄,3段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2053	铁	mg	0.30	6.16
蛋白质	g	0.74	15.20	锌	mg	0.16	3.21
脂肪	g	1.17	24.00	钙	mg	25	521
亚油酸	g	0.09	1.90	磷	mg	17	349
α-亚麻酸	mg	12	246	碘	μg	2.5	51.5
碳水化合物	g	2.5	52.25	氯	mg	24	499
维生素				可选择成分			
维生素A	μg RE	23	462	硒	μg	0.75	15.32
维生素D	μg	0.60	12.32	胆碱	mg	6.0	123.6
维生素E	mg α-TE	0.26	5.27	锰	μg	3.31	68.05
维生素K_1	μg	1.93	39.63	肌醇	mg	3.1	63.3
维生素B_1	μg	25	518	牛磺酸	mg	1.8	37.9
维生素B_2	μg	35	710	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B_6	μg	14.9	305.1	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.9	60.2
维生素B_{12}	μg	0.127	2.608	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.6	94.9
烟酸（烟酰胺）	μg	150	3086	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.7	低聚半乳糖	g	0.028	0.575
泛酸	μg	164	3376	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	3.9	80.0	聚葡萄糖	g	0.08	1.62
生物素	μg	0.78	16.01	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
矿物质				叶黄素	μg	7.9	162.0
钠	mg	7	151	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	29	595	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	80.5
铜	μg	13.8	282.4				
镁	mg	1.9	39.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核桃油、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B_1)、核黄素(维生素B_2)、盐酸吡哆醇(维生素B_6)、氰钴胺(维生素B_{12})、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、磷酯。
本产品含有乳成分。

生羊乳加工

6 949008 408118

标签10：

奶具消毒及食用方法



① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖上的残奶。

② 将奶具放入沸水中煮五分钟，待用。

③ 调奶用水应煮沸五分钟，冷却至45℃左右。

④ 依照婴幼儿年龄及**推荐喂哺表**的指示，先将准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

⑤ 再依**推荐喂哺表**指示加入准确份量（平匙）的乳粉。只可用专用量匙。

⑥ 摇动奶瓶直至乳粉完全溶解。

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照**推荐喂哺表**用量冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

推荐喂哺表

月龄	每次喂哺份量			每日喂哺次数
	温开水（mL）	乳粉		乳粉（次）
		（g）	（平匙）	
12个月起	210	31.5	7	3

说明：每平匙乳粉约4.5g。

贮存条件

本品应贮藏阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请务必密封剩余乳粉并于1个月内食用完毕。

产品类别：幼儿配方食品
产品标准代号：GB 10767-2021
制造商：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
食品生产许可证编号：SC12961042400829

产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳

产品信息及产品资料查询 www.sxruyo.com

产品咨询热线 400-692-8998

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

优利士®

金瑞优®



3 段

净含量：718克 国食注字 YP20170650 生产日期、保质期至:见罐底

幼儿配方羊乳粉
(12—36月龄,3段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2053	铁	mg	0.30	6.16
蛋白质	g	0.74	15.20	锌	mg	0.16	3.21
脂肪	g	1.17	24.00	钙	mg	25	521
亚油酸	g	0.09	1.90	磷	mg	17	349
α-亚麻酸	mg	12	246	碘	μg	2.5	51.5
碳水化合物	g	2.5	52.25	氯	mg	24	499
维生素				可选择成分			
维生素A	μg RE	23	462	硒	μg	0.75	15.32
维生素D	μg	0.60	12.32	胆碱	mg	6.0	123.6
维生素E	mg α-TE	0.26	5.27	锰	μg	3.31	68.05
维生素K_1	μg	1.93	39.63	肌醇	mg	3.1	63.3
维生素B_1	μg	25	518	牛磺酸	mg	1.8	37.9
维生素B_2	μg	35	710	左旋肉碱	mg	1.5	31.5
维生素B_6	μg	14.9	305.1	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.9	60.2
维生素B_{12}	μg	0.127	2.608	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.6	94.9
烟酸（烟酰胺）	μg	150	3086	膳食纤维			
叶酸	μg	3.5	72.7	低聚半乳糖	g	0.028	0.575
泛酸	μg	164	3376	低聚果糖	g	0.007	0.149
维生素C	mg	3.9	80.0	聚葡萄糖	g	0.08	1.62
生物素	μg	0.78	16.01	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
矿物质				叶黄素	μg	7.9	162.0
钠	mg	7	151	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
钾	mg	29	595	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	80.5
铜	μg	13.8	282.4				
镁	mg	1.9	39.0				

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g。

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、核桃油、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱、氯化胆碱、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、盐酸硫胺素(维生素B_1)、核黄素(维生素B_2)、盐酸吡哆醇(维生素B_6)、氰钴胺(维生素B_{12})、叶黄素、肌醇、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、烟酰胺、D-生物素(生物素)、牛磺酸、碘酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、磷酸。
本产品含有乳成分。

生羊乳加工





标签11：

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096
蛋白质	g	0.50	10.40
脂肪	g	1.21	25.40
亚油酸	g	0.16	3.37
α-亚麻酸	mg	18	386
碳水化合物	g	2.7	56.4
维生素			
维生素A	μg RE	18	374
维生素D	μg	0.60	12.58
维生素E	mg α-TE	0.25	5.14
维生素K1	μg	1.81	37.97
维生素B1	μg	25	523
维生素B2	μg	39	807
维生素B6	μg	15.0	314.6
维生素B12	μg	0.131	2.743
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3138
叶酸	μg	4.3	90.4
泛酸	μg	161	3369
维生素C	mg	4.2	87.3
生物素	μg	0.71	14.79
胆碱	mg	6.0	125.8
矿物质			
钠	mg	9	183

项目	单位	每100kJ	每100g
钾	mg	21	445
铜	μg	17.9	374.7
镁	mg	1.7	36.3
铁	mg	0.19	3.95
锌	mg	0.18	3.74
锰	μg	2.6	54.1
钙	mg	16	330
磷	mg	11	228
碘	μg	4.5	94.3
氯	mg	15	322
硒	μg	0.90	18.86
可选择成分			
肌醇	mg	3.3	68.2
牛磺酸	mg	1.8	37.0
左旋肉碱	mg	1.3	26.3
二十二碳六烯酸 (DHA)	mg	4.5	94.3
二十碳四烯酸 (AA/ARA)	mg	5.2	109.5
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.68
低聚果糖	g	0.04	0.93
核苷酸	mg	0.6	12.0
乳铁蛋白	mg	1.2	25.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	61.7

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

1.本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
2.每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
3.开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者： 陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址： 陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站： www.ylshi.com
电话： 029-35330333

产地： 陕西·咸阳
产品类别： 婴儿配方食品
产品属性： 乳基粉状
产品标准代号： GB 10765-2021
食品生产许可证编号： SC12961042400829
保质期： 24个月
生产批号： 见罐底
检验合格证号： 同生产批号

400 6060 780
工作时间 AM08:30 PM05:30

6 949008 408569

优利士®

优能佳®

1段

净含量:100克 国食注字 YP 20230162

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

生产日期、保质期至:见罐底

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、*dl-α*-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。
本产品含有乳成分。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量 量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	每天喂哺次数
0-1周	2	9	60	8
1-2周	3	13.5	90	6
2-4周	4	18	120	5
1-2个月	5	22.5	150	5
2-4个月	6	27	180	5
4-6个月	7	31.5	210	5

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法

1. 1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。
2. 2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。
3. 3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。
4. 4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C 左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。
5. 5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。
6. 6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签12：


营养成分表
项目 单位 每100kJ 每100g
能量 kJ 100 2096
蛋白质 g 0.50 10.40
脂肪 g 1.21 25.40
亚油酸 g 0.16 3.37
α-亚麻酸 mg 18 386
碳水化合物 g 2.7 56.4
维生素
维生素A μg RE 18 374
维生素D μg 0.60 12.58
维生素E mg α-TE 0.25 5.14
维生素K1 μg 1.81 37.97
维生素B1 μg 25 523
维生素B2 μg 39 807
维生素B6 μg 15.0 314.6
维生素B12 μg 0.131 2.743
烟酸(烟酰胺) μg 150 3138
叶酸 μg 4.3 90.4
泛酸 μg 161 3369
维生素C mg 4.2 87.3
生物素 μg 0.71 14.79
胆碱 mg 6.0 125.8
矿物质
钠 mg 9 183
钾 mg 21 445
铜 μg 17.9 374.7
镁 mg 1.7 36.3
铁 mg 0.19 3.95
锌 mg 0.18 3.74
锰 μg 2.6 54.1
钙 mg 16 330
磷 mg 11 228
碘 μg 4.5 94.3
氯 mg 15 322
硒 μg 0.90 18.86
可选择成分
肌醇 mg 3.3 68.2
牛磺酸 mg 1.8 37.0
左旋肉碱 mg 1.3 26.3
二十二碳六烯酸(DHA) mg 4.5 94.3
二十碳四烯酸(AA/ARA) mg 5.2 109.5
膳食纤维
低聚半乳糖 g 0.08 1.68
低聚果糖 g 0.04 0.93
核苷酸 mg 0.6 12.0
乳铁蛋白 mg 1.2 25.0
酪蛋白磷酸肽 mg 2.9 61.7
说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克
储藏方法
1. 本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
2. 每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
3. 开封后，请务必在一个月内食用完毕。
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylshi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
400 6060 780
工作时间 AM08:30 PM05:30
6 949008 408576
优利士®
优能佳®
1段
净含量:400克 国食注字 YP 20230162 生产日期、保质期至:见罐底
婴儿配方羊乳粉
（0－6月龄，1段）
配料表
生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。
本产品含有乳成分。
喂哺用量建议表
月龄 每次乳粉用量 每天喂哺次数
量匙数量 乳粉克数 温开水(ml)
0-1周 2 9 60 8
1-2周 3 13.5 90 6
2-4周 4 18 120 5
1-2个月 5 22.5 150 5
2-4个月 6 27 180 5
4-6个月 7 31.5 210 5
注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。
喂哺及注意事项
请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。
奶具消毒及调奶方法
1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。
2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。
3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。
4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。
5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。
6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。
温馨提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签13：



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096
蛋白质	g	0.50	10.40
脂肪	g	1.21	25.40
亚油酸	g	0.16	3.37
α-亚麻酸	mg	18	386
碳水化合物	g	2.7	56.4
维生素			
维生素A	μg RE	18	374
维生素D	μg	0.60	12.58
维生素E	mg α-TE	0.25	5.14
维生素K_1	μg	1.81	37.97
维生素B_1	μg	25	523
维生素B_2	μg	39	807
维生素B_6	μg	15.0	314.6
维生素B_{12}	μg	0.131	2.743
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3138
叶酸	μg	4.3	90.4
泛酸	μg	161	3369
维生素C	mg	4.2	87.3
生物素	μg	0.71	14.79
胆碱	mg	6.0	125.8
矿物质			
钠	mg	9	183
钾	mg	21	445
铜	μg	17.9	374.7
镁	mg	1.7	36.3
铁	mg	0.19	3.95
锌	mg	0.18	3.74
锰	μg	2.6	54.1
钙	mg	16	330
磷	mg	11	228
碘	μg	4.5	94.3
氯	mg	15	322
硒	μg	0.90	18.86
可选择成分			
肌醇	mg	3.3	68.2
牛磺酸	mg	1.8	37.0
左旋肉碱	mg	1.3	26.3
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.3
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.2	109.5
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.68
低聚果糖	g	0.04	0.93
核苷酸	mg	0.6	12.0
乳铁蛋白	mg	1.2	25.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	61.7

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

1. 本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
2. 每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
3. 开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者： 陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址： 陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站： www.ylshi.com
电话： 029-35330333
产地： 陕西·咸阳

产品类别： 婴儿配方食品
产品属性： 乳基粉状
产品标准代号： GB 10765-2021
食品生产许可证编号： SC12961042400829
保质期： 24个月
生产批号： 见罐底
检验合格证号： 同生产批号

400 6060 780
工作时间 周一-周五 AM08:30 PM05:30

6 949008 408224

优利士®

优能佳®

1段

净含量:700克 国食注字 YP 20230162 生产日期、保质期至:见罐底

婴儿配方羊乳粉
（0－6月龄，1段）

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、*dl-α*-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-乌苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。
本产品含有乳成分。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
0-1周	2	9	60	8
1-2周	3	13.5	90	6
2-4周	4	18	120	5
1-2个月	5	22.5	150	5
2-4个月	6	27	180	5
4-6个月	7	31.5	210	5

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法

1. 在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。
3. 把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。
4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。
5. 用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。
6. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签14：



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096
蛋白质	g	0.50	10.40
脂肪	g	1.21	25.40
亚油酸	g	0.16	3.37
α-亚麻酸	mg	18	386
碳水化合物	g	2.7	56.4
维生素			
维生素A	μg RE	18	374
维生素D	μg	0.60	12.58
维生素E	mg α-TE	0.25	5.14
维生素K_1	μg	1.81	37.97
维生素B_1	μg	25	523
维生素B_2	μg	39	807
维生素B_6	μg	15.0	314.6
维生素B_{12}	μg	0.131	2.743
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3138
叶酸	μg	4.3	90.4
泛酸	μg	161	3369
维生素C	mg	4.2	87.3
生物素	μg	0.71	14.79
胆碱	mg	6.0	125.8
矿物质			
钠	mg	9	183
钾	mg	21	445
铜	μg	17.9	374.7
镁	mg	1.7	36.3
铁	mg	0.19	3.95
锌	mg	0.18	3.74
锰	μg	2.6	54.1
钙	mg	16	330
磷	mg	11	228
碘	μg	4.5	94.3
氯	mg	15	322
硒	μg	0.90	18.86
可选择成分			
肌醇	mg	3.3	68.2
牛磺酸	mg	1.8	37.0
左旋肉碱	mg	1.3	26.3
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.3
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.2	109.5
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.68
低聚果糖	g	0.04	0.93
核苷酸	mg	0.6	12.0
乳铁蛋白	mg	1.2	25.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	61.7

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

1. 本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
2. 每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
3. 开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylshi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 6060 780
工作时间 AM08:30 PM05:30

6 949008 409603

优利士®

优能佳®

1段

净含量:750克 国食注字 YP 20230162 生产日期、保质期至:见罐底

婴儿配方羊乳粉
（0－6月龄，1段）

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、*dl-α*-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。
本产品含有乳成分。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
0-1周	2	9	60	8
1-2周	3	13.5	90	6
2-4周	4	18	120	5
1-2个月	5	22.5	150	5
2-4个月	6	27	180	5
4-6个月	7	31.5	210	5

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法

1. 在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。
3. 把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。
4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。
5. 用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。
6. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签15：

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096
蛋白质	g	0.50	10.40
脂肪	g	1.21	25.40
亚油酸	g	0.16	3.37
α-亚麻酸	mg	18	386
碳水化合物	g	2.7	56.4
维生素			
维生素A	μg RE	18	374
维生素D	μg	0.60	12.58
维生素E	mg α-TE	0.25	5.14
维生素K_1	μg	1.81	37.97
维生素B_1	μg	25	523
维生素B_2	μg	39	807
维生素B_6	μg	15.0	314.6
维生素B_{12}	μg	0.131	2.743
烟酸(烟酰胺)	μg	150	3138
叶酸	μg	4.3	90.4
泛酸	μg	161	3369
维生素C	mg	4.2	87.3
生物素	μg	0.71	14.79
胆碱	mg	6.0	125.8
矿物质			
钠	mg	9	183
钾	mg	21	445
铜	μg	17.9	374.7
镁	mg	1.7	36.3
铁	mg	0.19	3.95
锌	mg	0.18	3.74
锰	μg	2.6	54.1
钙	mg	16	330
磷	mg	11	228
碘	μg	4.5	94.3
氯	mg	15	322
硒	μg	0.90	18.86
可选择成分			
肌醇	mg	3.3	68.2
牛磺酸	mg	1.8	37.0
左旋肉碱	mg	1.3	26.3
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.3
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.2	109.5
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.68
低聚果糖	g	0.04	0.93
核苷酸	mg	0.6	12.0
乳铁蛋白	mg	1.2	25.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	61.7

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

1. 本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
2. 每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
3. 开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylshi.com
电话：029-35330333

产地：陕西·咸阳
产品类别：婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 6060 780
工作时间 AM08:30 PM05:30

6 949008 407913

优利士®

优能佳®

1段

净含量:800克 国食注字 YP 20230162 生产日期、保质期至:见罐底

婴儿配方羊乳粉
（0－6月龄，1段）

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、*dl-α*-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

本产品含有乳成分。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
0-1周	2	9	60	8
1-2周	3	13.5	90	6
2-4周	4	18	120	5
1-2个月	5	22.5	150	5
2-4个月	6	27	180	5
4-6个月	7	31.5	210	5

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法


1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。


2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。


3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。


4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。


5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。


6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签16：


营养成分表
项目 单位 每100kJ 每100g
能量 kJ 100 2083
蛋白质 g 0.60 12.40
脂肪 g 1.20 25.00
亚油酸 g 0.13 2.80
α-亚麻酸 mg 16 327
碳水化合物 g 2.6 54.5
维生素
维生素A μg RE 23 469
维生素D μg 0.60 12.50
维生素E mg α-TE 0.24 4.93
维生素K1 μg 1.85 38.51
维生素B1 μg 25 527
维生素B2 μg 32 668
维生素B6 μg 14.7 306.6
维生素B12 μg 0.123 2.555
烟酸(烟酰胺) μg 149 3101
叶酸 μg 3.5 72.5
泛酸 μg 158 3290
维生素C mg 4.2 87.4
生物素 μg 0.73 15.11
胆碱 mg 6.0 125.0
矿物质
钠 mg 6 127
钾 mg 25 516
铜 μg 14.3 298.7
镁 mg 2.1 44.0
铁 mg 0.30 6.25
锌 mg 0.20 4.07
锰 μg 2.90 60.31
钙 mg 22 448
磷 mg 15 303
碘 μg 4.5 93.7
氯 mg 20 425
硒 μg 0.66 13.73
可选择成分
肌醇 mg 2.9 60.2
牛磺酸 mg 1.7 34.8
左旋肉碱 mg 1.2 24.8
二十二碳六烯酸(DHA) mg 4.5 93.7
二十碳四烯酸(AA/ARA) mg 5.4 112.3
膳食纤维
低聚半乳糖 g 0.08 1.68
低聚果糖 g 0.04 0.93
核苷酸 mg 0.6 12.0
乳铁蛋白 mg 1.2 25.0
酪蛋白磷酸肽 mg 3.4 71.3
说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克
储藏方法
1. 本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
2. 每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
3. 开封后，请务必在一个月内食用完毕。
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylshi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
400 6060 780
工作时间 AM08:30 PM05:30
6 949008 408583
优利士®
优能佳®
2段
净含量:400克 国食注字 YP 20230163 生产日期、保质期至:见罐底
较大婴儿配方羊乳粉
(6－12月龄，2段)
配料表
生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。
本产品含有乳成分。
喂哺用量建议表
月龄 每次乳粉用量 每天喂哺次数
量匙数量 乳粉克数 温开水(ml)
6-12个月 7 31.5 210 3-4
注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。
喂哺及注意事项
请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。
奶具消毒及调奶方法
1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。
2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。
3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。
4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。
5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。
6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。
温馨提示：对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

标签17：

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2083
蛋白质	g	0.60	12.40
脂肪	g	1.20	25.00
亚油酸	g	0.13	2.80
α-亚麻酸	mg	16	327
碳水化合物	g	2.6	54.5
维生素			
维生素A	μg RE	23	469
维生素D	μg	0.60	12.50
维生素E	mg α-TE	0.24	4.93
维生素K_1	μg	1.85	38.51
维生素B_1	μg	25	527
维生素B_2	μg	32	668
维生素B_6	μg	14.7	306.6
维生素B_{12}	μg	0.123	2.555
烟酸(烟酰胺)	μg	149	3101
叶酸	μg	3.5	72.5
泛酸	μg	158	3290
维生素C	mg	4.2	87.4
生物素	μg	0.73	15.11
胆碱	mg	6.0	125.0
矿物质			
钠	mg	6	127
钾	mg	25	516
铜	μg	14.3	298.7
镁	mg	2.1	44.0
铁	mg	0.30	6.25
锌	mg	0.20	4.07
锰	μg	2.90	60.31
钙	mg	22	448
磷	mg	15	303
碘	μg	4.5	93.7
氯	mg	20	425
硒	μg	0.66	13.73
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	60.2
牛磺酸	mg	1.7	34.8
左旋肉碱	mg	1.2	24.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.7
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	112.3
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.68
低聚果糖	g	0.04	0.93
核苷酸	mg	0.6	12.0
乳铁蛋白	mg	1.2	25.0
酪蛋白磷酸肽	mg	3.4	71.3

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

1. 本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
2. 每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
3. 开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者： 陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址： 陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站： www.ylshi.com
电话： 029-35330333
产地： 陕西·咸阳

产品类别： 较大婴儿配方食品
产品属性： 乳基粉状
产品标准代号： GB 10766-2021
食品生产许可证编号： SC12961042400829
保质期： 24个月
生产批号： 见罐底
检验合格证号： 同生产批号

400 6060 780
工作时间 周一-周五 AM08:30 PM05:30

6 949008 408231

优利士®

优能佳®

2段

净含量:700克 国食注字 YP 20230163 生产日期、保质期至:见罐底

较大婴儿配方羊乳粉
(6－12月龄，2段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、*dl-α*-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-乌苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。
本产品含有乳成分。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
6-12个月	7	31.5	210	3-4

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法



温馨提示：对于6－12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

标签18：



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2083
蛋白质	g	0.60	12.40
脂肪	g	1.20	25.00
亚油酸	g	0.13	2.80
α-亚麻酸	mg	16	327
碳水化合物	g	2.6	54.5
维生素			
维生素A	μg RE	23	469
维生素D	μg	0.60	12.50
维生素E	mg α-TE	0.24	4.93
维生素K_1	μg	1.85	38.51
维生素B_1	μg	25	527
维生素B_2	μg	32	668
维生素B_6	μg	14.7	306.6
维生素B_{12}	μg	0.123	2.555
烟酸(烟酰胺)	μg	149	3101
叶酸	μg	3.5	72.5
泛酸	μg	158	3290
维生素C	mg	4.2	87.4
生物素	μg	0.73	15.11
胆碱	mg	6.0	125.0
矿物质			
钠	mg	6	127
钾	mg	25	516
铜	μg	14.3	298.7
镁	mg	2.1	44.0
铁	mg	0.30	6.25
锌	mg	0.20	4.07
锰	μg	2.90	60.31
钙	mg	22	448
磷	mg	15	303
碘	μg	4.5	93.7
氯	mg	20	425
硒	μg	0.66	13.73
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	60.2
牛磺酸	mg	1.7	34.8
左旋肉碱	mg	1.2	24.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.7
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	112.3
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.68
低聚果糖	g	0.04	0.93
核苷酸	mg	0.6	12.0
乳铁蛋白	mg	1.2	25.0
酪蛋白磷酸肽	mg	3.4	71.3

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

1. 本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
2. 每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
3. 开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylshi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 6060 780
工作时间 周一-周五 AM08:30 PM05:30

6 949008 409610

优利士®

优能佳®

2段

净含量:750克 国食注字 YP 20230163 生产日期、保质期至:见罐底

较大婴儿配方羊乳粉
(6－12月龄，2段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、*dl-α*-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-乌苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。
本产品含有乳成分。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
6-12个月	7	31.5	210	3-4

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法

1. 在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。
3. 把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。
4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。
5. 用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。
6. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于6－12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

标签19：



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2083
蛋白质	g	0.60	12.40
脂肪	g	1.20	25.00
亚油酸	g	0.13	2.80
α-亚麻酸	mg	16	327
碳水化合物	g	2.6	54.5
维生素			
维生素A	μg RE	23	469
维生素D	μg	0.60	12.50
维生素E	mg α-TE	0.24	4.93
维生素K_1	μg	1.85	38.51
维生素B_1	μg	25	527
维生素B_2	μg	32	668
维生素B_6	μg	14.7	306.6
维生素B_{12}	μg	0.123	2.555
烟酸(烟酰胺)	μg	149	3101
叶酸	μg	3.5	72.5
泛酸	μg	158	3290
维生素C	mg	4.2	87.4
生物素	μg	0.73	15.11
胆碱	mg	6.0	125.0
矿物质			
钠	mg	6	127
钾	mg	25	516
铜	μg	14.3	298.7
镁	mg	2.1	44.0
铁	mg	0.30	6.25
锌	mg	0.20	4.07
锰	μg	2.90	60.31
钙	mg	22	448
磷	mg	15	303
碘	μg	4.5	93.7
氯	mg	20	425
硒	μg	0.66	13.73
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	60.2
牛磺酸	mg	1.7	34.8
左旋肉碱	mg	1.2	24.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	93.7
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	112.3
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.68
低聚果糖	g	0.04	0.93
核苷酸	mg	0.6	12.0
乳铁蛋白	mg	1.2	25.0
酪蛋白磷酸肽	mg	3.4	71.3

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

1. 本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
2. 每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
3. 开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylshi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 6060 780
工作时间 AM08:30 PM05:30

6 949008 407920

优利士®

优能佳®

2段

净含量:800克 国食注字 YP 20230163 生产日期、保质期至:见罐底

较大婴儿配方羊乳粉
(6－12月龄，2段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、*dl-α*-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。
本产品含有乳成分。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
6-12个月	7	31.5	210	3-4

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法

1. 在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。
3. 把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。
4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。
5. 用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。
6. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

温馨提示：对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

标签20：



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067	铜	μg	14.6	302.7
蛋白质	g	0.73	15.00	镁	mg	2.0	41.0
脂肪	g	1.20	24.80	铁	mg	0.30	6.20
亚油酸	g	0.10	2.08	锌	mg	0.15	3.20
α-亚麻酸	mg	12	250	钙	mg	25	517
碳水化合物	g	2.5	51.4	磷	mg	17	343
维生素				碘	μg	2.8	56.9
维生素A	μg RE	22	465	氯	mg	24	492
维生素D	μg	0.60	12.40	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.23	4.70	硒	μg	0.71	14.72
维生素K_1	μg	1.88	38.96	胆碱	mg	6.0	124.0
维生素B_1	μg	26	531	锰	μg	3.09	63.88
维生素B_2	μg	33	684	肌醇	mg	3.1	63.1
维生素B_6	μg	14.8	305.1	牛磺酸	mg	1.8	37.7
维生素B_{12}	μg	0.126	2.595	左旋肉碱	mg	1.2	25.4
烟酸(烟酰胺)	μg	151	3124	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.2	45.6
叶酸	μg	3.5	72.7	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.3	68.8
泛酸	μg	165	3413	膳食纤维			
维生素C	mg	4.1	83.9	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.77	15.88	低聚果糖	g	0.04	0.93
矿物质				核苷酸	mg	0.6	12.0
钠	mg	7	137	乳铁蛋白	mg	1.1	23.5
钾	mg	28	582	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	81.6

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

1. 本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
2. 每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
3. 开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者： 陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址： 陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站： www.ylshi.com
电话： 029-35330333

产地： 陕西·咸阳
产品类别： 幼儿配方食品
产品属性： 乳基粉状
产品标准代号： GB 10767-2021
食品生产许可证编号： SC12961042400829
保质期： 24个月
生产批号： 见罐底
检验合格证号： 同生产批号

400 6060 780
工作时间 AM08:30 PM05:30

6 949008 408590

优利士®

优能佳®

3段

净含量:400克 国食注字 YP 20230164 生产日期、保质期至:见罐底

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、*dl*-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。
本产品含有乳成分。

生羊乳加工

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
12-36个月	7	31.5	210	3

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法

1. 在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。
2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。
3. 把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。
4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。
5. 用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。
6. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

标签21：

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067	铜	μg	14.6	302.7
蛋白质	g	0.73	15.00	镁	mg	2.0	41.0
脂肪	g	1.20	24.80	铁	mg	0.30	6.20
亚油酸	g	0.10	2.08	锌	mg	0.15	3.20
α-亚麻酸	mg	12	250	钙	mg	25	517
碳水化合物	g	2.5	51.4	磷	mg	17	343
维生素				碘	μg	2.8	56.9
维生素A	μg RE	22	465	氯	mg	24	492
维生素D	μg	0.60	12.40	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.23	4.70	硒	μg	0.71	14.72
维生素K_1	μg	1.88	38.96	胆碱	mg	6.0	124.0
维生素B_1	μg	26	531	锰	μg	3.09	63.88
维生素B_2	μg	33	684	肌醇	mg	3.1	63.1
维生素B_6	μg	14.8	305.1	牛磺酸	mg	1.8	37.7
维生素B_{12}	μg	0.126	2.595	左旋肉碱	mg	1.2	25.4
烟酸(烟酰胺)	μg	151	3124	二十二碳六烯酸 (DHA)	mg	2.2	45.6
叶酸	μg	3.5	72.7	二十碳四烯酸 (AA/ARA)	mg	3.3	68.8
泛酸	μg	165	3413	膳食纤维			
维生素C	mg	4.1	83.9	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.77	15.88	低聚果糖	g	0.04	0.93
矿物质				核苷酸	mg	0.6	12.0
钠	mg	7	137	乳铁蛋白	mg	1.1	23.5
钾	mg	28	582	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	81.6

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

1. 本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
2. 每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
3. 开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者： 陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址： 陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站： www.ylshi.com
电话： 029-35330333
产地： 陕西·咸阳

产品类别： 幼儿配方食品
产品属性： 乳基粉状
产品标准代号： GB 10767-2021
食品生产许可证编号： SC12961042400829
保质期： 24个月
生产批号： 见罐底
检验合格证号： 同生产批号

400 6060 780
工作时间 周一-周五 AM08:30 PM05:30

6 949008 408248

优利士®

优能佳®

3段

净含量:700克 国食注字 YP 20230164 生产日期、保质期至:见罐底

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、*dl-α*-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。
本产品含有乳成分。

生羊乳加工

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
12-36个月	7	31.5	210	3

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法


1. 在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。


2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。


3. 把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。


4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。


5. 用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。


6. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

标签22：


营养成分表
项目 单位 每100kJ 每100g
能量 kJ 100 2067
蛋白质 g 0.73 15.00
脂肪 g 1.20 24.80
亚油酸 g 0.10 2.08
α-亚麻酸 mg 12 250
碳水化合物 g 2.5 51.4
维生素
维生素A μg RE 22 465
维生素D μg 0.60 12.40
维生素E mg α-TE 0.23 4.70
维生素K1 μg 1.88 38.96
维生素B1 μg 26 531
维生素B2 μg 33 684
维生素B6 μg 14.8 305.1
维生素B12 μg 0.126 2.595
烟酸(烟酰胺) μg 151 3124
叶酸 μg 3.5 72.7
泛酸 μg 165 3413
维生素C mg 4.1 83.9
生物素 μg 0.77 15.88
矿物质
钠 mg 7 137
钾 mg 28 582
铜 μg 14.6 302.7
镁 mg 2.0 41.0
铁 mg 0.30 6.20
锌 mg 0.15 3.20
钙 mg 25 517
磷 mg 17 343
碘 μg 2.8 56.9
氯 mg 24 492
可选择成分
硒 μg 0.71 14.72
胆碱 mg 6.0 124.0
锰 μg 3.09 63.88
肌醇 mg 3.1 63.1
牛磺酸 mg 1.8 37.7
左旋肉碱 mg 1.2 25.4
二十二碳六烯酸(DHA) mg 2.2 45.6
二十碳四烯酸(AA/ARA) mg 3.3 68.8
膳食纤维
低聚半乳糖 g 0.08 1.68
低聚果糖 g 0.04 0.93
核苷酸 mg 0.6 12.0
乳铁蛋白 mg 1.1 23.5
酪蛋白磷酸肽 mg 3.9 81.6
说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克
储藏方法
1. 本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
2. 每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
3. 开封后，请务必在一个月内食用完毕。
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylshi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：幼儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
400 6060 780
工作时间 AM08:30 PM05:30
6 949008 409627
优利士
优能佳®
3段
净含量:750克 国食注字 YP 20230164 生产日期、保质期至:见罐底
幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)
配料表
生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。
本产品含有乳成分。
生羊乳加工
喂哺用量建议表
月龄 每次乳粉用量 每天喂哺次数
量匙数量 乳粉克数 温开水(ml)
12-36个月 7 31.5 210 3
注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。
喂哺及注意事项
请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。
奶具消毒及调奶方法
1.在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。
2.清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。
3.把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。
4.饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。
5.用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。
6.用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

标签23：



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067	铜	μg	14.6	302.7
蛋白质	g	0.73	15.00	镁	mg	2.0	41.0
脂肪	g	1.20	24.80	铁	mg	0.30	6.20
亚油酸	g	0.10	2.08	锌	mg	0.15	3.20
α-亚麻酸	mg	12	250	钙	mg	25	517
碳水化合物	g	2.5	51.4	磷	mg	17	343
维生素				碘	μg	2.8	56.9
维生素A	μg RE	22	465	氯	mg	24	492
维生素D	μg	0.60	12.40	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.23	4.70	硒	μg	0.71	14.72
维生素K_1	μg	1.88	38.96	胆碱	mg	6.0	124.0
维生素B_1	μg	26	531	锰	μg	3.09	63.88
维生素B_2	μg	33	684	肌醇	mg	3.1	63.1
维生素B_6	μg	14.8	305.1	牛磺酸	mg	1.8	37.7
维生素B_{12}	μg	0.126	2.595	左旋肉碱	mg	1.2	25.4
烟酸(烟酰胺)	μg	151	3124	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.2	45.6
叶酸	μg	3.5	72.7	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.3	68.8
泛酸	μg	165	3413	膳食纤维			
维生素C	mg	4.1	83.9	低聚半乳糖	g	0.08	1.68
生物素	μg	0.77	15.88	低聚果糖	g	0.04	0.93
矿物质				核苷酸	mg	0.6	12.0
钠	mg	7	137	乳铁蛋白	mg	1.1	23.5
钾	mg	28	582	酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	81.6

说明：每100毫升奶液含乳粉13.5克

储藏方法

1. 本品应储存于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏；
2. 每次食用完毕后，请及时盖紧罐盖；
3. 开封后，请务必在一个月内食用完毕。

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
官方网站：www.ylshi.com
电话：029-35330333
产地：陕西·咸阳
产品类别：幼儿配方食品
产品属性：乳基粉状
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829
保质期：24个月
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号

400 6060 780
工作时间 AM08:30 PM05:30

6 949008 407937

优利士®

优能佳®

3段

净含量:800克 国食注字 YP 20230164 生产日期、保质期至:见罐底

幼儿配方羊乳粉
(12-36月龄,3段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、磷脂)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、*dl-α*-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、核苷酸(5'单磷酸腺苷、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。
本产品含有乳成分。

生羊乳加工

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量			每天喂哺次数
	量匙数量	乳粉克数	温开水(ml)	
12-36个月	7	31.5	210	3

注：一优能佳平匙本产品(约4.5克)兑30毫升温开水为标准稀释法。

喂哺及注意事项

请遵照喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用。

奶具消毒及调奶方法

1. 在调配乳粉之前，请洗净、擦干双手。

2. 清洗奶杯/奶瓶、奶嘴、瓶盖。

3. 把奶杯/奶瓶放在沸水中至少煮5分钟。

4. 饮用水煮沸5分钟后，冷却至45°C左右，将正确量煮开过的温水(45°C左右)倒入消毒后的奶杯/奶瓶中。

5. 用优能佳专用量勺，参照喂哺表加入正确份量乳粉。

6. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，冷却到适合宝宝饮用的温度，可以滴一滴出来到手腕处测试温度。

标签24：

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2109	钾	mg	21	448
蛋白质	g	0.49	10.27	铜	μg	17.9	377.0
脂肪	g	1.22	25.82	镁	mg	1.6	34.7
亚油酸	g	0.16	3.46	铁	mg	0.19	4.02
α-亚麻酸	mg	20	425	锌	mg	0.18	3.73
碳水化合物	g	2.7	56.58	锰	μg	2.49	52.43
维生素				钙	mg	16	330
维生素A	μg RE	17	367	磷	mg	10	215
维生素D	μg	0.60	12.65	碘	μg	4.5	94.9
维生素E	mg α-TE	0.27	5.79	氯	mg	15	324
维生素K_1	μg	1.71	36.12	硒	μg	0.90	18.98
维生素B_1	μg	25	524	可选择成分			
维生素B_2	μg	35	734	肌醇	mg	3.0	62.8
维生素B_6	μg	13.5	283.7	牛磺酸	mg	1.6	34.2
维生素B_{12}	μg	0.124	2.620	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.9
烟酸（烟酰胺）	μg	144	3031	二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.2	109.6
叶酸	μg	4.3	90.5	膳食纤维			
泛酸	μg	171	3615	低聚半乳糖	g	0.03	0.56
维生素C	mg	4.3	91.3	聚葡萄糖	g	0.07	1.57
生物素	μg	0.69	14.51	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.8
胆碱	mg	6.0	126.5	乳铁蛋白	mg	1.5	32.6
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	60.2
钠	mg	9	185	说明：每100mL奶液含乳粉13.5g			

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K_1)、盐酸硫胺素(维生素B_1)、核黄素(维生素B_2)、盐酸吡哆醇(维生素B_6)、氰钴胺(维生素B_{12})、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。
本产品含有乳成分。

优利士®

贝博儿®



1段

净含量:100克　国食注字 YP20230165　生产日期、保质期至:见罐底

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
0-1周	60	2	8
1-2周	90	3	6
2-4周	120	4	5
1-2月	150	5	5
2-4月	180	6	5
4-6月	210	7	5

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

产品类别：婴儿配方食品
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法



调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。



依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。



取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。



盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。



6 949008 408606

标签25：

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2109	钾	mg	21	448
蛋白质	g	0.49	10.27	铜	μg	17.9	377.0
脂肪	g	1.22	25.82	镁	mg	1.6	34.7
亚油酸	g	0.16	3.46	铁	mg	0.19	4.02
α-亚麻酸	mg	20	425	锌	mg	0.18	3.73
碳水化合物	g	2.7	56.58	锰	μg	2.49	52.43
维生素				钙	mg	16	330
维生素A	μg RE	17	367	磷	mg	10	215
维生素D	μg	0.60	12.65	碘	μg	4.5	94.9
维生素E	mg α-TE	0.27	5.79	氯	mg	15	324
维生素K_1	μg	1.71	36.12	硒	μg	0.90	18.98
维生素B_1	μg	25	524	可选择成分			
维生素B_2	μg	35	734	肌醇	mg	3.0	62.8
维生素B_6	μg	13.5	283.7	牛磺酸	mg	1.6	34.2
维生素B_{12}	μg	0.124	2.620	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.9
烟酸(烟酰胺)	μg	144	3031	二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.2	109.6
叶酸	μg	4.3	90.5	膳食纤维			
泛酸	μg	171	3615	低聚半乳糖	g	0.03	0.56
维生素C	mg	4.3	91.3	聚葡萄糖	g	0.07	1.57
生物素	μg	0.69	14.51	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.8
胆碱	mg	6.0	126.5	乳铁蛋白	mg	1.5	32.6
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	60.2
钠	mg	9	185	说明：每100mL奶液含乳粉13.5g			

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K_1)、盐酸硫胺素(维生素B_1)、核黄素(维生素B_2)、盐酸吡哆醇(维生素B_6)、氰钴胺(维生素B_{12})、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。
本产品含有乳成分。

优利士®



1段

净含量:400克 国食注字YP20230165 生产日期、保质期至:见罐底

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
0-1周	60	2	8
1-2周	90	3	6
2-4周	120	4	5
1-2月	150	5	5
2-4月	180	6	5
4-6月	210	7	5

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

产品类别：婴儿配方食品
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

奶具消毒及食用方法


调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。


依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。


取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。


盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

6 949008 408613

标签26：

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂）、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂（DHA）、花生四烯酸油脂（ARA）、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯（维生素A）、胆钙化醇（维生素D）、dl-α-醋酸生育酚（维生素E）、植物甲萘醌（维生素K_1）、盐酸硫胺素（维生素B_1）、核黄素（维生素B_2）、盐酸吡哆醇（维生素B_6）、氰钴胺（维生素B_{12}）、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙（泛酸）、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠（维生素C）、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

本产品含有乳成分。

产品类别：婴儿配方食品
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

6 949008 408651

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2109
蛋白质	g	0.49	10.27
脂肪	g	1.22	25.82
亚油酸	g	0.16	3.46
α-亚麻酸	mg	20	425
碳水化合物	g	2.7	56.58
维生素			
维生素A	μg RE	17	367
维生素D	μg	0.60	12.65
维生素E	mg α-TE	0.27	5.79
维生素K_1	μg	1.71	36.12
维生素B_1	μg	25	524
维生素B_2	μg	35	734
维生素B_6	μg	13.5	283.7
维生素B_{12}	μg	0.124	2.620
烟酸（烟酰胺）	μg	144	3031
叶酸	μg	4.3	90.5
泛酸	μg	171	3615
维生素C	mg	4.3	91.3
生物素	μg	0.69	14.51
胆碱	mg	6.0	126.5
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	21	448
铜	μg	17.9	377.0
镁	mg	1.6	34.7
铁	mg	0.19	4.02
锌	mg	0.18	3.73
锰	μg	2.49	52.43
钙	mg	16	330
磷	mg	10	215
碘	μg	4.5	94.9
氯	mg	15	324
硒	μg	0.90	18.98
可选择成分			
肌醇	mg	3.0	62.8
牛磺酸	mg	1.6	34.2
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.9
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.2	109.6
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.07	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.8
乳铁蛋白	mg	1.5	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	60.2

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®



1段

净含量:700克　国食注字 YP20230165　生产日期、保质期至:见罐底

婴儿配方羊乳粉
（0-6月龄，1段）

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003



奶具消毒及食用方法

① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③ 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④ 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量（毫升）	平匙数	
0-1周	60	2	8
1-2周	90	3	6
2-4周	120	4	5
1-2月	150	5	5
2-4月	180	6	5
4-6月	210	7	5

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签27：

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂）、乳糖、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂（DHA）、花生四烯酸油脂（ARA）、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯（维生素A）、胆钙化醇（维生素D）、dl-α-醋酸生育酚（维生素E）、植物甲萘醌（维生素K_1）、盐酸硫胺素（维生素B_1）、核黄素（维生素B_2）、盐酸吡哆醇（维生素B_6）、氰钴胺（维生素B_{12}）、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙（泛酸）、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠（维生素C）、柠檬酸钠、磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

本产品含有乳成分。

产品类别：婴儿配方食品
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10765-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

6 949008 407944

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2109
蛋白质	g	0.49	10.27
脂肪	g	1.22	25.82
亚油酸	g	0.16	3.46
α-亚麻酸	mg	20	425
碳水化合物	g	2.7	56.58
维生素			
维生素A	μg RE	17	367
维生素D	μg	0.60	12.65
维生素E	mg α-TE	0.27	5.79
维生素K_1	μg	1.71	36.12
维生素B_1	μg	25	524
维生素B_2	μg	35	734
维生素B_6	μg	13.5	283.7
维生素B_{12}	μg	0.124	2.620
烟酸（烟酰胺）	μg	144	3031
叶酸	μg	4.3	90.5
泛酸	μg	171	3615
维生素C	mg	4.3	91.3
生物素	μg	0.69	14.51
胆碱	mg	6.0	126.5
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	21	448
铜	μg	17.9	377.0
镁	mg	1.6	34.7
铁	mg	0.19	4.02
锌	mg	0.18	3.73
锰	μg	2.49	52.43
钙	mg	16	330
磷	mg	10	215
碘	μg	4.5	94.9
氯	mg	15	324
硒	μg	0.90	18.98
可选择成分			
肌醇	mg	3.0	62.8
牛磺酸	mg	1.6	34.2
二十二碳六烯酸（DHA）	mg	4.5	94.9
二十碳四烯酸（ARA）	mg	5.2	109.6
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.07	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.8
乳铁蛋白	mg	1.5	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	60.2

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®



1段

净含量:800克　国食注字 YP20230165　生产日期、保质期至:见罐底

婴儿配方羊乳粉
（0-6月龄，1段）

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003



奶具消毒及食用方法

① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③ 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④ 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

婴儿月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量（毫升）	平匙数	
0-1周	60	2	8
1-2周	90	3	6
2-4周	120	4	5
1-2月	150	5	5
2-4月	180	6	5
4-6月	210	7	5

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

标签28：

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2093	钾	mg	23	488
蛋白质	g	0.58	12.10	铜	μg	14.1	294.8
脂肪	g	1.21	25.30	镁	mg	2.0	41.5
亚油酸	g	0.13	2.81	铁	mg	0.30	6.28
α-亚麻酸	mg	16	340	锌	mg	0.18	3.67
碳水化合物	g	2.6	54.97	锰	μg	2.74	57.27
维生素				钙	mg	21	445
维生素A	μg RE	23	471	磷	mg	13	280
维生素D	μg	0.60	12.56	碘	μg	4.5	94.2
维生素E	mg α-TE	0.27	5.56	氯	mg	20	421
维生素K_1	μg	1.75	36.60	硒	μg	0.66	13.77
维生素B_1	μg	25	528	可选择成分			
维生素B_2	μg	30	627	肌醇	mg	2.7	57.0
维生素B_6	μg	13.8	287.8	牛磺酸	mg	1.6	33.0
维生素B_{12}	μg	0.117	2.458	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.2
烟酸(烟酰胺)	μg	144	3005	二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.4	112.1
叶酸	μg	3.5	72.5	膳食纤维			
泛酸	μg	170	3566	低聚半乳糖	g	0.03	0.56
维生素C	mg	4.4	91.4	聚葡萄糖	g	0.08	1.57
生物素	μg	0.71	14.89	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.6
胆碱	mg	6.0	125.6	乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	69.5
钠	mg	6	123	说明：每100mL奶液含乳粉13.5g			

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K_1)、盐酸硫胺素(维生素B_1)、核黄素(维生素B_2)、盐酸吡哆醇(维生素B_6)、氰钴胺(维生素B_{12})、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。
本产品含有乳成分。

优利士®

贝博儿®



2段

净含量:400克 国食注字 YP20230166 生产日期、保质期至:见罐底

较大婴儿配方羊乳粉

(6-12月龄,2段)

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
6-12个月	210	7	3-4

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！
6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

奶具消毒及食用方法

① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③ 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④ 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

产品类别：较大婴儿配方食品
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

品牌官方网址 www.beiboer.cn
产品咨询热线 400-029-8003

6 949008 408620

标签29：

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K_1)、盐酸硫胺素(维生素B_1)、核黄素(维生素B_2)、盐酸吡哆醇(维生素B_6)、氰钴胺(维生素B_{12})、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

本产品含有乳成分。

产品类别：较大婴儿配方食品
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10766-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

6 949008 408668

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2093
蛋白质	g	0.58	12.10
脂肪	g	1.21	25.30
亚油酸	g	0.13	2.81
α-亚麻酸	mg	16	340
碳水化合物	g	2.6	54.97
维生素			
维生素A	μg RE	23	471
维生素D	μg	0.60	12.56
维生素E	mg α-TE	0.27	5.56
维生素K_1	μg	1.75	36.60
维生素B_1	μg	25	528
维生素B_2	μg	30	627
维生素B_6	μg	13.8	287.8
维生素B_{12}	μg	0.117	2.458
烟酸(烟酰胺)	μg	144	3005
叶酸	μg	3.5	72.5
泛酸	μg	170	3566
维生素C	mg	4.4	91.4
生物素	μg	0.71	14.89
胆碱	mg	6.0	125.6
矿物质			
钠	mg	6	123
钾	mg	23	488
铜	μg	14.1	294.8
镁	mg	2.0	41.5
铁	mg	0.30	6.28
锌	mg	0.18	3.67
锰	μg	2.74	57.27
钙	mg	21	445
磷	mg	13	280
碘	μg	4.5	94.2
氯	mg	20	421
硒	μg	0.66	13.77
可选择成分			
肌醇	mg	2.7	57.0
牛磺酸	mg	1.6	33.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.2
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.4	112.1
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.08	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.6
乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	69.5

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®

2段

净含量:700克　国食注字 YP20230166　生产日期、保质期至:见罐底

较大婴儿配方羊乳粉
(6—12月龄,2段)

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③ 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④ 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
6-12个月	210	7	3-4

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

标签30：

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K_1)、盐酸硫胺素(维生素B_1)、核黄素(维生素B_2)、盐酸吡哆醇(维生素B_6)、氰钴胺(维生素B_{12})、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

本产品含有乳成分。

产品类别：较大婴儿配方食品

生产批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

销售热线：029-81776389

产品属性：乳基粉状

保质期：24个月

产地：陕西 咸阳

产品标准代号：GB 10766-2021

食品生产许可证编号：SC12961042400829

6 949008 407951

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2093
蛋白质	g	0.58	12.10
脂肪	g	1.21	25.30
亚油酸	g	0.13	2.81
α-亚麻酸	mg	16	340
碳水化合物	g	2.6	54.97
维生素			
维生素A	μg RE	23	471
维生素D	μg	0.60	12.56
维生素E	mg α-TE	0.27	5.56
维生素K_1	μg	1.75	36.60
维生素B_1	μg	25	528
维生素B_2	μg	30	627
维生素B_6	μg	13.8	287.8
维生素B_{12}	μg	0.117	2.458
烟酸(烟酰胺)	μg	144	3005
叶酸	μg	3.5	72.5
泛酸	μg	170	3566
维生素C	mg	4.4	91.4
生物素	μg	0.71	14.89
胆碱	mg	6.0	125.6
矿物质			
钠	mg	6	123
钾	mg	23	488
铜	μg	14.1	294.8
镁	mg	2.0	41.5
铁	mg	0.30	6.28
锌	mg	0.18	3.67
锰	μg	2.74	57.27
钙	mg	21	445
磷	mg	13	280
碘	μg	4.5	94.2
氯	mg	20	421
硒	μg	0.66	13.77
可选择成分			
肌醇	mg	2.7	57.0
牛磺酸	mg	1.6	33.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	94.2
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.4	112.1
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.08	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.6
乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	3.3	69.5

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®

2段

净含量:800克　国食注字 YP20230166　生产日期、保质期至:见罐底

较大婴儿配方羊乳粉

(6-12月龄,2段)

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③ 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④ 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
6-12个月	210	7	3-4

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

6~12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

标签31：

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.72	14.80
脂肪	g	1.19	24.60
亚油酸	g	0.11	2.25
α-亚麻酸	mg	12	248
碳水化合物	g	2.5	52.27
维生素			
维生素A	μg RE	23	466
维生素D	μg	0.60	12.40
维生素E	mg α-TE	0.26	5.36
维生素K_1	μg	1.79	37.01
维生素B_1	μg	26	531
维生素B_2	μg	32	659
维生素B_6	μg	13.8	284.3
维生素B_{12}	μg	0.122	2.519
烟酸（烟酰胺）	μg	147	3033
叶酸	μg	3.5	72.7
泛酸	μg	180	3723
维生素C	mg	3.9	81.5
生物素	μg	0.76	15.68
矿物质			
钠	mg	7	143
钾	mg	27	560
铜	μg	14.4	298.6
镁	mg	1.9	38.3
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.15	3.04
钙	mg	24	503
磷	mg	17	354
碘	μg	2.7	55.7
氯	mg	23	484
可选择成分			
硒	μg	0.71	14.74
胆碱	mg	6.0	124.0
锰	μg	2.91	60.25
肌醇	mg	2.9	60.9
牛磺酸	mg	1.8	36.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.5	30.8
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.6	53.4
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.08	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.4
乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	79.6

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K)、盐酸硫胺素(维生素B_1)、核黄素(维生素B_2)、盐酸吡哆醇(维生素B_6)、氰钴胺(维生素B_{12})、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。
本产品含有乳成分。

生羊乳加工

优利士®

贝博儿®



3段

净含量：400克 国食注字YP20230167 生产日期、保质期至：见罐底

幼儿配方羊乳粉
(12–36月龄，3段)

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量（毫升）	平匙数	
12-36个月	210	7	3

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

奶具消毒及食用方法

① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③ 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④ 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

产品类别：幼儿配方食品
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

6 949008 408637

标签32：

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K_1)、盐酸硫胺素(维生素B_1)、核黄素(维生素B_2)、盐酸吡哆醇(维生素B_6)、氰钴胺(维生素B_{12})、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。
本产品含有乳成分。

生羊乳加工

产品类别：幼儿配方食品
生产批号：见罐底
检验合格证号：同生产批号
生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司
地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区
销售热线：029-81776389
产品属性：乳基粉状
保质期：24个月
产地：陕西 咸阳
产品标准代号：GB 10767-2021
食品生产许可证编号：SC12961042400829

6 949008 408675

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.72	14.80
脂肪	g	1.19	24.60
亚油酸	g	0.11	2.25
α-亚麻酸	mg	12	248
碳水化合物	g	2.5	52.27
维生素			
维生素A	μg RE	23	466
维生素D	μg	0.60	12.40
维生素E	mg α-TE	0.26	5.36
维生素K_1	μg	1.79	37.01
维生素B_1	μg	26	531
维生素B_2	μg	32	659
维生素B_6	μg	13.8	284.3
维生素B_{12}	μg	0.122	2.519
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3033
叶酸	μg	3.5	72.7
泛酸	μg	180	3723
维生素C	mg	3.9	81.5
生物素	μg	0.76	15.68
矿物质			
钠	mg	7	143
钾	mg	27	560
钙	μg	14.4	298.6
镁	mg	1.9	38.3
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.15	3.04
钙	mg	24	503
磷	mg	17	354
碘	μg	2.7	55.7
氯	mg	23	484
可选择成分			
硒	μg	0.71	14.74
胆碱	mg	6.0	124.0
锰	μg	2.91	60.25
肌醇	mg	2.9	60.9
牛磺酸	mg	1.8	36.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.5	30.8
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.6	53.4
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.08	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.4
乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	79.6

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®



3段

净含量:700克　国食注字 YP20230167　生产日期、保质期至:见罐底

幼儿配方羊乳粉
(12–36月龄,3段)

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003



奶具消毒及食用方法

① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③ 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④ 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
12-36个月	210	7	3

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！

标签33：

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、玉米油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油、磷脂)、聚葡萄糖、低聚半乳糖、异构化乳糖液、浓缩羊乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K_1)、盐酸硫胺素(维生素B_1)、核黄素(维生素B_2)、盐酸吡哆醇(维生素B_6)、氰钴胺(维生素B_{12})、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、肌醇、牛磺酸、L-抗坏血酸钠(维生素C)、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种Bi-07、动物双歧杆菌乳亚种HN019、磷脂。

本产品含有乳成分。

生羊乳加工

产品类别：幼儿配方食品

生产批号：见罐底

检验合格证号：同生产批号

生产者：陕西优利士乳业集团有限责任公司

地址：陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区

销售热线：029-81776389

产品属性：乳基粉状

保质期：24个月

产地：陕西 咸阳

产品标准代号：GB 10767-2021

食品生产许可证编号：SC12961042400829

6 949008 407968

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.72	14.80
脂肪	g	1.19	24.60
亚油酸	g	0.11	2.25
α-亚麻酸	mg	12	248
碳水化合物	g	2.5	52.27
维生素			
维生素A	μg RE	23	466
维生素D	μg	0.60	12.40
维生素E	mg α-TE	0.26	5.36
维生素K_1	μg	1.79	37.01
维生素B_1	μg	26	531
维生素B_2	μg	32	659
维生素B_6	μg	13.8	284.3
维生素B_{12}	μg	0.122	2.519
烟酸(烟酰胺)	μg	147	3033
叶酸	μg	3.5	72.7
泛酸	μg	180	3723
维生素C	mg	3.9	81.5
生物素	μg	0.76	15.68
矿物质			
钠	mg	7	143
钾	mg	27	560
铜	μg	14.4	298.6
镁	mg	1.9	38.3
铁	mg	0.30	6.20
锌	mg	0.15	3.04
钙	mg	24	503
磷	mg	17	354
碘	μg	2.7	55.7
氯	mg	23	484
可选择成分			
硒	μg	0.71	14.74
胆碱	mg	6.0	124.0
锰	μg	2.91	60.25
肌醇	mg	2.9	60.9
牛磺酸	mg	1.8	36.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.5	30.8
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.6	53.4
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.03	0.56
聚葡萄糖	g	0.08	1.57
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.1	2.4
乳铁蛋白	mg	1.6	32.6
酪蛋白磷酸肽	mg	3.9	79.6

说明：每100mL奶液含乳粉13.5g

优利士®

贝博儿®

3段

净含量:800克　国食注字 YP20230167　生产日期、保质期至:见罐底

幼儿配方羊乳粉
(12–36月龄,3段)

品牌官方网址
www.beiboer.cn

产品咨询热线
400-029-8003

奶具消毒及食用方法

① 调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

② 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将45°C左右准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

③ 取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

④ 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

置阴凉、干燥处贮存。食用后请将罐盖盖紧，并在一个月内用完。

喂哺用量建议表

月龄	每次乳粉用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	平匙数	
12-36个月	210	7	3

说明：每平匙净含量约4.5克

温馨提示：调奶时请使用罐内专用量匙，建议按照喂哺用量建议表冲调乳粉，请勿随意改变冲调比例，除非有专业人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害！