附件 2：陕西圣唐乳业有限公司婴幼儿配方食品产品标签信息

标签 1

食用方法



1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
2、将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40°C-50°C，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
4、盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
5、滴一滴奶液在手腕测试温度，确定适宜时即可喂哺。

喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量（平匙）	温开水量（毫升）	
0-2周	2	60	8
2-4周	3	90	7
1-2个月	4	120	6
2-3个月	5	150	6
3-4个月	6	180	5
4-6个月	7	210	5

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉≈4.4克。

温馨提示

1、对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

贮存条件

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
产地:陕西省·渭南市
电话:0913-8228385(工厂)
产品标准代号:GB 10765-2021
食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品类别及属性: 乳基 粉状 婴儿配方食品
保质期:24个月
如需了解更多产品信息，请登录 www.shengtangruye.com
营养咨询热线:400-990-0589
6 970942 483312

圣唐 SHENGTANG

国食注字YP20230217
曾用名：唯尔普思



圣唐瑞羊

1段

净含量:750克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

生产日期、保质期至及批号：见罐底喷码

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、大豆油、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019;维生素:醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱;矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠。
过敏提示:本产品含有乳成分。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2048**
蛋白质	**g**	**0.61**	**12.40**
脂肪	**g**	**1.16**	**23.80**
亚油酸	g	0.15	3.07
α-亚麻酸	mg	19	389
碳水化合物	**g**	**2.7**	**55.0**
维生素			
维生素A	μg RE	22	451
维生素D	μg	0.60	12.29
维生素E	mg α-TE	0.37	7.58
维生素K_1	μg	1.83	37.48
维生素B_1	μg	19	389
维生素B_2	μg	28	573
维生素B_6	μg	16.8	344.1
维生素B_{12}	μg	0.069	1.413
烟酸(烟酰胺)	μg	131	2683
叶酸	μg	4.0	81.9
泛酸	μg	134	2744
维生素C	mg	4.1	84.0
生物素	μg	0.49	10.04
胆碱	mg	6.0	122.9
矿物质			
钠	mg	9	184
钾	mg	22	451
铜	μg	18.5	378.9
镁	mg	1.5	30.7
铁	mg	0.19	3.89
锌	mg	0.21	4.30
锰	μg	4.57	93.59
钙	mg	16	328
磷	mg	10	205
碘	μg	4.8	98.3
氯	mg	16	328
硒	μg	0.90	18.43
可选择成分			
肌醇	mg	2.8	57.3
牛磺酸	mg	1.7	34.8
左旋肉碱	mg	0.9	18.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.2
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	102.4
低聚半乳糖	g	0.04	0.82
低聚果糖	g	0.09	1.84
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.92
叶黄素	μg	4.08	83.56
核苷酸	mg	0.9	18.4

100毫升奶液≈13.2克婴儿配方羊奶粉+90毫升水

标签 2

食用方法



1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
2、将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40°C-50°C，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
4、盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
5、滴一滴奶液在手腕测试温度，确定适宜时即可喂哺。

喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量（平匙）	温开水量（毫升）	
0-2周	2	60	8
2-4周	3	90	7
1-2个月	4	120	6
2-3个月	5	150	6
3-4个月	6	180	5
4-6个月	7	210	5

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉≈4.4克。

温馨提示

1、对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

贮存条件

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
产地:陕西省·渭南市
电话:0913-8228385(工厂)
产品标准代号:GB 10765-2021
食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品类别及属性: 乳基 粉状 婴儿配方食品
保质期:24个月
如需了解更多产品信息，请登录 www.shengtangruye.com
营养咨询热线: 400-990-0589

6 970942 483381

圣唐® SHENGTANG

国食注字YP20230217
曾用名：唯尔普思



圣唐瑞羊

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄，1段)

1段

净含量:138克

生产日期、保质期至及批号：见罐底喷码

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、大豆油、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019；维生素:脂酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱；矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠。
过敏提示:本产品含有乳成分。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2048
蛋白质	g	0.61	12.40
脂肪	g	1.16	23.80
亚油酸	g	0.15	3.07
α-亚麻酸	mg	19	389
碳水化合物	g	2.7	55.0
维生素			
维生素A	μg RE	22	451
维生素D	μg	0.60	12.29
维生素E	mg α-TE	0.37	7.58
维生素K_1	μg	1.83	37.48
维生素B_1	μg	19	389
维生素B_2	μg	28	573
维生素B_6	μg	16.8	344.1
维生素B_{12}	μg	0.069	1.413
烟酸(烟酰胺)	μg	131	2683
叶酸	μg	4.0	81.9
泛酸	μg	134	2744
维生素C	mg	4.1	84.0
生物素	μg	0.49	10.04
胆碱	mg	6.0	122.9
矿物质			
钠	mg	9	184
钾	mg	22	451
铜	μg	18.5	378.9
镁	mg	1.5	30.7
铁	mg	0.19	3.89
锌	mg	0.21	4.30
锰	μg	4.57	93.59
钙	mg	16	328
磷	mg	10	205
碘	μg	4.8	98.3
氯	mg	16	328
硒	μg	0.90	18.43
可选择成分			
肌醇	mg	2.8	57.3
牛磺酸	mg	1.7	34.8
左旋肉碱	mg	0.9	18.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.2
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	102.4
低聚半乳糖	g	0.04	0.82
低聚果糖	g	0.09	1.84
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.92
叶黄素	μg	4.08	83.56
核苷酸	mg	0.9	18.4

100毫升奶液≈13.2克婴儿配方羊奶粉+90毫升水

标签 3

食用方法



1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
2、将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40°C-50°C，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
4、盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
5、滴一滴奶液在手腕测试温度，确定适宜时即可喂哺。

喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量（平匙）	温开水量（毫升）	
6-8个月	7	210	5
8-12个月	8	240	4

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉≈4.4克。

温馨提示

1、对于6-12月龄的较大婴儿食用本品时，须配合添加辅助食品。
2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

贮存条件

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
产地:陕西省·渭南市
电话:0913-8228385(工厂)
产品标准代号:GB 10766-2021
食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品类别及属性: 乳基 粉状 较大婴儿配方食品
保质期:24个月
如需了解更多产品信息，请登录 www.shengtangruye.com
营养咨询热线:400-990-0589

6 970942 483329

圣唐® SHENGTANG

国食注字YP20230218
曾用名：唯尔普思



圣唐瑞羊

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

2段
净含量:750克

生产日期、保质期至及批号：见罐底喷码

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019;维生素:醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱;矿物质:硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。
过敏提示:本产品含有乳成分。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1998
蛋白质	g	0.72	14.40
脂肪	g	1.09	21.80
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	mg	16	320
碳水化合物	g	2.7	54.3
维生素			
维生素A	μg RE	26	519
维生素D	μg	0.60	11.99
维生素E	mg α-TE	0.38	7.59
维生素K_1	μg	2.09	41.76
维生素B_1	μg	19	380
维生素B_2	μg	24	480
维生素B_6	μg	16.0	319.7
维生素B_{12}	μg	0.069	1.379
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2757
叶酸	μg	3.9	77.9
泛酸	μg	141	2817
维生素C	mg	4.3	85.9
生物素	μg	0.54	10.79
胆碱	mg	6.0	119.9
矿物质			
钠	mg	7	140
钾	mg	24	480
铜	μg	14.3	285.7
镁	mg	1.5	30.0
铁	mg	0.30	5.99
锌	mg	0.21	4.20
锰	μg	4.38	87.51
钙	mg	22	440
磷	mg	14	280
碘	μg	4.6	91.9
氯	mg	20	400
硒	μg	0.68	13.59
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	57.9
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	1.0	20.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	89.9
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.2	103.9
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
叶黄素	μg	10.14	202.60
核苷酸	mg	0.9	18.0

100毫升奶液≈13.2克较大婴儿配方羊奶粉+90毫升水

标签 4

食用方法



1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
2、将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40°C-50°C，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
4、盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
5、滴一滴奶液在手腕测试温度，确定适宜时即可喂哺。

喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量（平匙）	温开水量（毫升）	
6-8个月	7	210	5
8-12个月	8	240	4

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉≈4.4克。

温馨提示

1、对于6~12月龄的较大婴儿食用本品时，须配合添加辅助食品。
2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

贮存条件

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
产地:陕西省·渭南市
电话:0913-8228385(工厂)
产品标准代号:GB 10766-2021
食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品类别及属性: 乳基 粉状 较大婴儿配方食品
保质期:24个月
如需了解更多产品信息，请登录 www.shengtangruye.com
营养咨询热线: 400-990-0589

6 970942 483398

圣唐 SHENGTANG

国食注字YP20230218
曾用名：唯尔普思



圣唐瑞羊

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

2段
净含量:138克

生产日期、保质期至及批号：见罐底喷码

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种BD-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、维生素、脂肪酸(视黄酯、胆钙化醇、dl-α-脂肪酸生育酚)、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、矿物质(硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。
过敏提示:本产品含有乳成分。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1998
蛋白质	g	0.72	14.40
脂肪	g	1.09	21.80
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	mg	16	320
碳水化合物	g	2.7	54.3
维生素			
维生素A	μg RE	26	519
维生素D	μg	0.60	11.99
维生素E	mg α-TE	0.38	7.59
维生素K_1	μg	2.09	41.76
维生素B_1	μg	19	380
维生素B_2	μg	24	480
维生素B_6	μg	16.0	319.7
维生素B_{12}	μg	0.069	1.379
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2757
叶酸	μg	3.9	77.9
泛酸	μg	141	2817
维生素C	mg	4.3	85.9
生物素	μg	0.54	10.79
胆碱	mg	6.0	119.9
矿物质			
钠	mg	7	140
钾	mg	24	480
铜	μg	14.3	285.7
镁	mg	1.5	30.0
铁	mg	0.30	5.99
锌	mg	0.21	4.20
锰	μg	4.38	87.51
钙	mg	22	440
磷	mg	14	280
碘	μg	4.6	91.9
氯	mg	20	400
硒	μg	0.68	13.59
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	57.9
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	1.0	20.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	89.9
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.2	103.9
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
叶黄素	μg	10.14	202.60
核苷酸	mg	0.9	18.0

100毫升奶液≈13.2克较大婴儿配方羊奶粉+90毫升水

标签 5

食用方法



1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
2、将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40°C-50°C，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
4、盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
5、滴一滴奶液在手腕测试温度，确定适宜时即可喂哺。

喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量（平匙）	温开水量（毫升）	
12-36个月	8	240	3

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉≈4.4克。

温馨提示

1、对于12~36月龄的幼儿食用本品时，须配合添加辅助食品。
2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

贮存条件

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
产地:陕西省·渭南市
电话:0913-8228385(工厂)
产品标准代号:GB 10767-2021
食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品类别及属性: 乳基 粉状 幼儿配方食品
保质期:24个月
如需了解更多产品信息，请登录 www.shengtangruye.com
营养咨询热线: 400-990-0589
6 970942 483336

圣唐® SHENGTANG

国食注字YP20230219
曾用名：唯尔普思



圣唐瑞羊

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄，3段)

3段

净含量:750克

生产日期、保质期至及批号：见罐底喷码

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、磷脂、肌醇、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019;维生素:醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素;矿物质:硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。
过敏提示:本产品含有乳成分。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2016**
蛋白质	**g**	**0.76**	**15.30**
脂肪	**g**	**1.15**	**23.10**
亚油酸	g	0.11	2.22
α-亚麻酸	mg	16	323
碳水化合物	**g**	**2.6**	**51.6**
维生素			
维生素A	μg RE	26	524
维生素D	μg	0.60	12.10
维生素E	mg α-TE	0.38	7.66
维生素K_1	μg	2.08	41.93
维生素B_1	μg	20	403
维生素B_2	μg	24	484
维生素B_6	μg	15.8	318.5
维生素B_{12}	μg	0.066	1.331
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2782
叶酸	μg	3.6	72.6
泛酸	μg	144	2903
维生素C	mg	3.7	74.6
生物素	μg	0.52	10.48
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	26	524
铜	μg	10.8	217.7
镁	mg	1.8	36.3
铁	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.20	4.03
钙	mg	22	444
磷	mg	14	282
碘	μg	4.2	84.7
氯	mg	22	444
可选择成分			
硒	μg	0.60	12.10
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	4.39	88.50
肌醇	mg	2.7	54.4
牛磺酸	mg	1.8	36.3
左旋肉碱	mg	1.0	20.2
二十二碳六烯酸 (DHA)	mg	4.2	84.7
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.6	92.7
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.79
1, 3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.02
叶黄素	μg	10.04	202.41
核苷酸	mg	0.9	18.1

100毫升奶液≈13.2克幼儿配方羊奶粉+90毫升水

标签 6

食用方法



1、冲调奶粉前须洗手，奶具在开水中消毒。
2、将饮用水倒入干净容器中煮沸后，冷却至40°C-50°C，将喂哺建议表中正确数量的水倒入奶瓶中。
3、参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中。
4、盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
5、滴一滴奶液在手腕测试温度，确定适宜时即可喂哺。

喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	奶粉用量（平匙）	温开水量（毫升）	
12-36个月	8	240	3

每30毫升温开水中加入一平匙配方羊奶粉，一平匙奶粉≈4.4克。

温馨提示

1、对于12~36月龄的幼儿食用本品时，须配合添加辅助食品。
2、请遵照喂哺建议表冲调奶粉，不正确的冲调浓度不利于您孩子的健康。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热后超过2小时的奶液勿再食用。
3、密封盖如有遗失或破损请勿食用。

贮存条件

奶粉应存放于阴凉干燥处，避免太阳直射及高温。开封后，请盖紧罐盖，并在4周内食用完，且勿放入冰箱内保存。请在保质期内食用本产品。

生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
产地:陕西省·渭南市
电话:0913-8228385(工厂)
产品标准代号:GB 10767-2021
食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品类别及属性: 乳基 粉状 幼儿配方食品
保质期:24个月
如需了解更多产品信息，请登录www.shengtangruye.com
营养咨询热线: 400-990-0589

圣唐 SHENGTANG

国食注字YP20230219
曾用名：唯尔普思



圣唐瑞羊

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄，3段)

3段

净含量:138克

生产日期、保质期至及批号：见罐底喷码

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、磷脂、肌醇、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019;维生素:脂酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-脂酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素;矿物质:硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。
过敏提示:本产品含有乳成分。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.76	15.30
脂肪	g	1.15	23.10
亚油酸	g	0.11	2.22
α-亚麻酸	mg	16	323
碳水化合物	g	2.6	51.6
维生素			
维生素A	μg RE	26	524
维生素D	μg	0.60	12.10
维生素E	mg α-TE	0.38	7.66
维生素K_1	μg	2.08	41.93
维生素B_1	μg	20	403
维生素B_2	μg	24	484
维生素B_6	μg	15.8	318.5
维生素B_{12}	μg	0.066	1.331
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2782
叶酸	μg	3.6	72.6
泛酸	μg	144	2903
维生素C	mg	3.7	74.6
生物素	μg	0.52	10.48
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	26	524
铜	μg	10.8	217.7
镁	mg	1.8	36.3
铁	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.20	4.03
钙	mg	22	444
磷	mg	14	282
碘	μg	4.2	84.7
氯	mg	22	444
可选择成分			
硒	μg	0.60	12.10
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	4.39	88.50
肌醇	mg	2.7	54.4
牛磺酸	mg	1.8	36.3
左旋肉碱	mg	1.0	20.2
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	84.7
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.6	92.7
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.79
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.02
叶黄素	μg	10.04	202.41
核苷酸	mg	0.9	18.1

100毫升奶液≈13.2克幼儿配方羊奶粉+90毫升水

标签 7

食用方法



冲调配方奶粉之前须洗手，奶具须在开水中消毒。



将饮用水倒入干净容器中煮沸后冷却至40°C-50°C，将喂哺表中正确数量的水倒入奶瓶中。



慢慢用量勺将配方奶粉倒入水中（请参照喂哺表）。



盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。



滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

贮藏方法

请置于阴凉干燥洁净处保存。开封后，盖好罐盖，并建议四周内食用完。请勿放置在冰箱内及高温、潮湿的环境中，以免影响产品的品质。

销售服务热线
400-801-9397

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、肌醇、牛磷酸、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽。

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳成分、坚果成分。

喂哺表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量（毫升）	量勺数（平勺）	
0-2周	60	2	8
2-4周	90	3	7
1-2个月	120	4	6
2-3个月	150	5	6
3-4个月	180	6	5
4-6个月	210	7	5

温馨提示

1. **对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。**
2. 未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。
3. 冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。

圣唐 SHENGTANG

圣唐美可羊

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄，1段)



净含量：800克

注册号：国食注字 YP20230220

生产日期、保质期至及批号：见罐底喷码

1

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2054**
蛋白质	**g**	**0.59**	**12.20**
脂肪	**g**	**1.17**	**24.10**
亚油酸	g	0.15	3.08
α-亚麻酸	mg	19	390
碳水化合物	**g**	**2.7**	**54.9**
维生素			
维生素A	μg RE	22	452
维生素D	μg	0.60	12.32
维生素E	mg α-TE	0.36	7.39
维生素K_1	μg	1.82	37.38
维生素B_1	μg	19	390
维生素B_2	μg	28	575
维生素B_6	μg	16.8	345.1
维生素B_{12}	μg	0.069	1.417
烟酸（烟酰胺）	μg	131	2691
叶酸	μg	4.0	82.2
泛酸	μg	134	2752
维生素C	mg	4.1	84.2
生物素	μg	0.49	10.06
胆碱	mg	6.0	123.2
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	22	452
铜	μg	18.5	380.0
镁	mg	1.5	30.8
铁	mg	0.19	3.90
锌	mg	0.21	4.31
锰	μg	4.57	93.87
钙	mg	16	329
磷	mg	10	205
碘	μg	4.8	98.6
氯	mg	16	329
硒	μg	0.90	18.49
可选择成分			
肌醇	mg	2.7	55.5
牛磷酸	mg	1.7	34.9
左旋肉碱	mg	0.9	18.5
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.4
二十碳四烯酸	mg	5.0	102.7
低聚半乳糖	g	0.04	0.89
低聚果糖	g	0.09	1.87
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.93
叶黄素	μg	4.08	83.80
乳铁蛋白	mg	0.76	15.61
酪蛋白磷酸肽	mg	1.59	32.66

100毫升奶液≈13.2克婴儿配方奶粉+90毫升水

圣唐 SHENGTANG



食品生产许可证编号：SC10561052802876
产品标准代号：GB 10765-2021
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
保质期：24个月
生产商：陕西圣唐乳业有限公司
地　址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
产　地：陕西·渭南
销售热线：400-801-9397
网　址：www.shengtangruye.com

6 970942 487211

标签 8

食用方法



冲调配方奶粉之前须洗手，奶具须在开水中消毒。



将饮用水倒入干净容器中煮沸后冷却至40℃-50℃，将喂哺表中正确数量的水倒入奶瓶中。



慢慢用量勺将配方奶粉倒入水中（请参照喂哺表）。



盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。



滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

贮藏方法

请置于阴凉干燥洁净处保存。开封后，盖好罐盖，并建议四周内食用完。请勿放置在冰箱内及高温、潮湿的环境中，以免影响产品的品质。

销售服务热线 400-801-9397

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽。

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳成分、坚果成分。

喂哺表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量（毫升）	量勺数（平勺）	
0-2周	60	2	8
2-4周	90	3	7
1-2个月	120	4	6
2-3个月	150	5	6
3-4个月	180	6	5
4-6个月	210	7	5

温馨提示

1. **对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。**
2. 未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。
3. 冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。

圣唐 SHENGTANG

圣唐美可羊

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄，1段)



净含量：400克

注册号：国食注字 YP20230220

生产日期、保质期至及批号：见罐底喷码

1

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2054**
蛋白质	**g**	**0.59**	**12.20**
脂肪	**g**	**1.17**	**24.10**
亚油酸	g	0.15	3.08
α-亚麻酸	mg	19	390
碳水化合物	**g**	**2.7**	**54.9**
维生素			
维生素A	μg RE	22	452
维生素D	μg	0.60	12.32
维生素E	mg α-TE	0.36	7.39
维生素K_1	μg	1.82	37.38
维生素B_1	μg	19	390
维生素B_2	μg	28	575
维生素B_6	μg	16.8	345.1
维生素B_{12}	μg	0.069	1.417
烟酸（烟酰胺）	μg	131	2691
叶酸	μg	4.0	82.2
泛酸	μg	134	2752
维生素C	mg	4.1	84.2
生物素	μg	0.49	10.06
胆碱	mg	6.0	123.2
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	22	452
铜	μg	18.5	380.0
镁	mg	1.5	30.8
铁	mg	0.19	3.90
锌	mg	0.21	4.31
锰	μg	4.57	93.87
钙	mg	16	329
磷	mg	10	205
碘	μg	4.8	98.6
氯	mg	16	329
硒	μg	0.90	18.49
可选择成分			
肌醇	mg	2.7	55.5
牛磺酸	mg	1.7	34.9
左旋肉碱	mg	0.9	18.5
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.4
二十碳四烯酸	mg	5.0	102.7
低聚半乳糖	g	0.04	0.89
低聚果糖	g	0.09	1.87
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.93
叶黄素	μg	4.08	83.80
乳铁蛋白	mg	0.76	15.61
酪蛋白磷酸肽	mg	1.59	32.66

100毫升奶液≈13.2克婴儿配方奶粉+90毫升水

圣唐 SHENGTANG



食品生产许可证编号：SC10561052802876

产品标准代号：GB 10765-2021

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品

保质期：24个月

生产商：陕西圣唐乳业有限公司

地　址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧

产　地：陕西·渭南

销售热线：400-801-9397

网　址：www.shengtangruye.com

6 970942 485552

标签 9

食用方法



冲调配方奶粉之前须洗手，奶具须在开水中消毒。



将饮用水倒入干净容器中煮沸后冷却至40℃-50℃，将喂哺表中正确数量的水倒入奶瓶中。



慢慢用量勺将配方奶粉倒入水中（请参照喂哺表）。



盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。



滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

贮藏方法

请置于阴凉干燥洁净处保存。开封后，盖好罐盖，并建议四周内食用完。请勿放置在冰箱内及高温、潮湿的环境中，以免影响产品的品质。

销售服务热线
400-801-9397

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽。

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳成分、坚果成分。

喂哺表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量（毫升）	量勺数（平勺）	
0-2周	60	2	8
2-4周	90	3	7
1-2个月	120	4	6
2-3个月	150	5	6
3-4个月	180	6	5
4-6个月	210	7	5

温馨提示

❶ 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
❷ 未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。
❸ 冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。

圣唐 SHENGTANG

圣唐美可羊

婴儿配方羊奶粉
（0-6月龄，1段）



净含量：100克

注册号：国食注字 YP20230220

生产日期、保质期至及批号：见罐底喷码

1

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2054**
蛋白质	**g**	**0.59**	**12.20**
脂肪	**g**	**1.17**	**24.10**
亚油酸	g	0.15	3.08
α-亚麻酸	mg	19	390
碳水化合物	**g**	**2.7**	**54.9**
维生素			
维生素A	μg RE	22	452
维生素D	μg	0.60	12.32
维生素E	mg α-TE	0.36	7.39
维生素K_1	μg	1.82	37.38
维生素B_1	μg	19	390
维生素B_2	μg	28	575
维生素B_6	μg	16.8	345.1
维生素B_{12}	μg	0.069	1.417
烟酸（烟酰胺）	μg	131	2691
叶酸	μg	4.0	82.2
泛酸	μg	134	2752
维生素C	mg	4.1	84.2
生物素	μg	0.49	10.06
胆碱	mg	6.0	123.2
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	22	452
铜	μg	18.5	380.0
镁	mg	1.5	30.8
铁	mg	0.19	3.90
锌	mg	0.21	4.31
锰	μg	4.57	93.87
钙	mg	16	329
磷	mg	10	205
碘	μg	4.8	98.6
氯	mg	16	329
硒	μg	0.90	18.49
可选择成分			
肌醇	mg	2.7	55.5
牛磺酸	mg	1.7	34.9
左旋肉碱	mg	0.9	18.5
二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.4
二十碳四烯酸	mg	5.0	102.7
低聚半乳糖	g	0.04	0.89
低聚果糖	g	0.09	1.87
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.93
叶黄素	μg	4.08	83.80
乳铁蛋白	mg	0.76	15.61
酪蛋白磷酸肽	mg	1.59	32.66

100毫升奶液≈13.2克婴儿配方奶粉+90毫升水

圣唐 SHENGTANG



食品生产许可证编号：SC10561052802876

产品标准代号：GB 10765-2021

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品

保质期：24个月

生产商：陕西圣唐乳业有限公司

地　址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧

产　地：陕西·渭南

销售热线：400-801-9397

网　址：www.shengtangruye.com

6 970942 485521

标签 10

食用方法



冲调配方奶粉之前须洗手，奶具须在开水中消毒。



将饮用水倒入干净容器中煮沸后冷却至40°C-50°C，将喂哺表中正确数量的水倒入奶瓶中。



慢慢用量勺将配方奶粉倒入水中（请参照喂哺表）。



盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。



滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

贮藏方法

请置于阴凉干燥洁净处保存。开封后，盖好罐盖，并建议四周内食用完。请勿放置在冰箱内及高温、潮湿的环境中，以免影响产品的品质。

销售服务热线
400-801-9397

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽。

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳成分、坚果成分。

喂哺表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量（毫升）	量勺数（平勺）	
6-8个月	210	7	5
8-12个月	240	8	4


温馨提示

1. **对于6~12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。**
2. 未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。
3. 冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。

圣唐 SHENGTANG

圣唐美可羊

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄，2段)



净含量：800克

注册号：国食注字 YP20230221

生产日期、保质期至及批号：见罐底喷码

2

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**1998**
蛋白质	**g**	**0.72**	**14.30**
脂肪	**g**	**1.09**	**21.80**
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	**g**	**2.7**	**54.4**
维生素			
维生素A	μg RE	26	519
维生素D	μg	0.60	11.99
维生素E	mg α-TE	0.33	6.59
维生素K_1	μg	2.03	40.56
维生素B_1	μg	19	380
维生素B_2	μg	24	480
维生素B_6	μg	16.0	319.7
维生素B_{12}	μg	0.069	1.379
烟酸（烟酰胺）	μg	138	2757
叶酸	μg	3.9	77.9
泛酸	μg	147	2937
维生素C	mg	4.3	85.9
生物素	μg	0.54	10.79
胆碱	mg	6.0	119.9
矿物质			
钠	mg	7	140
钾	mg	24	480
铜	μg	14.3	285.7
镁	mg	1.6	32.0
铁	mg	0.30	5.99
锌	mg	0.21	4.20
锰	μg	4.39	87.71
钙	mg	22	440
磷	mg	14	280
碘	μg	4.6	91.9
氯	mg	20	400
硒	μg	0.68	13.59
可选择成分			
肌醇	mg	2.4	48.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	1.0	20.0
二十二碳六烯酸	mg	4.5	89.9
二十碳四烯酸	mg	4.9	97.9
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
叶黄素	μg	10.15	202.80
乳铁蛋白	mg	0.79	15.78
酪蛋白磷酸肽	mg	2.46	49.15

100毫升奶液≈13.2克较大婴儿配方奶粉+90毫升水

圣唐 SHENGTANG



食品生产许可证编号：SC10561052802876
产品标准代号：GB 10766-2021
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
保质期：24个月
生产商：陕西圣唐乳业有限公司
地　址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
产　地：陕西·渭南
销售热线：400-801-9397
网　址：www.shengtangruye.com

6 970942 487228

标签 11

食用方法



冲调配方奶粉之前须洗手，奶具须在开水中消毒。



将饮用水倒入干净容器中煮沸后冷却至40℃-50℃，将喂哺表中正确数量的水倒入奶瓶中。



慢慢用量勺将配方奶粉倒入水中（请参照喂哺表）。



盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。



滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

贮藏方法

请置于阴凉干燥洁净处保存。开封后，盖好罐盖，并建议四周内食用完。请勿放置在冰箱内及高温、潮湿的环境中，以免影响产品的品质。

销售服务热线 400-801-9397

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽。

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳成分、坚果成分。

喂哺表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量（毫升）	量勺数（平勺）	
6-8个月	210	7	5
8-12个月	240	8	4

温馨提示

1. **对于6~12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。**
2. 未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。
3. 冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。

圣唐 SHENGTANG

圣唐美可羊

较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）



净含量：400克

注册号：国食注字 YP20230221

生产日期、保质期至及批号：见罐底喷码

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**1998**
蛋白质	**g**	**0.72**	**14.30**
脂肪	**g**	**1.09**	**21.80**
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	**g**	**2.7**	**54.4**
维生素			
维生素A	μg RE	26	519
维生素D	μg	0.60	11.99
维生素E	mg α-TE	0.33	6.59
维生素K_1	μg	2.03	40.56
维生素B_1	μg	19	380
维生素B_2	μg	24	480
维生素B_6	μg	16.0	319.7
维生素B_{12}	μg	0.069	1.379
烟酸（烟酰胺）	μg	138	2757
叶酸	μg	3.9	77.9
泛酸	μg	147	2937
维生素C	mg	4.3	85.9
生物素	μg	0.54	10.79
胆碱	mg	6.0	119.9
矿物质			
钠	mg	7	140
钾	mg	24	480
铜	μg	14.3	285.7
镁	mg	1.6	32.0
铁	mg	0.30	5.99
锌	mg	0.21	4.20
锰	μg	4.39	87.71
钙	mg	22	440
磷	mg	14	280
碘	μg	4.6	91.9
氯	mg	20	400
硒	μg	0.68	13.59
可选择成分			
肌醇	mg	2.4	48.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	1.0	20.0
二十二碳六烯酸	mg	4.5	89.9
二十碳四烯酸	mg	4.9	97.9
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
叶黄素	μg	10.15	202.80
乳铁蛋白	mg	0.79	15.78
酪蛋白磷酸肽	mg	2.46	49.15

100毫升奶液≈13.2克较大婴儿配方奶粉+90毫升水

圣唐 SHENGTANG



食品生产许可证编号：SC10561052802876
产品标准代号：GB 10766-2021
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
保质期：24个月
生产商：陕西圣唐乳业有限公司
地　址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
产　地：陕西·渭南
销售热线：400-801-9397
网　址：www.shengtangruye.com

6 970942 485569

标签 12

食用方法



冲调配方奶粉之前须洗手，奶具须在开水中消毒。



将饮用水倒入干净容器中煮沸后冷却至40°C-50°C，将喂哺表中正确数量的水倒入奶瓶中。



慢慢用量勺将配方奶粉倒入水中（请参照喂哺表）。



盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。



滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

贮藏方法

请置于阴凉干燥洁净处保存。开封后，盖好罐盖，并建议四周内食用完。请勿放置在冰箱内及高温、潮湿的环境中，以免影响产品的品质。

销售服务热线
400-801-9397

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽。

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳成分、坚果成分。

喂哺表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量（毫升）	量勺数（平勺）	
6-8个月	210	7	5
8-12个月	240	8	4

温馨提示

❶ **对于6~12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。**
❷ 未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。
❸ 冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热超过1小时的奶液勿再食用。

圣唐 SHENGTANG

圣唐美可羊

较大婴儿配方羊奶粉
（6–12月龄，2段）



净含量：100克

注册号：国食注字 YP20230221

生产日期、保质期至及批号：见罐底喷码

2

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**1998**
蛋白质	**g**	**0.72**	**14.30**
脂肪	**g**	**1.09**	**21.80**
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	**g**	**2.7**	**54.4**
维生素			
维生素A	μg RE	26	519
维生素D	μg	0.60	11.99
维生素E	mg α-TE	0.33	6.59
维生素K_1	μg	2.03	40.56
维生素B_1	μg	19	380
维生素B_2	μg	24	480
维生素B_6	μg	16.0	319.7
维生素B_{12}	μg	0.069	1.379
烟酸（烟酰胺）	μg	138	2757
叶酸	μg	3.9	77.9
泛酸	μg	147	2937
维生素C	mg	4.3	85.9
生物素	μg	0.54	10.79
胆碱	mg	6.0	119.9
矿物质			
钠	mg	7	140
钾	mg	24	480
铜	μg	14.3	285.7
镁	mg	1.6	32.0
铁	mg	0.30	5.99
锌	mg	0.21	4.20
锰	μg	4.39	87.71
钙	mg	22	440
磷	mg	14	280
碘	μg	4.6	91.9
氯	mg	20	400
硒	μg	0.68	13.59
可选择成分			
肌醇	mg	2.4	48.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	1.0	20.0
二十二碳六烯酸	mg	4.5	89.9
二十碳四烯酸	mg	4.9	97.9
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00
叶黄素	μg	10.15	202.80
乳铁蛋白	mg	0.79	15.78
酪蛋白磷酸肽	mg	2.46	49.15

100毫升奶液≈13.2克较大婴儿配方奶粉+90毫升水

圣唐 SHENGTANG



食品生产许可证编号：SC10561052802876
产品标准代号：GB 10766-2021
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
保质期：24个月
生产商：陕西圣唐乳业有限公司
地　址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
产　地：陕西-渭南
销售热线：400-801-9397
网　址：www.shengtangruye.com

6 970942 485538

标签 13

食用方法



冲调配方奶粉之前须洗手，奶具须在开水中消毒。



将饮用水倒入干净容器中煮沸后冷却至40°C-50°C，将喂哺表中正确数量的水倒入奶瓶中。



慢慢用量勺将配方奶粉倒入水中（请参照喂哺表）。



盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。



滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

贮藏方法

请置于阴凉干燥洁净处保存。开封后，盖好罐盖，并建议四周内食用完。请勿放置在冰箱内及高温、潮湿的环境中，以免影响产品的品质。

销售服务热线
400-801-9397

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、肌醇、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽。

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素。

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳成分、坚果成分。

喂哺表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量（毫升）	量勺数（平勺）	
12-36个月	240	8	3


温馨提示

1. **对于12~36月龄的幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。**
2. 未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。
3. 冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。

圣唐 SHENGTANG

圣唐美可羊

幼儿配方羊奶粉
（12-36月龄，3段）



净含量：800克

注册号：国食注字 YP20230222

生产日期、保质期至及批号：见罐底喷码

3

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2016**
蛋白质	**g**	**0.73**	**14.80**
脂肪	**g**	**1.15**	**23.10**
亚油酸	g	0.11	2.22
α-亚麻酸	mg	15	302
碳水化合物	**g**	**2.6**	**52.1**
维生素			
维生素A	μg RE	26	524
维生素D	μg	0.60	12.10
维生素E	mg α-TE	0.33	6.65
维生素K_1	μg	2.02	40.72
维生素B_1	μg	20	403
维生素B_2	μg	24	484
维生素B_6	μg	15.8	318.5
维生素B_{12}	μg	0.066	1.331
烟酸（烟酰胺）	μg	138	2782
叶酸	μg	3.6	72.6
泛酸	μg	144	2903
维生素C	mg	3.8	76.6
生物素	μg	0.52	10.48
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	26	524
铜	μg	10.8	217.7
镁	mg	1.8	36.3
铁	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.20	4.03
钙	mg	22	444
磷	mg	14	282
碘	μg	4.2	84.7
氯	mg	22	444
可选择成分			
硒	μg	0.60	12.10
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	4.40	88.70
肌醇	mg	2.3	46.4
牛磺酸	mg	1.8	36.3
左旋肉碱	mg	1.0	20.2
二十二碳六烯酸	mg	4.2	84.7
二十碳四烯酸	mg	4.6	92.7
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.79
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.02
叶黄素	μg	10.07	203.01
乳铁蛋白	mg	0.79	15.93
酪蛋白磷酸肽	mg	2.52	50.80

100毫升奶液≈13.2克幼儿配方奶粉+90毫升水

圣唐 SHENGTANG



食品生产许可证编号：SC10561052802876
产品标准代号：GB 10767-2021
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
保质期：24个月
生产商：陕西圣唐乳业有限公司
地　址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
产　地：陕西·渭南
销售热线：400-801-9397
网　址：www.shengtangruye.com

6 970942 487235

标签 14

食用方法



冲调配方奶粉之前须洗手，奶具须在开水中消毒。



将饮用水倒入干净容器中煮沸后冷却至40°C-50°C，将喂哺表中正确数量的水倒入奶瓶中。



慢慢用量勺将配方奶粉倒入水中（请参照喂哺表）。



盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。



滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

贮藏方法

请置于阴凉干燥洁净处保存。开封后，盖好罐盖，并建议四周内食用完。请勿放置在冰箱内及高温、潮湿的环境中，以免影响产品的品质。

销售服务热线
400-801-9397

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、肌醇、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽。

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素。

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳成分、坚果成分。

喂哺表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量（毫升）	量勺数（平勺）	
12-36个月	240	8	3

温馨提示

1. **对于12~36月龄的幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。**
2. 未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。
3. 冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。

圣唐 SHENGTANG

圣唐美可羊

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄，3段)



净含量：400克

注册号：国食注字 YP20230222

生产日期、保质期至及批号：见罐底喷码

3

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2016**
蛋白质	**g**	**0.73**	**14.80**
脂肪	**g**	**1.15**	**23.10**
亚油酸	g	0.11	2.22
α-亚麻酸	mg	15	302
碳水化合物	**g**	**2.6**	**52.1**
维生素			
维生素A	μg RE	26	524
维生素D	μg	0.60	12.10
维生素E	mg α-TE	0.33	6.65
维生素K_1	μg	2.02	40.72
维生素B_1	μg	20	403
维生素B_2	μg	24	484
维生素B_6	μg	15.8	318.5
维生素B_{12}	μg	0.066	1.331
烟酸（烟酰胺）	μg	138	2782
叶酸	μg	3.6	72.6
泛酸	μg	144	2903
维生素C	mg	3.8	76.6
生物素	μg	0.52	10.48
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	26	524
铜	μg	10.8	217.7
镁	mg	1.8	36.3
铁	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.20	4.03
钙	mg	22	444
磷	mg	14	282
碘	μg	4.2	84.7
氯	mg	22	444
可选择成分			
硒	μg	0.60	12.10
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	4.40	88.70
肌醇	mg	2.3	46.4
牛磺酸	mg	1.8	36.3
左旋肉碱	mg	1.0	20.2
二十二碳六烯酸	mg	4.2	84.7
二十碳四烯酸	mg	4.6	92.7
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.79
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.02
叶黄素	μg	10.07	203.01
乳铁蛋白	mg	0.79	15.93
酪蛋白磷酸肽	mg	2.52	50.80

100毫升奶液≈13.2克幼儿配方奶粉+90毫升水

圣唐 SHENGTANG



食品生产许可证编号：SC10561052802876

产品标准代号：GB 10767-2021

产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品

保质期：24个月

生产商：陕西圣唐乳业有限公司

地　址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧

产　地：陕西·渭南

销售热线：400-801-9397

网　址：www.shengtangruye.com

6 970942 485576

标签 15

食用方法

1. 冲调配方奶粉之前须洗手，奶具须在开水中消毒。
2. 将饮用水倒入干净容器中煮沸后冷却至40°C-50°C，将喂哺表中正确数量的水倒入奶瓶中。
3. 慢慢用量勺将配方奶粉倒入水中（请参照喂哺表）。
4. 盖紧奶瓶，摇匀至奶粉充分溶解。
5. 滴一滴奶液在手背测试温度，确定适宜时即可喂哺。

贮藏方法

请置于阴凉干燥洁净处保存。开封后，盖好罐盖，并建议四周内食用完。请勿放置在冰箱内及高温、潮湿的环境中，以免影响产品的品质。

销售服务热线 400-801-9397

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、核桃油、磷脂、肌醇、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽。

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素。

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳成分、坚果成分。

喂哺表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量（毫升）	量勺数（平勺）	
12-36个月	240	8	3

温馨提示

❶ 对于12~36月龄的幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
❷ 未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。
❸ 冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。

圣唐 SHENGTANG

圣唐美可羊

幼儿配方羊奶粉
（12–36月龄，3段）



净含量：100克

注册号：国食注字 YP20230222

生产日期、保质期至及批号：见罐底喷码

3

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2016**
蛋白质	**g**	**0.73**	**14.80**
脂肪	**g**	**1.15**	**23.10**
亚油酸	g	0.11	2.22
α-亚麻酸	mg	15	302
碳水化合物	**g**	**2.6**	**52.1**
维生素			
维生素A	μg RE	26	524
维生素D	μg	0.60	12.10
维生素E	mg α-TE	0.33	6.65
维生素K_1	μg	2.02	40.72
维生素B_1	μg	20	403
维生素B_2	μg	24	484
维生素B_6	μg	15.8	318.5
维生素B_{12}	μg	0.066	1.331
烟酸（烟酰胺）	μg	138	2782
叶酸	μg	3.6	72.6
泛酸	μg	144	2903
维生素C	mg	3.8	76.6
生物素	μg	0.52	10.48
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	26	524
铜	μg	10.8	217.7
镁	mg	1.8	36.3
铁	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.20	4.03
钙	mg	22	444
磷	mg	14	282
碘	μg	4.2	84.7
氯	mg	22	444
可选择成分			
硒	μg	0.60	12.10
胆碱	mg	6.0	121.0
锰	μg	4.40	88.70
肌醇	mg	2.3	46.4
牛磺酸	mg	1.8	36.3
左旋肉碱	mg	1.0	20.2
二十二碳六烯酸	mg	4.2	84.7
二十碳四烯酸	mg	4.6	92.7
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.79
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.02
叶黄素	μg	10.07	203.01
乳铁蛋白	mg	0.79	15.93
酪蛋白磷酸肽	mg	2.52	50.80

100毫升奶液≈13.2克幼儿配方奶粉+90毫升水

圣唐 SHENGTANG



食品生产许可证编号：SC10561052802876
产品标准代号：GB 10767-2021
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
保质期：24个月
生产商：陕西圣唐乳业有限公司
地　址：陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
产　地：陕西·渭南
销售热线：400-801-9397
网　址：www.shengtangruye.com

6 970942 485545

标签 16

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、大豆油、磷脂、肌醇、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

维生素:醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

*致敏物质提示:本产品含有乳成分。

贮存条件

请置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内冷藏。产品开封后,请于1个月内食用完毕,每次食用后请务必密封剩余乳粉,以免吸潮或掉入异物。

官方微信公众号
扫码关注
了解更多
获得更多资讯和会员权益

6 970942 487181

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2068**
蛋白质	**g**	**0.58**	**11.90**
脂肪	**g**	**1.20**	**24.80**
亚油酸	g	0.15	3.10
α-亚麻酸	mg	19	393
碳水化合物	**g**	**2.6**	**54.5**
维生素			
维生素A	μg RE	22	455
维生素D	μg	0.60	12.41
维生素E	mg α-TE	0.37	7.65
维生素K_1	μg	1.83	37.84
维生素B_1	μg	20	414
维生素B_2	μg	28	579
维生素B_6	μg	16.8	347.4
维生素B_{12}	μg	0.070	1.448
烟酸(烟酰胺)	μg	131	2709
叶酸	μg	4.0	82.7
泛酸	μg	134	2771
维生素C	mg	4.1	84.8
生物素	μg	0.49	10.13
胆碱	mg	6.0	124.1
矿物质			
钠	mg	9	186
钾	mg	22	455
铜	μg	18.5	382.6
镁	mg	1.5	31.0
铁	mg	0.19	3.93
锌	mg	0.21	4.34
锰	μg	4.57	94.51
钙	mg	16	331
磷	mg	10	207
碘	μg	4.8	99.3
氯	mg	16	331
硒	μg	0.90	18.61
可选择成分			
肌醇	mg	3.2	66.2
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.1
二十碳四烯酸	mg	4.9	101.3
低聚半乳糖	g	0.04	0.89
低聚果糖	g	0.09	1.87
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.96
叶黄素	μg	4.08	84.37
乳铁蛋白	mg	0.76	15.72

100毫升奶液≈13.2克婴儿配方乳粉+90毫升水

圣唐乳业

宝乐滋

1

生产日期、保质期至及批号:见罐底喷码
净含量:800克 国食注字YP20230223

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

奶具消毒及食用方法

1. 调奶之前请先洗手。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,放入沸水中煮5分钟消毒。
3. 饮用水煮沸,冷却至40°C- 50°C,预备使用。
4. 参照"喂哺用量建议表"将正确数量的水倒入奶瓶,使用专用的量勺加入乳粉。
5. 盖紧奶瓶,摇匀至乳粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

温馨提示

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平勺)	
0-2周	60	2	8
2-4周	90	3	7
1-2个月	120	4	6
2-3个月	150	5	6
3-4个月	180	6	5
4-6个月	210	7	5

温馨提示

未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。冲调好的奶液应及时饮用,喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。

食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品标准代号:GB 10765-2021
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
保质期:24个月
生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
网站:www.shengtangruye.com
产地:陕西·渭南
销售热线:029-85733375

产品咨询热线
400-034-0899

标签 17

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、大豆油、磷脂、肌醇、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

维生素:醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

*致敏物质提示:本产品含有乳成分。

贮存条件

请置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内冷藏。产品开封后,请于1个月内食用完毕,每次食用后请务必密封剩余乳粉,以免吸潮或掉入异物。

官方微信公众号
扫码关注
了解更多
获得更多资讯和会员权益

6 970942 485767

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2068**
蛋白质	**g**	**0.58**	**11.90**
脂肪	**g**	**1.20**	**24.80**
亚油酸	g	0.15	3.10
α-亚麻酸	mg	19	393
碳水化合物	**g**	**2.6**	**54.5**
维生素			
维生素A	μg RE	22	455
维生素D	μg	0.60	12.41
维生素E	mg α-TE	0.37	7.65
维生素K_1	μg	1.83	37.84
维生素B_1	μg	20	414
维生素B_2	μg	28	579
维生素B_6	μg	16.8	347.4
维生素B_{12}	μg	0.070	1.448
烟酸(烟酰胺)	μg	131	2709
叶酸	μg	4.0	82.7
泛酸	μg	134	2771
维生素C	mg	4.1	84.8
生物素	μg	0.49	10.13
胆碱	mg	6.0	124.1
矿物质			
钠	mg	9	186
钾	mg	22	455
铜	μg	18.5	382.6
镁	mg	1.5	31.0
铁	mg	0.19	3.93
锌	mg	0.21	4.34
锰	μg	4.57	94.51
钙	mg	16	331
磷	mg	10	207
碘	μg	4.8	99.3
氯	mg	16	331
硒	μg	0.90	18.61
可选择成分			
肌醇	mg	3.2	66.2
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.1
二十碳四烯酸	mg	4.9	101.3
低聚半乳糖	g	0.04	0.89
低聚果糖	g	0.09	1.87
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.96
叶黄素	μg	4.08	84.37
乳铁蛋白	mg	0.76	15.72

100毫升奶液≈13.2克婴儿配方乳粉+90毫升水

圣唐乳业

宝乐滋

生产日期、保质期至及批号:见罐底喷码
净含量:300克 国食注字YP20230223

1

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

奶具消毒及食用方法

1. 调奶之前请先洗手。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,放入沸水中煮5分钟消毒。
3. 饮用水煮沸,冷却至40°C-50°C,预备使用。
4. 参照"喂哺用量建议表"将正确数量的水倒入奶瓶,使用专用的量勺加入乳粉。
5. 盖紧奶瓶,摇匀至乳粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

温馨提示

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平勺)	
0-2周	60	2	8
2-4周	90	3	7
1-2个月	120	4	6
2-3个月	150	5	6
3-4个月	180	6	5
4-6个月	210	7	5

温馨提示

未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。冲调好的奶液应及时饮用,喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。

食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品标准代号:GB 10765-2021
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
保质期:24个月
生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
网站:www.shengtangruye.com
产地:陕西·渭南
销售热线:029-85733375

产品咨询热线
400-034-0899

标签 18

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、大豆油、磷脂、肌醇、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

维生素:醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

*致敏物质提示:本产品含有乳成分。

贮存条件

请置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内冷藏。产品开封后,请于1个月内食用完毕,每次食用后请务必密封剩余乳粉,以免吸潮或掉入异物。

官方微信公众号
扫码关注
了解更多
获得更多资讯和会员权益

6 970942 485156

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2068**
蛋白质	**g**	**0.58**	**11.90**
脂肪	**g**	**1.20**	**24.80**
亚油酸	g	0.15	3.10
α-亚麻酸	mg	19	393
碳水化合物	**g**	**2.6**	**54.5**
维生素			
维生素A	μg RE	22	455
维生素D	μg	0.60	12.41
维生素E	mg α-TE	0.37	7.65
维生素K_1	μg	1.83	37.84
维生素B_1	μg	20	414
维生素B_2	μg	28	579
维生素B_6	μg	16.8	347.4
维生素B_{12}	μg	0.070	1.448
烟酸(烟酰胺)	μg	131	2709
叶酸	μg	4.0	82.7
泛酸	μg	134	2771
维生素C	mg	4.1	84.8
生物素	μg	0.49	10.13
胆碱	mg	6.0	124.1
矿物质			
钠	mg	9	186
钾	mg	22	455
铜	μg	18.5	382.6
镁	mg	1.5	31.0
铁	mg	0.19	3.93
锌	mg	0.21	4.34
锰	μg	4.57	94.51
钙	mg	16	331
磷	mg	10	207
碘	μg	4.8	99.3
氯	mg	16	331
硒	μg	0.90	18.61
可选择成分			
肌醇	mg	3.2	66.2
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.1
二十碳四烯酸	mg	4.9	101.3
低聚半乳糖	g	0.04	0.89
低聚果糖	g	0.09	1.87
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.96
叶黄素	μg	4.08	84.37
乳铁蛋白	mg	0.76	15.72

100毫升奶液≈13.2克婴儿配方乳粉+90毫升水

圣唐乳业

宝乐滋

生产日期、保质期至及批号:见罐底喷码

净含量:75克　国食注字YP20230223

1

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄,1段)

奶具消毒及食用方法

1. 调奶之前请先洗手。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,放入沸水中煮5分钟消毒。
3. 饮用水煮沸,冷却至40°C-50°C,预备使用。
4. 参照"喂哺用量建议表"将正确数量的水倒入奶瓶,使用专用的量勺加入乳粉。
5. 盖紧奶瓶,摇匀至乳粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

温馨提示

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平勺)	
0-2周	60	2	8
2-4周	90	3	7
1-2个月	120	4	6
2-3个月	150	5	6
3-4个月	180	6	5
4-6个月	210	7	5

温馨提示

未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。冲调好的奶液应及时饮用,喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。

食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品标准代号:GB 10765-2021
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
保质期:24个月
生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
网站:www.shengtangruye.com
产地:陕西·渭南
销售热线:029-85733375

产品咨询热线
400-034-0899

标签 19

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、磷脂、肌醇、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

维生素:醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质:硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

*致敏物质提示:本产品含有乳成分。

贮存条件

请置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内冷藏。产品开封后,请于1个月内食用完毕,每次食用后请务必密封剩余乳粉,以免吸潮或掉入异物。

官方微信公众号
扫码关注
了解更多
获得更多资讯和会员权益

6 970942 487198

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2004**
蛋白质	**g**	**0.70**	**14.10**
脂肪	**g**	**1.10**	**22.00**
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	mg	16	321
碳水化合物	**g**	**2.7**	**54.5**
维生素			
维生素A	μg RE	26	521
维生素D	μg	0.60	12.02
维生素E	mg α-TE	0.38	7.62
维生素K_1	μg	2.09	41.88
维生素B_1	μg	19	381
维生素B_2	μg	24	481
维生素B_6	μg	16.0	320.6
维生素B_{12}	μg	0.069	1.383
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2766
叶酸	μg	3.9	78.2
泛酸	μg	141	2826
维生素C	mg	4.3	86.2
生物素	μg	0.54	10.82
胆碱	mg	6.0	120.2
矿物质			
钠	mg	7	140
钾	mg	24	481
铜	μg	14.3	286.6
镁	mg	1.5	30.1
铁	mg	0.30	6.01
锌	mg	0.21	4.21
锰	μg	4.38	87.78
钙	mg	22	441
磷	mg	14	281
碘	μg	4.6	92.2
氯	mg	20	401
硒	μg	0.68	13.63
可选择成分			
肌醇	mg	3.2	64.1
二十二碳六烯酸	mg	4.7	94.2
二十碳四烯酸	mg	5.3	106.2
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.77
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.01
叶黄素	μg	10.15	203.41
乳铁蛋白	mg	0.79	15.83

100毫升奶液≈13.2克较大婴儿配方乳粉+90毫升水

圣唐乳业

宝乐滋

生产日期、保质期至及批号:见罐底喷码
净含量:800克 国食注字YP20230224

2

较大婴儿配方羊乳粉
(6—12月龄,2段)

奶具消毒及食用方法

1. 调奶之前请先洗手。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,放入沸水中煮5分钟消毒。
3. 饮用水煮沸,冷却至40°C- 50°C,预备使用。
4. 参照“喂哺用量建议表”将正确数量的水倒入奶瓶,使用专用的量勺加入乳粉。
5. 盖紧奶瓶,摇匀至乳粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

温馨提示

对于6~12月龄的较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平勺)	
6-8个月	210	7	5
8-12个月	240	8	4

温馨提示

未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。冲调好的奶液应及时饮用,喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。

食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品标准代号:GB 10766-2021
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
保质期:24个月
生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
网站:www.shengtangruye.com
产地:陕西·渭南
销售热线:029-85733375

产品咨询热线
400-034-0899

标签 20

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、磷脂、肌醇、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

维生素：醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质：硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

*致敏物质提示：本产品含有乳成分。

贮存条件

请置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内冷藏。产品开封后，请于1个月内食用完毕，每次食用后请务必密封剩余乳粉，以免吸潮或掉入异物。

官方微信公众号
扫码关注
了解更多
获得更多资讯和会员权益

6 970942 485774

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2004**
蛋白质	**g**	**0.70**	**14.10**
脂肪	**g**	**1.10**	**22.00**
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	mg	16	321
碳水化合物	**g**	**2.7**	**54.5**
维生素			
维生素A	μg RE	26	521
维生素D	μg	0.60	12.02
维生素E	mg α-TE	0.38	7.62
维生素K_1	μg	2.09	41.88
维生素B_1	μg	19	381
维生素B_2	μg	24	481
维生素B_6	μg	16.0	320.6
维生素B_{12}	μg	0.069	1.383
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2766
叶酸	μg	3.9	78.2
泛酸	μg	141	2826
维生素C	mg	4.3	86.2
生物素	μg	0.54	10.82
胆碱	mg	6.0	120.2
矿物质			
钠	mg	7	140
钾	mg	24	481
铜	μg	14.3	286.6
镁	mg	1.5	30.1
铁	mg	0.30	6.01
锌	mg	0.21	4.21
锰	μg	4.38	87.78
钙	mg	22	441
磷	mg	14	281
碘	μg	4.6	92.2
氯	mg	20	401
硒	μg	0.68	13.63
可选择成分			
肌醇	mg	3.2	64.1
二十二碳六烯酸	mg	4.7	94.2
二十碳四烯酸	mg	5.3	106.2
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.77
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.01
叶黄素	μg	10.15	203.41
乳铁蛋白	mg	0.79	15.83

100毫升奶液≈13.2克较大婴儿配方乳粉+90毫升水

圣唐乳业

宝乐滋

生产日期、保质期至及批号：见罐底喷码

净含量：300克 国食注字YP20230224

2

较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄，2段)

奶具消毒及食用方法

1. 调奶之前请先洗手。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净，放入沸水中煮5分钟消毒。
3. 饮用水煮沸，冷却至40°C-50°C，预备使用。
4. 参照“喂哺用量建议表”将正确数量的水倒入奶瓶，使用专用的量勺加入乳粉。
5. 盖紧奶瓶，摇匀至乳粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度，确定温度适宜时即可喂哺。

温馨提示

对于6~12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平勺)	
6-8个月	210	7	5
8-12个月	240	8	4

温馨提示

未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。冲调好的奶液应及时饮用，喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。

食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品标准代号:GB 10766-2021
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
保质期:24个月
生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
网站:www.shengtangruye.com
产地:陕西·渭南
销售热线:029-85733375

产品咨询热线
400-034-0899

标签 21

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、磷脂、肌醇、氯化胆碱、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

维生素:醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素。

矿物质:硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

*致敏物质提示:本产品含有乳成分。

贮存条件

请置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内冷藏。产品开封后,请于1个月内食用完毕,每次食用后请务必密封剩余乳粉,以免吸潮或掉入异物。

官方微信公众号
扫码关注
了解更多
获得更多资讯和会员权益

6 970942 487204

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2028**
蛋白质	**g**	**0.72**	**14.70**
脂肪	**g**	**1.17**	**23.70**
亚油酸	g	0.11	2.23
α-亚麻酸	mg	15	304
碳水化合物	**g**	**2.5**	**51.6**
维生素			
维生素A	μg RE	26	527
维生素D	μg	0.60	12.17
维生素E	mg α-TE	0.38	7.71
维生素K_1	μg	2.08	42.18
维生素B_1	μg	20	406
维生素B_2	μg	24	487
维生素B_6	μg	15.8	320.4
维生素B_{12}	μg	0.066	1.338
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2799
叶酸	μg	3.6	73.0
泛酸	μg	141	2859
维生素C	mg	3.8	77.1
生物素	μg	0.52	10.55
矿物质			
钠	mg	7	142
钾	mg	26	527
铜	μg	10.8	219.0
镁	mg	1.8	36.5
铁	mg	0.30	6.08
锌	mg	0.20	4.06
钙	mg	22	446
磷	mg	14	284
碘	μg	4.2	85.2
氯	mg	22	446
可选择成分			
硒	μg	0.60	12.17
胆碱	mg	6.0	121.7
锰	μg	4.40	89.23
肌醇	mg	3.1	62.9
二十二碳六烯酸	mg	4.6	93.3
二十碳四烯酸	mg	5.0	101.4
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.79
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.04
叶黄素	μg	10.06	204.02
乳铁蛋白	mg	0.78	15.82

100毫升奶液≈13.2克幼儿配方乳粉+90毫升水

圣唐乳业

宝乐滋

生产日期、保质期至及批号:见罐底喷码
净含量:800克 国食注字YP20230225

3

幼儿配方羊乳粉
(12–36月龄,3段)

奶具消毒及食用方法

1. 调奶之前请先洗手。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,放入沸水中煮5分钟消毒。
3. 饮用水煮沸,冷却至40°C- 50°C,预备使用。
4. 参照"喂哺用量建议表"将正确数量的水倒入奶瓶,使用专用的量勺加入乳粉。
5. 盖紧奶瓶,摇匀至乳粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

温馨提示

对于12~36月龄的幼儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平勺)	
12-36个月	240	8	3

温馨提示

未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。冲调好的奶液应及时饮用,喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。

食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品标准代号:GB 10767-2021
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
保质期:24个月
生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
网站:www.shengtangruye.com
产地:陕西·渭南
销售热线:029-85733375

产品咨询热线
400-034-0899

标签 22

配料表

生羊乳、脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、大豆油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、磷脂、肌醇、氯化胆碱、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

维生素:醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素。

矿物质:硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

*致敏物质提示:本产品含有乳成分。

贮存条件

请置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内冷藏。产品开封后,请于1个月内食用完毕,每次食用后请务必密封剩余乳粉,以免吸潮或掉入异物。

官方微信公众号
扫码关注
了解更多
获得更多资讯和会员权益

6 970942 485781

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	**kJ**	**100**	**2028**
蛋白质	**g**	**0.72**	**14.70**
脂肪	**g**	**1.17**	**23.70**
亚油酸	g	0.11	2.23
α-亚麻酸	mg	15	304
碳水化合物	**g**	**2.5**	**51.6**
维生素			
维生素A	μg RE	26	527
维生素D	μg	0.60	12.17
维生素E	mg α-TE	0.38	7.71
维生素K_1	μg	2.08	42.18
维生素B_1	μg	20	406
维生素B_2	μg	24	487
维生素B_6	μg	15.8	320.4
维生素B_{12}	μg	0.066	1.338
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2799
叶酸	μg	3.6	73.0
泛酸	μg	141	2859
维生素C	mg	3.8	77.1
生物素	μg	0.52	10.55
矿物质			
钠	mg	7	142
钾	mg	26	527
铜	μg	10.8	219.0
镁	mg	1.8	36.5
铁	mg	0.30	6.08
锌	mg	0.20	4.06
钙	mg	22	446
磷	mg	14	284
碘	μg	4.2	85.2
氯	mg	22	446
可选择成分			
硒	μg	0.60	12.17
胆碱	mg	6.0	121.7
锰	μg	4.40	89.23
肌醇	mg	3.1	62.9
二十二碳六烯酸	mg	4.6	93.3
二十碳四烯酸	mg	5.0	101.4
低聚半乳糖	g	0.06	1.18
低聚果糖	g	0.09	1.79
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.04
叶黄素	μg	10.06	204.02
乳铁蛋白	mg	0.78	15.82

100毫升奶液≈13.2克幼儿配方乳粉+90毫升水

圣唐乳业 SHENGTANG INDUSTRY CO.,LTD

宝乐滋

生产日期、保质期至及批号:见罐底喷码
净含量:300克 国食注字YP20230225

3

幼儿配方羊乳粉
(12–36月龄,3段)

奶具消毒及食用方法

1. 调奶之前请先洗手。
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,放入沸水中煮5分钟消毒。
3. 饮用水煮沸,冷却至40°C-50°C,预备使用。
4. 参照“喂哺用量建议表”将正确数量的水倒入奶瓶,使用专用的量勺加入乳粉。
5. 盖紧奶瓶,摇匀至乳粉充分溶解。
6. 滴一滴奶液在手背测试温度,确定温度适宜时即可喂哺。

温馨提示

对于12~36月龄的幼儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	量勺数(平勺)	
12-36个月	240	8	3

温馨提示

未经煮沸的水、未消毒的奶具或不恰当的冲调浓度均可能引起宝宝不适。冲调好的奶液应及时饮用,喂剩或加热超过2小时的奶液勿再食用。

食品生产许可证编号:SC10561052802876
产品标准代号:GB 10767-2021
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
保质期:24个月
生产商:陕西圣唐乳业有限公司
地址:陕西省渭南市富平县高新技术产业开发区泰安路中段东侧
网站:www.shengtangruye.com
产地:陕西·渭南
销售热线:029-85733375

产品咨询热线
400-034-0899